


אשפוז בר מניעה – האם השתנה בתקופת הקורונה? עטל-שולמית גורדון, יעל אפלבוים, ציונה חקלאי אגף המידע, משרד הבריאות, ירושלים


רקע: בשנת הקורונה הראשונה 2020, שיעורי האשפוז ירדו, בשנה השנייה עלו אך עדיין היו נמוכים מהשיעור בשנת 2019. השאלה האם מגמות דומות היו באשפוז בר-מניעה, כלומר, אשפוז עקב אסתמה, COPD, CHF, יתר לחץ דם וסוכרת, שנרשמו כאבחנה עיקרית, שהם מדד לאיכות הטיפול בקהילה.
שיטות: המידע מבוסס על מאגר האשפוזים במשרד הבריאות והגדרות ה-OECD.

Age adjusted rate: percent change from 2019 All acute, non-maternal hospitalizations



פרט לחודשים
יוני-אוקטובר
2021, יש
ירידה
מרשימה
מהשיעור ב
2019, עם
ירידה גבוה
יותר לנקבות
מזכרים.

Age specific rate: change from 2019, Selected main diagnoses



השינויים דומים בכל קב' הגיל,
למעט סוכרת ואסתמה.
הירידה מאשפוז בר מניעה היה
גבוה יותר מסך האשפוז הכללי,
למעט סוכרת ויתר לחץ דם.

מסקנות: יש לעקוב אחר חולים עם מחלות כרוניות בקהילה, במיוחד במצבי לחץ כמו בתקופת הקורונה, כולל באמצעות טיפול פרונטלי או באמצעות רפואה מרחוק.