הקשר בין מועד הערכת בליעה והתאמת טיפול תזונתי במהלך אשפוז, לבין סטטוס תזונתי בעת שחרור משיקום נוירוגריאטרי

ענב הורוביץ-בור [2,1], ד"ר יוליה בוגייבסקי[1] , פרופ' מונה בועז[2]

[1] – מר"ג שיקומי בית-רבקה [2] – המחלקה למדעי התזונה, אוניברסיטת אריאל

רקע

תת- תזונה הינה אחת מההשלכות המוכרות של דיספאגיה (קיים קשר דו-כיווני בין התופעות)

מטרת המחקר

לאמוד את הקשר בין תזמון הערכת הבליעה (ה"ב) לבין סטטוס תזונתי (ס"ת) בשחרור משיקום נוירו-גריאטרי.

שיטות

- פרוספקטיבי, חד-מוסדי
- סקירת נתונים דיגיטאליים
- חלוקה ל- 2 קבוצות- ה"ב מוקדמת (עד 48 ש' מקבלה לשיקום) וה"ב מאוחרת
- ס"ת הוערך על ידי MNA-SF 2* (סמוך לקבלה וסמוך לשחרור)



השינוי בשיעור תת-תזונה בין קבלה לשחרור, בכל קבוצה



מסקנות

1. עדות לחשיבות ביצוע הערכת בליעה מוקדמת באוכלוסיית המחקר בשיקום
2. נחיצות התערבות תזונתית עקבית בשיקום
3. המערך השיקומי כפלטפורמה לשיפור ס"ת