

מדיניות הטיפול בסרטן בתקופת הפנדמיה של COVID-19: סקר בקרב רופאים אונקולוגים בישראל

גלית הירש-יחזקאל¹, שירה רמות¹, אנג'לה שטרית¹, עידו וולף²


¹ מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, מרכז רפואי שיבא ² המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי - איכילוב

הפנדמיה של COVID-19 השפיעה באופן ישיר ובלתי ישיר על חולי סרטן. מחלקות אונקולוגיות שינו דפוסי התנהלות כך שיאפשרו את המשך הטיפול בחולים, תוך הפחתת הסיכון להידבקות בנגיף

מטרה: לבחון עמדות של רופאים אונקולוגים בבתי חולים בישראל, ביחס להתנהלות המחלקות בצל מגפת ה-COVID-19


שיטות: שאלון לאונקולוגים בנוגע להתנהלות המחלקה בעת המגפה (49 משתתפים בלבד)

"להערכתך, מה אחוז החולים שהחמיצו לפחות סבב אחד מתוכנן לטיפול בסרטן, במהלך המגפה?"



"מה עמדתך ביחס לאמצעים שננקטו להגבלת הדבקה?"

להחיל רק בתקופת הסגרים (orange) להחיל גם בתקופה שבין הסגרים (grey) לא יודע (white)



80%

העריכו כי הפגיעה בטיפול נובעת מעומס במערכת הבריאות:

מחסור בכח אדם ו/או מחסור בחדרי אשפוז, בצידוד או בתרופות

60%

חשבו כי מגפת הקורונה פגעה בטיפול

50%

העריכו כי למגפה יהיו השלכות ארוכות טווח על חולי הסרטן

מעל מחצית מהרופאים טענו כי **המגפה פגעה בטיפול השוטף**, בשל העומס שנוצר על המערכת או בעקבות חולים שנמנעו מלהגיע. אולי משום כך, מחצית מהאונקולוגים העריכו כי **למגפה יהיו השלכות ארוכות טווח**, על החולים.

הדיון בנוגע להתנהלות המחלקות האונקולוגיות בזמן הקורונה צריך להוות בסיס להיערכות, לקראת מגפות אפשריות בעתיד