



Risk Ratio (RR)
השיעור מתוקן לגיל
בהשוואה
לממוצע הארצי

נפות מעל הממוצע הארצי



נפות מתחת לממוצע הארצי






שיעור מתוקן לגיל, אחוז שינוי




2019 / 2010	2021 / 2019	2021 / 2010	סה"כ
15%-	7%-	21%-	ירושלים
3%-	1%-	3%-	הצפון
17%-	7%-	22%-	חיפה
16%-	8%-	22%-	המרכז
18%-	9%-	25%-	תל אביב
16%-	10%-	24%-	הדרום
13%-	6%-	19%-	יהודה ושומרון
17%-	6%-	22%-	

מטרה: לאמוד את השינויים בשיעורי האשפוז בעשור האחרון לפי אזורים גיאוגרפיים, גיל ומין
שיטות: העבודה מבוססת על מאגר האשפוזים במשרד הבריאות, בהתאם לדוחות בתי החולים. בדקנו את שיעורי האשפוז במחלקות הכלליות ללא יולדות בעשור האחרון, 2010-2021, לפי מחוז ונפה, שיעור מתוקן לגיל ושיעור לילדים בגיל 0-14 ומבוגרים בגיל 65 ומעלה

שיעור אשפוזים ללא יולדות ל-1,000 תושבים



% שנוי 2010 \ 2021



תוצאות: שיעור האשפוזים המתוקן לגיל ירד משנת 2010 ב-21%, במחוזות ת"א והמרכז ירד ב-24-25%, במחוז הדרום ב-19%, אך במחוז ירושלים השיעור יציב יחסית. בקרב בני 65+, השיעור ירד 25-31% במרבית המחוזות, פרט ל-35% במחוז המרכז וירידה נמוכה ב-9% במחוז ירושלים. בקרב ילדים בגיל 0-14, השיעור ירד ב-26-30% במרבית המחוזות, פרט לירידה גבוהה ב-33% ביהודה ושומרון וירידה נמוכה בדרום ב-18% וירושלים ב-21%. ההבדלים לזכרים ולנקבות מצביעים על מגמות דומות. שיעור אשפוז גבוה מהממוצע הארצי נרשם בכל הנפות של מחוזות הצפון, חיפה והדרום ובנפת השרון, ואילו בנפות ת"א, פ"ת, רחובות ורמלה נרשם שיעור נמוך יותר, ובמיוחד נמצא שיעור נמוך במחוז ירושלים וביהודה ושומרון.

סיכום ומסקנות: בעשור האחרון, נרשמה מגמת ירידה בשיעור האשפוזים. השיעור ירד לזכרים ולנקבות במרבית המחוזות והנפות, בקרב ילדים ומבוגרים. אך השיעור בפריפריה נותר גבוה בהשוואה למרכז ולממוצע הארצי, עם שינוי נמוך יחסית במשך השנים. יש להמשיך לבדוק הסיבות למגמות אלו והגורמים לשיעורי האשפוז הגבוהים בפריפריה - מצאי שירותים בקהילה, מדיניות הקופות, מדיניות בתי החולים, רצף הטיפול, תחלואה ומאפיינים חברתיים כלכליים.