



טיפול בחולים לאחר שבר צוואר הירך, בעזרת תוכנת "יעץ אנדו וירטואלי" ויעוץ רוקחת קלינית שנשלחו לרופאים ראשונים

מציגים: ד"ר טוביה בייבסקי ד"ר אלכסנדר גורשטיין, ד"ר טלי שיק, ד"ר דורון פקליארן, ד"ר מאיה רוזן

רקע - מהי הבעיה/מהו הצורך:

מטופלים עם שבר צוואר הירך שלא מקבלים טיפול נגד אוסטאופורוזיס - בעלי סיכון מוגבר לשברים חוזרים, לסיבוכים קשים ולסיכון לתמותה מוקדמת. מתן טיפול תרופתי למטופלים אלו אמור למנוע שברים חוזרים, אך לפי סטטיסטיקה עולמית, אחוז מטופלים שמקבלים טיפול נדרש הינו נמוך.

תהליך עבודה ושיטות:

פיתוח אלגוריתם אשר מייצר המלצות פרטניות לגבי השלמת בירור וטיפול באוסטאופורוזיס למטופלים עם שבר צוואר הירך, באופן אוטומטי. אלגוריתם לוקח בחשבון מועדים ותוצאות של בדיקות מעבדה, טיפול נוכחי במידה ויש, ביקורים אצל רופא אנדו, התוויות נגד טיפול ועוד. על בסיס אלגוריתם נבנתה תוכנת מחשב אשר שולחת באופן אוטומטי מייל עם המלצות לרופאים ראשונים אחת לחודש - הנחיות עבור כל מטופל להשלמת בירור, שינוי/התחלת טיפול, בהתאם למצב מטופל, טיפול נוכחי והיסטוריה של טיפולים קודמים. בנוסף רוקחת קלינית מחוזית שולחת ייעוציים מרחוק עם המלצות לטיפול למטופלים מורכבים. אחת לשבוע נשלח דוח אוטומטי של יישום ההמלצות על ידי רופאים מטפלים למנהלים רפואיים במינהלות.


מטרות ויעדים

פיתוח שיטה המעודדת רופאים ראשונים להתחיל טיפול נגד אוסטאופורוזיס למטופלים אחרי שבר צוואר הירך.

ממצאים/תוצאות:

החל מה 12/2020 נשלחו המלצות ל 350 רופאים ראשונים במחוז עבור 2,500 מטופלים. החל מה- 2023 רוקחת קלינית שלחה 405 ייעוציים לרופאים ראשונים. שיעור יישום המלצות אוטומטיות עמד על 25%. עם שליחת ייעוצים של רוקחת קלינית שיעור יישום ההמלצות על ידי רופאים עלתה ל- 34.8%.

השוואת שיעור עמידה ביעד במדד איכות טיפול תרופתי לאחר שצ"י



מסקנות:

התערבות יזומה לעידוד רופאים ראשונים למתן טיפול נדרש למטופלים לאחר שבר צוואר הירך עם המלצות פרטניות ומעקב יישום ההמלצות, מאפשרת לשפר איכות טיפול באוסטאופורוזיס עבור מטופלים אלה.