

פגיה זבת חלב

טיפול בקולוסטרם בוקאלי בפגים בשבוע מתחת ל- 29

ד"ר כלנית הרשקוביץ שפורן, הגברת תמר מור, הגברת אורנה ועלני, הגברת טטיאנה בארי, הגברת סבטלנה קפניס

רקע ורציונל

חלב אם מפחית תמותה, סיבוכי פגות ומביא לתוצאה נטוירה התפתחותית טובה יותר. מתן קולוסטרם בוקאלי מפחית סיכון לאלח דם ולדלקת נמקית של המעי, מאפשר הגעה לכלכלה אנטרלית מלאה מוקדם יותר, למשקל גבוה יותר בשחרור ולקיצור משך אשפוז.

התחלת הפקת קולוסטרם על ידי סחיטה מהשד מוקדם ככל הניתן ועד 8 שעות מהלידה, מאפשרת ייצור חלב אם בכמות גדולה יותר.

מטרת העבודה

מתן קולוסטרם לכל הפגים הנולדים מתחת לשבוע 29 תוך 8 שעות מהלידה.

השיטה

הוקם צוות היגוי רב מחלקתי ורב סקטוריאלי שכלל את מחלקת ילודים ופגים, מחלקות הריון בסיכון, חדר לידה, מחלקות יולדות והתאוששות הוקם מסד נתונים

בוצע מיפוי פערים: פערי ידע, העדר תהליכי עבודה, תיעוד ובקרה, קושי בתקשורת חשיפת הצוותים לפרויקט, כתיבת הנחיות ומינוי נאמני תחום בכל מחלקה פיתוח תרשימי זרימה ורשימות תיוג לביסוס תהליכי עבודה ותקשורת בין מעברים פיתוח פורמט הדרכה עיוני ומעשי לסחיטת קולוסטרם, הדרכת צוות ויולדות פיתוח רכיב ממוחשב בתיק הרפואי לתיעוד מתן הדרכה ומתן קולוסטרם

תוצאות

טרם הפרוייקט שיעור מתן קולוסטרם היה 0-25% בשנה. לאחריו עליה שנתית ל- 91-100%.

סיכום ומסקנות

התבססות על צוות הפגיה בלבד הביאה לעליה במתן ל- 25% בלבד. פרויקט שיפור איכות חטיבתי שכלל רתימת הצוותים, הקניית ידע, כתיבת הנחיות, מנגנוני שיפור תקשורת בין מעברים והתגייסות של מספר מחלקות הביא לעליה ל- 100% לסיכום-

טיפול בקולוסטרם חיוני לאיכות הטיפול בפג. תהליך מובנה של שיפור איכות שכלל עבודת צוות ותקשורת רב מחלקתית ורב סקטוריאלית הביאה לעליה במתן ל 100%