

חום בתינוקות: מחקר פרוספקטיבי לאומי לזיהוי גורמי פניה למלר"ד ושירותי בריאות קהילתיים בישראל

חום בתינוק הינו מצב שכיח בקרב תינוקות הגורם לחודה הורית (Fever Phobia) ומוביל לפניות מרובות למלר"ד ולשירותי בריאות.

חוקרים: ד"ר שרית שמעוני קנט¹, פרופ' איתן כרם², פרופ' עידו שולט³, גב' נידאא נאטור⁴, גב' אלינה קופיטמן⁵, גב' וילן קרסק⁶, פרופ' רוזה גופין⁷
ארגון: ¹הקריה האקדמית אונו, ²בי"ח הדסה, ³בי"ח רמב"ם, ⁴הביטוח הלאומי בישראל, ⁵בי"ח סורוקה, ⁶בי"ח רבין, ⁷ביה"ס לבריאות הציבור, הדסה והאוניברסיטה העברית




מטרת המחקר

לבחון גורמי סיכון לפניה למלר"ד ושימוש בשירותי הבריאות הקהילתיים עם חום בקרב אמהות לתינוקות בריאים עד גיל 6 חודשים


מסקנות

אמהות לתינוק ראשון הן קבוצת הסיכון העקרית לפניה למלר"ד. אפשר שעות קבלת רופא נוחות מאוד בקהילה הוא חיוני כדי להפחית עומס פניות אלה.

ממוצע רמת ידע האמהות על טיפול בחום בתינוק, n=907



שימוש בשירותי בריאות עם חום בתינוק n=907



שיטה

מחקר פרוספקטיבי לאומי בקרב 6 בתי חולים (n=1,447). משתתפות המחקר מילאו שאלון במחלקות יולדות לאחר הלידה ורואיינו בטלפון כעבור חצי שנה.

תוצאות

ידע האמהות על טיפול בחום בתינוק היה נמוך לאחר לידה ובינוני לאחר שישה חודשים. 62.7% מהאמהות (n=907) דיווחו שלתינוק שלהן היה חום בשלושת החודשים האחרונים, מבין הפונים למלר"ד 38.4% אושפזו. הדיווח על חום בתינוק היה ביחס הפוך לרמת הכנסה ($p<0.024$). אמהות נתמכות ומתיעצות יותר עם משפחה, חברים ובן הזוג שלהן מאשר עם אנשי מקצועות הבריאות. זוהו שני מנבאים לפניה או אי פניה למלר"ד. אמהות לתינוק ראשון פנו יותר למלר"ד ביחס לאמהות לשני ילדים או יותר ($OR=2.04$, 95% CI=1.16-3.56); ואמהות שדיווחו על שעות קבלה נוחות מאוד לרופא בקהילה פנו פחות למלר"ד ($OR=-0.35$, 95% CI=0.15-0.78).

פרטי התקשרות

ד"ר שרית שמעוני קנט sarit.sk@ono.ac.il