

רצף הטיפול בקשישים שבריריים לאחר ניתוח אלקטיבי

מחקר במימון הביטוח הלאומי

רעות רון¹, הדר גולדשטיין¹, נטלי אהרונביץ², רויטל פייגה גרוס-נבו²
¹מכון אסותא לחקר שירותי בריאות, אסותא מרכזים רפואיים ²השירות הגריאטרי, אסותא רמת החיל

מטרות

להעריך מודל רצף טיפול
בקרב מטופלים
שבריריים העוברים
ניתוחים אלקטיביים
גדולים ברשת אסותא
מרכזים רפואיים

רקע

שבריריות היא תסמונת גריאטרית שכיחה המתאפיינת בחולשה, ירידה בכוח ובתפקוד, ומעלה את הסיכון להידרדרות בריאותית בקרב קשישים - במיוחד לאחר ניתוחים. הערכה גריאטרית מוקדמת מסייעת בשיפור תוצאות הניתוח ובהפחתת סיבוכים. עם זאת, רצף הטיפול בעת המעבר בין מסגרות בריאות מהווה גורם קריטי שלעיתים קרובות אינו מושם ביטוב.

התערבות: העברת ממצאי ההערכה
הגריאטרית ישירות לרופא המשפחה

161 מטופלים

81 ביקורת


80 התערבות

ביקורת: העברת המידע הוטלה על
המטופלים עצמם


02/23-07/24

תוצאות

חוות הרצף מול רופא.ת המשפחה
(אחוז מסכימים)



מצב פיזי ונפשי לפני ואחר הניתוח



מסקנות

- ✓ שיפור ברצף הטיפול ועלייה בשביעות רצון
- ✓ צורך בתמיכה רגשית בהחלמה
- ✓ חסמים מערכתיים ותיאום לקוי פוגעים
- ✓ העברת מידע לקויה דורשת פתרונות

המלצות מדיניות

פתרונות דיגיטליים חדשניים
הכשרות ייעודיות לרופאים
בקהילה