



אירועים מוחיים לאחר שבר בצוואר הירך: ממצאים מהמאגר הלאומי 2014-2023

יעל אפלבוים, שולמית גורדון
אגף המידע, משרד הבריאות

מטרת המחקר

הערכת שכיחות שבץ מוחי בקרב מטופלים לאחר שבר בירך והשוואת השכיחות לאוכלוסייה הכללית. שיטות: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שמבוסס על מאגר האשפוזים הלאומי. אוכלוסיית המחקר: מאושפדים בני +65 שנותחו עקב שבר בירך (2014-2023)

תקופת מעקב: מיום הניתוח ועד שנה לאחריו. קריטריון הכללה: ללא היסטוריה של אירוע מוחי או שבר בצוואר הירך ב-5 השנים הקודמות. מדדי תוצאה: שיעורי שבץ איסכמי, שבץ דימומי מתקננים לגיל.



השלכות מדיניות

שבץ מוחי הוא סיבוך שכיח ומשמעותי בקרב מטופלים לאחר שבר בירך בישראל. למרות הירידה בשיעור השבץ האיסכמי באוכלוסייה הכללית, אוכלוסיית החולים ששברו את צוואר הירך ממשיכה לסבול מסיכון מוגבר ולפיכך יש מקום לבחון צעדים מניעתיים וטיפוליים ייעודיים לאוכלוסייה פגיעה זו.

ממצאים עיקריים

סיכון מוגבר משמעותית לאחר שבר בירך:

★ שבץ דימומי: פי 10 מהאוכלוסייה הכללית

★ שבץ איסכמי: פי 16 מהאוכלוסייה הכללית

★ TIA: פי 6.6 מהאוכלוסייה הכללית