

הבנת הצורך בביצוע - Peripherally Inserted Central Catheters (PICC) אצל מטופלים

מאושפזים בחטיבה הכירורגית, כאסטרטגיה למעורבות ומחויבות המטופל לתהליך

טליה שורר, יאנה קוצר, יוסף אייזנברג ואילנה ליבשיץ ריבן

מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה

ממצאים עיקריים

תקופת המחקר דצמבר 2023 עד מאי 2025.
292 מטופלים ענו על השאלון
(Cronbach's Alpha=0.747).
נמצאו 5 גורמים: "הבנת הנחיצות" של הפרוצדורה
 $\alpha = 0.896$; שביעות רצון של המטופלים מההדרכה והשיתוף
במהלך הפעולה $\alpha = 0.77$; הבנת היתרונות של טיפול ביתי
 $\alpha = 0.747$; אומדן כאב וחרדה בעת הפרוצדורה.
"הבנת הנחיצות" נמצאה קשורה באופן מובהק עם:
תחושת היתרון להשתחרר הביתה
 $p < 0.001$ $r = 0.206$;
הדרכה ושיתוף של הצוות $p < 0.016$ $r = 0.126$;
תמיכה רגשית מהמשפחה
 $p < 0.015$ $r = 0.128$;
קשר הפוך עם גיל $p < 0.024$ $r = -0.117$;
קבלת תמיכה רגשית מהמשפחה קשורה באופן מובהק עם:
תחושת היתרון להשתחרר הביתה
 $p < 0.000$ $r = 0.307$;
הדרכה ושיתוף של הצוות $p < 0.001$ $r = 0.183$;
וקשר הפוך עם הגיל $p < 0.001$ $r = -0.183$;
הדרכה ושיתוף של הצוות נמצאה בקשר מובהק עם הפחתת
חרדה $p < 0.000$ $r = 0.385$;
ברגרסיה לינארית נמצא שהמשתנים המובהקים המנבאים
את תחושת "הבנת הנחיצות" הם הדרכת הצוות ושיתוף
פעולה $p < 0.031$ $\beta = 0.125$;
וכן תחושת היתרון להשתחרר הביתה
 $p < 0.000$ $\beta = 0.45$.

רקע

טיפול רפואי באמצעות PICC הוא הפתרון האידיאלי
לקיצור משך האשפוז והביקוש הגובר לטיפול דרך
הווריד בבית. הפעולה מתבצעת במרכז הרפואי שלנו
באשפוז היום הכירורגי על ידי צוות ייעודי. כעת, בחרנו
לבחון הבניית חזון עבור המטופלים באשר ליעדי
התהליך.
מטרות המחקר:
לבחון האם הצלחנו בקרב המטופלים המאושפזים:
"ליצור את הבנת הנחיצות של PICC"; מידת ההבנה של
היתרון "להיות בבית ולקבל טיפול דרך הוריד"; שביעות
רצון המטופלים מההדרכה ושיתוף הפעולה במהלך
הפעולה; לבדוק אומדן כאב וחרדה; לבחון את תפיסת
המטופל לגבי תמיכת המשפחה כל זאת, לצורך הבניית
אסטרטגיה למעורבות היוצרת מחויבות של המטופל
והמטפל העיקרי.

שיטות

לאחר קבלת אישור מוועדת הלסינקי (SOR-0415-23)
בוצע מחקר חתך באמצעות שאלון שניתן בסיום
הפרוצדורה. כלי המחקר כלל 10 היגדים על סולם
ליקארט ב-5 דרגות, בדק היבטים שונים בתפיסת
המטופלים את תהליך החדרת (PICC), ומשתנים
דמוגרפיים.

דיון ומסקנות:

ניכר שהמטופלים מבינים שהפיק ליין הוא פתרון אידאלי המאפשר להם להשתחרר. בנוסף, ככל שהמטופל צעיר יותר
ומקבל תמיכה רגשית מהמשפחה, השחרור לביתו נתפס כתהליך חיובי יותר.
תהליך הדרכה ושיתוף במהלך הפרוצדורה תורם להפחתת החרדה.