

אופן הלידה לאחר ניתוח קיסרי- תמונת מצב

עטל-שולמית גורדון, יעל אפלבוים


משרד הבריאות- אגף המידע

רקע: היו כ-178,000 לידות בשנה בין השנים 2020-2024, מהן כ- 18% מטרחשות באמצעות ניתוח קיסרי. שיעורי לידה נרתיקית לאחר קיסרי (VBAC) משתנים ברחבי העולם בין 10 – 50% עם השלכות משמעותיות על סיבוכים אימהיים ועל היילוד, עלויות בריאות והקצאת משאבים. הבנת דפוסי VBAC חיונית לתכנון מדיניות בריאות וקבלת החלטות קליניות.


שיטות: מחקר רטרוספקטיבי השתמש בנתונים אדמיניסטרטיביים ממאגר האשפוזים הלאומי של ישראל הנוהל במשרד הבריאות. כללנו רק לידות בקטגוריות הבאות:

- לידות ללא היסטוריה של ניתוח קיסרי ("ביקורת"),
- לידות ראשונות לאחר קיסרי ראשון שהיו ניתוחים קיסריים חוזרים ("קיסרי חוזר"),
- לידות ראשונות לאחר קיסרי ראשון שהיו נרתיקיות ((VBAC", n=16,623)


אחוז לידות קיסריות



סוג לידה אחר קיסרי ראשון



שיעור מתוקנן ללפחות לידה אחת נוספת לאחר לידה ראשונה אחרי קיסרי ראשון



אין הבדל בסיכוי לאשפוז חוזר תוך שבועיים או חודש בין לידה קיסרי חוזר ולידה נרתיקית לאחר קיסרי

מסקנות: התוצאות תומכות במדיניות המעודדת VBAC כאשר זה מתאים קלינית, בהתחשב בתוצאות פריון חיוביות לטווח ארוך

התפלגות מצטבר- שהיה לאחר לידה

