

אשפוז חוזר בתקופת משכב לידה: מחקר רב-מרכזי

אדל פרחי¹, גלית הירש-יחזקאל¹, אינה זסלבסקי-פליטאל¹, אורנה רייכמן², רוני מיימון³, יניב עובדיה⁴, מרדכי דוליצקי¹, ליאת לרנר-גבע^{1,5}
¹מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, המרכז הרפואי שיבא | ²מ"ר שערי צדק | ³מ"ר שמיר | ⁴מ"ר ברזילי | ⁵אוניברסיטת ת"א

מטרה: לאמוד את שיעור האשפוזים החוזרים בתקופת משכב הלידה (6 שבועות לאחר לידה) ולזהות מאפיינים דמוגרפיים, קליניים, ומיילדותיים, הקשורים לסיכון לאשפוז חוזר, בתקופה זו


שיטות: מחקר עוקבה היסטורי, שכלל 112,136 נשים, שילדו בין השנים 2017-2020, ב-4 מרכזים רפואיים בישראל



שיבא
תל השומר

תוצאות


1.6% (טווח 1.0%-2.7%) מכלל היולדות חזרו לאשפוז בתקופת משכב הלידה



התפלגות אשפוז חוזר לפי מספר שבועות מהלידה

מרבית האשפוזים התרחשו במהלך השבועיים שלאחר הלידה

שיעור אשפוז חוזר לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים נבחרים




מצב משפחתי


נשואה: 1.5%
לא נשואה: 2.3%

ארץ לידה


ישראל: 1.3%
אחר: 1.5%



הפריה חוץ גופית



גיל הריון



מסקנות

ישנם גורמי סיכון לאשפוז חוזר, הניתנים לזיהוי כבר במהלך אשפוז הלידה, ובהם גיל אימהי מתקדם, לידה בניתוח קיסרי, ולידה בשבוע הריון מוקדם. זיהוי גורמים אלה עשוי לאפשר **איתור מוקדם** של נשים המצויות בסיכון מוגבר.



ממצאים אלו מדגישים את הפוטנציאל ליישום **התערבות ממוקדת לאחר לידה** - כגון, מעקב מוקדם מששה שבועות - בקרב קבוצות שבסיכון, במטרה לצמצם את התופעה.

הסיכון היחסי לאשפוז חוזר לפי מספר שבועות מהלידה

משתנה	קטגוריות	OR*	95%CI
ארץ לידה	ישראל	1.00	
	אחר	1.13	0.54-2.35
ניתוח קיסרי בעבר	ללא	1.00	
	כן	1.93	1.69-2.20
גיל הריון	שבוע 37 ומעלה	1.00	
	קטן משבוע 37	2.31	1.90-2.80
משקל הילוד	≥2,500	1.00	
	1,500-<2,500	1.33	1.09-1.63
	<2,500	4.23	2.87-6.25
הפריה חוץ גופית	לא	1.00	
	כן	1.57	1.29-1.91
סוג הלידה	וגינלי	1.00	
	מכשירנית	1.39	1.11-1.74
	ניתוח קיסרי	2.25	2.01-2.53

*מתוקנן למרכז רפואי ושנת לידה (הנתונים המודגשים בצבע = מובהקות)