




הערכת שנת הפעילות הראשונה של שירות בריאות השן לנוער בסיכון במסגרות חוץ-ביתיות: צרכים,

חסמים ומדיניות

ד"ר ניצן חדד, ד"ר דן דקל, ד"ר יפעת שלו, ד"ר הדס פלמון, פרופ' לנה נטפוב.

ממצאים מרכזיים:

צורך קליני גבוה משמעותית: שיעור
ההפניה להמשך טיפול בקרב נוער בסיכון
עמד על 50.7%, לעומת ממוצע ארצי של
כ-43% ($p < 0.001$, $OR = 1.64$)



רקע:

האגף לבריאות השן תוך שיתוף פעולה עם משרד
הרווחה, השיקו שירות מניעה ראשוני במסגרות
חוץ ביתיות.
השירות כולל הדרכה להיגיינה, בדיקה וטיפול
בפלואוריד על ידי שינניות.

מטרות המחקר:

- הערכת היקף היישום וההיענות לשירות
בשנה הראשונה.
- מיפוי צרכי בריאות השן של נוער בסיכון
בהשוואה לכלל התלמידים.
- זיהוי חסמים תפעוליים ופסיכו-סוציאליים
במתן השירות.

שיטות מחקר

מחקר הערכה רטרוספקטיבי המבוסס על נתוני
שירות שהתקבלו מהחברות הזכייניות ("של
פריקטים" ו"צבר") מ-80 פנימיות בפריסה
ארצית, כ-414 כיתות.
המחקר כלל ניתוח דיווחי ביצוע של הדרכות,
מריחת לכת פלואוריד, בדיקות דנטליות
ושיעורי הפניה לטיפול.

מסקנות והמלצות:

- ישנה חשיבות גבוהה להמשך מתן השירות
והטמעתו במסגרות החוץ-ביתיות.
- מומלץ לפעול לשיפור התיאום הלוגיסטי בין
שירותי בריאות השן ומסגרות רווחה
- הסברה מותאמת: יש לפתח כלי הסברה
המותאמים פסיכולוגית לנוער בסיכון כדי
להפחית התנגדויות ולצמצם אי-שוויון
בבריאות.

חסמים שזוהו:

- קשיים בתיאום לוגיסטי מול הנהלות
המוסדות.
- קושי בקבלת הסכמת אפוטרופוס.
- סירוב השתתפות של חלק מבני הנוער.