


השפעת מלחמת "עם כלביא" על תחלואה צרברו-וסקולרית בישראל

יעל אפלבוים, אירנה ליפשיץ
אגף המידע, משרד הבריאות

ניתוח נתוני אשפוזים בבתי חולים כלליים: השוואה בין שלוש תקופות זמן


לפני המלחמה (30.05-12.06)	במהלך המלחמה (13.06-26.06)	אחרי המלחמה (27.06-10.07)
------------------------------	-------------------------------	------------------------------

שבץ איסכמי ו-TIA: תופעת ה-V-Pattern



המחקר מבוסס על נתונים אדמיניסטרטיביים ואינו מוכיח קשר סיבתי, אלא קורלציות זמן מובהקות. נבחנו אבחנות של שבץ מוחי באבחנה ראשונה או משנית, על פי קודי ICD-9

שבץ המוריהגי: דפוס התנהגות שונה



קבוצת הסיכון המרכזית:
גילאי 65-74



בקבוצה זו נרשמה הירידה החדה ביותר (34%) והזינוק הגבוה ביותר (55%) בשבץ איסכמי.

השפעה מוגברת על נשים



נשים הציגו תנודות חריפות במיוחד, עם זינוק של 65% בפניות TIA לאחר המלחמה.

הסברים אפשריים לירידה בפניות



תמותה מוגברת בבית
החשש הוא שדחיית הטיפול הובילה למקרים של תמותה בקהילה שאינם מתועדים כאשפוזים



דחיית פנייה עקב חרדה
חשש מהגעה לבתי חולים או שינוי בסדרי עדיפויות אישיים בזמן חירום



ירידה בתחלואה בפועל
ייתכן שהישארות בבית עם משפחה והפחתת לחצים מסוימים הובילו לירידה

