



מגמות בצריכת תרופות להפרעת קשב וריכוז בישראל בשנים 2020-2025

רועי רוקי, אלי מרום, ישראל פיטוסי, ויקטוריה פינקל-פקרסקי, מירי כהן-קנדלי, מירי טריינין

המחלקה ליבוא פרמצבטיקה וסמים, אגף הרוקחות

רקע

במהלך העשור האחרון חלה בישראל עלייה משמעותית בטיפול התרופתי להפרעת קשב וריכוז (ADHD). בעוד שבעבר הטיפול התבסס ברובו המכריע על נגזרות מתילפנידט, כניסתם של תכשירים חדשים לסל שירותי הבריאות והרחבת פרטוקולי הטיפול הובילו לשינוי משמעותי בכמות

שיטות מחקר


בוצע ניתוח רטרופסטיבי של נתוני היבוא המנהלים באגף הרוקחות במשרד הבריאות עבור ארבע קבוצות התכשירים: מתילפנידט, ליסדקסאמפטמין, דקסמתילפנידט ומיקס אמפטמינים. על מנת לבדוק מגמות ולנטרל את השפעת הגידול הדמוגרפי, בוצע תקנון שנתי של נתוני הצריכה אל מול נתוני האוכלוסייה הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור כל אחת משנות המחקר. הנתונים חושבו ביחידות מינון יומי מוגדר (DDD) לכל 1,000 תושבים ליום, בהתאם למתודולוגיית ארגון הבריאות העולמי לסיווג ולמינון תרופות (WHO ATC/DDD).

מטרה אפיין וניתוח השינויים הכמותיים והמבניים בדפוסי צריכה בטיפול תרופתי להפרעת קשב וריכוז בישראל בין השנים 2020-2025.


תוצאות

- בין השנים 2020 ל-2025, סך הצריכה הכוללת של תרופות ל-ADHD בישראל כמעט הוכפלה, עם עלייה של 93% מ-12.73 ל-24.58 DDD ל-1,000 איש.
- מהפך בנתח השוק: תכשירי המתילפנידט, ששלטו ב-75% מהשוק בשנת 2020, רשמו ירידה נומינלית של 14% בצריכה וצניחה בנתח השוק היחסי ל-33% בלבד בשנת 2025.
- דומיננטיות האמפטמינים: המיקס אמפטמינים הפכו לחומר המוביל בשוק בשנת 2025 עם 40% מנתח השוק (עלייה של 656% בצריכה בהשוואה ל-2020).
- מגמות צמיחה נוספות: צריכת הליסדקסאמפטמין עלתה ב-175% וצריכת הדקסמתילפנידט זינקה ב-553%. נכון לשנת 2025, נגזרות אמפטמין מהוות יחד 56% מכלל הצריכה הלאומית המתוקנת.

אחוז יחסי מסך התכשירים 2020




אחוז יחסי מסך התכשירים 2025



DDD	חומר פעיל	DDD per 1,000 inhabitants per day	
		2025	2020
30 mg	מתילפנידט	8.20	9.59
15 mg	דקסמתילפנידט	2.67	0.41
30 mg	ליסדקסאמפטמין	3.99	1.45
15 mg	מיקס אמפטמין	9.72	1.29
	סה"כ	24.58	12.73

אחוז יחסי מסך התכשירים לאורך השנים



מסקנות והמלצות

שוק הטיפול התרופתי להפרעת קשב וריכוז בישראל עבר שינוי פרדיגמה עמוק, המאופיין בהחלפת הדומיננטיות ההיסטורית של המתילפנידט בשימוש נרחב בתכשירי אמפטמינים ונגזרותיהם. הגידול המהיר בצריכה הלאומית, לצד המעבר המבני לתכשירים בעלי פרופיל פרמקולוגי שונה, מחייב מעקב רגולטורי אחר הלימות האבחון רישום המרשמים ובחינת ההשלכות הקליניות והכלכליות ארוכות הטווח של מגמות אלו.