הרדמה אזורית כאמצעי להפחתת שימוש באופיואידים ביחידה לטיפול נמרץ כללי

המרכז הרפואי קפלן

ד"ר ילנה קישינבסקי, יעל פולישוק, אמנדה גולדנברג, רחל בשארי, נוית טבק

רקע ורציונל

בעשור האחרון נרשמה עלייה משמעותית בשימוש באופיואידים, המלווה בסיבוכים רבים. היחידה לטיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי קפלן הטמיעה אסטרטגיית שיכוך כאב מולטי-מודלית, המבוססת על הרדמה אזורית לצד מיטת המטופל, כדי להשיג שיכוך כאב יעיל ובטוח יותר.




אסטרטגיה מולטי-מודלית



שימוש באופיואידים

תוצאות והשפעה קלינית

ירידה של 49% בשימוש באופיואידים



צניחה בכמות ניפוק האופיואידים מ-9,547 בשנת 2024 ל 4,757 בשנת 2025.

שיפור משמעותי במדדי הנשמה וסדציה



גמילה מהירה מהנשמה



הפחתת סדציה

פוטנציאל לנמילה מהירה מהנשמה, הפחתת הצורך בסדציה ומניעת הנשמה פולשנית.

עלייה בשימוש בחלופות בטוחות



מרקאין



קטמין

נצפתה עלייה מקבילה בשימוש במרקאין ובקטמין כאמצעים לשיכוך כאב.

הטמעה ותהליך העבודה

בניית תשתית פיזית ומקצועית



הצטיידות בעגלת בלוקים ייעודית, הכשרת רופאים מרדימים והדרכת הצוות הסיעודי.

גישה מולטי-מודלית לצד מיטת המטופל



ביצוע הרדמה אזורית בשיתוף מחלקת הרדמה ועידוד הדרכה למטופלים ולמשפחותיהם.

המרכז הרפואי קפלן
יש על מי לסמוך
מקבוצת כללית