מרכז רפואי מאיר
מסונף לפקולטה למדעי הרפואה והבריאות ע"ש גריי
אוניברסיטת תל אביב

מקבוצת כללית

שירות פיזיותרפיה וסטיבולרית במחלקה לרפואה דחופה

אביגיל הופמן BPT, מרים גרינשטיין BPT, אבנר שבתאי BPT MSc, ד"ר אלווירה חן MD, שגיב פרל BPT MSc



עוצרים את הסחרחורת כבר במיון

טיפול מיידי ב-BPPV

BPPV היא גורם מרכזי לסחרחורת במלר"ד, וניתנת לאבחון ולטיפול מיידי בתמרון ייעודי, שחוסך הדמיות, תרופות והפניות.


ובכל זאת, מטופלים רבים משתחררים ללא אבחנה וללא טיפול.

×6.5

סיכון לנפילות
ב-BPPV שלא אובחנה[1]

החלטנו לשנות את זה.

בתחילת 2026 הקמנו צוות מוביל של פיזיותרפיסטים וסטיבולריים.
העברנו סדנאות מקצועיות לרופאי המלר"ד לשיפור מיומנות באבחון סחרחורת.



עמדנו בכל שלושת היעדים

זמן הגעה
כל הקריאות נענו תוך 30 דק'
✓ יעד: עד 60 דק'

30'

טופלו בתמרון
26/26 מאובחני BPPV
✓ יעד: 100%

100%

שוחררו לביתם
25/26 מאובחני BPPV
(אחד אושפז עקב חום)
✓ יעד: 90% ומעלה

96.2%

מסקנות

1 מודל ישים
אבחון, טיפול ורצף טיפולי – כבר במיון

2 העצמה מקצועית
חיזוק המסוגלות ועבודה משותפת עם המלר"ד, נוירולוגיה ואא"ג

3 הצעד הבא
המשך פיתוח השירות והכרה מוסדית פורמלית

[1] Edlow JA, Carpenter C, Akhter M, et al. Guidelines for reasonable and appropriate care in the emergency department 3 (GRACE-3): Acute dizziness and vertigo in the emergency department. Acad Emerg Med. 2023;30(5):442-486. doi:10.1111/acem.14728