



 **Kineret®** עלון הדרכה
(anakinra) להזרקה תת עורית של



להתוויה המלאה ולפרטים נוספים
אודות התרופה, יש לעיין בעלון לרופא
כפי שאושר ע"י משרד הבריאות




לפרטים נוספים:
09-7604596

1 לפני

- יש להוציא את מזרק Kineret מהמקרר 30 דק' לפני ההזרקה
- יש לבדוק את מראה התמיסה בתוך המזרק, עליה להיות צלולה עד לבנה
- אין לנער את המזרק
- אין להסיר את מכסה המזרק עד ההזרקה
- יש לשטוף ידיים ביסודיות
- יש לבחור את אזור ההזרקה
- יש להכין את המינון הנדרש עפ"י הנחיות הרופא מומלץ להזריק את התרופה בשעה קבועה מדי יום

2 אזורים מומלצים להזרקה:

- החלק העליון של הירך
 - בטן, למעט האזור סביב הטבור (מרחק של 5 ס"מ לפחות מהטבור)
 - האזורים החיצוניים העליונים של העכוז
 - האזור החיצוני העליון של הזרועות
- יש לבחור מיקום שונה בכל הזרקה



3 הזרקה

- יש להסיר את מכסה המחט מבלי לסובב
- אין לגעת במחט או לדחוף את הבוכנה
- יש לחטא את העור ע"י שימוש במגבון אלקוהול
- יש להרים את העור בין הבוהן לאצבע המורה, מבלי ללחוץ
- יש להחדיר את המחט במלואה לתוך העור בזווית $90^{\circ} - 45^{\circ}$
- יש להזריק את הנוזל לאט ובאופן שווה
- לאחר ההזרקה, יש למשוך החוצה את המחט ולשחרר את אחיזת העור

כל מזרק מיועד להזרקה אחת בלבד. שימוש חוזר עלול לגרום לזיהום

4 מניעה והתמודדות עם תופעות לוואי של נפיחות, אודם, חבלות או גרד באזור ההזרקה

- יש להוציא את מזרק Kineret מהמקרר 30 דק' לפני ההזרקה
- יש לקרר את אזור ההזרקה לפני ואחרי ההזרקה למשך מס' דקות
- אין להזריק באזור חבול או מגורה
- במידת הצורך ועפ"י הנחיית הרופא ניתן להשתמש בסטרואידים טופיקלים או אנטיהיסטמינים

התגובה באזור ההזרקה לרוב קלה וחולפת תוך 4-6 שבועות

