


En direct de la CAF

Première mention française du Bruant à sourcils jaunes *Emberiza chrysophrys*



Frédéric Jiguet & la CAF

Le Bruant à sourcils jaunes *Emberiza chrysophrys* niche en Sibérie centrale dans la taïga, en forêt fermée ou près des clairières, principalement au nord et au nord-est du lac Baïkal ; il hiverne dans le centre et le sud-est de la Chine (Byers *et al.* 1995). Cette espèce fait partie des captures douteuses signalées par Mayaud (1936) dans son *Inventaire des oiseaux de France*.

CONTEXTE DE LA MENTION FRANÇAISE

Un spécimen de cette espèce est présent dans les collections du muséum d'histoire naturelle de Lille, Nord, référencé dans la collection dite « Degland » sous le numéro 252. Récemment, la Commission de l'Avifaune Française (CAF) publiait les éléments suivants concernant la capture de cet individu en France au XIX^e siècle (CAF 2006) :

« En parlant de cette espèce en Europe, Degland & Gerbe (1867) écrivent “*Tel est un individu qui se trouve au musée d'histoire naturelle de Lille... Le sujet [...] a été pris, au filet, derrière la citadelle de cette ville*”. Naumann (1905) suppose les captures de France et du Luxembourg douteuses, notamment car il n'y a aucune donnée de Heligoland ou du Royaume-Uni (ce qui a changé depuis). Il suppose également que c'est le même spécimen qui était au muséum de Cologne puis de Lille où Degland l'a trouvé. Naumann rapporte en effet la présence d'un spécimen capturé au filet derrière la citadelle de Cologne, conservé au muséum de cette ville en 1840, mais absent des collections en 1892. On notera que dans les écrits de Degland & Gerbe (1867), si le filet et la citadelle sont cités, le nom de la ville est absent. C'est la conjonction des deux descriptions de capture (filet, citadelle) qui fait penser à Naumann qu'il s'agit du même oiseau. Ce spécimen est toujours dans la collection « Degland » du muséum de Lille, mais en mauvais état. Il s'agit d'un mâle de 1^{re} année, dont l'identification a été confirmée par le CHN. Toutefois, la CAF considère que cette donnée est allemande et non française, le Bruant à sourcils jaunes reste donc sur la liste des espèces citées mais non admises. »

Depuis, et grâce à la publication de ces informations, de nouveaux éléments ont été portés à la connaissance de la CAF, par l'intermédiaire d'Alain Lebossé et de la conservatrice des collections du muséum de Lille, Muriel Larue-Lecouvez. Le catalogue (mammifères et oiseaux) du muséum d'histoire naturelle de Lille, de Degland, paru en 1860, indique comme origine pour ce spécimen : « 1827 - Lille - De la collection Macquart ». Il s'agit certainement de l'entomologiste P.J.M. Macquart (1776-1855), dont les collections ont été léguées à ce muséum. La première édition de l'ornithologie européenne de Degland & Gerbe, parue en 1849, signale déjà ce spécimen, et le commentaire est identique dans la seconde édition de 1867. Un morceau de catalogue des collections, commencé par Degland mais non daté et non terminé, signale que cet oiseau a été « pris aux filets en automne, derrière la citadelle de Lille ». Enfin le *Catalogue des oiseaux d'Europe* de Trouessart (1912), cite trois mentions pour l'Europe : Belgique, Luxembourg, Lille. Pour la première fois, on obtient donc des informations sur la date et le lieu de capture de cet oiseau, puisque les différents écrits cités, nouvellement portés à la connaissance de la CAF, signalent précisément que cet oiseau a été capturé en automne, en 1827, et derrière la citadelle de Lille, Nord. L'ensemble de ces éléments a conduit la CAF à considérer cette mention comme se référant bien à une donnée française, car seuls les écrits de Naumann (1905) remettent en cause cette origine, sans que la capture de l'oiseau de Cologne ne puisse être confirmée. La CAF a donc décidé de placer le Bruant à sourcils jaunes en catégorie B de la Liste des Oiseaux de France. Il s'agit de la première mention pour le Paléarctique occidental, où il existe 7 autres mentions, dont 4 au Royaume-

Uni (19 octobre 1975, Holkham Meads, Norfolk ; mâle du 12 au 23 octobre 1980, Fair Isle, Shetland ; mâle les 22 et 23 septembre 1992, North Ronaldsay, Orkney, et du 19 au 22 octobre 1994, îles Scilly ; Wright 1994). Un mâle a été capturé à Tongeren, Belgique, le 20 octobre 1966 (puis gardé en captivité jusqu'à sa mort durant l'hiver 1969-1970 ; de Smet 1996). Un individu a été capturé le 19 octobre 1982 sur l'île de Schiermonnikoog, Pays-Bas, et une donnée du 1^{er} janvier 1983 provient d'Ukraine.

DESCRIPTION DU SPÉCIMEN

Les photographies du spécimen montrent qu'il s'agit d'un bruant du genre *Emberiza*, avec un bec fort pour une espèce de ce genre. Le dessin de la tête montre une calotte brun-noir coupée d'une raie sommitale blanchâtre, des sourcils démarquant à la base du bec et très visibles en arrière de l'œil, larges et rejoignant le cou, blanchâtre avec une coloration jaunâtre prononcée depuis le bec jusque loin en arrière de l'œil ; les joues sont brun-roux entourées de brun-noir, avec un point blanc à l'arrière des parotiques (bien visible sur le côté gauche de la tête), un trait sous-mustacien clair est visible ainsi qu'un trait malaire brun-noir. La poitrine est blanchâtre rayé de brun-noir, avec

quelques plumes à coloration plus brunes sur les côtés du haut de la poitrine. Le dos est brun-roux rayé de noir (centres des plumes). Le croupion est roussâtre rayé de noir. Les rectrices sont toutes pointues, les deux plus externes sont largement blanches à leur extrémité. Sur les ailes, les moyennes couvertures sus-alaires sont brun-noir avec une extrémité blanche, formant une barre alaire, alors que les grandes couvertures présentent de larges franges crème à roussâtre. Quelques tertiaires sont encore présentes et montrent le dessin typique des bruants du genre *Emberiza*, avec un centre brun-noir et une large frange rousse montrant un décrochement net « en marche d'escalier » sur le vexille externe.

CONCLUSION

Le motif de la tête de ce spécimen, ancien (il est âgé de presque 180 ans...) et relativement abîmé, ne laisse malgré tout pas de doute sur son identité spécifique et cette identification a été validée par le Comité d'Homologation National.

La forme des rectrices indique qu'elles sont de type juvénile : il s'agit donc d'un oiseau de 1^{re} année, et une capture en automne 1827 est donc cohérente avec l'âge de cet oiseau.



1. Bruant à sourcils jaunes *Emberiza chrysophrys*, mâle 1^{re} année, capturé à Lille durant l'automne 1827 (Christophe Hildebrand). 1st-winter male Yellow-browed Bunting, mist-netted at Lille, northern France, in autumn 1827, the first-ever for the Western Palearctic.



2. Bruant à sourcils jaunes *Emberiza chrysophrys*, mâle 1^{re} année, capturé à Lille durant l'automne 1827 (Christophe Hildebrand). *1st-winter male Yellow-browed Bunting, mist-netted at Lille, northern France, in autumn 1827, the first-ever for the Western Palearctic.*



3. Bruant à sourcils jaunes *Emberiza chrysophrys*, mâle 1^{re} année, capturé à Lille durant l'automne 1827 (Christophe Hildebrand). *1st-winter male Yellow-browed Bunting, mist-netted at Lille, northern France, in autumn 1827, the first-ever for the Western Palearctic.*



4. Bruant à sourcils jaunes *Emberiza chrysophrys*, mâle, Chine, mai 2006 (Thierry Queleennec). *Male Yellow-browed Bunting, China.*

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier ici toutes les personnes qui ont permis de retrouver la trace du spécimen, documenter son identification et son histoire : Muriel Larue-Lecouvez, Christophe Hildebrand, Alain Lebossé et Marc Duquet.

BIBLIOGRAPHIE

- BYERS C., OLSSON U. & CURSON J. (1995). *Buntings and Sparrows. A guide to the Buntings and North American Sparrows*. Pica Press, The Banks.
- CAF (2006). En direct de la CAF. Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française en 2004-2005. *Ornithos* 13-4 : 244-257.
- DE SMET G. (1996). De eerste Geelbrauwgors *Emberiza chrysophrys* in het West-Palearctisch gebied : de vergeten vogel van oktober 1966. *Oriolus* 62(4) : 92-94.
- DEGLAND C.D. & GERBE Z. (1867) *Ornithologie européenne ou catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe*. 2^e édition. Baillière, Paris.
- MAYAUD N. (1936). *Inventaire des Oiseaux de France*. Société d'Études Ornithologiques, Paris
- NAUMANN J.F. (1905). *Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas*. Gera-Untermhaus, Köhler.
- TROUËSSART E.L. (1912). *Catalogue des Oiseaux d'Europe pour servir de complément et de supplément à l'Ornithologie*

européenne de Degland et Gerbe (1867). L'homme, Paris.
• WRIGHT J. (1994). The Yellow-browed Bunting on Scilly. *Birding World* 7(10) : 410-411.

SUMMARY [À VOIR PAR GW]

Yellow-browed Bunting, new to France. *A first-winter male Yellow-browed Bunting, captured in a mist-net behind the castle of Lille, Nord, northern France, in autumn 1827, constitutes the first record of this species for France. The specimen is preserved at the Museum of Natural History of Lille. Cited in many old French birding literature, the record was considered doubtful by Naumann, who suspected the bird could have been captured in Germany. However, informations gathered from the different collections' catalogues at Lille confirmed that it can be safely considered as a French record. Its identification has been validated by the French Rarities Committee, and the species was added to category B of the French list by the French Avifaunal Committee. It becomes the first record for the Western Palearctic, predating a male captured in Belgium on 20 October 1966.*

Frédéric Jiguet
Commission de l'Avifaune Française, CRBPO
55 rue Buffon, 75005 Paris