



Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2010-2012)

13^e rapport de la CAF



Pierre-André Crochet, Philippe J. Dubois, Frédéric Jiguet, Pierre Le Maréchal, Jean-Marc Pons & Pierre Yésou

Ce 13^e rapport de la Commission de l'Avifaune Française (CAF) présente les décisions prises de 2010 à 2012. Il concerne des inscriptions sur la Liste des oiseaux de France (LOF) et des modifications systématiques (rangs taxonomiques). Ces modifications systématiques suivent les décisions de l'AERC-TAC (www.aerc.eu/tac.html), le comité taxonomique consultatif européen, dont l'objectif est de proposer des recommandations validées par la majorité des cinq comités taxonomiques nationaux actuellement constitués en Europe – Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Suède.

L'identification des espèces et sous-espèces placées dans une catégorie (A, B, C, D ou E, seules les trois premières catégories formant la LOF; Dubois *et al.* 2008) a préalablement été vérifiée par le Comité d'Homologation National (CHN), dont les rapports sont publiés dans *Ornithos* (Reeber & le CHN 2011 et 2012 pour les plus récents). Les éléments de contexte qui ont conduit la CAF à inscrire un taxon en catégorie A de la Liste des oiseaux de France sont systématiquement publiés sous forme d'un « Commentaire de la CAF » associé à chaque note de première française publiée dans *Ornithos*.

PREMIÈRES FRANÇAISES PLACÉES EN CATÉGORIE A DE LA LOF

Pétrel gongon *Pterodroma feae* (Salvatori, 1899)

Au mois d'août 2010, par deux fois, un Pétrel gongon (Îles du Cap-Vert, Madère) a été photographié en mer à une centaine de kilomètres au nord-ouest d'Ouessant, Finistère. La distance entre les deux observations laisse penser qu'il s'agissait de deux individus différents. Aucune mention certaine de cette espèce n'avait pu être homologuée auparavant, car les descriptions ne permettaient pas au CHN de trancher entre le Pétrel gongon et le Pétrel de Madère *P. madeira* (Dubois *et al.* 2003), ces deux espèces étant très proches morphologiquement et génétiquement. Le nombre de couples de Pétrels de Madère ne dépassant pas la centaine, il est fort probable que les données précédentes correspondaient plutôt à *P. feae*. Les deux données de 2010 ont été attribuées sans aucun doute par le CHN au Pétrel gongon. En conséquence le binôme *P. feae*/*P. madeira* n'apparaît plus dans la LOF.

Fou à pieds rouges *Sula sula* (Linné, 1766)

Cette espèce monotypique, originaire des zones intertropicales de tous les océans, n'avait été notée que deux fois en Europe, en août puis en décembre 2010 en Espagne. Un adulte a séjourné du 2 au 14 juillet 2011 sur le lac de Sainte-Croix, à Aiguine et communes voisines, départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence. Capturé afin d'être examiné, ce fou ne montrait aucun signe de détention préalable, aucune bague ni puce électronique.

La Commission de l'Avifaune Française est un comité d'experts créé en 1987 qui maintient la Liste des oiseaux de France métropolitaine, en y ajoutant les nouvelles espèces observées en métropole et en intégrant les changements taxonomiques éventuels concernant les oiseaux français. La CAF est composée de six membres qui représentent divers organismes nationaux: Pierre Le Maréchal (professeur Université Paris-Sud, président de la CAF), Frédéric Jiguet (CRBPO/MNHN, CHN, secrétaire de la CAF), Pierre-André Crochet (CNRS), Philippe Dubois (CHN, LPO), Jean-Marc Pons (MNHN) et Pierre Yésou (ONCFS).



**Grue du Canada *Grus canadensis* (Linné, 1758)**

Cette espèce polytypique (6 sous-espèces) niche au nord-est de la Sibérie, en Alaska et à travers le Canada. En automne, les populations nordiques migrent vers le sud-est des États-Unis et le nord du Mexique alors que les populations du sud-est des États-Unis et de Cuba sont sédentaires. Il existait cinq mentions en Europe avant 2009 : Irlande, îles Féroé, Grande-Bretagne (deux mentions), Açores et Pays-Bas (un des deux oiseaux britanniques). Entre le 7 et le 12 octobre 2009, une Grue du Canada de plus d'un an a séjourné avec des Grues cendrées *Grus grus* à Pontons-sur-Adour, Landes (Toutain 2011) ; les détails de plumage visibles sur les photos disponibles indiquent qu'il s'agissait du même individu que celui présent du 22 au 29 septembre 2009 dans les Orcades, au nord de l'Écosse, avant d'être vu en migration vers le sud à travers l'Écosse le 29 septembre (*Birding World* 22 : 376-378).

Bécasseau à longs doigts *Calidris subminuta* (Middendorff, 1853)

Cette espèce monotypique niche dans l'est de la Sibérie et hiverne sur les côtes d'Asie du Sud-Est et en Australie. Un juvénile a effectué un séjour remarquable du 1^{er} novembre 2011 au 26 janvier 2012 à La Turballe, Loire-Atlantique (Raitière *et al.* 2013).


Martinet cafre *Apus caffer* (Lichtenstein, 1823)

Le Martinet cafre est une espèce monotypique nichant en Afrique subsaharienne et ponctuellement au Maroc et en Espagne. Certains auteurs distinguent deux sous-espèces – *A. c. caffer* et *A. c. streubelii* – sur un critère de longueur des ailes. Mais le patron de la variation géographique de cette mesure, observé entre les diverses populations africaines, conduit d'autres auteurs, suivis en cela par la CAF, à ne pas faire cette distinction subsppécifique (del Hoyo *et al.* 1999). Un individu a été observé le 26 juin 2011 en vol au-dessus de l'étang de la Matte, commune de Lespignan dans l'Hérault (Kayser & Clément 2013).

Paruline jaune *Dendroica petechia* (Linné, 1766)

Le 30 août 2011, dans le cadre d'opérations de baguage, une Paruline jaune (*Dendroica petechia* = *Setophaga petechia*) a été capturée à Mortagne-sur-Gironde, Charente-Maritime, en bordure de l'estuaire de la Gironde (Musseau & Herrmann 2013, Musseau *et al.* 2011). La mesure de la formule alaire a permis de rattacher cette paruline au groupe *aestiva*, qui rassemble les sous-espèces nichant de l'Amérique du Nord au Mexique et hivernant en Amérique centrale ou du Sud. C'est le seul groupe de sous-espèces qui ait été signalé jusqu'à présent dans le Paléarctique occidental, ce qui semble logique sachant que les deux autres groupes – *petechia* et *erithachorides* – sont essentiellement sédentaires.

1-3. Capture du Fou à pieds rouges *Sula sula* du lac de Sainte-Croix, juillet 2011 (Aymeric Le Calvez). Red-footed Booby, southern France.





Paruline à flancs marron *Dendroica pensylvanica* (Linné, 1766)

La Paruline à flancs marron (*Dendroica pensylvanica* = *Setophaga pensylvanica*), espèce monotypique, est une nicheuse relativement commune en Amérique du Nord. En automne, elle migre à l'intérieur des terres vers les Antilles, et il existe très peu de mentions en Europe : la dernière avant l'observation française datait d'octobre 1995 dans le Devon (Grande-Bretagne). Un mâle de 1^{re} année a séjourné sur l'île de Sein, Finistère, du 10 au 12 octobre 2010, constituant la première mention française de l'espèce (Jordan *et al.* 2012).

Vacher à tête brune *Molothrus ater* (Boddaert, 1783)

Le Vacher à tête brune est un icteridé qui niche dans la partie méridionale du Canada, à Terre-Neuve, dans le centre et l'ouest des États-Unis, en Californie et au Nouveau-Mexique. Sur les trois sous-espèces reconnues, deux vivent dans l'ouest nord-américain (*M. a. artemisae* et *M. a. obscurus*) et une dans la partie est (*M. a. ater*). L'individu observé plusieurs jours début mai 2010 sur une mangeoire à Ouzouër-sur-Trézée, Loiret (Danjon 2011) n'a toutefois pas pu être attribué à une sous-espèce particulière.

ESPÈCES NOUVELLEMENT ADMISES EN CATÉGORIE A DE LA LOF

Grue demoiselle *Grus virgo* (Linné 1758)

Cette grue niche en Eurasie, de l'est de la Turquie et du nord de la mer Noire jusqu'au nord de la Chine et hiverne en Inde, au Pakistan ainsi qu'en Afrique de l'Est. Les populations qui nichaient en Afrique du Nord jusqu'au ^{xx}e siècle ont maintenant disparu. Un individu de 1^{re} année a été observé du 13 au 16 octobre 2010 à Saint-Josse, Pas-de-Calais, puis du 24 octobre au 11 novembre 2010 à Beauvoir, Manche. Cette donnée a tout d'abord été placée en catégorie D (réunion CAF 2010) puis en catégorie A (réunion CAF 2012), après une analyse précise de nouvelles informations sur les circonstances de l'observation et de la situation de l'espèce en captivité. La quinzaine d'autres mentions connues en France a été placée en catégorie E, certaines concernant clairement des oiseaux échappés et aucune autre n'est aussi probante que les mentions de 2010.

Bruant roux *Emberiza rutila* (Pallas 1776)

Ce bruant niche dans le sud-est de la Sibérie et le nord de la Chine. Il a été importé comme oiseau de cage jusqu'au milieu des années 1990. Dans ce contexte, lorsque la première mention de cette espèce en France était obtenue en octobre 1995, la prudence sur l'origine de l'espèce avait conduit la CAF à placer cette donnée en catégorie D (V. *Ornithos* 4-3 : 138-139), comme cela avait été le cas pour la donnée du ^{xix}e siècle d'un oiseau capturé au filet en Franche-Comté et naturalisé (Mayaud *et al.* 1936, Mayaud 1941). L'observation d'un juvénile sur l'île de Sein, Finistère, du 5 au 11 octobre 2009 et l'ensemble des éléments de contexte (notamment origine captive maintenant peu probable) ont conduit la CAF à inscrire l'espèce en catégorie A de la LOF. À cette occasion, la CAF a reconsidéré la mention d'un oiseau les 5 et 11 octobre 1995 à Vuillecin, Doubs, et a inscrit cette donnée en catégorie A (Michelat *et al.* 2011).

NOUVELLES SOUS-ESPÈCES AJOUTÉES EN CATÉGORIE A DANS LA LOF

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros phoenicuroides*

Le Rougequeue noir est une espèce répartie de l'Europe à l'Asie avec la sous-espèce *P. o. gilbraltariensis* (Europe, Afrique du Nord, Asie mineure) qui est connue en France. Un mâle de 1^{re} année de la sous-espèce *P. o. phoenicuroides* (Asie centrale, du Tien Shan à la Mongolie) a été observé sur l'île d'Yeu, Vendée, le 12 novembre 2011. C'est la première mention de cette sous-espèce du Rougequeue noir en France. Plusieurs autres données ont été obtenues en Europe de l'Ouest lors de ce même automne.





4. Bruant roux *Emberiza rutila*, femelle, Corée-du-Sud, mai 2009 (Aurélien Audevard). Female Chestnut Bunting.



Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus caudatus*

Un afflux de Mésanges à longue queue de la sous-espèce nominale s'est produit au cours de l'hiver 2010-2011, essentiellement dans la moitié est de la France (Olios & le CHN 2011). Aucune mention n'avait encore été authentifiée pour la France, car l'identification de ce taxon est rendue complexe par l'existence de nombreux intermédiaires en provenance des zones de sympatrie avec d'autres taxons, dont certains montrent une tête blanche (Paepegaey & le CHN 2011).

Tarier de Sibérie *Saxicola maurus* et ordre systématique des *Saxicola*

Jusqu'à récemment le Tarier pâtre *Saxicola torquatus* était considéré comme espèce polytypique regroupant une douzaine de sous-espèces réparties en Europe, en Afrique et en Asie. En France, on en connaissait trois sous-espèces : *S. t. rubicola*, *S. t. hibernans* et *S. t. maurus*.

Des analyses phylogénétiques (Illera *et al.* 2008, Zink *et al.* 2008) ont permis de réviser l'histoire de ce taxon et de proposer un nouveau classement du complexe « *Saxicola torquatus* ». Le nom *Saxicola torquatus* est à présent réservé à l'espèce d'Afrique subsaharienne appelée « Tarier d'Afrique ».

Pour ce qui concerne la LOF, il résulte de ces travaux que la sous-espèce *S. t. maurus* est élevée au rang d'espèce *Saxicola maurus* (Tarier de Sibérie) qui regroupe cinq sous-espèces, principalement réparties de la Sibérie à la Chine. Les mentions de *Saxicola maurus* actuellement homologuées par le CHN ne permettent pas une identification subsppécifique. Il peut logiquement s'agir de *S. m. maurus* ou de *S. m. stejnegeri*, les deux sous-espèces sibériennes.

Autre conséquence de ce nouveau classement, le nom scientifique du Tarier pâtre devient *Saxicola rubicola* (Europe, Afrique du Nord et Turquie) qui regroupe deux sous-espèces : *S. r. rubicola* (Europe de l'Ouest et du Sud, côtes d'Afrique, Turquie) et *S. r. hibernans* (Grande-Bretagne, Irlande et ouest de la Bretagne ; des Pays-Bas à l'ouest de la péninsule Ibérique, les oiseaux sont intermédiaires entre ces deux formes).





Le classement des *Saxicola* dans la LOF est désormais le suivant :

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linné, 1758)

Tarier de Sibérie *Saxicola maurus* (Pallas, 1773)

appartenance subspécifique inconnue

Tarier pâle *Saxicola rubicola* (Linné, 1766)

– *S. r. rubicola* (Linné, 1766)

– *S. r. hibernans* (Hartert, 1910)

MODIFICATIONS DE NOMS SCIENTIFIQUES

Suite aux recommandations de l'AERC TAC 2011 et 2012 (Crochet *et al.* 2011, 2012) les modifications suivantes ont été apportées au nom scientifique de certaines espèces européennes.

• **Gélinotte des bois** *Tetrastes bonasia* (Linné, 1758) au lieu de *Bonasa bonasia* (Linné, 1758)

– *T. b. rupestris* (C. L. Brehm, 1831)

• **Chevalier semipalmé** *Tringa semipalmata* (J.F. Gmelin, 1789) au lieu de *Catoptrophorus semipalmatus* (J.F. Gmelin, 1789)

• **Sterne fuligineuse** *Onychoprion fuscatus* (Linné, 1766) au lieu de *O. fuscata*

– *Onychoprion fuscatus fuscatus* (Linné, 1766)

• **Sterne bridée** *Onychoprion anaethetus* (Scopoli, 1786)


– *Onychoprion anaethetus melanopterus* (Swainson, 1837) au lieu de *O. a. melanoptera*

• **Grive de Sibérie** *Geokichla sibirica* (Pallas, 1776) au lieu de *Zoothera sibirica* (Pallas, 1776)

– *Geokichla sibirica sibirica* (Pallas, 1776)

• **Hypolaïs pâle** *Iduna pallida* (Hemprich & Ehrenberg, 1833) au lieu de *Hippolais pallida* (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

• **Hypolaïs obscure** *Iduna opaca* (Cabanis, 1850) au lieu de *Hippolais opaca* Cabanis, 1850



5. Gélinotte des bois
Tetrastes bonasia, mâle,
Les Houches, Haute-Savoie,
mai 2006 (Bernard Bellon).
Male Hazel Grouse.





- **Hypolaïs bottée** *Iduna caligata* (Lichtenstein, 1823) au lieu de *Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823)
- **Hypolaïs rama** *Iduna rama* (Sykes, 1822) au lieu de *Hippolais rama* (Sykes, 1822)
- **Tarier pâtre** *Saxicola rubicola* (Linné, 1766) au lieu de *Saxicola torquatus* (V. aussi *Saxicola maurus* plus haut)
- **Fauvette de Rüppell** *Sylvia ruppeli* (Temminck, 1823) au lieu de *Sylvia rueppelli*
La littérature ancienne, notamment la publication de Temminck, montre que l'orthographe originale est bien *ruppeli*.

- **Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans* (Pallas, 1764)
S. c. subalpina Temminck, 1820 au lieu de *S. c. moltonii* (Baccetti *et al.* 2007)
Le classement des sous-espèces dans la LOF est désormais le suivant :

- Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans* (Pallas, 1764)
 - *S. c. cantillans* (Pallas, 1764)
 - Fauvette de Moltoni *S. c. subalpina* Temminck, 1820
 - Fauvette des Balkans *S. c. albistriata* C. L. Brehm, 1855

Les noms vernaculaires « Fauvette de Moltoni » et « Fauvette des Balkans » ont été préconisés par la CAF pour les deux sous-espèces de *S. cantillans* dans la mesure où, selon certains auteurs, elles pourraient être élevées au rang d'espèce (Brambilla *et al.* 2010), décision actuellement non suivie par l'AERC.

- **Étourneau roselin** *Pastor roseus* (Linné, 1758) au lieu de *Sturnus roseus* (Linné, 1758)

CHANGEMENTS DE L'ORDRE TAXONOMIQUE AU NIVEAU GÉNÉRIQUE ET/OU SPÉCIFIQUE

Ordre taxonomique des limicoles des genres *Xenus*, *Actitis* et *Tringa*

Les relations phylogénétiques de ces trois genres ont été revues à la suite d'analyses d'ADN mitochondrial et nucléaire et publiées récemment (Pereira & Baker 2005, Gibson 2010). En plus du changement de genre de *Catoptrophorus semipalmatus* en *Tringa semipalmata* (V. plus haut), l'ordre des espèces dans la LOF est dorénavant le suivant :

- Chevalier bargette** *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775)
- Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* (Linné, 1758)
- Chevalier grivelé** *Actitis macularia* (Linné, 1766)
- Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* Linné, 1758
- Chevalier solitaire** *Tringa solitaria* Wilson, 1813
 - *T. s. solitaria* Wilson, 1813
- Chevalier arlequin** *Tringa erythropus* (Pallas, 1764)
- Chevalier criard** *Tringa melanoleuca* (J.F. Gmelin, 1789)
- Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767)
- Chevalier à pattes jaunes** *Tringa flavipes* (J.F. Gmelin, 1789)
- Chevalier semipalmé** *Tringa semipalmata* (J.F. Gmelin, 1789)
 - *T. s. inornata* (Brewster, 1887)
- Chevalier stagnatile** *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803)
- Chevalier sylvain** *Tringa glareola* Linné, 1758
- Chevalier gambette** *Tringa totanus* (Linné, 1758)
 - *T. t. totanus* (Linné, 1758)
 - *T. t. robusta* (Schioler, 1919)





Ordre taxonomique des guêpiers

Un nouvel ordre taxonomique des guêpiers a été récemment proposé à la suite d'analyses de séquences d'ADN mitochondrial et nucléaire (Marks *et al.* 2007). Cet ordre a été accepté par l'AERC. Ainsi l'ordre des deux espèces de guêpiers connues en France devient :

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* Linné, 1758

Guêpier de Perse *Merops persicus* Pallas, 1773

Ordre taxonomique des Hirundinidés

Des études phylogénétiques récentes (Sheldon *et al.* 2005, Pavlova *et al.* 2008, Dor *et al.* 2010) ont permis de revisiter la séquence taxonomique de cette famille. L'ordre systématique des hirondelles observées en France est désormais le suivant :

Hirondelle paludicole *Riparia paludicola* (Vieillot, 1817)

– appartenance subspécifique inconnue

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linné, 1758)

– *R. r. riparia* (Linné, 1758)

Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769)

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Linné, 1758

– *H. r. rustica* Linné, 1758

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linné, 1758)

– *D. u. urbicum* (Linné, 1758)

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* (Linné, 1771)

– *C. d. rufula* (Temminck, 1835)

Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota* (Vieillot, 1817)

– appartenance subspécifique inconnue

Ordre taxonomique des fauvettes des genres *Iduna*, *Hippolais* et *Acrocephalus*

Des analyses phylogénétiques récentes ont proposé de reclasser les espèces du Paléarctique occidental des genres *Iduna*, *Hippolais* et *Acrocephalus* (Fregin *et al.* 2009). Suite au changement du générique des quatre espèces d'hypolaïs, l'ordre systématique est le suivant pour les espèces de la LOF :

Hypolaïs bottée *Iduna caligata* (Lichtenstein, 1823)

Hypolaïs rama *Iduna rama* (Sykes, 1822)

Hypolaïs obscure *Iduna opaca* (Cabanis, 1850)

Hypolaïs pâle *Iduna pallida* (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

– *I. p. elaeica* (Lindermayer, 1843)

Hypolaïs icterine *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817)

Lusciniole à moustaches *Acrocephalus melanopogon* (Temminck, 1823)

– *A. m. melanopogon* (Temminck, 1823)

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817)

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (Linné, 1758)

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845)

– *A. a. septima* Gavrilenko, 1954

Rousserolle des buissons *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798)



**Rousserolle effarvatte** *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)

- *A. s. scirpaceus* (Hermann, 1804)
- *A. s. fuscus* (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* (Linné, 1758)

- *A. a. arundinaceus* (Linné, 1758)

Ordre taxonomique des genres *Sturnus* et *Pastor*

Lovette *et al.* (2008) et Zuccon *et al.* (2008) ont proposé un nouveau classement des *Sturnus*, *Acridotheres* et genres alliés sur la base d'études phylogéniques (séquences de gènes mitochondriaux). Compte tenu des distances génétiques entre les taxons, Zuccon *et al.* (2008) recommandent l'utilisation du générique synonyme *Pastor* pour l'Étourneau roselin. L'ordre systématique des sturnidés de la LOF est donc :

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* Temminck, 1820

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* Linné, 1758

- *S. v. vulgaris* Linné, 1758

Étourneau roselin *Pastor roseus* (Linné, 1758)

ESPÈCES ET SOUS-ESPÈCES SUPPRIMÉES DE LA LOF ENTRE 2010 ET 2012**Colin de Virginie** *Colinus virginianus*

Cette espèce a été introduite en France à des fins cynégétiques. En 1995, nous écrivions : « Une population semble se maintenir dans le centre de la France et réunir donc les conditions nécessaires au maintien de l'espèce dans la catégorie C » (V. *Ornithos* 2-2 : 82-88). Mais il s'avère que les populations introduites ne se sont pas maintenues depuis l'arrêt des lâchers massifs des années 1990 (Dubois *et al.* 2012). La CAF a donc décidé de reclasser cette espèce en catégorie E, ce qui la fait sortir de la LOF.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus samamisisus*

Cette sous-espèce niche en Crimée, dans le Caucase, l'est et le sud de la Turquie, du Levant et jusqu'à l'est de l'Iran. En 2009, le CHN a révisé les données françaises suite à la publication d'un article précisant l'identification de ce taxon (Small 2009). Comme aucune de ces données ne présentait tous les caractères attendus pour une identification certaine de cette sous-espèce, elles ont toutes été refusées. *Phoenicurus p. samamisisus* a ainsi été supprimé de la LOF.

Pouillot du Caucase *Phylloscopus nitidus*

La seule mention connue date des 20 et 21 septembre 2003 dans le Pas-de-Calais (*Phylloscopus nitidus* était encore une sous-espèce de *Phylloscopus trochiloides* en 2003). Dans un premier temps, elle a été homologuée par le CHN (Frémont & le CHN 2005) et placée en catégorie A par la CAF (V. *Ornithos* 11-5 : 230-245). Suite aux recommandations de l'AERC concernant les premières nationales (descriptions concordantes de plusieurs observateurs et/ou photos), cette donnée a été réexaminée par le CHN qui a finalement décidé de ne plus l'homologuer (Reeber & le CHN 2011).

Gobemouche de la taïga *Ficedula albicilla*

Cette espèce niche en Sibérie, en Asie centrale et de l'Est. L'évolution des connaissances sur l'identification de cette espèce implique désormais que l'acceptation de données soit basée sur une description très solide, accompagnée de photographies et si possible d'un enregistrement du cri (diagnostique), ce qui a conduit le CHN à réviser les données françaises (Reeber & le CHN 2012). L'ensemble des données françaises a ainsi été refusé suite à ce réexamen et il n'existe donc plus, en France, de mention homologuée de cette espèce, qui a donc été retirée de la LOF.



Paruline obscure *Vermivora peregrina*

Cette paruline originaire d'Amérique du Nord (essentiellement du Canada) hiverne en Amérique du Sud en passant à l'est des Rocheuses. Un individu, considéré comme femelle en plumage nuptial ou mâle nuptial incomplet, a été mentionné sur l'île de Sein, Finistère, le 25 avril 1997 et cette donnée avait été homologuée par le CHN (V. *Ornithos* 6-4 : 189-192). En 2006, un réexamen de plusieurs espèces de sa base de données a conduit le CHN à conclure que la possibilité d'un Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* ne pouvait être totalement écartée (Reeber *et al.* 2008). Dans la mesure où il n'y a pas eu d'autre mention de cette espèce en France métropolitaine, la Paruline obscure ne fait donc plus partie de la LOF.

BIBLIOGRAPHIE

- BACCETTI N., MASSA B. & VIOLANI C. (2007). Proposed synonymy of *Sylvia cantillans moltonii* Orlando, 1937, with *Sylvia cantillans subalpina* Temminck, 1820. *Bull. B.O.C.* 127(2) : 107-110. • BRAMBILLA M., VITULANO S., FERRI A., SPINA F., FABBRI E. & RANDI E. (2010). What are we dealing with ? An explicit test reveals different levels of taxonomical diagnosability in the *Sylvia cantillans* species complex. *J. Ornithol.* 151 : 309-315. • CROCHET P.-A., BARTHEL P.H., BAUER H.-G., VAN DEN BERG A.B., BEZZEL E., COLLINSON J.M., DIETZEN C., DUBOIS P.J., FROMHOLTZ J., HELBIG A.J., JIGUET F., JIRLE E., KNOX A.G., KRÜGER T., LE MARÉCHAL P., VAN LOON A.J., PÄCKERT M., PARKIN D.T., PONS J.-M., RATY L., ROSELAAR C.S., SANGSTER G., STEINHEIMER F.D., SVENSSON L., TYRBERG T., VOTIER S.C. & YÉSOU P. (2011). AERC TAC's taxonomic recommendations: 2011 report (www.aerc.eu/tac.html). • CROCHET P.-A., BARTHEL P.H., BAUER H.-G., VAN DEN BERG A.B., BEZZEL E., COLLINSON J.M., DIETZEN C., DUBOIS P.J., FROMHOLTZ J., HELBIG A.J., JIGUET F., JIRLE E., KNOX A.G., KRÜGER T., LE MARÉCHAL P., VAN LOON A.J., PÄCKERT M., PARKIN D.T., PONS J.-M., RATY L., ROSELAAR C.S., SANGSTER G., STEINHEIMER F.D., SVENSSON L., TYRBERG T., VOTIER S.C. & YÉSOU P. (2012). AERC TAC's taxonomic recommendations: 2012 report (www.aerc.eu/tac.html). • DANJON Y. (2011). Un Vacher à tête brune *Molothrus ater* dans le Loiret en 2010: première mention française. *Ornithos* 18-5 : 320-321. • DEL HOYO J., ELLIOTT J. & SARGATAL J. (1999). *Handbook of the Birds of the World. Vol. 5, Barn-owls to Hummingbirds*. Lynx Edicions, Barcelona. • DOR R., SAFRAN R.J., SHELTON F.H., WINKLER D.W. & LOVETTE I.J. (2010). Phylogeny of the genus *Hirundo* and the Barn Swallow subspecies complex. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 56 : 409-418. • DUBOIS P.J., DUQUET M., FOSSÉ A., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. & YÉSOU P. (2012). Notes d'ornithologie française. Première mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France. *Ornithos* 19-1 : 2-41. • DUBOIS P.J., JIGUET F., LE MARÉCHAL P. & LA CAF (2003). En direct de la CAF. Décisions récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française. *Ornithos* 10-5 : 230-237. • DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. & YÉSOU P. (2008). *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris. • FREGIN S., HAASE M., OLSSON U. & ALSTRÖM P. (2009). Multilocus phylogeny of the family *Acrocephalidae* (Aves: Passeriformes). The traditional taxonomy overthrown. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 52 : 866-878. • FRÉMONT J.-Y. & LE CHN (2005). Les oiseaux rares en France en 2003. 22^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 12-1 : 2-45. • GIBSON R. (2010). *Phylogenetic relationships among the Scolopaci (Aves: Charadriiformes): implications for the study of behavioural evolution*. Unpublished MSc thesis, Graduate Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Toronto, Toronto. • ILLERA J.C., RICHARDSON D.S., HELM B., ATIENZA J.C. & EMERSON B.C. (2008). Phylogenetic relationships, biogeography and speciation in the avian genus *Saxicola*. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 48 : 1145-1154. • JORDAN J.-P., LAROUSSE A. & VILLEMAGNE M. (2012). Une Paruline à flancs marron *Dendroica pensylvanica* à Sein, Finistère, en octobre 2010: première mention française. *Ornithos* 19-3 : 214-216. • KAYSER Y. & CLÉMENT D. (2013). Un Martinet café *Apus caffer* dans l'Hérault en juin 2011: première mention française. *Ornithos* 20-3 : 188-191. • LOVETTE I.J., MCCLEERY B.V., TALABA A.L. & RUBENSTEIN D.R. (2008). A complete species-level molecular phylogeny for the "Eurasian" starlings (Sturnidae: *Sturnus*, *Acridotheres*, and allies): recent diversification in a highly social and dispersive avian group. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 47 : 251-260. • MARKS B.D., WECKSTEIN J.D. & MOYLE R.G. (2007). Molecular phylogenetics of the bee-eaters (Aves: Meropidae) based on nuclear and mitochondrial DNA sequence data. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 45 : 23-32. • MAYAUD N. (1941). Commentaires sur l'ornithologie française et suppléments. *L'Oiseau & RFO* 11 (n°spécial) : LIX-CXXXVI. • MAYAUD N., HEIM DE BALSAC H. & JOUARD H. (1936). *Inventaire des Oiseaux de France*. Blot, Paris. • MICHELAT D., REEBER S. & GARCIA F. (2011). Deuxième mention du Bruant roux *Emberiza rutila* en France: révision du statut de l'espèce. *Ornithos* 18-6 : 392-397. • MUSSEAU R. & HERRMANN V. (2013). Première mention de la Paruline jaune *Dendroica petechia* pour la France métropolitaine et l'Europe continentale. *Ornithos* 20-2 : 132-135. • MUSSEAU R., HERRMANN V. & JIGUET F. (2011). American Yellow Warbler at Gironde estuary, France, in August 2011. *Dutch Birding* 33-5 : 322-325. • OLIOSSO & LE CHN (2011). Important afflux de Mésanges à longue queue à tête blanche *Aegithalos c. caudatus* en France. *Ornithos* 18-5 : 300-306. • PAEPEGAY B. & LE CHN (2011). Eléments d'identification. La Mésange à longue queue nordique *Aegithalos c. caudatus*. *Ornithos* 18-1 : 20-25. • PAVLOVA A., ZINK R.M., DROVETSKI S.V. & ROHWER S. (2008). Pleistocene evolution of closely related sand martins *Riparia riparia* and *R. diluta*. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 48 : 61-73. • PEREIRA S.L.



6. Hirondele rousseline
Cecropis daurica, Ouessant,
Finistère, octobre 2012
(Aurélien Audevard).
Red-rumped Swallow.



• **BAKER A.J.** (2005). Multiple gene evidence for parallel evolution and retention of ancestral morphological states in the shanks (Charadriiformes: Scolopacidae). *Condor* 107: 514-526. • **RAITIÈRE W., MÉROT J., MOUSSEAU A. & VANNUCCI O.** (2013). Première mention française du Bécasseau à longs doigts *Calidris subminuta* en 2011. *Ornithos* 20-1: 69-70. • **REEBER S. & LE CHN** (2011). Les oiseaux rares en France en 2010. 28^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 18-6: 325-367. • **REEBER S. & LE CHN** (2012). Les oiseaux rares en France en 2011. 29^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 19-6: 353-395. • **REEBER S., FRÉMONT J.-Y., FLUITI A. & LE CHN** (2008). Les oiseaux rares en France en 2006-2007. 25^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 15-5: 313-355. • **SHELDON F.H., WHITTINGHAM L.A., MOYLE R.G., SLIKAS B. & WINKLER D.W.** (2005). Phylogeny of swallows (Aves: Hirundinidae) estimated from nuclear and mitochondrial DNA sequences. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35: 254-270. • **SMALL B.J.** (2009). From the Rarities Committee's files. The identification of male 'Ehrenberg's Redstart', with comments on British claims. *British Birds* 102: 84-97. • **TOUTAIN Y.** (2011). Une Grue du Canada dans les Landes en 2009: première mention française. *Ornithos* 18-3: 194-195. • **ZINK R.M., PAVLOVA A., DROVETSKI S.V., WINK M. & ROHWER S.** (2009). Taxonomic status and evolutionary history of the *Saxicola torquata* complex. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 52: 769-773. • **ZUCCON D., PASQUET E. & ERICSON P.G.P.** (2008). Phylogenetic relationships among Palearctic - Oriental starlings and mynas (genera *Sturnus* and *Acridotheres*: Sturnidae). *Zoologica Scripta* 37: 469-481.

SUMMARY

13th Report of the French Avifauna Committee (CAF). *This paper deals with decisions adopted by the French Avifauna Committee (CAF) from 2010 to 2012. The following species and subspecies have been added to the French bird list in category A: Fea's Petrel (*Pterodroma feae*); Red-footed Booby (*Sula sula*); Sandhill Crane (*Grus canadensis*); Demoiselle Crane (*Grus virgo*); Long-toed Stint (*Calidris subminuta*); White-rumped Swift (*Apus caffer*); Eastern Black Redstart (*Phoenicurus ochruros phoenicuroides*); Long-tailed Tit (*Aegithalos c. caudatus*); Yellow Warbler (*Dendroica petechia*); Chestnut-sided Warbler (*Dendroica pensylvanica*); Chestnut Bunting (*Emberiza rutila*); Brown-headed Cowbird (*Molothrus ater*). Adoption of taxonomic order and generic/species names changes to the French Bird List according the AERC TAC recommendations:*

• taxonomic orders of waders of the genus *Xenus*, *Actitis* and *Tringa*, bee-eaters, Hirundinidae, warblers of the genus *Iduna*, Hippolais and Acrocephalus, and Sturnidae of the genus *Sturnus* and Pastor;

• species and subspecies scientific names: Hazel Grouse (*Tetrastes bonasia*); Willet (*Tringa semipalmata*); Sooty Tern (*Onychoprion fuscatus*); Siberian Thrush (*Geokichla sibirica*); Eastern Olivaceous Warbler (*Iduna pallida*); Western Olivaceous Warbler (*Iduna opaca*); Sykes's Warbler (*Iduna rama*); European Stonechat (*Saxicola rubicola*); Rüppell's Warbler (*Sylvia ruppelli* instead of *S. rueppelli*); Subalpine Warbler (*Sylvia cantillans subalpina* instead of *S. c. moltonii*); Rosy Starling (*Pastor roseus*).

Finally, the following taxa are deleted from the French list: Northern Bobwhite (*Colinus virginianus*); Green Warbler (*Phylloscopus nitidus*); Taiga Flycatcher (*Ficedula albicilla*); Tennessee Warbler (*Vermivora peregrina*) and Common Redstart (*Phoenicurus p. samamisisicus*).

Pierre Le Maréchal
(pierre.le-marechal@orange.fr)

