

Première mention française de la Fauvette passerinette orientale *Sylvia cantillans albistriata*

Le 20 avril 2004, alors que je finis de prospecter le secteur de Cost ar Reun sur l'île d'Ouessant, Finistère, je découvre une Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* à quelques mètres de la chapelle N.-D. du Bon Voyage. L'oiseau, un mâle adulte, prospecte tranquillement le haut de la végétation, à découvert. La coloration générale très grise du dos est assez remarquable, tout comme la coloration rouge brique de la gorge et du ventre, ainsi que la moustache blanche assez large. Quelques échanges de courriels avec Philippe J. Dubois et la consultation de l'ouvrage *Sylvia Warblers* (Shirihai *et al.* 2001) confirment que tous ces critères indiquent la race *albistriata* en provenance du sud-est de l'Europe. L'oiseau stationnera sur le site jusqu'au 25 avril 2004. Aucun cri ne sera entendu durant tout son

séjour.

DESCRIPTION

Aspect général. Petite fauvette gracieuse et élancée, à ailes longues et queue courte, de taille inférieure à la Fauvette à tête noire *S. atricapilla* avec laquelle la comparaison a pu être réalisée. À distance, la couleur dominante est très grise avec la gorge rouge brique, ornée d'une large moustache blanche.

Parties supérieures. La tête est gris plomb, marquée d'un cercle orbitaire rouge vif et d'une large moustache blanche démarrant de la base du bec et se poursuivant jusqu'à la gorge. Cette moustache est plus large que chez la sous-espèce nominale. Le manteau est également gris plomb, sans aucun contraste entre la tête et le dos de l'oiseau. Les ailes sont grises, l'alula noire à bordure pâle. Les tertiaires noirâtres ont de larges bords crème. La queue grise montre des bords blancs aux rectrices externes.

Parties inférieures. La gorge est d'un rouge brique très marqué descendant jusque sur le haut de la poitrine. Cette zone ressort parfaitement par rapport à la poitrine et aux flancs qui sont d'un blanc rosé ou orangé très diffus. La couleur s'estompe et devient blanc sale sur le bas de la poitrine.

Parties nues. Bec fin et court, grisâtre sur la mandibule supérieure et chair à la base de la mandibule inférieure,

avec la pointe grisâtre. Iris brun et pattes chair jaunâtre.

OBSERVATIONS SIMULTANÉES EN GRANDE-BRETAGNE

Cette première observation de ce taxon pour la France est à mettre en relation avec l'afflux de Fauvettes passerinettes ayant touché les îles Britanniques au printemps 2004, avec 21 oiseaux notés entre le 16 avril et le 12 juin. Trois de ces oiseaux ont été homologués par le *British Birds Rarities Committee* comme appartenant à la forme *albistriata* – le 30 avril dans le Dorset, le 1^{er} mai dans le Kent, le 16 mai sur l'île de Man –, alors qu'un oiseau observé le 6 mai aux îles Shetland est homologué comme « probablement *albistriata* » (V. *British Birds* 99, 2005 : 677 & 100, 2007 : 85) ; ces homologations complètent et corrigent les informations fournies par Cade & Walker (2004), qui signalaient deux autres *albistriata* potentielles.

BIBLIOGRAPHIE

- CADE M. & WALKER D. (2004). Eastern Subalpine Warblers in spring 2004. *Birding World* 17 : 202-203.
- SHIRIHAI H., GARGALLO G. & HELBIG A.J. (2001). *Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Helm, London.

SUMMARY

Eastern Subalpine Warbler, new to France. A male Subalpine Warbler of the eastern race *albistriata* was observed on Ouessant island, Brittany, from 20 to 25 April 2004. This is the first record of this subspecies in France. This record has been placed in Category A of the French List. This record is discussed in the context of an influx of the species in the British Isles in spring 2004, where at least 3 birds were recorded.



1. Fauvette passerinette *Sylvia cantillans*, mâle de la sous-espèce *albistriata*, Grèce, avril 2006 (Paul Cools). Male Subalpine Warbler of the eastern race *albistriata*.

Aurélien Audevard
Kerhuel, 29242 Ouessant
(aurelien.audevard@gmail.com)

Commentaire du CHN. Le CHN a homologué sans difficulté cette première observation française d'une Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* de la sous-espèce *albistriata*. Les larges moustaches blanches présentées par ce mâle adulte, les dimensions retraits et la teinte rouge brique (et non orangée) de sa tache pectorale, ainsi que la teinte très grise (et non brune) de ses parties supérieures désignent en effet cette sous-espèce, sans confusion possible. Espérée depuis quelque temps sur le territoire français, cette découverte était plutôt attendue dans le sud du pays. L'observation d'Ouessant s'inscrit cependant dans le cadre des dépassements d'aire printaniers (*overshooting*) qui à plusieurs reprises ont déjà conduit cette sous-espèce jusque dans les îles Britanniques. Dès le printemps suivant, deux données méditerranéennes allaient confirmer le bien fondé des prédictions antérieures : elles concernent deux mâles, observé pour l'un et capturé pour l'autre, sur l'île de Porquerolles, Var, respectivement les 26 avril et 9 mai 2005. Il est bien sûr possible de penser que cette série de mentions résulte avant tout de la clarification des critères d'identification des différentes sous-espèces de la Fauvette passerinette, l'étude de la variabilité phénotypique de cette espèce ayant été menée parallèlement à d'intéressantes recherches taxonomiques retracées dans le commentaire de la CAF.

Commentaire de la CAF. Cantonnée au pourtour du bassin méditerranéen, la Fauvette passerinette est classiquement divisée en quatre sous-espèces regroupées en trois groupes : le groupe *cantillans* (*cantillans* : de la péninsule Ibérique à l'Italie via le sud de la France ; *inornata* : Maghreb), le groupe *albistriata* (de la Turquie occidentale à la côte orientale de l'Adriatique au nord-est de l'Italie, c'est-à-dire à moins de 500 km de la frontière française...) et le groupe *moltonii* (Shirihai *et al.* 2001). On a longtemps considéré que *moltonii* était limité aux îles de la Méditerranée occidentale (Corse, Sardaigne et une partie des Baléares), mais des travaux récents ont montré que ce taxon occupe aussi le centre et une bonne partie du nord de la péninsule Italienne (V. p. ex. Festari 2004, Bambrilla *et al.* 2006). Les formes *cantillans* et *moltonii* sont largement parapatriques et se trouvent ponctuellement en syntopie. Elles diffèrent par le plumage des mâles, les cris de contact et le chant (Shirihai *et al.* 2001), et sur les sites de sympatrie, Bambrilla *et al.* (2006) n'ont observé ni individus hybrides ni couples mixtes, ce qui suggère que *moltonii* devrait être élevé au rang d'espèce. Festari (2004) va plus loin, suggérant la reconnaissance de trois espèces : *Sylvia moltonii* (Corse, Sardaigne, Baléares orientales, ainsi que la moitié nord de l'Italie), *S. albistriata* (de répartition inchangée) et *S. cantillans*, elle-même composée de trois sous-espèces (*cantillans* : de la péninsule Ibérique au sud de la France ; *inornata* : Maghreb ; *sconosciuta* : moitié sud de la péninsule Italienne). Cette dernière proposition demande à être validée, entre autres par l'étude de zones de contact entre *albistriata* et *cantillans*, par exemple dans le nord-est de l'Italie. Elle montre en tout cas l'intérêt de poursuivre les recherches en la matière, et donc d'identifier de la manière la plus précise possible les Fauvettes passerinettes observées en France, et notamment les migrateurs.

Des Fauvettes passerinettes migratrices sont observées annuellement bien au nord de l'aire de reproduction de l'espèce. La sous-espèce *albistriata* a ainsi été notée à plusieurs reprises en Grande-Bretagne, surtout au printemps, mais aussi à l'automne (Gantlett 2001), la première fois en mai 1951 sur Fair Isle (V. *British Birds* 100, 2007 : 85-86). Ce contexte, conjugué à l'absence d'ambiguïté sur l'identification des mâles adultes de cette forme, a permis à la CAF d'inscrire *Sylvia cantillans albistriata* en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France sur la base de l'oiseau mâle observé le 20 avril 2004 sur l'île d'Ouessant, Finistère (V. *Ornithos* 13-4, 2006 : 246). Les caractéristiques de ce taxon sont mieux connues depuis les publications de Shirihai *et al.* (2000, 2001), aussi d'autres observations et captures devraient-elles suivre.

La CAF souligne par ailleurs que, pour préciser le statut des différentes formes de Fauvettes passerinettes présentes en France, il serait utile de confirmer celui de *moltonii* en Provence : simple migratrice en dépassement d'aire ou bien nicheuse en continuité de la situation récemment décrite dans le nord-ouest de l'Italie où cette forme domine en Toscane, Émilie-Romagne, Ligurie et Piémont (Festari *et al.* 2002, Bambrilla *et al.* 2006) ?

Bibliographie

- BAMBRILLA M., TELLINI FLORENZANO G., SORACE A. & GUIDALI F. (2006) Geographical distribution of Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* subspecies in mainland Italy. *Ibis* 148 : 568-571.
- FESTARI I. (2004). Tassonomia e variabilità geografica della Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*) in Italia. *Quaderni di birdwatching*, Anno VI, vol. 12, ottobre 2004. (<http://www.ebnitalia.it/QB/QB012/sterpazzoline.htm>)
- FESTARI I., JANNI O. & RUBOLINI D. (2002). Moltoni's Warbler breeding in mainland Italy. *Dutch Birding* 24 : 88-90.
- GANTLETT S. (2001). Subalpine Warbler forms in Britain. *Birding World* 14 : 482-483.
- SHIRIHAI H., GARGALLO G. & HELBIG A.J. (2001). *Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Helm, London.
- SHIRIHAI H., GARGALLO G. & HELBIG A.J., HARRIS A. & COTTRIDGE D.M. (2000). Subalpine Warbler : identification, ageing and sexing. *Birding World* 13 : 234-250.