

notes

Un Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmii* dans le Pays basque : première mention française de l'espèce

Le 1^{er} janvier 2023, le centre de soins pour la faune sauvage géré par l'association Hegalaldia¹ à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) réceptionne un oiseau qui avait été heurté par une voiture en pleine ville de Guéthary. Surprise pour les soigneurs : il s'agit d'un petit héron, qu'ils identifient

¹ À la demande de l'équipe du centre de soins pour la faune sauvage Hegalaldia, cet article a été rédigé par Pierre Yésou, qui est mandaté par Ornithos, la CAF et le CHN pour coordonner la rédaction des textes des « premières françaises ».



rapidement comme un Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmii* immature ! Ne montrant ni blessure externe ni dégât au plumage, il pesait 92 g, un poids normal pour l'espèce, et l'adiposité autour de son bréchet indiquait l'absence de stress alimentaire. L'oiseau est néanmoins mort dans la nuit du 2 au 3 janvier...

Le cadavre a été immédiatement congelé, puis adressé au Muséum national d'histoire naturelle, où il a été préparé par Jérôme Fuchs afin d'intégrer la collection ornithologique française. La dissection a montré qu'il s'agissait d'une femelle très jeune (des traces de duvet se trouvaient encore sur la poitrine) ayant subi un fort traumatisme crânien avec beaucoup de sang dans la tête. Le spécimen est conservé au MNHN et y est inscrit au Catalogue général (oiseaux) sous le numéro 2023-619 (J. Fuchs, comm. pers.).

Entre temps, l'information avait été rapidement diffusée sur Internet (notamment sur Faune France) et des photos de l'oiseau, prises quand il était encore en soins, ont été transmises au CHN, qui a homologué la donnée comme première française pour l'espèce. La CAF a ensuite placé le Blongios de Sturm en catégorie A de la Liste des oiseaux de France.

Cette espèce niche en Afrique tropicale et équatoriale, du Sahel à l'Afrique australe. Elle occupe des habitats humides très variés, de la mangrove littorale aux marais boisés inondables, en passant par des plans d'eau artificiels, sans être nulle part commune. Les oiseaux des zones tropicales sont migrateurs : ils n'y sont guère présents qu'en saison des pluies, puis vont rejoindre les populations équatoriales qui sont

1. Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmii*, femelle 1^{re} année, Guéthary, Pyrénées-Atlantiques, janvier 2023 (Hegalaldia). 1st-cy female Dwarf Bittern, new to France.



2. Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmii*, femelle 1^{re} année, Guéthary, Pyrénées-Atlantiques, janvier 2023 (Hegalaldia). 1st-cy female Dwarf Bittern, new to France.

probablement plus sédentaires.

Selon la synthèse de Kratzer *et al.* (2018), il est rare que des migrateurs s'égarent. Le 6 octobre 2011, un oiseau a toutefois atteint l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique, à quelque 1900 km des côtes africaines. Dans le Paléarctique occidental, les données viennent avant tout des îles atlantiques : Santiago dans l'archipel du Cap-Vert du 12 juin au 17 juillet 2011, et îles Canaries en octobre 1886, du 21 au 30 janvier 2000, du 23 août 2002 au 10 mai 2003, le 25 novembre 2017, du 1^{er} décembre 2017 à décembre 2019 (de plus, le site *Ornithomedia*

a signalé un individu épuisé recueilli le 14 janvier 2014 dans un centre de soins de l'archipel). Plus près de chez nous, un juvénile a été trouvé mort le 17 octobre 2019 à Saragosse, dans le nord-ouest de l'Espagne (Gutiérrez 2019). Par ailleurs, un oiseau a été noté le 1^{er} novembre 2013 au sultanat d'Oman. La donnée présentée ici est donc la seconde pour le continent européen ainsi que la plus septentrionale pour l'espèce.

BIBLIOGRAPHIE

• GUTIÉRREZ R. (2019). Rarest of the rare 2019 / El más raro de los raros 2019. *Rare Birds in Spain Blog*, 23 December 2019 (rarebirdspain.blogspot.com).

• KRATZER D., LIUNDY V. & ŁAWICKI L. (2018). Two Dwarf Bitterns on Fuerteventura, Canary Islands, in winter of 2017/18. *Dutch Birding* 40: 98-101.

SUMMARY

Dwarf Bittern, new for France.

On 1st January 2023 a small heron hit by a car in Guéthary city centre, Pyrénées-Atlantiques, was brought to a wildlife care centre where it was identified as an immature Dwarf Bittern. Unfortunately it died two nights later. Post-mortem examination showed it to be a very young female (some down still attached to its breast) which endured a serious cranial trauma. This constitutes the first

record of this species for France, the second record for continental Europe and the northernmost record for the species. The national avifaunistic committee has added the Dwarf Bittern in category A of the French list.

Pierre Yésou
(p.yesou@gmail.com),
Céline Maury, Stephan
Maury & Hugo Perez

Commentaire du CHN. L'identification de l'espèce n'est pas difficile, aucun autre héron ne présentant ces caractéristiques de plumage. Si le Blongios à cou jaune *Ixobrychus flavicollis*, du sous-continent Indien, présente lui aussi un plumage largement sombre, il est toutefois nettement plus sombre dessous. L'âge est établi par les scapulaires et couvertures alaires juvéniles : courtes, rondes et frangées de crème (longues, allongées et entièrement bleu sombre pour les plumes postjuvéniles). Cet âge a été confirmé à la dissection lors de la mise en peau du spécimen au Muséum national d'histoire naturelle de Paris par Jérôme Fuchs (comm. pers.) qui a noté la présence de traces de duvet sur la poitrine. Le sexe a été établi à la dissection et le CHN a accepté la conclusion de J. Fuchs. Le CHN n'a donc eu aucun mal à homologuer cet individu comme un Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmii* femelle de 1^{re} année.



3. Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmii*, femelle 1^{re} année, Guéthary, Pyrénées-Atlantiques, janvier 2023 (Hegaldia). 1st-cy female Dwarf Bittern, new to France.

Commentaire de la CAF. Le Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmii*, espèce monotypique, niche à travers l'Afrique tropicale et équatoriale, du Sahel à l'Afrique du Sud. Seules les populations proches des tropiques sont vraiment migratrices : en saison sèche, elles tendent à rejoindre la zone équatoriale humide (Martínez-Vilalta et al. 2020). Ce petit héron s'observe exceptionnellement hors de son aire normale de répartition. Dans le Paléarctique occidental, les rares observations proviennent très majoritairement des îles Canaries : après une mention en octobre 1886, cinq données y ont ainsi été obtenues de 2000 à 2019, entre fin août et fin janvier, certains oiseaux séjournant longuement dans l'archipel (cf. la note ci-dessus pour le détail de ces données). Il existe aussi deux mentions au Cap-Vert (eBird, avec photos). La seule donnée européenne concerne un juvénile trouvé mort à Saragosse, Espagne, le 17 octobre 2019. Elle est actuellement classée en catégorie D par le comité d'homologation espagnol sur la base d'une étude isotopique des plumes de l'oiseau, suggérant qu'il n'était pas né en Afrique. Cette étude, non publiée, présente cependant plusieurs points intrigants qui interrogent sur ses conclusions, et la catégorisation de cet oiseau devrait être prochainement revue par le Comité de Rarezas (Marc Illa *in litt.*). Par ailleurs, concomitamment à la mention de Blongios de Sturm discutée ici, deux autres espèces afrotropicales ont été notées dans le nord-ouest de l'Espagne fin 2022 : une Marouette rayée *Aenigmatolimnas marginalis* le 25 décembre dans les Asturies, et une Talève d'Allen *Porphyrio alleni* le 26 décembre en Galice (Pardo de Santayana et al. 2023). Au vu des précédentes données d'erratismes et de l'arrivée quasi simultanée d'autres espèces afrotropicales dans le même secteur géographique du Sud-Gascogne, et prenant en compte la rareté de l'espèce en captivité, la CAF a rejeté l'hypothèse d'un individu captif qui se serait échappé, et a considéré que l'espèce était capable d'atteindre la France sans bénéficier d'un transport par bateau de port à port. Cette dernière hypothèse n'est pas la plus probable, même si on ne peut exclure que cet oiseau ait pu séjournier sur un bateau durant une partie du trajet (cf. *infra*). La CAF a donc inscrit le Blongios de Sturm *Ixobrychus sturmii* en catégorie A de la Liste des oiseaux de France sur la base de la jeune femelle recueillie par le centre de soins Hegaldia à la suite de sa collision avec une voiture en centre-ville de Guéthary, Pyrénées-Atlantiques, le 1^{er} janvier 2023, et dont la peau est conservée au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Rappelons que deux anciennes mentions de l'espèce (captures qui auraient été réalisées dans les Pyrénées-Atlantiques – déjà ! – au XIX^e siècle) ne sont pas admises par la CAF, n'étant pas documentées. De plus, un oiseau conservé dans les collections du musée de Bordeaux, étiqueté comme Blongios de Sturm provenant de France, s'est avéré être un Blongios nain *I. minutus* (Commission de l'Avifaune Française 2006). Pour expliquer les circonstances de l'arrivée de cet oiseau en France, il a été proposé (Anonyme 2023) qu'il y avait été apporté par la calima, nom donné à des vents de sable soufflant de l'est depuis l'Afrique du Nord vers les Canaries. Nombre d'oiseaux africains arrivant dans l'archipel sont effectivement portés par ces vents (Gutiérrez et al. 2022) : il s'agit surtout d'espèces sahariennes. Les oiseaux d'origine afrotropicale parvenant sur l'archipel le font avant tout par des vents de sud à sud-est (García del Rey & García Vargas 2013). Certains individus, certainement déjà en erratisme vers le nord, peuvent toutefois être déportés vers l'Atlantique par la calima : un tel épisode météorologique a touché les Canaries fin 2022, avec des répercussions dans le sud de l'Espagne, et un Râle des prés *Crecopsis egregia* a alors été découvert le 27 décembre sur l'île de Lanzarote (Pardo de Santayana et al. 2023). Cela ne saurait cependant suffire à expliquer l'arrivée du Blongios de Sturm en France, où aucun vent de ce type n'a soufflé préalablement à la découverte de cet oiseau. La dernière décade de décembre 2022 a été marquée en France par des températures élevées, avec des écarts à la normale particulièrement marqués dans le Sud-Ouest et singulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette situation tenait à un flux d'air chaud de sud-ouest (Météo France 2023), venant de l'Atlantique et non directement d'Afrique. De plus, l'observation d'une jeune Gallinule d'Allen le 5 janvier 2023 dans le Tangérois, au nord-ouest du Maroc (Bergier et al. 2023), montre que des oiseaux afrotropicaux ont pu poursuivre vers le nord sans être détournés vers l'Atlantique par la calima. Les conditions météorologiques d'arrivée de ce Blongios de Sturm en France ne sont donc pas clairement déterminées, pas plus qu'elles ne le sont pour les deux autres espèces afrotropicales trouvées mortes fin décembre 2022 dans le nord-ouest de l'Espagne. Une hypothèse un peu complexe est d'envisager que le Blongios de Sturm et ces deux rallidés, en déplacement vers le nord, ont été poussés par la calima vers le large comme le Râle des prés observé à Lanzarote ; le flux de sud-ouest les aurait alors portés vers le sud du golfe de Gascogne, avec ou sans pose sur un bateau pour une partie du trajet, cette éventualité étant suggérée par la découverte des deux rallidés dans des ports. Mais ils ont aussi pu suivre un trajet essentiellement orienté vers le nord, comme l'a fait la gallinule tangéroise.

RÉFÉRENCES

• ANONYME (2023). Un Blongios de Sturm récupéré dans le centre de soins d'Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) en janvier 2023! (*Ornithomedia*, 4/01/2023). • BERGIER P., SADAK M. & LA CHM (2023). Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine Numéro 29. *Éléments d'Ornithologie Marocaine*: eom23121. • COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE (2006). En direct de la CAF. Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française en 2004-2006. *Ornithos* 13-4: 244-257. • GARCÍA DEL REY E. & GARCÍA VARGAS FJ. (2013). *Rare birds of the Canary Islands*. Lynx, Barcelona. • GUTIÉRREZ R., GARCÍA-VARGAS FJ., LORENZO J.A. & DE VRIES P. (2022). Influx of Saharan species to Canary Islands after calima storm in February 2020. *Dutch Birding* 44: 1-16. • MARTÍNEZ-VILALTA A., MOTIS A. & KIRWAN G.M. (2020). Dwarf Bittern (*Ixobrychus sturmii*). In DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J., CHRISTIE D.A. & DE JUANA E. (eds), *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca (doi.org/10.2173/bow.dwabit1.01). • MÉTÉO FRANCE (2023). Bulletin climatique. Décembre 2022 (www.meteofrance.com). • PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., GIL-VELASCO M., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D. & ILLA M. (2023). Observaciones de aves raras en España. Noviembre-Diciembre, 2022. In SEO/BIRDLIFE, *Informe Del Comité De Rarezas Noviembre-Diciembre 2022* (seo.org/wp-content/uploads/2023/02/Informe-CR-Noviembre-Diciembre-2022-FINAL-1.pdf).