

Une Fauvette naine *Sylvia nana* en 2015 en Vendée: première mention de l'espèce pour la France

Cela faisait plusieurs jours que je n'étais pas passé, comme je le fais souvent, le long de la digue de la pointe du Devin à l'Épine, l'une des quatre communes de l'île de Noirmoutier, Vendée. La veille s'y déroulait une compétition de «run and bike», et les jours précédents l'agitation due aux hordes de pêcheurs à pieds attirés par les forts coefficients des marées d'équinoxe m'avait dissuadé d'y venir. La pointe du Devin est protégée des assauts de la mer par



un enrochement linéaire, longé par une chaussée carrossable. Un milieu dunaire restreint s'y maintient tant bien que mal. Les vestiges de l'ancienne digue, plusieurs haies de tamaris, quelques buissons d'arroche marine et de soude viennent agrémenter l'ensemble. Le pied de la dune est fréquemment enrichi par des laisses de mer, projetées lors de coups de vent à marée haute, et trois grilles permettent au trop-plein d'eau de s'évacuer; autour de l'une d'elles, un buisson de soude s'est développé.

Par chance, en ce 24 mars 2015, la météo est favorable à l'observation des passereaux avec très peu de vent, et en dépit du ciel gris, la température est douce. En arrivant près de la digue vers 12h30, j'aperçois un petit passereau clair à l'allure de fauvette, plongeant dans le buisson de soude que je frôle. Sans descendre de voiture, je devine l'oiseau qui progresse lentement dans le buisson, son déplacement étant trahi par les mouvements des branches. À plusieurs reprises mais trop brièvement, j'observe entièrement la fauvette dont l'iris est pâle. Après consultation de mon guide de terrain, je m'oriente vers les Fauvettes du désert *Sylvia deserti* et naine *S. nana*, rien que ça !

Devant reprendre le travail à 13h30, je décide de faire un essai de repasse en utilisant les vocalisations de la Fauvette naine, ce qui provoque une vive réaction de l'oiseau: il se pose à trois mètres de la voiture en bordure du buisson, change plusieurs fois de perchoir, chante un peu,

1. Fauvette naine *Sylvia nana*, mâle, île de Noirmoutier, L'Épine, Vendée, 24 mars 2015 (Dominique Robard). Asian Desert Warbler, the first for France.

Ornithos 23-6 (2016)



2 & 3. Fauvette naine *Sylvia nana*, mâle, île de Noirmoutier, L'Épine, Vendée (Dominique Robard). Noter les rectrices en mue sur ces photos prises le 24 mars (2) et le 3 avril 2015 (3). Asian Desert Warbler, the first for France. Note moulting tail-feathers.

puis très vite retrouve une attitude calme. L'observation atteint alors son paroxysme: la fauvette se nourrit de graines de soude ou de larves, puis se toilette à trois mètres de moi. Rapidement, je note le centre sombre des tertiaires et des rectrices centrales, ce qui élimine la Fauvette du désert. C'est le ventre vide mais la tête pleine du merveilleux souvenir de cette observation que je reprends le travail. Vers 18h00, je retrouve Gérard Besseau, tout juste arrivé sur place, qui, après un examen méticuleux de l'oiseau évoluant toujours dans le même buisson, me confirme qu'il s'agit bien d'une Fauvette naine. De très nombreux autres observateurs viendront, souvent de loin, voir cet oiseau durant son séjour, jusqu'au dernier contact le 6 avril 2015. Dans un premier temps les observateurs se tenaient à distance, respectueux de l'oiseau. Malheureusement, certains ont donné le mauvais exemple, met-

Ornithos 23-6 (2016)

tant littéralement le nez dans le buisson pour vérifier la présence de la fauvette lorsqu'elle se faisait discrète, ce qui a entraîné une pression croissante sur l'oiseau.

DESCRIPTION

Silhouette et plumage

Globalement, la silhouette est celle d'une petite fauvette, de couleur brun sable sur le dessus, avec les ailes et surtout la queue plus rousses, le dessous apparaissant plus pâle. La tête est brun pâle, sauf le menton et la gorge qui sont blanchâtres, l'œil est entouré d'un cercle oculaire pâle et l'iris est jaune. Le bec, court, est jaune pâle avec la pointe et le culmen sombres; les pattes sont sensiblement dans les mêmes tons. Les couvertures sus-alaires présentent des teintes un peu plus chaudes et les tertiaires, centrées de sombre, ont de larges liserés ocre. Les sus-caudales sont franchement rousses, de même que les rectrices centrales, dont le

centre et le rachis sont sombres; rectrices externes blanches. L'oiseau était en mue, les rectrices centrales et externes ayant poussé entre le 24 mars et le 3 avril.

Comportement

Durant tout son séjour, la fauvette a exploité le même buisson bas, où elle se nourrissait de larves ou de graines de soude, parfois à même le sol. Elle se montrait relativement peu mais, souvent de façon timide, elle s'est mise à chanter de temps à autre. Devenue plus farouche lorsque la pression d'observation s'est intensifiée, elle s'est même enfuie de la soude à plusieurs reprises pour se réfugier dans un buisson proche, avant d'y revenir dès que la «menace» s'était éloignée. En fin de période, les mouvements migratoires se faisant plus nets, quelques Accenteurs mouchets *Prunella modularis*, Rougegorges familiers *Erithacus rubecula*, Merles noirs *Turdus merula* ou Pouillots fitis *Phylloscopus trochilus* investis-



4. Site d'observation de la Fauvette naine *Sylvia nana* sur l'île de Noirmoutier, L'Épine, Vendée (Dominique Robard). La petite zone de soudes au centre évoque les buissons bas où vit l'espèce dans les steppes d'Asie. Site of record of Asian Desert Warbler in France.

Commentaire du CHN. La Fauvette naine *Sylvia nana* se distingue de la Fauvette du désert *S. deserti* par sa coloration générale plus grise, notamment sur les parties supérieures, qui contrastent avec l'ensemble queue/ailles/sus-caudales/croupion brun-roux; la Fauvette du désert est un oiseau roux sable dessus, y compris sur la tête et la face. La projection primaire de la Fauvette naine est un peu plus longue que chez cette dernière, différence qui reste néanmoins subtile et difficile à vérifier sans photographies. La coloration des tertiaires et des rectrices est essentielle pour différencier les deux espèces. En effet, chez la Fauvette naine, ces plumes sont largement centrées de brun-noir, alors que chez la Fauvette du désert, les tertiaires sont de couleur sable uniforme, tout comme les rectrices centrales et les vexilles des rectrices les plus internes. Il y a en outre une différence dans le dessin des couvertures sus-alaires, en particulier les moyennes, qui sont largement bordées de gris chez la Fauvette naine alors qu'elles sont unies chez la Fauvette du désert. Enfin, il existe de légères différences de longueur du bec et du tarse, qui sont plus longs chez la Fauvette naine. Les photos de l'oiseau de Vendée ont permis au CHN de valider cette observation comme Fauvette naine. L'oiseau chantait, il s'agissait donc d'un mâle. Il n'a pas été possible d'en préciser l'âge.

Commentaire de la CAF. La Fauvette naine *Sylvia nana* et la Fauvette du désert *S. deserti*, longtemps considérées comme races d'une même espèce, forment un duo d'espèces dont la séparation, proposée par SHIRIHAI *et al.* (2001), est reconnue par la CAF (JIGUET & LA CAF 2004). La Fauvette naine niche en Asie centrale, du delta de la Volga, en Ukraine, à la Mongolie intérieure, dans l'ouest de la Chine. Migratrice, elle hiverne du sous-continent Indien à l'Iran, à la péninsule Arabique et à l'Afrique orientale. Les hivernants amorcent leur retour début mars, le pic migratoire semblant se situer dans la dernière décennie de ce mois, et au début d'avril, les sites d'hivernage sont quasiment désertés par l'espèce (CRAMP 1992). Si la Fauvette du désert, migratrice à moins longue distance, ne semble guère se dérouter au-delà des îles proches de l'Afrique du Nord (quelques rares mentions sur Linosa, à Malte, aux Canaries*), la Fauvette naine s'aventure jusqu'au nord de l'Europe. Ainsi, les 11 mentions du duo *nana/deserti* obtenues en Grande-Bretagne de 1970 à 2003 concernaient toutes la Fauvette naine, et il en allait de même pour les 9 mentions finlandaises connues à cette date (ROGERS *et al.* 2004). Les données britanniques citées dans cette publication sont surtout automnales (de fin octobre à fin novembre), deux observations seulement ayant été faites en mai. Fait plus surprenant, la première donnée britannique concernait un oiseau noté du 16 décembre 1970 au 2 janvier 1971 dans le sud du pays. L'observation de Noirmoutier s'intègre bien dans le contexte de dispersion de l'espèce en Europe. Elle se situe au cœur de la période de migration pré-nuptiale, mais le caractère essentiellement automnal de ses apparitions en Europe occidentale et le précédent de l'hiver 1970-1971 en Angleterre donnent un certain poids à la proposition de son découvreur, qui considère que l'oiseau aurait pu hiverner sur place. De fait, la CAF a inscrit la Fauvette naine *Sylvia nana* dans la catégorie A de la Liste des oiseaux de France, sur la base de l'oiseau mâle d'âge indéterminé, observé et photographié du 24 mars au 6 avril 2015 sur l'île de Noirmoutier, commune de L'Épine, Vendée.

* Rappelons qu'une observation du 16 mai 1971 en Camargue avait été attribuée à la Fauvette du désert (ERTEL & ERTEL 1972), mais la certitude manque pour éliminer la Fauvette naine, aussi la Fauvette du désert n'est-telle plus inscrite sur la Liste des oiseaux de France (CAF 2006).

RÉFÉRENCES

• CAF (2006). En direct de la CAF. Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française en 2004-2005. *Ornithos* 13-4: 244-257. • CRAMP S. (1992). *The Birds of the Western Palearctic. Volume VI*. Oxford University Press, Oxford. • ERTEL B. & ERTEL M. (1972). Wüstengrasmücke *Sylvia nana* in der Camargue. *Ornithologische Tittelungen* 24: 271-272. • JIGUET F. & LA CAF (2004). En direct de la CAF. Décisions récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française. *Ornithos* 11-5: 230-245. • ROGERS M.J. & THE RARITIES COMMITTEE (2004). Report on rare birds in Great Britain in 2003. *British Birds* 97: 558-625. • SHIRIHAI H., GARGALLO G. & HELBIG A. (2001). *Sylvia Warblers: identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Christopher Helm, London.

saient le buisson, et des Traquets motteux *Oenanthe oenanthe*, arrivés depuis peu, se postaient sur la digue. Le 2 et le 3 avril, la fauvette a été observée sur la digue et sur la plage, suivant les traquets: était-ce un signe annonciateur de son départ?

LA FAUVETTE AVAIT-ELLE PASSÉ L'HIVER SUR PLACE ?

Un jour entre mi-janvier et mi-février 2015, par un vent glacial soufflant du nord, alors que j'observais en mer à 500 m au nord du buisson de soude, un petit oiseau est sorti des enrochements en volant à moins de 5 m de moi pour se cacher dans des tamaris. Je n'ai pas eu le temps de prendre les jumelles, mais j'ai vu un oiseau qui m'a rappelé la Fauvette du désert trouvée aux Pays-Bas en novembre 2014, dont j'avais une photo en mémoire. Le souvenir résultant

de l'observation trop furtive s'estompait au fil des secondes pour se limiter à un petit oiseau ressemblant à une fauvette de couleur pâle et avec une queue rousse. Sans doute transi de froid, j'avais alors opté pour un Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* de type femelle, pâle et petit, certes, mais dont la silhouette en vol avait pu être déformée par le fort vent contraire. Avec le recul, je suis maintenant persuadé qu'il s'agissait de la Fauvette naine, sans que, hélas, je n'en retrouve la moindre trace dans mes notes. Il se pourrait donc qu'il ne s'agisse pas d'un migrateur pré-nuptial égaré, mais d'un oiseau ayant passé au moins une partie de l'hiver dans le secteur... Le fait que certaines rectrices, nouvellement muées, soient encore en croissance à la fin du mois de mars semble renforcer cette hypothèse. Ces plumes sont habituellement

muées entre décembre et mars, et les hivernants ont pour la plupart quitté les sites d'hivernage avant la fin mars (CRAMP 1992): il ne semble donc pas y avoir d'incompatibilité entre les chronologies de mue et de migration.

BIBLIOGRAPHIE

• CRAMP S. (1992). *The Birds of the Western Palearctic. Volume VI. Warblers*. Oxford University Press, Oxford.

SUMMARY

Asian Desert Warbler, new to France. On 24 March-6 April 2015, a male Asian Desert Warbler was present on the island of Noirmoutier in Vendée, Atlantic coast of France and constitutes the first record of this taxon in France. Accepted by the French Rarities Committee (CHN), it was added to category A of the French List by the French Avifaunal Committee.

Dominique Robard
(dominiquerobard@orange.fr)

5 & 6. Fauvette naine *Sylvia nana*, mâle, île de Noirmoutier, L'Épine, Vendée, 24 mars 2015 (Dominique Robard). Deux types de comportement de recherche alimentaire: capture d'invertébrés depuis le sol (5) et cueillette de graines de soude dans un buisson (6). Asian Desert Warbler. Feeding behaviour: capture of invertebrates from the ground (5) and picking of seeds in a soda bush (6).

