# Les oiseaux rares en France en 1994

## *Rapport du Comité d'Homologation National*

*par Philippe J. Dubois et le CHN*



### Introduction

Ce 13ème rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 1994. Au total, 490 fiches ont été examinées au cours de cette année, ce qui marque une augmentation de 27 % par rapport à 1993 ! Ceci inclut bien entendu des fiches antérieures à 1994. Parmi ces fiches, 85 % ont été homologuées, chiffre classique.

Comme pour le précédent rapport (*Ornithos* 2 : 1-19), les données publiées ici sont celles des espèces des catégories A et C. En annexe, se trouvent des données de la catégorie D1 et quelques rares mentions d'espèces inscrites dans aucune catégorie, mais dont le CHN considère qu'il est opportun de garder une trace.

Membre du CHN depuis 1987, Yvon Guermeur a été remplacé par Serge Nicolle en 1994, qui avait déjà été membre de 1985 à 1991. Le CHN remercie Yvon pour sa contribution à la bonne marche du comité. Pour cette année, le CHN se compose donc de : Pierre Crouzier, Philippe J. Dubois (Président), Marc Duquet, Jean-Yves Frémont (Secrétaire), Serge Nicolle, Alain Rouge, Jean Sériot et Pierre Yésou.

Un poste a été pourvu en 1995 et un autre doit l'être en 1996. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du CHN avant le 1er mars 1996.

### Travaux et décisions prises par le CHN

**Commission Avifaunistique Française**. Au cours de la séance plénière de mars 1995, le CHN s'est félicité de la rénovation de la Commission Avifaunistique Française (CAF). Désormais les « premières » françaises - espèces et sous-espèces - seront, après homologation et avis du CHN, inscrites dans l'une des catégories ou annexes de la Liste Française par la CAF qui étudiera chaque cas soumis par le CHN. Ces résultats sont et seront publiés régulièrement dans *Ornithos*, sous la rubrique « En Direct de la CAF et du CHN ».

**Nouvelle fiche CHN**. Un nouveau modèle de fiche d'homologation a été réalisé en 1995 avec l'aide de *Bushnell* et de *Bausch & Lomb*. Elle est disponible au secrétariat du CHN à Rochefort (envoyer une enveloppe timbrée à votre adresse) et *il est demandé explicitement d'utiliser ce modèle, si possible à l'exclusion de tout autre.*

**Révisions des données de certaines espèces**. Le CHN a terminé la révision des données du Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* présentant les caractéristiques de la race *tristis* (voir l'article de P.J. Dubois & P. Yésou dans le présent numéro, ainsi que les données publiées ci-dessous). Les données d'Aigrette des récifs *Egretta gularis* vont être prochainement réexaminées par le CHN.

**Choucas des tours oriental**. Le CHN souhaite recueillir des informations sur le Choucas des tours de la race orientale *Corvus monedula soemmerringii* (voir l'article de P. Crouzier dans le présent numéro).

**Rédaction des fiches**. Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche d'homologation dès que possible après l'observation et en tout cas avant le 31 décembre de l'année en cours. Ceci permettrait d'éviter la publication très tardive de données anciennes.

### Les faits marquants

Deux nouvelles espèces ont été inscrites en 1994 sur la Liste Française (catégorie A) : le Héron vert *Butorides virescens* et le Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis*. Deux « premières » françaises plus anciennes ont été également homologuées ; il s'agit du Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* en 1985 et du Fuligule à tête noire *Aythya affinis* en 1992 (catégorie A). De même une nouvelle sous-espèce est inscrite pour 1994 : le Pinson des arbres d'Afrique du Nord *Fringilla coelebs* gr. *spodiogenys* (catégorie A).

Par ailleurs, 1994 a fourni les seconde et troisième observations de Macreuse noire à bec jaune *Melanitta (nigra) americana*, la seconde de Goéland argenté nord-américain *Larus argentatus smithsonianus*, la seconde de Rousserolle

des buissons *Acrocephalus dumetorum*, la troisième de Roselin githagine *Rhodopechys githaginea*, la quatrième mention d'Albatros à sourcils noirs *Diomedea melanophrys*, de Gravelot de Leschenault *Charadrius leschenaultii*, de Pouillot de Schwarz *Phylloscopus schwarzi* et de Bruant auréole *Emberiza aureola*, la cinquième de Buse féroce *Buteo rufinus* (la première depuis 1979) et de Pipit à dos olive *Anthus hogdsoni*. Enfin, 1993 a vu la cinquième mention française du Guêpier de Perse *Merops persicus* (la première depuis 1927 !).
Des chiffres records d'Érismatures rousses *Oxyura jamaicensis* (25), de Bécassines doubles *Gallinago media* (5), de Pipits de Richard *Anthus richardi* (38), de Rousserolles isabelles *Acrocephalus agricola* (3) et de Bruants nains *Emberiza pusilla* (8) ont été enregistrés en 1994, ainsi qu'un total de 65 Pouillots à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*.
Enfin, bien qu'inscrits sur aucune liste, il faut noter la présence d'un Fou à pieds bleus *Sula nebouxii* près des Sept-Îles et d'au moins une dizaine de Sternes incas *Larosterna inca* sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique.

## Liste systématique des données acceptées (catégories A et C)

Les données sont présentées comme suit :

**1.** Noms français et scientifique.

**2.** Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre de données homologuées depuis 1981 (1994 exclue) et celui des individus correspondant ; les deux derniers, la même chose pour 1994.

**3.** Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.

**4.** Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).

**5.** Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.

**6.** Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré (enr.).

**7.** Date(s) d'observation.

**8.** Observateur(s), sauf exception limité à trois (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe/dessinateur).

**9.** Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.

**10.** La séquence taxonomique est celle de Voous (*The List of the Birds of the Western Palearctic*, 1978, modifiée par la liste « LPO »,1993).

**11.** Les données concernant les races sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la race concernée.

**12.** Sauf indication contraire, les données se rapportent à 1994. Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Héron vert : un ad., 1er avril, Hoëdic, Morhihan (G. Rault *in* Dubois et le CHN, 1995).

### GRÈBE À BEC BIGARRÉ *Podilymbus podiceps* (1/1 - 0/0)

**1985 Vendée** - lagune de La Belle-Henriette/La Faute-sur-Mer, ad., 17 octobre (P. Clairefond,P. Yésou)

(Amériques). Première observation française, examinée tardivement par le CHN, la donnée étant restée longtemps en souffrance dans le tiroir de l'un des observateurs. Elle précède de 10 ans la seconde, en cours d'examen, faite en janvier et février 1995 dans le port de Dunkerque, Nord. L'espèce a déjà été observée en Grande-Bretagne (une douzaine de fois), en Irlande, en Islande et aux Açores (P. Alström *et al.*, 1992, Guide des oiseaux accidentels et rares en Europe).

### ALBATROS À SOURCILS NOIRS *Diomedea melanophris* (3/3 - 1/1)

**Nord** - Le Clipon/Loon-Plage, imm., 6 novembre (V. Vanhalst).

(Mers australes). Quatrième observation française et la seconde effectuée à partir de la digue du Clipon dans le Nord ! C'est également la plus tardive et la première concernant un oiseau immature.

### PUFFIN SEMBLABLE *Puffinus assimilis* (26/29 - 2/2)

**Finistère** - Ouessant : Creac'h, 14 octobre (F. Schurr).

**Pas-de-Calais** - cap Gris-Nez/Audinghen, 29 août (V. Cohez, G. Flohart, P.R. Legrand).

(La race *baroli* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries et aux Açores). Après le « blanc » de 1993, à nouveau une année avec deux données conforme à toutes les précédentes depuis 1989. L'oiseau du cap Gris-Nez est le premier homologué pour ce site.

### OCÉANITE DE WILSON *Oceanites oceanicus* (4/4 - 1/1)

**Vendée** - au large des Sables d'Olonne, 46°28'N, 1°54'W, 18 août (D. Desmots *et al.*).

(Les îles de l'Antarctique. En période internuptiale, tous les océans, y compris l'Atlantique). Cet océanite reste encore d'une grande rareté dans les eaux continentales françaises, bien qu'il y soit peut-être régulier, en août, à l'instar des côtes du sud-ouest de l'Angleterre.

### HÉRON VERT *Butorides virescens* (0/0 - 1/1)

**Morbihan** - Hoëdic, ad., 1er avril (G. Rault).

(Amérique du Nord, centrale, jusqu'au Vénézuela). Première donnée française pour ce héron déjà observé en Europe (Grande-Bretagne, Açores). Le sérieux de la description (*cf. Ornithos* 2 : 90-92), exclut tout « poisson d'avril » !

### AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (16/15 - 1/0)

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : La Capelière, ad. , forme sombre, race *gularis*, 2 mai au 20 août (Y. Kayser*et al.*).

(Afrique, Asie). Présence cette année encore de l'oiseau « sombre » à la réserve de La Capelière.

### IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (134/244 - 11/22)

**Ain** - Lapeyrouse, 3 au 13 décembre (A. Bernard, P. et J.B. Crouzier *et al.*).
**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Mas Neuf du Vaccarès et environs, 2 ind., 2 janvier au 17 mars (M. Gounot, Y. Kayser *et al.*) ; Pont-de-Gau, 2 ind., 22 mai au 9 juin (R. Lamouroux *et al.*), sans doute les mêmes oiseaux, 2 ad. et 2 juv., 14 juin au 4 juillet (R. Lamouroux *et al.*), 6 ind., 16 août (R. Lamouroux) ; marais de Vigueirat et environs, un à 8 ind., 21 octobre au 15 février 1995 (A. Mante, J.L. Lucchesi *et al.*).
**Loire-Atlantique** - Donges, 8 mai, 13 juillet, 9 août (J. Bourles, D. Raboin, Ch. Vuillemot *et al.*) ; lac de Grand-Lieu, ad., 17 mai, 22 et 23 juin (S. Reeber *et al.*), sans doute le même oiseau.
**Morbihan** - Pénestin, 17 octobre (A. Le Nevé).
**Pyrénées-Atlantiques** - marais de la Saligue/Biron, 2 ind., 20 novembre et 1er décembre, un oiseau présent jusqu'au 14 mai 1995 (A. Guyot, N. Lasierra *et al.*).
**Sarthe** - Saint-Vincent-du-Lorouër, imm., phot., 22 au 25 octobre (Ch. Kerihuel, M. Leroux).
**1993 Alpes-Maritimes** - embouchure du Var, Saint-Laurent-du-Var, ad. et juv., 20 octobre, et non Var comme publié par erreur (*Ornithos* 2 : 3).

(Cosmopolite, les colonies les plus proches dans les Balkans et probablement en Hongrie. Aussi delta du Pô et Sardaigne. A niché en Camargue et dans l'Aude). Difficile de comptabiliser les oiseaux de Camargue : sans doute 16 oiseaux en tout, qui ont largement circulé.

### OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (13/46-1/0)

**Vendée** - Saint-Denis-du-Payré, ad., 16 novembre au 4 février 1995 (A. Thomas *et al.*), sans doute un des deux oiseaux de l'an passé (*cf. Ornithos* 2 : 3).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Phénomène classique de « rémanence » hivernale.

### BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (12/10-2/0)

Individus présentant les caractéristiques de la race *nigricans*, appelée « Bernache cravant du Pacifique » :
**Charente-Maritime** - île de Ré, ad., 19 décembre au 12 janvier 1995 (H. Robreau).
**Morbihan** - Saint-Armel, ad., 1er janvier (G. Rault).



*97.* Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*, immature, Saint-Vincent-du-Lorouër, Sarthe, octobre 1994. (M. Leroux)

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Apparemment l'oiseau présent chaque hiver sur Ré depuis 1985 n'a pas été revu, mais il est possible qu'il ait hiverné sur l'île d'Oléron (observations à venir) ; seul reste le deuxième individu découvert en janvier 1992. Celui du Morbihan est probablement le même que l'oiseau observé en 1990 et 1991 au même endroit et qui semble, entre temps, être passé inaperçu...

### BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis* (6/8-2/1)

**Morbihan** - Vannes, âge indéterminé, phot., 19 novembre (J.F. Robic *et al.*).
**Bas-Rhin** - Neuhaeusel, ad., 8 janvier au 9 février (Ch. Dronneau, Ch. Frauli *et al.*), sans doute le même oiseau que celui du Haut Rhin en décembre 1993 (*cf. Ornithos* 2 : 4).

(Sibérie). Le problème avec les Anatidés, c'est qu'il est toujours difficile de faire la part des oiseaux revenant sur leurs lieux d'hivernage. Dans le cas présent, l'oiseau d'Alsace est sans doute le même, mais celui du Morbihan est plus problématique : un imm. avait été vu en novembre et décembre 1990 dans le golfe du Morbihan. Cet oiseau aurait-il pu passer inaperçu pendant quatre ans ?

### SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (12/10 - 0/0)

Mâles présentant les caractéristiques de la race américaine *carolinensis*, appelée « Sarcelle d'hiver de la Caroline » :
**1991 Somme** - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, mâle, janvier au 23 mars (Ph. Carruette).
**1992 Somme** - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 mâles, 24 octobre, un mâle jusqu'au 8 novembre (Ph. Carruette), et non un mâle, 2 novembre au moins (*cf. Ornithos* 1 : 5).

(Amérique du Nord). Confirmation de l'hivernage plus ou moins régulier d'un oiseau au parc ornithologique du Marquenterre dans la Somme, avec - en prime - deux mâles en octobre 1992 !

### SARCELLE SOUCROUROU *Anas discors* (17/19 - 1/1)

**Loire-Atlantique** - lac de Grand-Lieu, mâle, 28 mars (S. Reeber).

(Amérique du Nord). Au printemps, c'est d'ordinaire en avril que s'observe cette sarcelle, dont c'est la première mention pour le mois de mars (bien qu'il y ait également une donnée de février 1992 dans les Côtes d'Armor).

### SARCELLE MARBRÉE *Marmaronetta angustirostris* (5/5 - 1/1)

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : marais du Grenouillet, 24 août au 4 septembre (Y. Kayser).
(Méditerrannée, Moyen-Orient, Inde du Nord). Le lieu et la date plaident en faveur d'un oiseau sauvage.

### FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (32/33 - 5/3)

**Charente-Maritime** - La Couarde/Ré, mâle ad., 4 décembre au 15 février 1995 (P.P. Evrard, M. Leroux, H. Robreau *et al.*).
**Eure** - Poses et Val de Reuil, fem. ad., 20 novembre au 5 mai 1995 (L. Demongin *et al.*).
**Gironde** - Braud-Saint-Louis, mâle ad., 15 janvier au 22 mars (J.P. Baudet, J.F Gaillard, J.L Hentz *et al.*).
**Moselle** - étang de Welchof/Puttelange-aux-Lacs, mâle ad., 8 octobre au 30 décembre au moins (G Joannès).
**Nord** - Fresnes-sur-Escaut, mâle, phot., 20 avril (P Plichon, R Tonnel).

(Amérique du Nord). Les oiseaux de l'Eure et de la Moselle sont des « revenants », le dernier hivernant sur la commune de Puttelange depuis l'hiver 1991/92.

### FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (2/1 - 0/0)

**1992 Bouches-du-Rhône** - Camargue : Pont-de-Gau, phot., mâle, 9 février (M. Gauthier-Clerc).
**1993 Bouches-du-Rhône** - Camargue : La Capelière, mâle, 20 au 24 novembre (Y. Kayser, H. Kowalski *et al.*), sans doute le même oiseau.

(Amérique du Nord). Premières données françaises concernant sans aucun doute le même mâle qui n'est guère resté sur les sites de découverte. Il existe quelques mentions dans les îles Britanniques, mais également aux Pays-Bas (1), en Suisse (1) et aux Canaries (une au moins). Dès lors que les critères d'identification sont bien connus, il est probable que le second oiseau en France ne devrait pas tarder.

### MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (1/1 - 2/2)

Individu présentant les caractéristiques de la race *americana*, appelée « Macreuse à bec jaune » :
**Nord** - nouvel avant-port de Dunkerque, mâle, 27 mars, 17 et 18 avril (E. Dansette, R.M. Lafontaine *et al.*).
**Pyrénées-Atlantiques** - Biarritz, mâle imm., 13 juin (A. Guyot).

(Amérique du Nord, Sibérie). Seconde et troisième données pour la France. L'oiseau du Nord pourrait être celui vu au même endroit le... 15 avril 1992. Quant à l'immature de Biarritz, la date surprenante laisse à penser que la mer, à cette époque, peut receler des raretés insoupçonnées.

### MACREUSE À LUNETTES *Melanitta perspicillata* (8/8 - 1/1)

**Charente-Maritime** - au large de la pointe de Chassiron/Oléron, mâle ad., 1er février (O. Girard).

(Amérique du Nord). C'est le quatrième oiseau de l'hiver 1993/94 (mais le seul pour cette dernière année). Celui-ci a été vu lors d'un recensement aérien en hélicoptère, à basse altitude !



*98.* Bernache à cou roux *Branta ruficollis*, Vannes, Morbihan, novembre 1994. (J.-F. Robic)



*99.* Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*, Mésangers, Mayenne, mai 1994. (J.-F. Arcanger)

### ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (79/137 - 15/25)

**Ain** - Versailleux, mâle et fem., 13 mars au 16 avril (P. et J.B. Crouzier, J.Y. Fournier).
**Bouches-du-Rhône** - Camargue : étang du Vaccarès, fem./imm., 29 et 30 novembre (P.A. Crochet, Y. Kayser, Ph. Vandewalle).
**Eure** - Poses, fem., 3 novembre (L. Demongin).
**Finistère** - étang de Trunvel, 2 fem./imm., 1er novembre (J. Petit).
**Ille-et-Vilaine** - étang de Bazouges/Hédé, fem./imm., 17 janvier (P. Le Mao).
**Landes** - marais d'Orx, fem./imm., 9 septembre (B. Delprat, R. Duguey).
**Loire-Atlantique** - Chateaubriant, fem., 16 juillet (J.F. Dufland) ; lac de Grand-Lieu/Saint-Philibert, 9 ind. dont 2 mâles au moins, 4 novembre (P. Boret, S. Reeber) ; Bourgneuf-en-Retz, mâle, 25 et 26 décembre (D. Pilvin).
**Marne** - lac du Der/Arrigny, fem., 28 et 29 octobre (E. Leroy, R. Riols).
**Mayenne** - étang de Mortry/Mésangers, mâle et fem., phot., 19 mai au 30 juin et Grande Métairie/Jublains, mâle et fem., 11 au 27 juillet (J.F. Arcanger *et al.*), les mêmes oiseaux.
**Pas-de-Calais** - Pont-d'Ardres, mâle, 22 juillet (D. Tirmarche) ; Mont-Bernenchon, fem./imm., 28 août au 11 septembre (D. Arnould, A. Louchart) ; Boiry-Sainte-Rictrude, fem./imm., 11 septembre (B. Tailliez).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). 1994 est une année record, tant pour le nombre de données que pour celui des individus. On constate d'abord une arrivée groupée fin octobre-début novembre (période classique), ensuite qu'il se confirme une arrivée plus précoce en saison (juillet-août-septembre), notamment dans les régions proches des îles Britanniques, enfin qu'une nouvelle reproduction est à attendre (et à craindre...), peut-être au lac de Grand-Lieu ou en Mayenne ?

### ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (11/11 - 3/2)

**Ain** - Villars-les-Dombes, mâle ad., 16 janvier (G. Bruneau, L. Majorel) ; Le Plantay, mâle ad., 20 février au 14 mars (P. et J.B. Crouzier, J.Y. Fournier, G. Piau *et al.*), peut-être le même oiseau.
**Nord** - Téteghem, fem. ad., phot., 4 au 12 décembre (Ph.J. Dubois, M. Duquet, J.-Y. Frémont *et al.*).

(Circum-méditerranéen : Espagne, Tunisie, Turquie, dans les Balkans [?]. Également au nord de la Caspienne). Toujours rien de nouveau qui puisse nous éclairer sur la provenance réelle de ces oiseaux observés en France. Celui de Téteghem est apparemment le premier pour la région Nord/Pas-de-Calais.

### ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (21/25 - 2/4)

**Eure** - « marais Vernier », couple, 22 août peut-être jusqu'à début mai 1995 au moins (F. Prévost *et al.*).
**Landes** - localité tenue secrète, « site n°4 », couple, 2 jeunes à l'envol, juin (G. Blake, P. Grisser *et al.*).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal). À nouveau reproduction dans les Landes cette année. La présence d'un couple cantonné en Normandie est tout à fait remarquable et constitue l'un des événements marquants de cette année. Cependant, peu de temps après leur découverte, les informations sur ces oiseaux sont devenues parcellaires, si bien que leur présence tout au long du printemps reste entachée d'incertitude...

**PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (177/150 - 9/9)**

**Allier** - Nassigny, imm., 18 au 20 mars (Anon.).:
**Bouches-du-Rhône** - Camargue : marais du Grenouillet, 1er hiver, 2 février au 9 mars (P. Crouzier, Y. Kayser *et al.*).
**Landes** - Saint-Martin-de-Seignanx, 2ème hiver probable, 23 janvier au 13 février (Ph.J. Dubois, A. Guyot, P. Grisser *et al.*).
**Marne** - lac du Der/Chantecoq, 3 ad. et 2 1er hiver, 26 et 27 février, 2 ad. et 2 1er hiver jusqu'au 1er mars, un ad. et un 1erhiver jusqu'au 27 mars (Ch. Riols *et al.*, *cf. Ornithos* 2 : 5) ; « étangs d'Argonne », imm., 18 mars (R. Desmet).
**Moselle** - étang du Lindre/Tarquimpol, imm., 12 mars (M. Parent).
**Pas-de-Calais** - cap Gris-Nez/Audinghen, 3 juv., 18 octobre (V. Cohez, D. Tirmarche).
**Bas-Rhin** - Kraff-Plobsheim/Erstein, ad., 27 février au 13 mars (Ch. Dronneau, A. Le Nevé *et al.*).
**Deux-Sèvres** - lac du Cébron/Saint-Loup-sur-Thouet, ad., 4 janvier au 3 mars (J.Y. Airaud, M. Fouquet *et al.*), sans doute le même oiseau que celui de 1993 (*cf.* ci-dessous).
**Yvelines** - Rambouillet, imm., 30 décembre (F. Arnaboldi, H. Vigoureux).
**1989 Gironde** - Grayan, 1er hiver, 19 décembre au 4 février 1990 (D. Gey *et al.*).
**1993 Indre-et-Loire** - La Fillonerie/Villandry, 1ère année probable, 1er novembre, et non Ille-et-Vilaine comme indiqué par erreur (*cf. Ornithos* 2 : 5).
**1993 Meurthe-et-Moselle** - étang de Bossupré/Parroy, imm., 13 novembre (F. Fève).
**1993 Deux-Sèvres** - lac du Cébron/Saint-Loup-sur-Thouet, ad. ou subad., 24 février au 10 mars (A. Armouet, M. Fouquet).
**Vendée** - La Guittière/Talmont, imm., phot., 26 juillet (*Ornithos* 2 : 5), également marais d'Olonne/L'Ile d'Olonne, 23 juin au 8 juillet (M. Fouquet *et al.*).

(Europe septentrionale et centrale, Islande, sud-ouest du Groenland). La comptabilité des Pygargues à queue blanche en France n'est pas aisée, notamment en Champagne-Ardenne (d'où les données pour l'hiver 1994/95 ne sont pas encore parvenues...). L'oiseau des Landes est le même que celui vu durant l'hiver 1992/93, celui des Deux-Sèvres a hiverné probablement deux hivers consécutifs. Pas d'informations précises pour celui de l'étang du Lindre. Notons enfin la donnée remarquable de trois jeunes oiseaux en migration active près du cap Gris-Nez, lors d'une journée de forte migration de rapaces.

**VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (4/4 - 1/1)**

**Pyrénées-Atlantiques** - Bilhères-en-Ossau/Bielle, phot., 5 au 8 avril (D. Peyrusqué).

(De l'Espagne à la Chine). L'espèce est annuelle en France depuis 1991. C'est encourageant, et le bon état de santé des populations espagnoles porte à l'optimisme pour l'avenir.

**BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (21/21 - 3/3)**

**Doubs** - Frasne, mâle 3ème année, 17 septembre (M. Duquet).
**Drôme** - Chabeuil, mâle 3ème année, phot., 4 au 7 avril (F. Lloret *et al.*).
**Marne** - Marigny-le-Grand, mâle, 19 avril (P. Ferté).

(Asie centrale, à l'ouest jusqu'en Roumanie). À nouveau une « bonne » année - la troisième consécutive - avec des observations à des dates parfaitement typiques. Au vu des récentes manifestations territoriales (France, Allemagne, Pays-Bas), d'une



***100.*** Busard pâle *Circus macrourus*, mâle, Chabeuil, Drôme, avril 1994. (F. Lloret)

tentative de reproduction avec un Busard Saint-Martin *C. cyaneus* aux Orcades, Shetland en 1995 (*Birding World* 8 : 253-255) et d'une hybridation réussie en Finlande en 1993 avec une femelle de Busard cendré *C. pygargus* (*Dutch Birding* 17 : 102-106), cette espèce est à suivre de près.

### BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (0/0 - 1/1)

**Alpes-Maritimes** - La Fontonne/Antibes, adulte probable, 4 octobre (L. Clair).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Cinquième donnée française et la première dans les archives du CHN (la précédente du 27 juillet 1979 en Crau). Les autres sont de septembre 1878, du 3 octobre 1902 et d'avril-juin 1972.

### BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (134/142 - 15/15)

**Ain** - Fort-l'Ecluse, imm., 19 mars (M. Bueno, B. Piot).
**Charente-Maritime** - Moëze, imm., 15 novembre au 27 février 1995 (Ph. Poiré *et al.*).
**Doubs** - La Rivière-Drugeon, ad., 26 février (M. Montadert).
**Finistère** - Ouessant : Cost ar Reun, 1er hiver, phot., 18 octobre ; Arland, le même, 19 octobre, moribond, mort par la suite (P. Crouzier, Ph.J. Dubois).
**Landes** - marais d'Orx, ad., 22 novembre (B. Delprat).
**Loiret** - Saint-Martin d'Abbat, 1er hiver, 7 novembre (M. Thibault).
**Marne** - Cernon, ad. probable, 8 mars (P. Ferté) ; lac du Der/Arrigny, 1er hiver probable, 1er novembre (Ch. et R. Riols).
**Nord** - Leffrinckoucke, 1er hiver, 16 octobre (H. Dufourny et al.).
**Pas-de-Calais** - Vimy, 13 septembre (D. Cohez, J.L. Migeon) ; Merlimont, ad., 9 octobre (Ch. Fournier, M. Guerville) ; Audinghen, 1er hiver, 17 octobre (D. Tirmarche) ; Thelus, 1er hiver, 26 octobre (J.M. Venel) ; Labroye et Raye-sur-Authie, 1er hiver, phot., 8 au 21 novembre (V. Gaveriaux).
**Bas-Rhin** - Herbsheim, ad., 22 janvier (Ch. Dronneau).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Une invasion en Europe du Nord-Ouest, à l'automne 1994, a touché la France, avec des oiseaux dans le nord du pays, mais aussi jusqu'en Charente-Maritime et dans les Landes, et même à... Ouessant ! La mention du 13 septembre dans le Pas-de-Calais est remarquable et devient la plus précoce pour l'automne (précédente : 15 septembre 1961 dans le Loir-et-Cher).

### AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (15/16 - 3/3)

**Charente-Maritime** - Les Portes-en-Ré, ad., 23 février au 17 mars (D. Lecuyer, E. Richard, H. Robreau).
**Pas-de-Calais** - cap Gris-Nez/Audinghen, ad., 18 octobre (H. Dupont, D. Heintz, N. Selosse) ; Hardelot, 1er hiver, 20 octobre au moins (M. Guerville, D. Willecomme).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Remarquables données : celle de l'île de Ré par sa date quasi-hivernale (ou très précoce ?), celles du Pas-de-Calais pour être les premières dans cette région et l'oiseau du 18 octobre ayant été vu quelques instants avant 3 Pygargues à queue blanche (cf. ci-dessus) !

### AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (64/53 - 5/4)

**Aude** - Gruissan, imm., 8 novembre au 31 mars 1995 (D. Clément *et al.*).
**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Bois de la Ville, Tour du Valat et environs, ad. jusqu'au 18 mars (*cf. Ornithos* 2 : 6), ad., 13 novembre au 13 mars 1995 (Y. Kayser *et al.*), 1er hiver forme pâle, 13 novembre au 30 mars 1995, (P.A. Crochet, Y. Kayser *et al.*), 1er hiver, forme *fulvescens*, 30 décembre au 3 mars (P.A. Crochet, Y. Kayser *et al.*), imm., 26 novembre au 12 mars (P.A. Crochet, Y. Kayser *et al.*) ; Marais du Vigueirat, ad., jusqu'au 19 mars (*cf. Ornithos* 2 : 6).
**1985 Vendée** - pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, 1er hiver, 7 février (S. Bonnaud), précédemment refusé, accepté après réexamen.
**1989 Haute-Savoie** - col de Coux, Le Berroi/Morzine, ad., 1er octobre (D. Baud, Ch. Berger).
**1990 Charente-Maritime** - Les Portes-en-Ré, ad., 28 mars (H. Robreau), précédemment accepté comme Aigle pomarin ou criard (*Alauda* 59 : 231).
**1992 Haute-Savoie** - col de Coux, Le Berroi/Morzine, ad., 21 septembre (D. Baud).

(Pologne à la Sibérie orientale). Belle série d'observations en Camargue, où - en dehors d'un adulte sans doute habitué des lieux - un jeune de la forme *fulvescens* a été noté, en même temps qu'un autre, assez pâle, qui a longtemps été pris pour l'Aigle impérial *A. heliaca* hivernant de l'an passé (à noter que les données de fin d'hivernage 1993/94 publiées ci-dessus n'ont pas été comptabilisées pour cette année). Sont publiées également quelques observations réexaminées récemment par le CHN (*cf. Ornithos* 2 : 1).

### AIGLE POMARIN ou CRIARD *Aquila pomarina* ou *clanga* (7/7 -0/0)

**1984 Nord** - Armentières, 27 octobre, précédemment accepté (*Alauda* 54 : 293), à présent refusé après réexamen.
**1989 Aude** - Treilles, 5 mai, précédemment accepté (*Alauda* 58 : 250), à présent refusé après réexamen.
**1990 Calvados** - Norrey-en-Auge, ad., 31 juillet, précédemment accepté (*Alauda* 60 : 204), à présent refusé après réexamen.

(Europe centrale à la Sibérie). Encore des conséquences du réexamen de l'ensemble des données d'Aigles criards et pomarins par le CHN.

**AIGLE IMPÉRIAL *Aquila heliaca* (1/1 -0/0)**

**1993 Bouches-du-Rhône** - Camargue, Grand Romieu, Tour du Valat et environs, 1ère année, phot., 12 novembre au 20 mars 1994 (et non 12 mars) et non marais du Vigueirat où l'oiseau n'est resté qu'une journée (*cf. Ornithos* 2 : 7).

(Balkans, Turquie jusqu'en Asie centrale, Mongolie). La donnée du 7 avril 1931 publiée également sous la rubrique « Aigle impérial » est erronée de l'avis même de l'informateur. L'oiseau de l'hiver 1993/94 est donc le troisième *heliaca* certain pour la France.

**FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (24/39-3/3)**

Hors Crau :

**Aude** - Treilles, fem. ou mâle imm., 28 avril (M. South, P. Yésou).

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : étang de Galabert, mâle imm., 8 avril (A. Guillaumet).

**Pyrénées-Orientales** - étang de Canet/Saint-Nazaire, mâle, 20 mars (S. Dulau).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). Toujours aussi peu de données en dehors de Crau (où il y a eu 28 couples en 1994 donnant 37 jeunes à l'envol (info. L. Brun et CEEP). La date du 20 mars est l'une des plus précoces connues en France.

**FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonorae* (152/209 - 27/38)**

**Ain** - Ceyzeriat, ad. forme claire, 2 octobre (P. et J.B. Crouzier, S. Piton).

**Aude** - Le Castelnau/Narbonne, forme claire, 30 avril (D. Clément, A. Jonard) ; Nissan, 5 ind., 28 mai (A. Guillaumet *et al.*) ; Gruissan, 1er mai (D. Clément, A. Guillaumet, A. Jonard), ad. forme claire et sombre, imm., 13 juillet (A. Guillaumet *et al.*), 2 ind., 26 juillet (D. Clément), forme claire, 10 août (O. Timsit), ad. forme sombre, 24 août (D. Delcampe, D. Gailliez, V. Zuin), 2 ind. dont une forme claire, 1er et 3 septembre (Equipe LPO-Aude), forme claire, 1er octobre (A. Guillaumet) ; étang de Pissevaches/Fleury, forme claire, 24 août (E. Rousseau) ; étang de Vendres/Vendres, ad. forme claire, 27 août (J. Ph. Siblet).

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : étang des Impériaux, forme claire, 20 avril (D. Gailliez) ; Tour Vieille, ad. forme claire, 26 avril (Th. Disca, V. et X. Rufray) ; Tour du Valat, ad. forme claire, 22 septembre (M. Gauthier-Clerc).

**Drôme** - montagne de la Série/Aleyrac, forme claire, 19 juillet (G. Olioso).

**Hérault** - Castelnau-le-Lez, forme sombre, 19 avril (P. Cramm, V. Rufray) ; Pignan, ad. forme claire, 15 mai (G. et M.N. Balança, Th. Bara).

***101.*** Vautour moine *Aegypius monachus*, Bilhères-en-Ossau, Pyrénées-Atlantiques, avril 1994. (D. Peyrusqué)



***102.*** Marouette poussin *Porzana parva*, femelle, Camargue, Bouches-du-Rhône, avril 1994. (A. Mante)



**Loire** - col de Baracuchet/Lérigneux, forme sombre, 21 août (P. Balluet).
**Loire-Atlantique** - La Turballe, forme claire, 31 mai (J. Pourreau).
**Lozère** - Le Chastelas/Vialas, forme sombre, 17 juillet (S. Dulau), 4 ind. forme claire dont un imm., 23 juillet (S. Dulau) ; Le Pont-de-Montvert et Altier, une forme claire au moins, 5 août (J. de Kermabon, S. Dulau, L. Terraz).
**Pyrénées-Orientales** - Eyne, 15 août (A. Millon, R. Riols), imm., 26 août (A. Millon, R. Riols), forme claire, 28 août (A. Millon, R. Riols).
**Var** - Port-Cros, forme sombre, 28 août (J.Y. Frémont).
**1992 Aude** - Gruissan, imm., 7 au 16 juillet, forme claire, 25 juillet sans doute jusqu'au 14 août et peut-être jusqu'au 22 septembre, imm., 27 et 28 juillet, 2 imm. dont un de forme sombre, 13 août, imm. 14 août, imm., 15 août, forme claire 28 août, imm., 1er septembre, imm. forme sombre, 9 septembre (Equipe LPO-Aude) ; étang de Campignol/Gruissan, forme sombre, 17 août (Equipe LPO-Aude) ; étang de Pissevaches/Fleury, forme claire, 27 août (Equipe LPO-Aude).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Les données de l'Aude pour 1992 et 1994 (mais pas 1993 ?) permettent de mieux cerner les mouvements estivaux de ce faucon. De plus, 1992 devient l'année record avec 45 oiseaux, contre 39 en 1988 et 38 en 1994. On note également la confirmation de la présence de l'espèce en été dans le sud du Massif Central, de même que sa propension au vagabondage plus au nord (Loire et surtout Loire-Atlantique). À quand sa reproduction en France ?

### FAUCON SACRE *Falco cherrug* (5/5 - 1/1)

**Creuse** - Guéret, ad. probable, 3 novembre (B. Brunet).

(Tchécoslovaquie, Turquie jusqu'en Sibérie centrale et méridionale). Huitième donnée française en provenance d'un département rarement cité dans les rapports du CHN. La précision, les détails fournis et le sérieux de la fiche soumise sont un modèle du genre !

### MAROUETTE POUSSIN *Porzana parva* (51/61 - 5/6)

**Corse-du-Sud** - marais de Budiccia/Bastelicaccia, mâle, phot., 5 et 6 mai (B. Recorbet).
**Haute-Corse** - Barcaggio, mâle et fem., 4 mai (B. Recorbet) ; Macinaggio, fem., 4 mai (B. Recorbet).
**Jura** - Le Pasquier, mâle chanteur, 25 au 29 mai (P. Crouzier, D. Michelat).
**Manche** - marais de Carentan/Auvers, mâle chanteur, 13 mai (C., C. et G. Debout).

*103.* Marouette de Baillon *Porzana pusilla*, adulte, Mougins, Alpes-Maritimes, avril 1994. (M. Boët)



**1993 Bouches-du-Rhône** - Camargue : Le Ligagneau, fem., phot., « avril » (A. Mante).

(Europe, Asie centrale). Troisième année consécutive avec 6 oiseaux (moyenne d'un peu moins de 5 oiseaux par an, 1981-94). Les Alpes-Maritimes et la Lorraine ne semblent plus avoir le monopole des « petites » marouettes, sans doute au détriment de la Corse. C'est d'ailleurs dans cette île qu'un observateur a fait, début mai, un beau triplé !

### MAROUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (25/24 - 3/2)

**Ain** - Joyeux, mâle chanteur, 2 au 10 juillet (P. et J.B. Crouzier, M. et F. Poumarat *et al.*).
**Alpes-Maritimes** - étang de Fontmerle/Mougins, ad., phot., 17 au 20 avril (S. Angibaud, M. Boët, L. Clair *et al.*).
**Doubs** - Granges-Sainte-Marie, mâle chanteur, 16 mai au 5 juin (D. Michelat, B. Tissot *et al.*).

(Europe, Asie centrale, Japon). L'oiseau du Doubs chantait à 100m du lieu de 1992 et 1993 et peut être considéré comme le même. Hormis quelques rares migrateurs, le chant de cette espèce est quasiment le seul contact que l'on peut avoir avec cette marouette.

### TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (4/4 - 2/2)

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : La Capelière, imm., 7 octobre puis 28 novembre au 1er décembre (Y. Cherain *et al.*) ; Le Ligagneau, ad., phot., 9 décembre au 21 janvier 1995 au moins (Ch. et M. Vergès, D. Sève *et al.*).

(Sud de l'Espagne, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). Il est probable que ces oiseaux - comme ceux vus ultérieurement en 1995 - viennent de Catalogne, où un programme de réintroduction est en cours. Qui sait alors ce que nous réserve l'avenir pour cette espèce ?

### GRANDE OUTARDE *Otis tarda* (4/6 - 1/1)

**Meurthe-et-Moselle** - Bruley, mâle, 5 novembre (E. Roualet).

(Europe centrale et méridionale, Turquie). À la différence du précédent oiseau - au cours de l'hiver 1992/93 en Saône-et-Loire - celui-ci n'a été vu que brièvement par un observateur chanceux.

### GRAVELOT DE LESCHENAULT *Charadrius leschenaultii* (0/0 - 1/1)

**Somme** - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, ad. plum. nupt., 17 juillet (Ph. Carruette, D. Chatelain *et al.*).

(De la Turquie à la Sibérie centrale). Quatrième mention française, 14 ans après la précédente (17 mai 1980) déjà en baie de Somme ! Les deux autres sont du 21 juin 1969 et des 6 et 7 mai 1970 en Camargue. Celui-là n'est pas resté longtemps, pour la plus grande frustration de ceux qui souhaitaient l'observer sur le sol français.

### PLUVIER DOMINICAIN *Pluvialis dominica* (10/10-2/3)

**Morbihan** - Hoëdic, juv., phot., 1er octobre (G. Rault).
**Vendée** - Bouin, 2 ad. en mue, 13 au 17 septembre (G. et M.N. Balança *et al.*).

(Amérique du Nord). La Vendée reste, avec le Finistère, le département privilégié pour observer ce pluvier néarctique. Mais l'espèce a été observée jusque dans le Loiret et l'Ain.

### PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva* (0/0 - 0/0)

**1991 Loire-Atlantique** - Petit-Mars, ad., 29 mai, précédemment accepté (*Ornithos* 1 : 9), à présent rejeté après réexamen.

(Sibérie, Alaska).

### VANNEAU SOCIABLE *Chettusia gregaria* (22/22 - 4/4)

**Charente-Maritime** - Moëze, ad., 15 novembre au 7 décembre (L. Malthieux *et al.*).
**Indre** - étang de Gabriau/Lingé, ad., 16 octobre (P. Cabard).
**Indre-et-Loire** - Verneuil-le-Château, 31 décembre au 7 janvier 1995 (L. Le Gal *et al.*).
**Seine-et-Marne** - La Tombe, ad., 28 au 30 octobre (V. Cudo *et al.*).

(Sud-est de l'U.R.S.S., Asie centro-méridionale). Après quatre années moyennes (1-2 oiseaux par an), à nouveau une année à quatre Vanneaux sociables, cette fois-ci tous en automne/hiver. La mention de fin décembre en Indre-et-Loire bat de deux jours la précédente des Pyrénées-Atlantiques en 1984 et montre bien qu'il faut continuer à scruter les bandes de Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* au-delà de novembre. Un séjour de trois semaines pour cette espèce (en Charente-Maritime) est fort long, mais il semble que cet oiseau ait été blessé à la chasse...

### BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (4/4 - 1/1)

**Finistère** - Ouessant : Porz Doun, juv., phot., 6 au 10 septembre (V. Cudo *et al.*).

(Amérique du Nord). 6ème oiseau français (et 5ème pour le Finistère !), second pour Ouessant et à une date des plus classiques.

### BÉCASSEAU À COU ROUX *Calidris ruficollis* (0/0 - 1/1)

**Pas-de-Calais** - Platier d'Oye/Oye-Plage, ad. plum. nuptial, 15 au 21 juillet (G. Flohart *et al.*).

(Sibérie orientale). Voici enfin la première donnée française de ce limicole attendu depuis longtemps sur notre sol. D'une grande rareté en Europe, il s'observe le plus souvent de mi-juillet à début août, et parfois en mai-juin. Celui-ci précédait de deux jours le Gravelot de Leschenault de baie de Somme (voir note dans *le* présent numéro)..



*104.* Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, juvénile, Breurey-lès-Faverney, Haute-Saône, août 1994. (D. Lecornu)




*fig. 1.* Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* : nombre d'individus observés par an en France (1966-94). *Annual numbers of Pectoral Sandpipers in France (1966-94).*

### BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (5/5-2/2)

**Finistère** - étang de Nérizelec/Plovan, ad., 9 au 11 août (B. Bargain, O. Claessens, A. Jean *et al.*).
**Seine-Maritime** - baie de Seine/Gonfreville l'Orcher, 2 octobre (O. Benoist).
**1993 Finistère** - étang de Trunvel/Ploneour-Lanvern, 30 août (B. Bargain, J.P. Thomas, A. Perthuis).

(Amérique du Nord). Neuvième à onzième données françaises, toutes en provenance de sites réputés excellents pour les limicoles nord-américains. Ainsi en baie d'Audierne, il y a eu trois Bécasseaux de Baird en quatre ans. Dates classiques.

### BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (119/130 - 16/18)

**Aude** - étang de Pissevaches/Fleury, juv., phot., 27 août au 15 septembre (G. et M.N. Balança, J.Ph. Siblet *et al.*).
**Finistère** - étang de Moulin-Neuf/Ploneour-Lanvern, juv., 29 août (G. Rault) ; Ouessant : réservoirs Saint-Michel, juv., 8 septembre (B. Bargain) ; Le Drennec/Sizun, juv., 14 au 24 septembre (J.Y. Péron).
**Ille-et-Vilaine** - estuaire de la Rance, juv., 11 septembre (Anon.).
**Loire-Atlantique** - étang des Gatineaux/Saint-Michel-Chef-Chef, 31 août et 1er septembre (D. Tavenon).
**Morbihan** - Falguérec/Séné, 29 août, 2 ind., 30 août, 3 ind., 31 août, 2 jusqu'au 7 septembre (J.P. Artel) ; Sarzeau, 7 septembre (J.P. Artel).
**Oise** - Vauciennes, juv., 11 septembre (A. Rouge).
**Haute-Saône** - Breurey-les-Faverney, juv., phot., 29 au 31 août (D. Lecornu *et al.*).
**Tarn** - Fréjeville, juv., 29 août (M. Malaterre).
**Vendée** - marais d'Olonne/Ile d'Olonne, 3 juv., phot., 10 au 16 septembre (G. Bulidon, B. Condoumi, D. Desmots *et al.*) ; lac d'Apremont/Maché et Aizenay, juv., 12 septembre (G. et M.N. Balança, M. Tessier), juv., 3 au 8 octobre (M. Tessier).

(Amérique du Nord, Sibérie). 1994 est un bon « cru » avec 18 oiseaux observés, battue de peu par 1984 (22 oiseaux) et 1985 (19 oiseaux). Outre la présence de deux fois trois oiseaux ensemble, on retiendra surtout l'arrivée extrêmement groupée dans les derniers jours d'août, touchant non seulement le littoral atlantique, mais aussi l'intérieur des terres comme l'Oise, l'Aude, la Haute-Saône et même le Tarn (premières observations pour ces deux derniers départements).

### BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (70/97 - 4/4)

**Aude** - étang de Pissevaches/Fleury, 3 mai, 2 ind., 4 au 8 mai (A. Guillaumet *et al.*).
**Bouches-du-Rhône** - Camargue : pointe de Beauduc, 6 mai (Th. Fournet) ; Baisse des 500 Francs, ad. plum. nuptial, 24 juillet au 7 août (T. Bino, G. Cauvin, M. Gauthier-Clerc *et al.*).

(Europe septentrionale). Rien de bien neuf pour ce limicole toujours régulier en Camargue en mai comme, le plus souvent en été, en août.

### BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (49/53 - 5/6)

**Finistère** - pointe de la Torche/Plomeur, juv., 17 et 18 septembre (J.Y. Péron) ; étang de Trunvel/Ploneour-Lanvern, 2 juv., 20 et 21 septembre (B. Bargain).
**Morbihan** - pointe de Penvins, juv., phot., 26 au 29 août (E. Chabot, Ch. Kerihuel *et al.*).
**Pas-de-Calais** - Boiry-Sainte-Rictrude, 2 octobre (B. Tailliez).
**Vendée** - lac d'Apremont/Maché et Aizenay, juv., 12 septembre (G. et M.N. Balança, M. Tessier).
**1993 Charente-Maritime** - Moëze, juv., 22 septembre (Ph. Delaporte).

(Amérique du Nord). Avec en moyenne 4 individus par an (1981-94), 1994 est un peu supérieure. On remarque des arrivées un peu plus tardives que pour le Bécasseau tacheté. La donnée du Pas-de-Calais (à l'intérieur des terres) est intéressante.

### BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (17/17 - 4/5)

**Aude** - Coussoules/Leucate, 28 avril au moins (M. Duquet, J.Y. Frémont).
**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Grenouillet, 2 ind. dont un juv. probable, 10 septembre (Y. Kayser).
**Charente-Maritime** - Breuil-Magné, juv., tué à la chasse, phot., 2 octobre (F. Bidet *et al.*).
**Puy-de-Dôme** - Cebazat, 8 avril (G. Blanc).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). On pourrait se réjouir de cette année « record » (cinq oiseaux), mais la donnée de Charente-Maritime vient ternir le tableau. En effet, tout porte à croire que les « auteurs » de cette mention s'y sont pris à plusieurs fois avant d'abattre cette bécassine venue ensuite probablement rejoindre les rayonnages d'un collectionneur peu scrupuleux...

### BARGETTE DU TÉREK *Xenus cinereus* (26/27 - 5/5)

**Alpes-Maritimes** - embouchure du Var/Saint-Laurent-du-Var, ad., 8 au 11 juillet (M. Boët, Y. Kolbeinsson *et al.*), ad., 25 septembre au 4 octobre (M. Boët, L. Cugnet, L. Clair *et al.*).
**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Galabert, 7 avril (A. Guillaumet).
**Hérault** - étang de l'Or, juv. probable, phot., 31 août et 1er septembre (B. Delprat, Ph. Geniez, V. Rufray).
**Var** - salins des Pesquiers/Hyères, phot., 6 septembre (Ph. Orsini).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Malgré une année record pour le nombre de données et d'individus, le Midi conserve sa prééminence sur le reste de la France. L'oiseau du 7 avril en Camargue est le plus précoce à ce jour. Il convient également de s'interroger sur les observations de l'embouchure du Var : se pourrait-il qu'un seul et même oiseau s'arrête sur ce site lors de sa migration (*cf.* les observations régulières) ?

### CHEVALIER GRIVELÉ *Actitis macularia* (6/7 - 1/1)

**Indre** - étang de Chérines, juv., 24 septembre (Ph. Persuy).

(Amérique du Nord). Septième mention française et la seconde à l'intérieur des terres (première : novembre-décembre 1989 dans l'Eure).

### LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (87/240 - 11/74)

**Finistère** - étang de Trunvel/Ploneur-Lanvern, ad., 23 octobre (G. Rault).
**Nord** - Le Clipon/Loon-Plage, 4 juv., 2 septembre (J.A. Leclercq *et al.*), 3 subad. et 29 juv., 16 septembre (J.A. Leclercq *et al.*), juv., 17 septembre (V. Cudo, J.Ph. Siblet, L. Spanneut), ad. et 4 juv., 18 septembre (V. Cudo, J.Ph. Siblet, L. Spanneut), 2 juv., 1er novembre (Ph. Donnadieu, J.A. Leclercq).
**Pas-de-Calais** : cap Gris-Nez/Audinghen, 3 juv., 2 septembre (E. Dansette, G. Flohart, P.R. Legrand), juv., 3 septembre (D. Tirmache), 18 juv., 16 septembre (Ph.J. Dubois, G. Flohart, J.Y. Frémont *et al.*), 6 juv., 18 septembre (P. Camberlain, E.et E. Dansette, G. Flohart *et al.*).
**Seine-Maritime** - Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, juv., trouvé mort, phot., 15 octobre (O. Benoist).
**1993 Bouches-du-Rhône** - Camargue : sud du Galabert/Salins-de-Giraud, ad., 16 août, et non 16 juin (*cf. Ornithos* 2 : 10).
**1993 Nord** - lac des Prés-du-Hem/Armentières, juv., phot., 2 au 7 septembre (P. Bonnel, Q. Spriet)




*fig. 2*. Effectifs annuels de limicoles néartiques en France (1981-94).
*Numbers of species, records and birds of north-american waders in France (1981-94).*

Bonne année pour les effectifs de limicoles nord-américains (31) en France, c'est le meilleur « cru » après 1984 (38 ind.). Également 27 données qui placent 1994 en quatrième position après 1984 (34), 1991 (30) et 1985 (28).La diversité est en revanche moyenne (6 espèces) et l'on remarquera d'ailleurs l'absence de Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* pour la première fois depuis la prise en compte des données d'oiseaux rares par le CHN (1981).

(Circumboréal). Bonne année pour le Labbe à longue queue (en Europe du Nord-Ouest également), trois ans après les chiffres records de 1991 (152 oiseaux). Évidemment le cap Gris-Nez et la digue du Clipon tiennent encore le haut du pavé, et il est possible qu'il y ait quelques « doublons » entre les deux sites (mais combien d'oiseaux sont passés inaperçus ?). L'identification des jeunes oiseaux a totalement changé le pattern de migration de l'espèce en France (cf. figure ci-dessous, et articles dans ce numéro et à paraître). À noter enfin la date tardive de l'adulte en Bretagne (où l'espèce reste rare) et celle d'Antifer qui concerne un oiseau mort « depuis 3 ou 4 semaines ».

### MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (13/13 - 1/1)

**Nord** - Le Clipon/Loon-Plage, juv., 28 août (S. Claerebout, N. Selosse).

(Amérique du Nord). Troisième mention pour le Nord (et quatrième pour la région) ; à nouveau un oiseau juvénile, d'ordinaire rare en Europe.

### GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (3/9 - 2/3)

En dehors du littoral méditerranéen :
**Charente-Maritime** - station d'épuration/Rochefort, 12 mai (Ch. Boucher).
**Rhône** - le Grand Large/Décines et Meyzieu, 2 ind., 1er mai (A. Renaudier).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). Bien que n'étant plus soumis à homologation nationale sur le littoral méditerranéen, le Goéland railleur ne semble pas prêt de disparaître des colonnes des rapports du CHN. Il semble bien que des oiseaux s'observent régulièrement au printemps vers la côte atlantique et la vallée du Rhône.

### GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (47/64 - 12/13)

**Aude** - étang de Pissevaches/Fleury, , 2ème été, 17 avril (V. Rufray *et al.*), 2 2ème été et un « subad. », un 2ème été avec une bague blanche « HNV » à gauche et bague métallique à droite, 4 mai, 24 et 26 mai, 2ème été, bagué (bague non lue) 15 juillet (H. Ballesdent, P. et J.B. Crouzier, A. Guillaumet *et al.*), 2 2ème été, non bagués, 18 au 21 mai (G. et M.N. Balança, P. et J.B. Crouzier *et al.*) ; Narbonne-Plage, 2 2ème été, 4 mai (H. Ballesdent, P. et J.B. Crouzier), les mêmes oiseaux que ceux de Pissevaches, sans doute ; salins de Gruissan, 2ème été, 9 mai, 4 2ème été, 19 mai (A. Guillaumet) ; salins de Lapalme, 2ème été, 11 mai (E. Gfeller, A. Guillaumet).
**Bouches-du-Rhône** - baisse des 500 Francs, 2ème été, 29 avril au 4 mai (M. Gauthier-Clerc *et al.*) ; étang du Fangassier, 2ème été, 3 au 6 mai (P.A. Crochet, M. Gauthier-Clerc) ; phare de Beauduc, ad., 18 mai et 3 juin (P.A. Crochet, M. Gauthier-Clerc).
**Hérault** - étang de la Pierreblanche, « subad. », 29 avril (F. et O. Larrey, X. Rufray).

(Circum-méditerranéen). Difficile de démêler l'écheveau des oiseaux présents à Pissevaches (cela rappelle l'espèce suivante...). Au total, il n'y a pas eu - aux dires mêmes des observateurs locaux - plus de trois individus en mai et un en juillet. De même en Camargue, il n'est pas aisé de différencier les oiseaux, d'autant qu'ils ont tendance à séjourner, comme dans l'Aude, longtemps dans la région. L'augmentation espérée du nombre d'oiseaux sur notre littoral, en relation avec le statut de l'espèce en Espagne, se fait attendre...

### GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (104/88 - 9/2)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*)
**Finistère** - vallon de Stang Alarc'h/Brest, ad., 20 janvier (J. Maout) ; Pont-L'Abbé, ad., 5 février (G. Rault).
**Landes** - Capbreton, ad., phot., 23 au 26 janvier (Ph.J. Dubois, A. Guyot).



***105.*** Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla*, juvénile, Ouessant, Finistère, septembre 1994. (V. Cudo)

**Loire-Atlantique** - Saint-Nazaire, ad., 10 janvier au 12 mars (D. Raboin *et al.*).
**Morbihan** - Pénestin, ad., 9 janvier (Y. Trévoux) ; Quilisoy/Larmor-Plage, ad.*, phot., 5 au 14 mars (G. Derian) ; étang du Tur/Ploemeur, ad.*, phot., 23 décembre au 15 janvier 1995 (C. Guihard), sans doute le même oiseau.
**Pyrénées-Atlantiques** - Boucau-sur-Adour, 1er hiver*, 23 janvier (A. Guyot, B. Toutain).
**Seine** - Jardin des Plantes/Paris, ad., 8 février (O. Claessens), le même oiseau que celui du Val de Marne.
**Val de Marne** - lac de Saint Mandé et lac Daumesnil, ad., 14 décembre à la fin de l'année au moins (F. Meurgey).

(Amérique du Nord). La plupart des observations concernent désormais des adultes revenant sur leurs précédents lieux d'hivernage, avec, comme record, celui de Pénestin pour la 11ème année. Ils ne semblent plus être suivis avec la même assiduité. Pour 1994, on dénombre deux nouveaux oiseaux dont un 1er hiver.

### GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (1/1 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la race néarctique *smithsonianus* :
**Finistère** - 30 km au sud/sud-ouest de la pointe de Penmarc'h, 2ème été, 9 juin (F. Jiguet).

(Amérique du Nord). Un an après la première mention française, voici la seconde... Les oiseaux de 1ère et de 2ème année sont d'identification aisée ; les plus âgés sont nettement plus problématiques.

### GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (76/75 - 3/3)

**Côtes d'Armor** - Erquy, 1er hiver, phot., 24 février (L. Spanneut).
**Finistère** - Ouessant : Porz Doun, 1er hiver, 27 octobre (Y. Schmidt).
**Pas-de-Calais** - Platier d'Oye/Oye-Plage, 1ère année, 16 avril (G. Lepoutre).

(Arctique canadien, Groenland). Pas d'afflux particulier cette année, mais il apparaît clairement que le Goéland à ailes blanches est (désormais ?) régulier sur nos côtes en hiver en dehors de tout épisode météorologique important.

### STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (4/4 - 3/3)

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : étang des Impériaux, ad., 22 juillet au moins (N. Sadoul).
**Loire-Atlantique** - Pen Bron/La Turballe, ad., 20 mars (I. Grant).
**Vendée** - lac de Jaunay/La Chapelle-Hermier, ad., 16 septembre (F. Portier).

(Méditerranée, Océan indien, Australie). A nouveau un oiseau en Camargue, comme en 1993. A signaler d'ailleurs la présence d'une « sterne à bec orange » également en Camargue les 19 mai, 27 et 29 juillet (le même oiseau ?). 1994 apporte également les deux premières données atlantiques : celle de La Turballe concerne peut-être la femelle nicheuse depuis plus de 10 ans à Farne Islands, Grande-Bretagne, en route vers le nord (date précoce). Quant à l'observation vendéenne, elle est d'autant plus remarquable qu'elle se situe à l'intérieur des terres.

### STERNE BRIDÉE *Sterna anaethetus* (5/5-1/1)

**Loire-Atlantique** - estuaire de la Loire/Mindin, 1er hiver probable, 20 août (D. Tavenon).
**1992 Gironde** - Banc d'Arguin/Arcachon, ad., 7 juillet (J.J. Boubert *et al.*).

(Des Caraïbes à l'Afrique de l'Ouest, Australie). Sur les six mentions françaises, quatre sont du Banc d'Arguin en Gironde. Les autres (cap Gris-Nez, estuaire de la Loire) sont de dates similaires (19 et 20 août). À signaler enfin cette première donnée d'un oiseau immature.

### STERNE BRIDÉE ou FULIGINEUSE *Sterna anaethetus* ou *fuscata* (1/1-1/1)

**Pas-de-Calais** - cap Gris-Nez/Audinghen, ad., 3 septembre (E. Dansette, P.R. Legrand, F. Müller).
**1993 Vendée** - pointe de l'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 23 septembre (Ch. Gonin).

(mers tropicales). Voici les deux premières mentions de « sternes tropicales » non identifiées avec certitude, bien que dans les deux cas, les observateurs aient plutôt penché pour une Sterne fuligineuse...

### GUILLEMOT À MIROIR *Cepphus grylle* (12/15 - 0/0)

**1992 Finistère** - Trévignon, ad., 27 décembre (R. Le Nevé, G. Rault).

(Arctique, Atlantique nord). L'irrégularité de cet alcidé sur les côtes françaises est surprenante. Fréquente-t-il davantage le milieu pélagique en hiver ?

### MERGULE NAIN *Alle alle* (83/370 - 2/2)

**Finistère** - Lesconil, phot., 16 au 27 janvier (G. Rault).
**Loire-Atlantique** - marais de Guérande, phot., 18 décembre (C. Gergaud, D. Gilet).

(Circumboréal). À nouveau une année pauvre en données, qui semble être plus la règle que l'exception.

### GUÊPIER DE PERSE *Merops persicus* (1/1-0/0)

**1993 Finistère** - Ouessant : réservoirs Saint-Michel, âge indéterminé, 15 octobre (E. Gfeller, A. Larousse).

(Afrique du Nord et de l'Ouest, Moyen-Orient, sous-continent indien). Cinquième donnée française (troisième pour ce siècle) et première en automne, évidemment là où converge bon nombre de raretés majeures.

**PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (58/58 - 25/38)**

**Charente-Maritime** - Ars-en-Ré, 14 octobre (F. Noël).
**Finistère** - Ouessant : Parluc'hen, 24 septembre (O. Bardet, M. Colombey) ; Ar Reun puis aérodrome, 2 ind., 9 octobre, un seul, 10 octobre (D. Desmots, C. et M. Vergès *et al.*) ; Kadoran, 2 ind., 14 octobre (C. et M. Vergès) ; Trébéchou, juv., 14 octobre (Ph.J. Dubois, M. Gauthier-Clerc, F. Schurr) ; Creac'h, juv., 17 au 19 octobre (M. Gauthier-Clerc *et al.*) ; Pors Coret, 2 ind., 20 octobre (J.P. Delapré, R. Muguet *et al.*), 28 octobre (M. Thibault) sans doute un des deux oiseaux ; presqu'île d'Arland, 21 octobre (J.M. et M. Thibault) ; Lann ar Bir, juv., 23 octobre (B. Duchenne, D. Tavenon). Etang de Trunvel/Ploneour-Lanvern, 3 ind., 1er novembre (J. et P. Petit).
**Morbihan** - Hoëdic, 16 octobre (A. Le Nevé).
**Pas-de-Calais** - cap Gris-Nez/Audinghen, 4 juv., 22 et 23 septembre, un seul le 24 septembre (P. Camberlain, G. Flohart *et al.*), un oiseau différent, 23 septembre (G. Flohart, P. Plichon), 3 ind., 11 octobre, 4 ind. dont deux juv., 12 et 13 octobre (G. Flohart, D. Tirmarche), 2 ind., 19 et 21 octobre (G. Flohart, D. Sève), 3 ind., apparemment différents, 24 octobre (J.A. Leclercq) ; Tardinghen, juv., 9 au 15 octobre (G. Flohart, J.A. Leclercq, A. Rouge), juv., 24 octobre (J.A. Leclercq).
**Pyrénées-Atlantiques** - Estérençuby, juv., 27 septembre (H. Vigoureux).
**Seine-Maritime** - Antifer, Saint-Jouin-Bruneval, 7 octobre (Ph.J. Dubois, J.Y. Frémont), 2 juv., 15 octobre, un seul le 16 octobre (O. Benoist, Y. Créau, A. Guillemont).
**Vendée** - marais d'Olonne/Olonne-sur-Mer, 28 septembre (D. Desmots) ; La Paracou/Les Sables d'Olonne, 20 au 25 octobre (D. Desmots, P.P. Evrard *et al.*).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). Sans conteste, 1994 est une année record laissant loin derrière la précédente (1990 avec 8 oiseaux). Le chiffre de 38 oiseaux est sûrement un miminum (d'autres données restent à homologuer). Les oiseaux d'Ouessant sont difficiles à comptabiliser (pression ornithologique importante, déplacements des oiseaux, renouvellement de ceux-ci difficile à appréhender) ; 11 individus différents ont été retenus. Il ne semble pas qu'il y ait eu de pic marqué cet automne, sinon un mouvement décelé fin septembre, puis dans la période 14-25 octobre. Dans les pays voisins, un fort passage a été également ressenti, avec 300 en Grande-Bretagne, plus de 45 en Belgique et « plus que d'habitude » aux Pays-Bas.

**PIPIT DE LA PETCHORA *Anthus gustavi* (1/1 - 0/0)**

**1987 Finistère** - Ouessant : Cost ar Reun, 28 avril, précédemment accepté (*Alauda* 57 : 284) à présent refusé après réexamen.
(Sibérie). La seule mention française est celle de septembre 1990 en Vendée.

**PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (4/4 - 1/1)**

**Finistère** - Ouessant : Cost ar Reun, juv. probable, 5 novembre (A. Mera, S. Pignocchi, J.P. Siblet).
(Sibérie, Extrême-Orient). La cinquième mention française vient, une fois encore, d'Ouessant. C'est, à trois jours près, la plus tardive.

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (19/19 - 1/1)**

Mâle présentant les caractéristiques de la race *feldegg* :
**Haute-Savoie** - Excenevex, 24 avril (D. Delmas, M. Pastore).
(Balkans, mer Noire). Date assez classique, quoique les oiseaux de cette race puissent se voir plus tôt encore en saison. Des oiseaux déjà observés en Haute-Savoie, le 8 mai 1974 et 12 mai 1984 à Chens.

**TARIER PÂTRE *Saxicola torquata* (10/10 - 2/2)**

Oiseaux présentant les caractéristiques des races orientales *maura/stejnegeri*, appelés couramment « Tarier pâtre sibérien ou oriental ».
**Finistère** - Sein, fem. 1er hiver, phot., 27 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont).
**Deux-Sèvres** - lac du Cébron/Saint-Loup-sur-Thouet, fem., 6 avril (M. Fouquet).
(Mer Blanche, Sibérie). Date d'automne assez tardive ; celle du printemps est conforme aux rares données françaises à cette saison.

**TRAQUET ISABELLE *Oenanthe isabellina* (4/4 - 1/1)**

**Bouches-du-Rhône** - Crau : Saint-Martin-de-Crau, fem. ad., 30 août (J.Ph. Siblet).
(De la Grèce et la Roumanie à la Sibérie et la Mongolie). Sixième mention française, à nouveau à une date précoce (la plus précoce à ce jour). Un oiseau avait été vu le 1er septembre 1993, également en Crau.

**TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (8/8 - 1/1)**

**Bouches-du-Rhône** - Crau : Eyguière-en-Crau, mâle ad., 13 novembre (E. Cosson).
(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). Cette dixième observation française (et la sixième dans le secteur Crau-étang de Berre !) s'inscrit bien dans le pattern d'apparition de l'espèce, à savoir en toute fin d'automne ou en hiver.

**TRAQUET RIEUR *Oenanthe leucura* (2/2 - 1/1)**

En dehors de la zone de reproduction des Pyrénées-Orientales :
**Hautes-Pyrénées** - Espiaube, mâle, 10 août (D. Guili, S. Vrignaud).



***106.*** Pouillot de Schwarz *Phylloscopus schwarzi*, Onival, Somme, novembre 1994. (J.-C. Robert)

(Pyrénées-Orientales, Espagne, Afrique du Nord). L'espèce est probablement sur le point de s'éteindre comme nicheur dans notre pays. Les observations en France de ce traquet largement sédentaire risquent également de devenir de plus en plus rares. La dernière - hors sites de reproduction - était d'avril 1989 dans l'Aude.

### GRIVE DE NAUMANN/À AILES ROUSSES *Turdus naumanni* (2/2 - 1/1)

**Haute-Savoie** - Seyssel, ind. présentant les caractéristiques de la race *eunomus*, 21 janvier (C. Revillard).

(Sibérie). Cinquième Grive à ailes rousses pour la France. Encore une grive accidentelle observée à partir d'un... jardin particulier !

### GRIVE À GORGE NOIRE ou ROUSSE *Turdus ruficollis* (6/6 - 1/1)

**Finistère** - Sein, mâle 1er hiver possible, présentant les caractéristiques de la race *atrogularis*, 22 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont).

(Sibérie). Encore une espèce que l'on observe soit en fin d'automne, soit en hiver. Après celle du 1er novembre 1989 à Ouessant, c'est la seconde pour la Bretagne.

### LOCUSTELLE FLUVIATILE *Locustella fluviatilis* (3/3 - 1/1)

**Aude** - Coussoules/Leucate, mâle chanteur, 29 avril (C. et D. Tissier).

(Sud de la Baltique, Balkans, jusqu'en Sibérie occidentale). Cette fois-ci un simple migrateur et non un oiseau cantonné, à une date plutôt précoce.

### ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (4/4 - 3/3)

**Finistère** - étang de Trunvel/Ploneour-Lanvern, juv., capturé, phot., 23 août (B. Bargain, C. Fridlender), juv., capturé, 28 octobre (B. Bargain).

**Seine-Maritime** - marais du Hode/Sandouville, juv., capturé, phot., 25 août (B. Lacorre, Camp du Hode).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Sept données françaises, alors que la première remonte à 1990 ! Cette fois-ci deux oiseaux capturés à quelques jours d'intervalle et un oiseau tardif, portant à trois le nombre de Rousserolles isabelles de baie d'Audierne. La liste ne devrait pas s'arrêter là.

### ROUSSEROLLE DES BUISSONS *Acrocephalus dumetorum* (1/1 - 1/1)

**Finistère** - Sein, ad., 23 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont).

(Europe du Nord-Est, Sibérie, Asie centrale). Seconde mention française (précédente : un oiseau capturé le 2 août 1984 en baie de Seine). Cet oiseau, observé jusqu'à un mètre de distance, pendant une quinzaine de minutes, présentait tous les caractères de terrain de l'espèce et a été homologué sur cette base. Le CHN est toutefois conscient que les observations sur le terrain ne permettent pas d'éliminer l'éventualité d'un hybride Rousserolle des buissons x Rousserolle verderolle *A. palustris*. En effet, ces espèces s'hybrident régulièrement en Finlande notamment (*Ornis fenn.* 57 : 26-32, *Lintumies* : 94-110, P. Koskimies *in litt.*), et certains hybrides peuvent ne pas être identifiables, même en main (*Birding World* 7 : 227-230, M. Rogers *in litt.*).

### FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (10/10 - 1/1)

**Pas-de-Calais** - Audinghen, juv., 10 août (G. Flohart).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Heureux retour d'un oiseau dans les parages du cap Gris-Nez, où l'espèce, autrefois régulière, n'avait pas été observée depuis 1979. Cela dit, combien d'oiseaux passent hors de champ de jumelles ?

### POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (6/6 -2/2)

**Finistère** - Ouessant : Ti Crenn, phot., 20 et 21 septembre (G. et M.N. Balança, O. Bardet, M. Colombey *et al.*).
**Nord** - Zuydcoote, ad. probable, 30 septembre et 1er octobre (J.A. Leclercq, N. Selosse *et al.*).
**1993 Gironde** - lagune de Contaut/Hourtin, 14 août (P. Grisser).
(Baltique à la Sibérie orientale). Huitième à dixième données françaises. Les dates des oiseaux de 1994 sont conformes à ce qui est connu en Europe du Nord-Ouest, celle de 1993 est assez précoce.

### POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (13/13 -4/6)

**Finistère** - Ouessant : Ker Radennec, 27 octobre (G. Léotard *et al.*) ; Cost ar Reun, 2 ind., vidéo, 5 novembre (M. Lambert, J.Ph. Siblet *et al.*).
**Pas-de-Calais** - parc de la Falaise/Le Portel, 2 ind., 30 et 31 octobre (P. Bernard, Ph.J. Dubois *et al.*).
**Var** - Saint-Aygulf, 13 octobre (Ch. Bury).
(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Il y a la façon optimiste d'analyser ces observations : six oiseaux (dont deux fois deux oiseaux, pour la première fois en France), c'est un record. La façon pessimiste est de constater qu'à la même époque il y en a eu plus de 180 dans les îles Britanniques (*Birding World* 7 : 438-439) et de penser à tous ceux qui ont échappé aux observateurs français.

### POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (350/375 -60/65)

**Charente-Maritime** - Lilleau-des-Niges/Les Portes-en-Ré,10 octobre (F. Noël).
**Finistère** - Ouessant : Arland, 24 mars (Y. Guermeur), 10 au 13 octobre (Y. Guermeur, E. Lapous *et al.*), 18 octobre (Y. Guermeur), 27 au 28 octobre (B. Forget), 2 ind., 30 octobre puis un le 31 octobre (Y.Guermeur), 7 novembre (Y. Guermeur), 10 novembre (Y. Guermeur) ; Cost ar Reun, 3 octobre (Y. Guermeur), 11 octobre (B. Helsens), 14 octobre (E. Lapous *et al.*), 5 novembre (Y. Guermeur) ; Kerbrad, 3 et 4 octobre (Y. Guermeur) ; Stang Korz, 8 au 10 octobre (B. Helsens, J.Y. Péron) ; Pount Salaün, 9 octobre (B. Helsens) ; Pount ar Rodez, 9 au 16 octobre (B. Helsens *et al.*) ; Porz Gwenn, 9 octobre (J.F. Arcanger) ; Lann Vras, 10 et 11 octobre (Y. Guermeur) ; Niou, 10 au 12 octobre (E. Lapous *et al.*), 4 novembre (Y. Guermeur) ; Prad Meur, 10 au 18 octobre (D. Desmots, C. et M.Vergès *et al.*), 2 ind., 19 au 22 octobre puis un seul, 24 au 30 octobre (P. Crouzier, Ph.J. Dubois *et al.*), 2 ind., 31 octobre (Y. Guermeur), 4 ind., 1er novembre, puis un seul du 2 au 4 novembre (A. Larousse *et al.*), 17 novembre (Y. Guermeur) ; Gerhuel, 11 octobre (B. Bargain), 29 octobre au 4 novembre (A. Larousse *et al.*) ; Ker Radennec/Stang ar Stiff, 12 octobre (J.Y. Péron), 17 et 18 octobre (Y. Guermeur), 27 octobre (Y. Guermeur), 2 ind., 28 octobre et un seul jusqu'au 1er novembre (Y. Guermeur *et al.*), 7 novembre (Y. Guermeur) ; Stang Meur, 16 au 19 octobre (A. Larousse *et al.*), 2 ind., 24 au 27 octobre (J.Ph. Siblet *et al.*) ; Stang Porz Gwenn, 16 octobre (E. Gfeller, F. Jiguet) ; Park Raden, 17 octobre (Y. Guermeur), 2 ind., 28 octobre, puis un seul jusqu'au 1er novembre (Y. Schmidt *et al.*), 3 novembre (Y. Guermeur) ; Poull Brac, 20 octobre (E. Gfeller, F. Jiguet), 2 ind., 21 octobre (P. Crouzier, Ph.J. Dubois), 17 novembre (Y. Guermeur) ; Ar Reun, 28 octobre (Y. Guermeur) 2 ind., 29 octobre, puis un seul jusqu'au 4 novembre (Y. Guermeur), Ar Picard, 1er novembre (A. Larousse) ; Kernigou, 1er novembre (A. Larousse) ; réservoirs Saint-Michel, 1er novembre (A. Larousse) ; Kadoran, 3 au 7 novembre (Y. Guermeur), 2 ind., 9 novembre (Y. Guermeur) ; le Stiff, 9 novembre (Y. Guermeur). Kérisit Vihan/Goulien, 17 novembre (P. Hamon).
**Nord** - Dunkerque, 16 octobre (J.A. Leclercq).
**Pas-de-Calais** - Haringzelle/Audinghen, 22 septembre (G. Flohart), 27 au 29 septembre (M. van Dongen, G. Flohart *et al.*) ; La Sirène/Audinghen, 2 novembre (G. Flohart).
**Seine-Maritime** - Le Tilleul, 9 octobre (O. Benoist, Y. Créau *et al.*).
**Var** - Chateaudouble, 26 octobre (O. Iborra).
**Vendée** - Les Agaures/Les Sables d'Olonne, 15 octobre (P. Yésou), 2 au 4 novembre (D. Desmots *et al.*), 13 au 17 novembre (D. Desmots, P. Yésou *et al.*) ; bois de la Chaise/Noirmoutier, 16 octobre (J.F. Darras).
**1993 Somme** - Hable d'Ault/Cayeux-sur-Mer, 22 septembre (V. Schricke, P. Triplet).
**1986 Charente-Maritime** - Le Bois Plage en-Ré, 27 août, précédemment accepté (*Alauda* 56 : 314) à présent refusé après réexamen.
(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). 1994 est un « cru » excellent avec 65 oiseaux en France (battue seulement par 1988 avec 94). Évidemment Ouessant attire la plus grande partie des oiseaux (y compris un en mars !), mais les sites du nord de la France ou de Vendée, une fois encore, ne sont pas absents (mais rien en provenance de Sein ? et Hoëdic ?). Le Var fournit sa seconde mention (1ère - un hivernant probable - en 1991) et la Somme sa première en 1993 (enfin !). Côté passage, on remarque une arrivée plus précoce dans le nord de la France (fin sept.) qu'à Ouessant où les premiers ne sont pas vus avant le 6 oct.. En revanche beaucoup d'oiseaux sont vus tardivement cette année (max. de 10 le 1er nov. à Ouessant) et les derniers oiseaux arrivent le 17 nov..

### POUILLOT DE SCHWARZ *Phylloscopus schwarzi* (2/2 - 1/1)

**Somme** - Onival/Ault, phot., 9 novembre (J. Bellard, J.C. Robert).
(Sibérie centrale et sud-orientale). La quatrième donnée française provient d'un site où l'on n'aurait pas cherché cette espèce *a priori* : ombellifères sèches, armoises et ronces à l'entrée d'un camping, lui même en bordure de mer.

**POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (9/10 - 1/1)**

**Vendée** - Les Agaures/Les Sables d'Olonne, 13 novembre (P. Yésou).

(Asie centrale et septentrionale). Dixième mention française, à nouveau en Vendée. La date est la plus tardive à ce jour.

**POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita***

***1*** - Individus présentant les caractéristiques du groupe *tristis/fulvescens* (2/2 - 1/2) :

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Salin de Badon, 2 ind., capturés, phot., 23 mars (P.A. Crochet, Y. Kayser, O. Pineau *et al.*).

**1983 Charente-Maritime** - baie d'Yves, capturé, phot., 3 mars (A. Doumeret, Ph.J. Dubois).

**1987 Drôme** - Grignan, capturé, phot., 12 avril (G. Olioso).

(Sibérie). Un article sur les différentes raisons qui ont conduit le CHN à scinder les données de Pouillot véloces « sibériens » est publié dans ce numéro d'Ornithos.

***2*** - Pouillots véloces de type sibérien (52/55 - 9/9)

**Aude** - Gruissan, 25 et 26 octobre (A. Guillaumet, T. Guillosson).

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Salin de Badon, capturé, phot., 23 mars (P.A. Crochet, Y. Kayser, O. Pineau *et al.*) ; Tour du Valat, 29 et 30 mars (Y. Kayser) ; Grenouillet, 13 avril (Y. Kayser).

**Finistère** - Ouessant : Kadoran, 28 octobre au 4 novembre (Y. Guermeur) ; Ker Radennec/Stang ar Stiff, 1er novembre (V. Caucheyeur, M. Lambert) ; Stang ar Glan, 4 novembre (Y. Guermeur) ; Arland, 23 novembre au 6 décembre (Y. Guermeur).

**Seine-Maritime** - Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, 5 novembre (Ph.J. Dubois, A. Larousse).

**1988 Aude** - Leucate, capt., phot., 29 avril (P. Fiquet *fide* J. Sériot).

**1992 Bouches-du-Rhône** - Camargue : Grau de la Dent, 4 mai (Y. Kayser, Ch. Tourenq).

**1992 Pas-de-Calais** - Audinghen, 10 octobre (G. Flohart, D. Tirmarche).

**1993 Ain** - Saint-Paul-de-Varax, 6 et 7 novembre (H. Ballesdent, P., J.B. et M. Crouzier).

**1993 Charente-Maritime** - Le Douhet/Saint-Denis-d'Oléron, 3 avril (Ph.J. Dubois, V. Guidoux).

**1993 Finistère** - estuaire de Quillec/Kerbrat, phot., 7 mars (L. Maumary, L. Vallotton *et al.*) ; Ouessant : Stang Meur, 13 et 14 octobre (Y. Créau).

**1993 Indre-et-Loire** - lac de la Bergeonnerie/Tours, 15 novembre (A. Pataud).

(Sibérie). Voir, là aussi, l'article sur les Pouillot véloces de type « sibérien » dans le présent numéro d'*Ornithos*. Ces oiseaux sont soumis au CHN depuis 1989 seulement, mais 1988 reste la meilleure année avec 30 oiseaux différents, cette année même où il y eut un nombre record de Pouillots à grands sourcils en France.



***107.*** Gobemouche nain *Ficedula parva*, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 1994. (J.-F. Arcanger)

### GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (120/123 - 9/9)

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Méjanes, juv., 6 octobre (P. Defos du Rau).
**Finistère** - Ouessant : Cost ar Reun, juv., 5 octobre (R. Le Nevé, G. Rault), juv., 9 octobre (J.Y. Péron) ; Prad Meur, juv., 8 octobre (J.Y. Péron), juv., 26 et 27 octobre (M. Thibault) ; Stang Porz Gwenn, juv., phot., 8 et 9 octobre (J.F. Arcanger, B. Helsens) ; Dizro, juv., 9 octobre (V. Froome, T. Grange) ; Ti Crenn, juv., 17 et 18 octobre (E. Gfeller) ; Arland, juv., 2 et 3 novembre (Ch. Brillaud, Y. Guermeur, J.Ph. Siblet *et al.*).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Les années se suivent et se ressemblent : entre sept et neuf Gobemouches nains par automne depuis 1991, avec Ouessant comme site privilégié pour observer cette espèce discrète.

### ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (37/103+-2/4)

En dehors de la Corse :
**Pyrénées-Orientales** - Canet-en-Roussillon, 2 ad., 21 avril (M. South, P. Yésou) ; Cerbère, 2 ad., 23 avril (M. South, P. Yésou).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). Deux nouvelles localités qui montrent bien que, peu à peu, toute cette région est colonisée par l'Étourneau unicolore.

### ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (25/32 -3/3)

**Alpes-Maritimes** - embouchure du Var/Saint-Laurent-du-Var, ad., 28 mai (M. et M. Boët, Y. Kolbeinson *et al.*).
**Morbihan** - Hoëdic - 1er hiver., 15 et 20 octobre (A. Le Nevé, G. Rault).
**Var** - salins d'Hyères, juv., 11 août (Ph. Orsini).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Bien peu d'oiseaux pour cette année d'invasion qui a vu déferler des centaines (milliers ?) d'oiseaux dans les Balkans et en Europe centrale, avec même de nombreuses reproductions en Hongrie. L'oiseau juvénile est le plus précoce connu à ce jour et Hoëdic accueille ici son troisième Étourneau roselin.

### PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs* (0/0 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques du groupe de races nord-africaines « *spodiogenys* » :
**Lozère** - Le Plan de Fontmort/Barre-des-Cévennes, mâle, 27 mars (P. Massé).

(Afrique du Nord). Première mention française d'un Pinson des arbres appartenant au groupe des races d'Afrique du Nord. Curieusement, un oiseau a été signalé en Grande-Bretagne du 11 au 24 avril 1994 (*Birding World* 7 : 132) et en Irlande du 25 au 28 mai 1994 (*Birding World* 7 : 180). On peut supposer qu'il s'agisse d'oiseaux qui ont suivi des Pinsons des arbres européens ayant hiverné quelque part en Afrique du Nord.

### ROSELIN GITHAGINE *Rhodopechys githaginea* (2/2 - 1/1)

**Territoire de Belfort** - Chaux, ad., probablement mâle, 30 juin (J.M. Rémy).
**1993 Bouches-du-Rhône** - Camargue : Montilles du Platelet/Beauduc, mâle, 19 avril, 21 avril et 1er mai (*Ornithos* 2 : 15), également R. et Th. Luglia parmi les découvreurs).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Cette troisième donnée française, très bien décrite, provient d'un lieu (un jardin privé) et d'une région où l'on ne s'attendrait guère à observer ce fringille. Dès lors l'origine de cet oiseau est plus que discutable...

### ROSELIN CRAMOISI* *Carpodacus erythrinus* (43/54 - 9/40+)

**Hautes-Alpes** - Les Sestrières/Monestier-les-Bains, 4 ind. dont un mâle et un juv. au moins, 7 août (G. Léotard).
**Doubs** - bassin du Drugeon, un couple et 2 mâles chanteurs (La Rivière-Drugeon et Sainte-Colombe), 24 mai au 11 juillet (D. Michelat et M. Kery *et al.*).
**Jura** - Les Rousses, total de 10 mâles (7 ad., un « orange », un 1ère année, un non vu), 4 fem. et un juv., phot., 28 mai au 30 juillet (P. Crouzier *et al.*).
**Pas-de-Calais** - secteur cap Blanc-Nez/Escalles, total de 10 à 13 mâles (5 à 8 ad., un 2ème année et 4 1ère année), 2 fem. au moins, 4 nids construits, une « famille », 16 mai au 24 juillet (E. Dansette, G. Flohart, D. Tirmarche *et al.*) ; La Sirène/Audinghen, mâle 1ère année chanteur, 1er juin (G. Flohart) ; Tardinghen, mâle ad. chanteur, 2 et 3 juin, un autre mâle chanteur, 3 juin (G. Flohart, D. Tirmarche).
**Haut-Rhin** - Le See d'Urbès, couple, 8 au 13 juillet (L. Boiteux, E. et G. Jardin).
**1993 Ain** - Prévessin, mâle ad. chanteur, 1er mai (B. Piot).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). 1994 confirme l'implantation du Roselin cramoisi en France comme espèce nicheuse. Les « places fortes » de Franche-Comté et du Pas-de-Calais se renforcent ; l'espèce est trouvée probablement nicheuse dans les Hautes-Alpes et cantonnée en Alsace. À cela s'ajoute une nouvelle localité dans l'Ain, concernant peut-être un migrateur (c'est le cas des trois oiseaux notés début juin autour du cap Gris-Nez). Une synthèse pour l'année 1994 a été publiée récemment (*Ornithos* 1 : 80-81). Les oiseaux nicheurs ne semblent pas s'attarder au-delà de fin juillet ; leur séjour en France est apparemment de courte durée.,

**pour les mâles, l'âge est donné si l'oiseau a été vu ou si cela est précisé par l'observateur.*



*108.* Bruant nain *Emberiza pusilla*, Sein, Finistère, octobre 1994. (M. Duquet)



*109.* Bruant auréole *Emberiza aureola*, juvénile, Sein, Finistère, octobre 1994. (M. Duquet)

**BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* (10/10 - 3/3)**

**Jura** - Bois d'Amont, mâle, 12 et 14 juillet (P. Crouzier, D. Michelat).
**Pas-de-Calais** - Cran Poulet/Audinghen, fem./imm., 24 octobre (J.A. Leclercq).
**Haute-Saône** - lac de Vaivre, mâle 1ère année possible, 16 et 17 mars (J. François, D. Lecornu).

(Scandinavie, Sibérie). Date remarquable pour l'oiseau du Jura, mais il y a eu des oiseaux en Allemagne et aux Pays-Bas en juin 1994. L'espèce serait-elle régulière dans l'est de la France ?

**BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (33/33 - 8/8)**

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Le Sambuc, 2 au 16 mars (B. Britton *et al.*) ; Le Pont Noir, juv., capt., phot., 31 octobre (P.A. Crochet, P. Thouy *et al.*).
**Finistère** - Ouessant : Cost ar Reun, 25 septembre (O. Bardet, M. Colombey) ; Creac'h, 7 octobre (R. Le Nevé, G. Rault) ; Kernigou, 1er novembre (A. Larousse) ; Ar Guizou, 4 novembre (A. Méra, J.Ph. Siblet). Sein, phot., 22 au 24 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont).
**Morbihan** - Hoëdic, 12 novembre (J. Bried, A. Le Nevé *et al.*).

(Scandinavie, Asie septentrionale). 1994 se caractérise par : un nombre record d'oiseaux, le retour de l'espèce à Ouessant après quatre années d'apparente absence, l'observation camarguaise à une date printanière tout à fait similaire à celle de l'an passé, enfin la confirmation que les îles bretonnes sont favorables au stationnement de ce bruant.

**BRUANT AURÉOLE *Emberiza aureola* (2/2- 1/1)**

**Finistère** - Sein, juv., phot., 24 au 27 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont).

(Eurasie septentrionale). Quatrième mention française pour ce siècle et la troisième du mois d'octobre (précédente : 26 octobre 1988 en Vendée). La présence de deux ornithologues confirmés sur Sein (à une époque certes favorable) a prouvé qu'il y avait sans doute, en dehors d'Ouessant, bien des secrets à percer en automne sur le chapelet des îles bretonnes.

**BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (27/29 - 1/1)**

**Haute-Savoie** - Sixt, mâle, 14 juillet (J.F. Desmet, J.J. Richard-Pomet).

(Europe du Sud-Est. Asie du Sud-Ouest). Annuel depuis 1986 en France, ce bruant ne s'observe pas uniquement sur le littoral méditerranéen, puisque celui-ci fréquentait un chaos rocheux à 2100 m d'altitude !

## Annexe 1 - Espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie (catégorie D1)

**PÉLICAN INDÉTERMINÉ *Pelecanus sp.* (7/7 - 2/2)**

**Aude** - Gruissan, 16 août (C. David, E. Le Roy, I. Rellstab) ; étang de l'Ayrolle/Gruissan, ad., 12 novembre (E. Jenczewski *et al.*).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Ces deux observations se rapportent peut-être à des Pélicans gris *Pelecanus rufescens*, dont plusieurs oiseaux, échappés du zoo de Sigean, fréquentent régulièrement les environs de Gruissan. Malheureusement les descriptions ne sont pas suffisamment étayées pour en avoir la certitude.

**TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (97/152 - 5/6)**

**Charente-Maritime** - Dolus d'Oléron, 24 janvier (A. Kim).

**Seine-et-Marne** - Réau, fem., 6 et 7 septembre (F. Legendre) ; Marolles-sur-Seine, 2 fem., 27 novembre (V. Cudo).
**Somme** - baie de Somme/Rue, mâle, 19 septembre (F. Sueur).
**Vendée** - baie de l'Aiguillon/Champagné-les-Marais, 2 ind., 11 décembre (M. Gauthier-Clerc).
**1993 Charente-Maritime** - Le Deu/Oléron, mâle, 13 avril (P. Nicolau-Guillaumet, A. Kim).

(Afrique du Nord, Europe du Sud-Est, Asie occidentale). Pour sa dernière année d'homologation nationale, il n'y a pas grand chose à dire sur la présence de l'espèce en France, sinon que notre pays semble avair été tenu à l'écart d'un mouvement important de Tadornes casarcas en Europe du Nord et de l'Ouest, concernant probablement des oiseaux sauvages.

*À compter du 1er janvier 1995, l'espèce ne sera plus à homologuer à l'échelon national, mais les observations antérieures à cette date sont et seront toujours les bienvenues.*

### TOURTERELLE MAILLÉE *Streptopelia senegalensis* (3/3 - 0/0)

**1992 Pas-de-Calais** - Wissant, mâle chanteur, 6 mars au 15 mai 1994, et non jusqu'en août 1993 seulement (*Ornithos* 1 : 19).

(Afrique, Asie Mineure, Istanbul). On remarquera le long séjour de cet oiseau dans un quartier résidentiel de cette commune balnéaire.

## ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possibles, même si a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

## 1994

**Plongeon à bec blanc** *Gavia adamsii* - Pyrénées-Atlantiques - Hendaye, imm., 20 février.
**Pétrel de Bulwer** *Bulweria bulweri* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 16 septembre.
**Aigrette des récifs** *Egretta gularis* - Haute-Corse - étang de Biguglia, forme grise, 11 septembre au 8 mars 1995.
**Oie à bec court** *Anser brachyrhynchus* - Côte d'Or - lac Kir/Dijon, 17 avril.
**Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea* - Charente-Maritime - Port-des-Barques, 11 janvier.
**Canard noir** *Anas rubripes* - Somme - baie de Somme/Rue, 4 ind., 12 août.
**Milan noir** *Milvus milvus* - Hautes-Alpes, ind. présentant les caractéristiques de la race *parasiticus*, 14 mai.
**Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* - Vendée - Beauvoir-sur-Mer, imm., 5 août.
**Vautour moine** *Aegypius monachus* - Pyrénées-Atlantiques - col d'Organbidexha/Larrau, 27 au 30 juillet.
**Busard pâle** *Circus macrourus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Sambuc, mâle, 24 janvier.
**Buse féroce** *Buteo rufinus* - Bouches-du-Rhône - Crau, ad., 3 décembre.
**Buse pattue** *Buteo lagopus* - Eure-et-Loir - Saint-Symphorien, 18 octobre.
**Aigle criard** - *Aquila clanga* - Vendée - La Guittière/Talmont-Saint-Hilaire, ad., 6 mars.
**Faucon d'Eléonore** *Falco eleonorae* - Var - Port-Cros, ad. forme claire, 26 avril.
**Faucon lanier** *Falco biarmicus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, 30 août au moins. Deux-Sèvres - Sainte-Blandine, 2 novembre.
**Faucon sacre** *Falco cherrug* - Pas-de-Calais - mont Saint-Frieux/Dannes, juv., 21 octobre.
**Marouette de Baillon** *Porzana pusilla* - Pas-de-Calais - Colline-Beaumont, mâle, 20 mars.
**Bécasseau tacheté** *Calidris melanotos* - Oise - Asnières-sur-Oise, ad., 6 mai.
**Bécassine double** *Gallinago media* - Ain - Colomby-de-Gex, 2 ind., 29 août. Bouches-du-Rhône - Camargue : Grenouillet, 18 octobre.
**Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus* - Var - salins des Pesquiers/Hyères, ad., 26 mai. Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, juv., 14 août. Somme - Quend-Plage, ad., 27 septembre.
**Mouette de Franklin** *Larus pipixcan* - Somme - Quend-Plage, 1ère année, 14 septembre.
**Goéland d'Audouin** *Larus audouinii* - Aude- étang de Pissevaches/Fleury, 1er été, 24 avril.
**Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis* - Alpes-Maritimes - îles de Lérins, 2ème hiver, 21 février. Gironde - Braud-Saint-Louis, subad, 3 février. Morbihan - Riantec, subad., 14 février, 3 ad./subad., 11 mars. Somme - Quend-Plage, 1er été, 30 septembre.
**Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides* - Manche - Coudeville, ad., 18 janvier et 13 février. Pyrénées-Atlantiques - Ciboure, ad., 2 avril.
**Sterne bridée** *Sterna anaethetus* - Somme - baie de Somme/Rue, ad., 26 août.
**Martinet des maisons** *Apus affinis* - Vaucluse - Maubec, 12 ind., 13 mai.
**Pipit de Richard** *Anthus richardi* - Nord - Wallers-Trélon, ad., 27 mars.
**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava* - mâles présentant les caractéristiques de la race *feldegg* - Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de Galabert, 3 mai. Meuse - lac de Madine, 9 mai.
**Bergeronnette citrine** *Motacilla citreola* - Mayenne - Bourgon, juv., 23 août.
**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* - mâle présentant les caractéristiques de la race *samamisicus* - Haute-Loire - Bas-en-Basset, mâle, 17 avril.

**Seine-et-Marne** - Réau, fem., 6 et 7 septembre (F. Legendre) ; Marolles-sur-Seine, 2 fem., 27 novembre (V. Cudo).
**Somme** - baie de Somme/Rue, mâle, 19 septembre (F. Sueur).
**Vendée** - baie de l'Aiguillon/Champagné-les-Marais, 2 ind., 11 décembre (M. Gauthier-Clerc).
**1993 Charente-Maritime** - Le Deu/Oléron, mâle, 13 avril (P. Nicolau-Guillaumet, A. Kim).
(Afrique du Nord, Europe du Sud-Est, Asie occidentale). Pour sa dernière année d'homologation nationale, il n'y a pas grand chose à dire sur la présence de l'espèce en France, sinon que notre pays semble avair été tenu à l'écart d'un mouvement important de Tadornes casarcas en Europe du Nord et de l'Ouest, concernant probablement des oiseaux sauvages.
*À compter du 1er janvier 1995, l'espèce ne sera plus à homologuer à l'échelon national, mais les observations antérieures à cette date sont et seront toujours les bienvenues.*

### TOURTERELLE MAILLÉE *Streptopelia senegalensis* (3/3 - 0/0)

**1992 Pas-de-Calais** - Wissant, mâle chanteur, 6 mars au 15 mai 1994, et non jusqu'en août 1993 seulement (*Ornithos* 1 : 19).
(Afrique, Asie Mineure, Istanbul). On remarquera le long séjour de cet oiseau dans un quartier résidentiel de cette commune balnéaire.

## ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possibles, même si a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

### 1994

**Plongeon à bec blanc** *Gavia adamsii* - Pyrénées-Atlantiques - Hendaye, imm., 20 février.
**Pétrel de Bulwer** *Bulweria bulweri* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 16 septembre.
**Aigrette des récifs** *Egretta gularis* - Haute-Corse - étang de Biguglia, forme grise, 11 septembre au 8 mars 1995.
**Oie à bec court** *Anser brachyrhynchus* - Côte d'Or - lac Kir/Dijon, 17 avril.
**Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea* - Charente-Maritime - Port-des-Barques, 11 janvier.
**Canard noir** *Anas rubripes* - Somme - baie de Somme/Rue, 4 ind., 12 août.
**Milan noir** *Milvus milvus* - Hautes-Alpes, ind. présentant les caractéristiques de la race *parasiticus*, 14 mai.
**Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* - Vendée - Beauvoir-sur-Mer, imm., 5 août.
**Vautour moine** *Aegypius monachus* - Pyrénées-Atlantiques - col d'Organbidexha/Larrau, 27 au 30 juillet.
**Busard pâle** *Circus macrourus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Sambuc, mâle, 24 janvier.
**Buse féroce** *Buteo rufinus* - Bouches-du-Rhône - Crau, ad., 3 décembre.
**Buse pattue** *Buteo lagopus* - Eure-et-Loir - Saint-Symphorien, 18 octobre.
**Aigle criard** - *Aquila clanga* - Vendée - La Guittière/Talmont-Saint-Hilaire, ad., 6 mars.
**Faucon d'Eléonore** *Falco eleonorae* - Var - Port-Cros, ad. forme claire, 26 avril.
**Faucon lanier** *Falco biarmicus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, 30 août au moins. Deux-Sèvres - Sainte-Blandine, 2 novembre.
**Faucon sacre** *Falco cherrug* - Pas-de-Calais - mont Saint-Frieux/Dannes, juv., 21 octobre.
**Marouette de Baillon** *Porzana pusilla* - Pas-de-Calais - Colline-Beaumont, mâle, 20 mars.
**Bécasseau tacheté** *Calidris melanotos* - Oise - Asnières-sur-Oise, ad., 6 mai.
**Bécassine double** *Gallinago media* - Ain - Colomby-de-Gex, 2 ind., 29 août. Bouches-du-Rhône - Camargue : Grenouillet, 18 octobre.
**Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus* - Var - salins des Pesquiers/Hyères, ad., 26 mai. Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, juv., 14 août. Somme - Quend-Plage, ad., 27 septembre.
**Mouette de Franklin** *Larus pipixcan* - Somme - Quend-Plage, 1ère année, 14 septembre.
**Goéland d'Audouin** *Larus audouinii* - Aude- étang de Pissevaches/Fleury, 1er été, 24 avril.
**Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis* - Alpes-Maritimes - îles de Lérins, 2ème hiver, 21 février. Gironde - Braud-Saint-Louis, subad, 3 février. Morbihan - Riantec, subad., 14 février, 3 ad./subad., 11 mars. Somme - Quend-Plage, 1er été, 30 septembre.
**Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides* - Manche - Coudeville, ad., 18 janvier et 13 février. Pyrénées-Atlantiques - Ciboure, ad., 2 avril.
**Sterne bridée** *Sterna anaethetus* - Somme - baie de Somme/Rue, ad., 26 août.
**Martinet des maisons** *Apus affinis* - Vaucluse - Maubec, 12 ind., 13 mai.
**Pipit de Richard** *Anthus richardi* - Nord - Wallers-Trélon, ad., 27 mars.
**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava* - mâles présentant les caractéristiques de la race *feldegg* - Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de Galabert, 3 mai. Meuse - lac de Madine, 9 mai.
**Bergeronnette citrine** *Motacilla citreola* - Mayenne - Bourgon, juv., 23 août.
**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* - mâle présentant les caractéristiques de la race *samamisicus* - Haute-Loire - Bas-en-Basset, mâle, 17 avril.

**Tarier pâtre** *Saxicola torquata* - oiseau présentant les caractéristiques de la race *maura*, Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, fem./imm., 20 septembre.
**Rousserolle isabelle** *Acrocephalus agricola* - Bouches-du-Rhône - Camargue : mas d'Agon, ad., 30 août.
**Hypolaïs bottée** *Hippolais caligata* - Finistère - Ouessant : Prad Meur, 28 et 29 octobre.
**Fauvette épervière** *Sylvia nisoria* - Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, 1er septembre.
**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Morbihan - Hoëdic, 15 octobre, 11 novembre. Vendée - La Paracou/Les Sables d'Olonne, 27 octobre.
**Mésangeai imitateur** *Perisoreus infaustus* - Pyrénées-Orientales - La Mouline, 19 avril.
**Bruant nain** *Emberiza pusilla* - Finistère - Ouessant : Ar Picard, 12 octobre. Puy-de-Dôme - Crevant-Laveine, 12 mars..

## 1993

**Albatros indéterminé** *Diomedea sp.* - Finistère - Ouessant : Creac'h, juv. possible, 13 octobre.
**Elanion blanc** *Elanus caeruleus* - Gironde - Vendays-Montalivet, 31 octobre.
**Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* - Haute-Savoie - réserve de Carlaveyron, âge inconnu, 19 septembre.
**Busard pâle** *Circus macrourus* - Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., 28 août.
**Buse variable** *Buteo buteo*, ind. présentant les caractéristiques de la race *vulpinus* - Loir-et-Cher - Selommes, 12 février. Bas-Rhin - Ratzwiller, ad., 10 au 12 septembre.
**Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus* - Saône-et-Loire - Blanzy - subad. possible, 26 septembre.
**Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis* - Pyrénées-Atlantiques - Capbreton, 1er hiver, 17 février.
**Alouette pispolette** *Calandrella rufescens* - Vendée - Saint-Denis-du-Payré, 1er septembre.
**Traquet rieur** *Oenanthe leucura* - Alpes-Maritimes - embouchure du Var/Saint-Laurent-du-Var, fem./imm., 6 mai.
**Grive à dos olive** *Catharus ustulatus* - Doubs - Saint-Vit, 22 octobre.
**Locustelle de Pallas** *Locustella certhiola* - Territoire-de-Belfort, Foussemagne, 28 septembre.
**Gobemouche nain** *Ficedula parva* - Doubs - Pontarlier, mâle ad., 23 avril. Moselle - Lessy, mâle, 25 septembre au 15 octobre. Pas-de-Calais - Mont-Bernenchon, fem./juv., 30 août.
**Moineau blanc** *Passer simplex* - Var - Porquerolle, fem., 18 mai.
**Roselin githagine** *Rhodopechys githaginea* - Haute-Corse - Barcaggio, un puis 2 ind., 10 au 12 mai.
**Bruant nain** *Emberiza pusilla* - Bas-Rhin - Rhinau, 10 octobre.

## 1992

**Oie à bec court** *Anser brachyrhynchus* - Moselle - étang de Rohrweiher, 21 mars.
**Buse féroce** *Buteo rufinus* - Bouches-du-Rhône - col de la Gineste/Cassis, ad., 26 avril.
**Pouillot verdâtre** *Phylloscopus trochiloides* - Ouessant : Porz Arland, juv., 8 octobre.
**Roselin githagine** *Rhodopechys githaginea* - Aude - Gruissan, 14 octobre.

## 1991

**Cormoran pygmée** *Phalacrocorax pygmaeus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Méjanes, 1er décembre.

## 1990

**Traquet pie** *Oenanthe pleschanka* - Finistère - Ouessant : Pern, mâle, 28 mai.

## 1986

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Drôme - Grignan, capt. 5 novembre.

## 1985

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Drôme - Grignan, capt., 21 mars, capt., 20 octobre.

## 1984

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Vaucluse - Donzère, capt., 28 mars.

### Annexe 3 - Espèces inscrites dans aucune catégorie

Figurent ici les espèces inscrites dans aucune catégorie pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour. Ne figurent pas les espèces pour lesquelles une origine sauvage est totalement invraisemblable.

**Tarier pâtre** *Saxicola torquata* - oiseau présentant les caractéristiques de la race *maura*, Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, fem./imm., 20 septembre.
**Rousserolle isabelle** *Acrocephalus agricola* - Bouches-du-Rhône - Camargue : mas d'Agon, ad., 30 août.
**Hypolaïs bottée** *Hippolais caligata* - Finistère - Ouessant : Prad Meur, 28 et 29 octobre.
**Fauvette épervière** *Sylvia nisoria* - Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, 1er septembre.
**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Morbihan - Hoëdic, 15 octobre, 11 novembre. Vendée - La Paracou/Les Sables d'Olonne, 27 octobre.
**Mésangeai imitateur** *Perisoreus infaustus* - Pyrénées-Orientales - La Moulinc, 19 avril.
**Bruant nain** *Emberiza pusilla* - Finistère - Ouessant : Ar Picard, 12 octobre. Puy-de-Dôme - Crevant-Laveine, 12 mars..

## 1993

**Albatros indéterminé** *Diomedea sp.* - Finistère - Ouessant : Creac'h, juv. possible, 13 octobre.
**Elanion blanc** *Elanus caeruleus* - Gironde - Vendays-Montalivet, 31 octobre.
**Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* - Haute-Savoie - réserve de Carlaveyron, âge inconnu, 19 septembre.
**Busard pâle** *Circus macrourus* - Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., 28 août.
**Buse variable** *Buteo buteo*, ind. présentant les caractéristiques de la race *vulpinus* - Loir-et-Cher - Selommes, 12 février. Bas-Rhin - Ratzwiller, ad., 10 au 12 septembre.
**Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus* - Saône-et-Loire - Blanzy - subad. possible, 26 septembre.
**Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis* - Pyrénées-Atlantiques - Capbreton, 1er hiver, 17 février.
**Alouette pispolette** *Calandrella rufescens* - Vendée - Saint-Denis-du-Payré, 1er septembre.
**Traquet rieur** *Oenanthe leucura* - Alpes-Maritimes - embouchure du Var/Saint-Laurent-du-Var, fem./imm., 6 mai.
**Grive à dos olive** *Catharus ustulatus* - Doubs - Saint-Vit, 22 octobre.
**Locustelle de Pallas** *Locustella certhiola* - Territoire-de-Belfort, Foussemagne, 28 septembre.
**Gobemouche nain** *Ficedula parva* - Doubs - Pontarlier, mâle ad., 23 avril. Moselle - Lessy, mâle, 25 septembre au 15 octobre. Pas-de-Calais - Mont-Bernenchon, fem./juv., 30 août.
**Moineau blanc** *Passer simplex* - Var - Porquerolle, fem., 18 mai.
**Roselin githagine** *Rhodopechys githaginea* - Haute-Corse - Barcaggio, un puis 2 ind., 10 au 12 mai.
**Bruant nain** *Emberiza pusilla* - Bas-Rhin - Rhinau, 10 octobre.

## 1992

**Oie à bec court** *Anser brachyrhynchus* - Moselle - étang de Rohrweiher, 21 mars.
**Buse féroce** *Buteo rufinus* - Bouches-du-Rhône - col de la Gineste/Cassis, ad., 26 avril.
**Pouillot verdâtre** *Phylloscopus trochiloides* - Ouessant : Porz Arland, juv., 8 octobre.
**Roselin githagine** *Rhodopechys githaginea* - Aude - Gruissan, 14 octobre.

## 1991

**Cormoran pygmée** *Phalacrocorax pygmaeus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Méjanes, 1er décembre.

## 1990

**Traquet pie** *Oenanthe pleschanka* - Finistère - Ouessant : Pern, mâle, 28 mai.

## 1986

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Drôme - Grignan, capt. 5 novembre.

## 1985

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Drôme - Grignan, capt., 21 mars, capt., 20 octobre.

## 1984

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Vaucluse - Donzère, capt., 28 mars.

### Annexe 3 - Espèces inscrites dans aucune catégorie

Figurent ici les espèces inscrites dans aucune catégorie pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour. Ne figurent pas les espèces pour lesquelles une origine sauvage est totalement invraisemblable.

**Fou à pieds bleus** *Sula nebouxii* - Sept-Iles/Perros-Guirrec, Côtes d'Armor, ad., 16 août 1994 (H. Vigoureux).

**Sterne inca** *Larosterna inca* - Loire-Atlantique : Le Croisic, imm., 12 août (F. Cavet, G. Mourgaud), ad., 13 août (C. et J.L. Dupont, P. Quaintenne) ; Saint-Nazaire, subad. possible, phot., 13 et 16 décembre (C. Thomas *et al.*). Morbihan : Beg Melen/Groix, ad., 6 août (A. Ducreux, C. Pichot). Nord : Le Clipon/Loon-Plage, imm., 21 août (Ch. et M. Vergès). Pas-de-Calais : Boulogne-sur-Mer, un à 2 ad., phot., 11 au 20 septembre, puis un seul jusqu'au 15 janvier 1995 (E. Dansette, G. Flohart, M. Narcy *et al.*) ; cap Gris-Nez/Audinghen, ad., 20 août (E. Dansette, L. Maquet), 27 août (G. Flohart) sans doute le même oiseau. Seine-Maritime : Le Tréport, ad., phot., 17 et 18 juillet 1994 (Ph. Dromard, C. et L. Spriet) ; Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, ad., phot., 28 août au 9 octobre (O. Benoist *et al.*). Somme : Mers-les-Bains, ad., phot., 5 août (J. Bellard, J.C. Robert).

**Moineau doré** *Passer luteus* - Beauduc, Camargue, Bouches-du-Rhône, mâle ad., fin décembre 1994 (A. Bechet, P. Defos du Rau, N. Jaeger).

**REMERCIEMENTS**

Le CHN remercie vivement ceux qui, au cours de l'année 1994, ont contribué à son bon fonctionnement :
- la **Ligue pour la Protection des Oiseaux** (LPO) pour l'aide matérielle et financière nécessaire au Comité et à son Secrétariat,
- Monsieur Médas, Directeur de **Médas France S.A.** (importateur Kowa, 57 avenue P. Doumer, BP 181, 03206 Vichy Cédex) pour son soutien financier sans faille ,
- Yvon Créau, Christian Dronneau, Pascal Grisser, Yvon Guermeur, Alban Guillaumet, Aymeric Jonard, Yves Kayser, Robert Lécaille, qui nous ont apporté des informations complémentaires ainsi que tous les responsables de Centrales Ornithologiques ou de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) qui nous ont transmis des données et Alban Larousse et Alain Rouge, responsables du répondeur du « Coin des Branchés »,
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

**SUMMARY**

**Rare birds in France in 1994**. *This report deals with 1994 rare birds. During this year, two new species have been added to the French List : Green Heron* Butorides virescens *and Rufous-necked Stint* Calidris ruficollis, *together with a new race - North African Chaffinch* Fringilla coelebs *gr.* spodiogenys. *Late « firsts » for 1992, a Lesser Scaup* Aythya affinis , *and for 1985, a Pied-billed Grebe* Podilymbus podiceps, *were also accepted.*
*During this year, interesting records include : 2nd and 3rd records of Black Scoter* Melanitta (nigra) americana, *the 2nd record for North American Herring Gull* Larus argentatus smithsonianus *and Blyth's Reed Warbler* Acrocephalus dumetorum, *the 3rd for Trumpeter Finch* Rhodopechys githaginea, *the 4th for Black-browed Albatros* Diomedea melanophrys, *Lesser Sand Plover* Charadrius leschenaultii, *Radde's Warbler* Phylloscopus schwarzi *and Yellow-breasted Bunting* Emberiza aureola, *the 5th Long-legged Buzzard* Buteo rufinus *(the first since 1979) and Olive-backed Pipit* Anthus hogdsoni, *and at last, for 1993, the 5th for Blue-cheeked Bee-eater* Merops persicus *(the first since 1927 !).*
*Record numbers include 25 Ruddy Ducks* Oxyura jamaicensis, *5 Great Snipes* Gallinago media, *38 Richard's Pipits* Anthus richardi, *3 Paddyfield Warblers* Acrocephalus agricola *and 8 Little Buntings* Emberiza pusilla *for 1994, and 65 Yellow-browed Warblers* Phylloscopus inornatus.
*At last, a Blue-footed Booby* Sula nebouxii *and at least a dozen of Inca Terns* Larosterna inca *are of interest, though in no any category.*
*The two first numbers in parentheses following the latin name of each species indicate respectively the total numbers of records and birds for 1981-93 period and the others the same for the current year (1994).*

**Comité d'Homologation National,**
**La Corderie Royale, BP 263, 17305 Rochefort Cedex.**

ZEISS *La publication du rapport annuel du CHN bénéficie du soutien de* ***Zeiss-France.***