Les oiseaux rares en France en 1995

Rapport du Comité d'Homologation National

par Philippe J. Dubois et le CHN



Introduction

Le 14ème rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 1995. Au cours de celle-ci, le comité a examiné **578** fiches, ce qui constitue un nouveau record, supérieur de près de 18 % par rapport à 1994 (490 fiches). Cela inclut des données antérieures à 1995 (et parfois même des données antérieures à la création du CHN). Au total, 81 % des fiches examinées ont été homologuées.

En 1995, c'était au tour de Jean-Yves Frémont de laisser sa place. Membre et Secrétaire depuis 1988, Jean-Yves a accepté de poursuivre sa tache au secrétariat du CHN, ce dont le comité le remercie vivement. Thierry Fournet est élu comme nouveau membre à partir de cette année. Pour 1995, le CHN se compose donc de : Pierre Crouzier, Philippe J. Dubois (Président), Marc Duquet, Thierry Fournet, Serge Nicolle, Alain Rouge, Jean Sériot et Pierre Yésou.

Un poste a été pourvu en 1996 et un doit l'être en 1997. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du CHN *avant le 1er mars 1997.*

Travaux et décisions prises par le CHN

Les travaux et décisions prises par le CHN sont désormais publiés séparément du rapport annuel. Il est donc conseillé de se reporter à ces publications (notamment *Ornithos* 3 : 142-143). Toutefois, est publié ici le résultat du réexamen de l'ensemble des fiches d'Aigrettes des récifs *Egretta gularis* observées en France.

Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (nouveau modèle) dès que possible après l'observation et en tout cas avant le 31 décembre de l'année en cours. Ceci éviterait la publication très tardive de données anciennes.

Important : les fiches de certaines données d'espèces rares observées par un grand nombre d'ornithologues n'arrivent pas au CHN. Cela vient du fait que chacun pense probablement que c'est « l'autre » qui fera la fiche. *Le CHN recommande vivement aux observateurs de faire une fiche, même s'ils ne sont pas les découvreurs de l'oiseau.* Enfin, si vous voyez qu'une observation déjà ancienne n'apparaît pas dans le rapport du CHN (acceptée ou refusée), et que vous avez été l'un des observateurs, c'est que probablement aucune fiche n'a été soumise. N'hésitez pas, là encore, à faire une fiche, en précisant les raisons qui vous ont conduit à la faire. Dans tous les cas, c'est agir utilement pour le CHN. Merci.

Les faits marquants

Pas de « première » française cette année, mais à nouveau une pour 1994 : le Pluvier fauve *Pluvialis fulva.* En 1995, en revanche, trois secondes mentions avec le Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps*, le Bécasseau d'Alaska *Calidris mauri* et la Paruline à collier *Parula americana.* La donnée de Grive à dos olive *Catharus ustulatus* constitue la troisième mention française et celle de la Macreuse à bec jaune *Melanitta nigra americana* la quatrième de cette race (ou espèce ?).

Côté effectifs, il faut noter les records pour l'Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* (49 oiseaux, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle...), le Mergule nain *Alle alle* (371 ind.) et le Gobemouche nain *Ficedula parva* (32 ind.), auxquels il faut ajouter le Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* dont c'est le meilleur effectif (10 ind.) depuis la création du CHN. Onze espèces de limicoles néarctiques ont été observées en France en 1995. Enfin, un Roselin rose *Carpodacus roseus* observé en 1994 n'a été placé dans aucune catégorie par la CAF.

Liste systématique des données acceptées (catégories A et C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.

2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre de données homologuées depuis 1981 (1995 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers, la même chose pour 1995.

3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.

4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).

5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.

6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré (enr.).

7. Date(s) d'observation.

8. Observateur(s), sauf exception limité à 3 (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe/dessinateur).

9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.

10. La séquence taxonomique est celle de Voous *(The List of the Birds of the Western Palearctic*, 1978), modifiée par la *Liste des Oiseaux de France* (CAF 1996)

11. Les données concernant les races sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la race concernée.

12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 1995. Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Albatros indéterminé, un le 16 septembre 1995 à Ouessant, Finistère (B. Trébern *in* Dubois et le CHN 1996).

PLONGEON À BEC BLANC *Gavia adamsii* (6/6 - 1/1)

Côtes-d'Armor - baie de Binic, imm., 1er décembre (P. Le Mao).

(Sibérie, Alaska). Comme la précédente (janvier 1992), cette onzième observation française a été faite en Bretagne, sur une seule journée et par un seul observateur. L'espèce reste tout à fait irrégulière en France.

GRÈBE À BEC BIGARRÉ *Podilymbus podiceps* (1/1 - 1/1)

Nord - bassin minéralier/Dunkerque, imm. ou ad. en plum. d'hiver, 2 janvier au 12 février (Th. Fournet *et al.*).

(Amériques). Seconde mention française après l'oiseau d'octobre 1985 en Vendée (*cf. Ornithos* 3 : 80-81). Celui-là, bien qu'ayant séjourné plus d'un mois, s'est avéré extrêmement difficile à observer et bon nombre d'ornithologues ont passé des heures à le chercher sans succès.

ALBATROS INDÉTERMINÉ *Diomedea sp.* (3/3 - 1/1)

Finistère - Ouessant : pointe de Pern, 16 septembre (B. Trébern).

(Mers de l'hémisphère Sud). Comme à l'accoutumée, il semble bien s'agir d'un Albatros à sourcils noirs *D. melanophris*, mais il manque, hélas ! quelques détails pour être certain de la détermination.

PUFFIN SEMBLABLE *Puffinus assimilis* (28/31 - 2/2)

Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 27 septembre (V. Van Halst).

Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, 27 septembre (G. Flohart, D. Heinz).

(La race *baroli* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries et aux Açores). Les sites d'observation en mer du nord de la France, désormais suivis presque quotidiennement en automne, permettent d'observer ce puffin. Cette espèce fait actuellement l'objet d'une révision des données au sein du CHN. À noter que l'oiseau de Loon-Plage a été vu un quart d'heure avant celui du cap Gris-Nez et, vu la distance entre les deux sites, il ne peut s'agir du même oiseau.

AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (15/10 - 1/0)

Bouches-du-Rhône - Camargue : La Sigoulette, ad., race *gularis*, forme sombre, 5 mai (Y. Kayser), le même oiseau que celui observé depuis 1988 (*cf.* ci-dessous).

1957 Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin de Badon, ad., race *gularis*, forme sombre, 22 juillet au 24 août (F. Vuilleumier *et al.*).

1968 Bouches-du-Rhône - Camargue : localité inconnue, race indéterminée, forme sombre, 6 juin (H. Hafner).

1975 Ain - Birieux, ad., race indéterminée, forme sombre, 29 juin au 5 juillet (Y. Reverdin).

1976 Hérault - étang de Capestang, ad. probable, race indéterminée, forme sombre, 13 juin (J.M. et M.F. Cugnasse).

1978 Var - étang de Villepey, ad., race *gularis* probable, forme sombre, phot., 9 mai (G. Le Grand).

1979 Bouches-du-Rhône - Camargue : Saintes-Maries-de-la-Mer, ad. probable, race *gularis*, forme sombre, phot., 27 juillet (K. Mauer, P. Scova-Righini).

1982 Bouches-du-Rhône - Camargue : Beauduc, juv., race *schistacea*, forme sombre, phot., 31 octobre au 3 novembre (J.M. Bompar, D. Michelland, P. Orsini).

1982 Bas-Rhin - Rohrschollen/Strasbourg, race *schistacea*, forme sombre, phot., 25 août au 1er septembre (Ch. Andres, F. et G. Roubert).
1984 Loire-Atlantique - étang de la Poitevinière/Riaillé, race indéterminée, forme sombre, 29 septembre (P. Monnier).
1986 Aude - étang de Campignol/Bages, ad., race *gularis*, forme sombre, 18 juin (J. Sériot *et al.*).
1988 Aude - île de Planasse/Peyriac-sur-Mer, race indéterminée, phot., 22 juin (D. Martinoles) ; étang de Campignol/Bages, ad., race *gularis*, forme sombre, 15 juillet au 23 août (S. Duterde *et al.*), oiseau différent de celui de 1986.
1988 Bouches-du-Rhône - Camargue : La Capelière et environs, ad., race *gularis*, forme sombre, phot., 27 août au 11 septembre (G. et M.N. Balança, Th. Bara). Oiseau observé ensuite du 18 juillet au 6 septembre 1989, du 16 juin au 18 septembre 1990, du 5 mai au 14 septembre 1992, du 15 mai au 25 août 1993, du 2 mai au 25 août 1994 (*cf.* précédents rapports CHN et Y. Kayser *in litt.*). Non observée en 1991.
1989 Var - salins des Pesquiers/Hyères, ad., race *gularis*, forme sombre, phot., 25 juillet au 18 août (Ph. Orsini).
1992 Ain - Saint-André-le-Bouchoux, ad., race *gularis*, forme sombre, phot., 30 mai (P. Crouzier *et al.*).
1993 Hérault - étang de l'Or, race *gularis* probable, forme sombre, 5 juin (B. Delprat, V. et X. Ruffray).

(Afrique, Asie). À la suite de la publication d'un article sur l'identification de cette espèce par deux membres du CHN (*British Birds* 88 : 307-319, 1995), le Comité a réexaminé l'ensemble des données françaises. Il en ressort qu'il existe actuellement 22 observations totalisant 16 oiseaux différents sur le territoire français entre 1957 et 1995 (liste exhaustive ci-dessus). Parmi ces derniers, 9 sont de la race occidentale *gularis* (7 certains et 2 probables), 2 de la race orientale *schistacea* et 5 de race indéterminée (et tous de forme sombre). À noter que les deux oiseaux de race *schistacea* ont été observés à la suite d'importations massives en Europe centrale.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (136/251 - 8/16)

Bouches-du-Rhône - Camargue : La Palissade, 4 ad., 17 janvier (R. Mathevet, C. Tourenq), sans doute en partie ceux signalés au Vigueirat précédemment (*cf. Ornithos* 2 : 147) ; marais de la Sigoulette, Vigueirat et environs, 2 à 6 ad., 9 mars au 15 juin (Y. Kayser, A. Mante *et al.*) ; Carrelet, un ad. et 2 jeunes, 19 juin, Tour du Valat et environs, les mêmes oiseaux, 14 août au 3 novembre (E. Didner, Y. Kayser) ; Pont de Gau, 3 ind., 10 au 31 décembre (E. Didner, Y. Kayser et R. Lamouroux), peut-être les mêmes oiseaux.
Haute-Garonne - Portet-sur-Garonne, ad., 18 avril au 20 mai au moins (J.F. Bousquet).
Landes - Saubusse, ad., 19 mai (P. Grisser).
Loire-Atlantique - lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, ad. et imm., 20 mai (S. Reeber *et al.*).
1982 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, 6 ind., 14 au 23 novembre (G. Bonaccorsi).
1993 Tarn - Cambounet-sur-le-Sor, phot., 24 octobre (M. Malaterre).

(Cosmopolite, les colonies les plus proches dans les Balkans et probablement en Hongrie. Aussi delta du Pô et Sardaigne. A niché en Camargue et dans l'Aude). À noter la présence fin mai de l'espèce dans l'ouest de la France et la donnée ancienne de Corse concernant 6 oiseaux. En Camargue, 2 couples se sont reproduits en 1995 (*Ornithos* 3 : 100), mais il s'agissait d'oiseaux échappés de captivité, ils ne sont donc pas intégrés dans les décomptes de données.

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (14/47-1/1)

Haute-Marne - Braucourt, ad., 19 au 28 octobre (Ph. Poiré).
1994 Charente-Maritime - Moëze, ad., 2 décembre (C. Bavoux, Ph. Poiré *et al.*).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Pas grand-chose cette année. À signaler la présence plutôt « méridionale » de l'oiseau de Charente-Maritime.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (14/10 - 2/0)

Individus présentant les caractéristiques de la race *nigricans*, appelée « Bernache cravant du Pacifique » :
Charente-Maritime - Dolus d'Oléron, ad., 16 janvier au moins (R. Besson, Ph. Delaporte, A. Kim) ; île de Ré, ad., 29 décembre au moins (H. Robreau).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). L'oiseau d'Oléron peut tout à fait être l'un des hivernants réguliers de Ré et n'est pas pris en considération comme nouvel individu.

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (13/14 - 1/1)

Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, mâle, 3 octobre (V. Van Halst).
1993 Finistère - Ouessant : réservoirs Saint-Michel, fem., 30 et 31 octobre (H. Darmandieu, Th. Fournet *et al.*).

(Amérique du Nord). L'espèce n'est apparemment pas vue annuellement en France. Octobre reste, avec mars, le meilleur mois pour détecter ce canard néarctique.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (12/10 - 1/0)

Mâles présentant les caractéristiques de la race américaine *carolinensis*, appellée « Sarcelle d'hiver de la Caroline » :
Somme - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, mâle, 14 et 15 janvier (C. Bernuzeau, Ph. Caruette, A. Rouge).

(Amérique du Nord). Rien de nouveau, hormis l'hivernage d'un oiseau peu visible au parc du Marquenterre, Somme, depuis 1990 (apparemment non vu en 1993 et 1994 ?).

SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors* (17/19 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de Ginès, mâle, 23 octobre.
Loire-Atlantique - lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle, 28 mars (S. Reeber), donnée de 1995, publiée par erreur dans le rapport 1994 (*Ornithos* 2 : 148).

(Amérique du Nord). 1994 est donc la première année « blanche » depuis 1987.

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (38/36 - 6/2)

Charente-Maritime - La Couarde/île de Ré, mâle, 12 novembre au 29 décembre (B. Florent *et al.*) ; Rochefort, mâle, 30 décembre au 21 janvier 1996 (P. Trotignon), sans doute l'oiseau de Ré.
Eure - Poses, fem., 16 novembre au 12 mai 1996 (L. Demongin *et al.*).
Haute-Garonne - Saint-Jory, mâle, 10 décembre au 27 janvier 1996 (J.F. Bousquet, P.A. Crochet), femelle, 30 décembre au 27 janvier 1996 (J.F. Bousquet, P.A. Crochet).
Moselle - étang de Welchof/Puttelange-aux-Lacs, mâle, phot., 15 octobre au 20 mars 1996 (G. Joannès *et al.*).

(Amérique du Nord). En dehors du couple de Haute-Garonne (première observation française de ce genre), tous les autres individus sont des hivernants sur des sites réguliers. Les données de Charente-Maritime, concernent, au vu des dates, très probablement le même oiseau qui s'est déplacé.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (3/3 - 1/1)

Individu présentant les caractéristiques de la race *americana*, appelée « Macreuse à bec jaune » :
Vendée - La Tranche-sur-Mer, mâle imm., 2 avril (F. Jiguet).

(Amérique du Nord, Sibérie). La quatrième mention française succède rapidement aux précédentes, puisque la première date de 1992 (en avril également).

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (9/9 - 3/3)

Loire-Atlantique - La Turballe, fem. 1er hiver, 14 novembre (Ch. Gaigeard et R. Gomès).
Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, mâle ad., 1er octobre (G. Flohart *et al.*).
Vendée - La Tranche-sur-Mer, mâle imm., 11 mars et 2 avril (P.P. Evrard, F. Jiguet, A. Thomas).

(Amérique du Nord). La plage de la Terrière à La Tranche-sur-Mer en Vendée semble recéler des macreuses fort intéressantes (*cf.* le mâle adulte de 1993/94 au même endroit) et l'observateur du 2 avril est bien chanceux. Quant au mâle du Gris-Nez, il a été vu dans une troupe migratrice de Macreuses noires *M. nigra* passant devant le cap ! L'espèce semble plus régulièrement vue en France depuis quelques années.

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (95/164 - 21/49)

Bouches-du-Rhône - Cadarache/Saint-Paul-Lez-Durance, mâle, phot., 15 janvier au 21 février (C. Tardieu, P. van Oye *et al.*).
Charente-Maritime - La Brée-les-Bains, mâle et fem. imm., 25 novembre (P. Trotignon).
Eure - Poses, mâle, 30 octobre (S. Anière), fem., 2 novembre (J. Jean-Baptiste, L. Demongin, C. Gérard *et al.*), mâle, 18 au 30 novembre (J. Jean-Baptiste *et al.*), 2 fem., 10 au 22 décembre (L. Demongin *et al.*).
Ille-et-Vilaine -étang d'Apigné/Rennes, imm., 29 décembre (P. Le Maréchal).
Landes - Orx, fem., 21 avril (B. Delprat).
Loire-Atlantique - lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, un à 28 ind., dont 14 mâles, 4 janvier au 6 mars, maxima de 6 mâles et 14 fem./imm., 4 janvier et 14 mâles et 8 fem./imm., 21 février (S. Reeber *et al.*) et non simplement 9 ind., 4 novembre 1994, comme publié précédemment (*Ornithos* 2 : 149).
Mayenne - étang de la Cosnuère/Mésangers, mâle, 5 avril (J.F. Arcanger).
Meuse - étang de la Perche/Buxerulles, mâle, 15 janvier au 2 avril (R. Lécaille *et al.*).
Moselle - étang de Lindre/Tarquimpol, mâle, 23 juillet (P. Vagner).
Nord - Condé-sur-Escaut, fem./imm., tué à la chasse, phot., 12 octobre (info P. Plichon) ; Denna/Loon-Plage, 3 imm., 12 au 22 décembre puis un seul jusqu'au 6 janvier 1996 (Ph. J. Dubois, G. Flohart *et al.*).
Oise - Chevrières, mâle, 10 juin au 6 août, 2 mâles le 25 juillet (R. Baradez, J.B. Marque *et al.*) ; Chevrières et Pontpoint, 3 fem./imm., 30 octobre au 4 novembre, un seul le 5 novembre (R. Baradez, A. Rouge), fem./imm., 16 décembre (J.L. Bigorne).
Seine-Maritime - baie de Seine/Le Havre, fem./imm., 14 et 15 octobre (R. Baradez *et al.*).
Somme - Hable d'Ault, 5 ind. (sans doute une femelle et 4 imm.), 20 octobre, puis 3 ind. jusqu'au 23 novembre (J. Bellard, J.C. Robert, P. Royer).
Yvelines - étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, mâle, 13 juin au 14 avril 1996 (Th. Fournet, J. Piguet *et al.*).
1994 Ille-et-Vilaine - étang de Bazouges/Hédé, 2 fem./imm., 9 au 17 janvier (P. Le Mao) et non une seule fem./imm. le 17 janvier comme publié précédemment (*Ornithos* 2 : 149).
1994 Seine-et-Marne - Varennes-sur-Seine et Cannes-Ecluse, fem., 11 décembre au 10 mars 1995 (L. Spanneut *et al.*).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). Le record de 1994 (27 individus) est - malheureusement... - battu cette année avec 49 oiseaux. À retenir d'une part la « poussée » vers l'est de la France, les séjours estivaux ou de très longue durée (*cf.* l'oiseau des Yvelines) et surtout cette troupe d'hivernants au lac de Grand-Lieu qui n'est pas de



1. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris,* mâle adulte, Sarreguemines, Moselle, février 1996 (P.E. Engel).
Male Ring-necked Duck.

bon augure. La reproduction en France, de cette espèce introduite malencontreusement en Grande-Bretagne, risque un peu plus, à moyen terme, de nuire gravement à la fragile population ibérique d'Érismature à tête blanche *O. leucocephala*. Des mesures vigoureuses d'éradication sont à l'étude.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (23/29 - 3/7)

Landes - localité tenue secrète, « site n°4 », couple, 2 jeunes à l'envol, mai, puis seconde nichée, 4 jeunes à l'envol, juillet (G. Blake, P. Grisser *et al.*).
Haut-Rhin - Hirsingue, imm., 2 avril (F. Fontaine).
(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal). Le couple fidèle au « site n°4 » des Landes a « innové » cette année avec deux nichées successives. L'observation alsacienne est remarquable et montre les velléités d'expansion de l'espèce, bien que le couple de Haute-Normandie n'ait pas tenu ses promesses...

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (198/161 - 19/11)

Gironde - Sainte-Eulalie, juv., électrocuté, phot., 23 novembre (L. Couzi *et al.*).
Marne - lac du Der/Chantecoq, 3ème hiver, 12 février au 6 mars (Ch. Riols *et al.*), juv., 12 février au 15 mars (Ch. Riols *et al.*), 4ème hiver, 26 février au 11 mars (Ch. Riols *et al.*), 4ème hiver, 27 octobre au 17 février 1996 (Ch. Riols *et al.*), ad., 1er novembre au 26 février 1996 (Ch. Riols *et al.*), 1er hiver, 4 novembre (Y. Baptiste *et al.*).
Moselle - Gondrexange, 12 mars (*fide* R. Lécaille) ; étang de Lindre/Tarquimpol, 3ème ou 4ème hiver, 1er avril (*fide* R. Lécaille), juv., 4 novembre au 28 février 1996 (J. François, R. Lécaille *et al.*), subad., 9 au 12 novembre (J. François, R. Lécaille *et al.*), juv., 2 au 15 décembre (J. François, R. Lécaille *et al.*), ad., 15 décembre (J. François, R. Lécaille *et al.*).
Nord -Avesnes-le-Sec, juv., 15 novembre (C. et J.Ch. Tombal).
Pas-de-Calais - Diéval, juv., tué à la chasse (!), fin novembre (*fide* A. Gouillart, Ph. Vanardois).
Bas-Rhin - Munchhausen, imm., 11 janvier (M. Brignon, R. Moratin) ; Erstein, imm., 13 janvier (G. Delacour) ; Rhinau, imm., 15 janvier au 5 février (Ch. et C. Braun, E. Esposito *et al.*), sans doute le même oiseau ; Muttersholtz, imm., 5 mars (H. Bertin, J.M. Gatefait).
1994 Aube - « lacs aubois », ad., 11 octobre au 12 février 1995 au moins (A. Millon, S. Paris *et al.*), ad., 9 novembre au 12 mars 1995 (A. Millon, S. Paris *et al.*), juv., 18 novembre au 31 décembre (A. Millon, S. Paris *et al.*), 2ème hiver, 7 décembre au 5 mars 1995 (A. Millon, S. Paris *et al.*), ad., 18 décembre (A. Millon, S. Paris *et al.*).
1994 Marne - lac du Der/Chantecoq, ad., 19 octobre au 19 février 1995 (Ch. Riols *et al.*), 3ème hiver, 29 octobre au 16 janvier 1995 au moins (Ch. Riols *et al.*), ad., 5 novembre au 18 mars 1995 (Ch. Riols *et al.*), 2ème hiver, 17 décembre au 19 février 1995 (Ch. Riols *et al.*).
1994 Moselle - étang de Lindre/Tarquimpol et environs, imm., 12 avril et non 12 mars comme indiqué précédemment (*Ornithos* 2 : 150), ad., 11 novembre au 19 février 1995 (J. François *et al.*), subad., 6 au 18 décembre (J. François *et al.*).
1994 Deux-Sèvres - lac du Cébron/Saint-Loup-sur-Thouet et environs, ad., 23 décembre au 28 février 1995 (M. Fouquet *et al.*).
(Europe septentrionale et centrale, Islande, sud-ouest du Groenland). Il y a sans doute eu 18 Pygargues à queue blanche cet hiver en France, mais sur les sites « classiques » (lac du Der, lacs aubois, étang de Lindre), seuls les juv./1er hiver et le 2ème hiver des lacs aubois (de 1994) ont été pris en compte dans les statistiques. Les adultes sont sans doute pour la plupart des « revenants », à l'image

de celui du lac du Cébron, Deux-Sèvres. Grâce aux informations reçues notamment de Lorraine et de Champagne humide, une arrivée est décelée autour de la mi-novembre, comme le confirme ce migrateur noté dans le Nord. On ne peut enfin passer sous silence l'électrocution d'un oiseau en Gironde et, pire encore, l'exploit cynégétique d'un nemrod nordiste anonyme...

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (24/24 - 3/3)

Haute-Corse - Barcaggio, imm., 2 mai (E. Christophersen, H. Thorhauge Rask).
Nord - Sebourg, mâle, 19 septembre (H. Dufourny *et al.*).
Pyrénées-Orientales - Salses-le-Château, mâle, 6 avril (J. At, M. Sauvage).

(Asie centrale, à l'ouest jusqu'en Roumanie). Quatrième bonne année consécutive pour ce rapace qui semble se montrer davantage que par le passé en Europe occidentale. À noter qu'une femelle avait déjà été vue à Barcaggio en 1992 (bon « spot » pour l'espèce ?).

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (7/6 - 1/2)

Individu présentant les caractéristiques de la race *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » ou « Buse des steppes » :
Marne - Cheniers, 2 ad., 7 octobre (H. Deglaire).
1993 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, ad., « décembre » au 18 février 1994 (J.Y. Frémont, A. Thomas *et al.*).
1994 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, ad., dernière décade de novembre au 19 mars 1995 (*cf.* ci-dessus, J.Y. Frémont, F. Jiguet, A. Larousse *et al.*).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). À retenir l'hivernage complet deux hivers consécutifs d'un adulte en Vendée et l'observation de deux oiseaux ensemble en migration.

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (2/2- 0/0)

1994 Gironde - Ambarès et Saint-Louis-de-Montferrand, ad., forme claire, phot., 28 juin au 7 octobre (J.L. Hentz *et al.*).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Cet oiseau (le 6ème français), qui est resté particulièrement longtemps, a donné bien du fil à retordre aux membres du CHN et il a fallu l'avis autorisé d'un expert pour pouvoir enfin trancher pour une Buse féroce, espèce qui avait été proposée, il faut le signaler, par le découvreur lui-même.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (152/160 - 6/6)

Pas-de-Calais -Sailly-Labourse, juv., 27 février (E. Fernandez, E. Louart) ; Tigny-Noyelles, juv., 16 et 19 mars (M. Guerville) ; Framzelle/Audinghen, imm., 5 avril (G. Flohart), 8 novembre (G. Flohart) ; Wissant, ad. probable, 1er novembre (P.R. Legrand) ; La Drève/Audinghen, juv., 9 novembre (G. Flohart).
1992 Pas-de-Calais - Camiers, 2 et 8 mars (L. Spanneut) et non 2 mars uniquement (*Ornithos* 1 : 7).
1993 Somme - Hable d'Ault, juv., 21 novembre (Th. Fournet).
1994 Landes - marais d'Orx, ad., 22 novembre, précédemment acceptée (*Ornithos* 2 : 151), à présent refusée après réexamen.
1994 Manche - Beauguillot/Sainte-Marie-du-Mont, juv., 11 novembre (Y. Gary) ; juv., 12 novembre (A. Chartier, Y. Gary).
1994 Marne - Cheniers, 10 décembre (H. Deglaire).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Retour à la normale après l'afflux de l'automne 1994. Celui-ci concerne sans doute les 3 oiseaux du printemps 1995, qui, comme ceux de l'automne, n'ont été observés que dans le Pas-de-Calais.

fig.1. Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae*, nombre d'individus observés par an en France (1981-95).
Annual numbers of Eleonora's Falcon in France (1981-95).



2. Marouette poussin *Porzana parva*, femelle, Macinaggio, Haute-Corse, mai 1995 (B. Recorbet).
Female Little Crake.



AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (71/57 - 5/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, ad., 25 octobre au 6 janvier 1996, puis présent en plusieurs sites jusqu'au 20 mars 1996 (Y. Kayser, M. Thibaut *et al.*) ; La Capelière et bois de la Ville, imm., forme pâle, 26 octobre au 24 février 1996 (Y. Kayser, M. Thibaut *et al.*) ; étang de Redon, ad., 16 novembre au 17 janvier 1995 (E. Didner, Y. Kayser).
Jura - Barretaine, ad., 20 mai (M. Looten Schmid, Th. Schmid).
Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, ad., 2 décembre au 20 mars 1996 (G. Blake, P. Grisser, A. Guyot *et al.*).
1993 Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, 3ème année, 5 décembre au 13 février 1994 (J. Beauvillain et J.F. Gaillard) et non uniquement jusqu'au 22 janvier 1994 (*cf. Ornithos* 2 : 7).
1994 Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, 4ème année, 25 décembre au 7 janvier 1995 (B. Delprat, R. Duguet, P. Grisser *et al.*).
(Pologne à la Sibérie orientale). La plupart des observations concernent des oiseaux revenant sur leurs sites habituels d'hivernage (notamment l'oiseau des Landes). Seul l'Aigle criard du Jura est comptabilisé comme nouvel oiseau, à une date particulièrement tardive puisque c'est presque le record français (21 mai 1969 en Brenne).

FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (31/46 - 3/3)

Hors Crau :
Bouches-du-Rhône - Camargue, Fiélouse, mâle, 23 mai (Ch. Tourenq *et al.*).
Corse-du-Sud - cap Rosso/Piana, mâle, 3 mai (Ph.J. Dubois, V. Guidoux).
Pyrénées-Orientales - Salses-le-Château, mâle, 6 avril (J. At, M. Sauvage).
1983 Corse-du-Sud - Molini/Porticcio, mâle, 29 mars (G. Bonaccorsi).
1987 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, mâle, 8 mai (G. Bonaccorsi).
1989 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, mâle, 7 avril (G. Bonaccorsi).
1993 Bouches-du-Rhône - Camargue : Fiélouse, mâle 1er été, phot., 1er août (E. Gazave, P.Y. Henry).
(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). Trois Faucons crécerellettes s'observent en moyenne par an, en dehors de Crau (1981-95, extrêmes : 0 en 1982, 7 en 1983) : 1995 est donc une année parfaitement normale. On retiendra que des données anciennes viennent confirmer le passage printanier en Corse. En Crau, 34 couples ont produit cette année un chiffre remarquable de 73 jeunes (*Ornithos* 3 : 104).

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonorae* (189/260 - 17/19)

Alpes-Maritimes - La Turbie, forme claire, 24 août (J. François).
Aude - Sainte-Lucie/Port-La-Nouvelle, forme claire, 19 mai au 6 juin (A. Jonard, N. Viale), forme sombre, 15 juillet (A. Jonard) ; Narbonne, forme sombre, 23 juin (T. Guillosson, J. Lecointe) ; Gruissan, forme claire et imm. probable, 14 août (T. Guillosson).
Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, forme sombre, 2 mai (Y. Kayser), forme claire, 23 août (Y. Kayser, C. Tourenq), forme claire, 27 septembre (T. Bino, Y. Kayser) ; marais de Saint-Seren, forme claire, 17 mai (Y. Kayser) ; Cabano Dis Ego, forme sombre, 24 mai (H. Hafner) ; Salin de Badon, forme claire, 30 et 31 août (M. Thibaut *et al.*) ; Grand Mas d'Avignon, forme sombre, 30 août (C. Tourenq).
Hérault - Montpellier, forme sombre, 17 juin (F. et L. Veyrunes).
Pyrénées-Orientales - Alénya, forme sombre, 7 mai (J.Y. Frémont) ; forêt de Valmy/Argelès, forme claire et forme sombre, 11 et 24 juin (Y. Aleman, M. Nègre, R. Prodon) ; Collioure, forme sombre, 18 août (J. Piette) ; col de Puymorens, forme claire, 11 septembre (Th. Debaere, I. Dupont).
1993 Aude - Gruissan, 29 juillet (*fide* A. Jonard), forme sombre, 8 au 11 août (D. Clément *et al.*), imm., 9 août (D. Clément *et al.*), forme claire, 27 au 31 août (D. Clément *et al.*), 2 ind., forme claire, 18 août (Équipe LPO-Aude) ; Pissevaches/Fleury, imm., 16 août au 13 septembre (R. Grignon, S. Nicolle, A. Trompat *et al.*).
1993 Pyrénées-Orientales - Barcarès, forme sombre, 23 juin (D. Clément) ; Garrieux, forme sombre et forme claire, 13 juillet (Y. Kayser, E. Rousseau).
1994 Corse-du-Sud - Solenzara, forme claire, 16 septembre (Th. Fournet) ; au nord de Porto-Vecchio, 2 ind., forme claire, 17 septembre (C. et Th. Fournet).
(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Année moyenne sans événement particulier ni présence hors des régions classiques de l'espèce. La figure 1 montre en revanche clairement l'accroissement spectaculaire des données en France depuis 1986 (1990 faisant figure d'exception).

FAUCON SACRE *Falco cherrug* (7/7 - 0/0)

1994 Pyrénées-Atlantiques - col d'Organbidexha, ad., 27 septembre (J.P. Urcun).
(Tchécoslovaquie, Turquie jusqu'en Sibérie centrale et méridionale). Les problèmes d'identification des grands faucons liés à la présence (croissante ?) d'hybrides rendent la tâche du CHN encore plus ardue. Le comité est donc obligé de prendre en compte uniquement les données extrêmement circonstanciées. Il en résulte que la plupart, sinon toutes, des données de Faucon sacre et de Faucon lanier *F. biarmicus* refusées (et listées comme telles en fin de rapport) doivent être considérées comme des « grands faucons indéterminés » plutôt que comme des erreurs d'identification. Cela veut dire que, si des éléments nouveaux permettant l'identification de ces faucons étaient publiés dans un avenir plus ou moins proche, le CHN n'hésitera pas à reconsidérer l'ensemble de ces données.

MAROUETTE POUSSIN *Porzana parva* (51/68 - 9/10)

Alpes-Maritimes - localité tenue secrète, mâle au moins, phot., 3 au 11 avril (M. Boët *et al.*).
Aude - Les Jonquiettes/Gruissan, imm., 11 août (Ph. Gautier, A. Guillaumet, O. Labbaye).
Bouches-du-Rhône - Camargue : Grand Ponche, mâle chanteur, 17 et 18 juillet (Y. Kayser).
Corse-du-Sud - Caldaniccia/Afa, fem., 1er avril (B. Recorbet).
Haute-Corse - Barcaggio, mâle, phot., 15 et 16 avril (M. Chassagne, Th. Le Quelennec) ; étang de Biguglia/Borgo, 3 mâles, phot., 17 avril (M. Chassagne, Th. Le Quelennec) ; Macinaggio, fem., phot., 8 mai (G. Bonaccorsi, B. Recorbet).
Isère - La Buisse, mâle, 25 avril (G. Bruneau, A. Ronseaux).
Meuse - localité tenue secrète, mâle chanteur, 6 mai à début juin (J. François, G. Frêne, R. Lécaille).
1994 Meuse - localité tenue secrète, mâle chanteur, 21 et 25 mai (J. François).

(Europe, Asie centrale). À nouveau une bonne année, avec 10 individus tous, sauf un, au printemps. Seule 1987 (14 oiseaux) avait fait mieux, et 1990 avait également donné 10 Marouettes poussins. Heureux retour des informations en provenance de Lorraine (où seul l'individu de 1994 est comptabilisé), qui demeure la région de France où la reproduction est la plus probable.

MAROUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (28/26 - 2/4)

Loire-Atlantique - près d'Ancenis, 3 ad., 4 août (B. Recorbet).
Vendée - La Belle-Henriette/La Faute-sur-Mer, ad., 14 au 17 août (F. Portier, A. Thomas).

(Europe, Asie centrale, Japon). Il aura fallu que l'observateur d'un grand nombre de marouettes en Corse revienne dans sa région d'origine le temps des vacances pour avoir à nouveau des nouvelles des Marouettes de Baillon de Loire-Atlantique (*cf. Ornithos* 1 : 9). La reproduction de l'espèce, là encore, n'est pas exclue.

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (8/8 - 3/7)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Ligagneau, ad., phot., 16 octobre au moins (R. Mathevet *et al.*).
Pyrénées-Orientales - étang de Canet, 2 ad., 3 subad. et un juv. probable, 11 au 16 juillet au moins (Y. Aleman, J.M. Algrin, Th. Bara *et al.*) ; 30 octobre, 2 ad. (G. et M. Olioso), sans doute en partie les mêmes oiseaux.
1987 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, ad. au moins, 27 mars au 18 avril (G. Bonaccorsi).
1988 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, ad., 28 février au 7 mai (G. Bonaccorsi).

(Sud de l'Espagne, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). Comme nous le suggérions dans le précédent rapport (*Ornithos* 2 : 154), les choses s'accélèrent puisqu'une reproduction dans les Pyrénées-Orientales en 1995 n'est pas à exclure, bien au contraire (voir article dans le présent numéro). Ces oiseaux proviennent probablement de la réserve de L'Empordá, en Catalogne espagnole, où un programme de réintroduction donne d'excellents résultats. L'oiseau de Camargue était quant à lui bagué (origine inconnue car lecture partielle de la bague). À noter également les données un peu plus anciennes de Corse et surtout le stationnement prolongé de l'oiseau de 1988.

GRAVELOT DE LESCHENAULT *Charadrius leschenaultii* (1/1 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de la Quarantaine, mâle, phot., 14 au 16 mai (E. Didner *et al.*).

(De la Turquie à la Sibérie centrale). La cinquième donnée française (et la troisième en Camargue) suit de près la précédente qui était de l'année dernière. À quand la prochaine ?

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (12/13 - 1/1)

Finistère - Tréguennec, ad. probable, phot., 9 au 25 septembre (Th. Fournet, S. Guérin, S. Guillaume *et al.*)

(Amérique du Nord). Donnée parfaitement classique, en un lieu classique. Que demander de plus, sinon que les découvreurs de l'oiseau fassent une fiche (éventuellement même avec son ancien nom vernaculaire) ?

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva* (1/1 - 0/0)

1994 Somme - Saint-Valéry-sur-Somme, mâle ad., tué à la chasse, phot. 17 juillet (M. Lelong, *fide* J.C. Robert).

(Sibérie, Alaska). Enfin la première donnée française ! On ne peut que regretter les circonstances de sa découverte... À noter tout de même qu'à la même époque, il y a eu en France un Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis*, et le même jour en baie de Somme, un Gravelot de Leschenault !

PLUVIER BRONZÉ ou FAUVE *Pluvialis dominica/fulva* (4/4 - 3/3)

Ain - Le Plantay, ad., 12 et 13 août (F. et M. Poumarat).
Vendée - Les Sables d'Olonne, 1er été ou ad. en mue, 9 au 14 août au moins (D. Desmots *et al.*).
Pas-de-Calais - Audinghen, ad., 7 mai (G. Flohart).

(Amérique du Nord, Sibérie). Les deux oiseaux du mois d'août avaient été soumis comme Pluvier bronzé : on remarquera la similitude de dates.

VANNEAU SOCIABLE *Chettusia gregaria* (26/26 - 2/2)

Loire - Chambéon, ad., 3 novembre (P. Bonin, S. Tyrawsky *et al.*).
Meurthe-et-Moselle - ad., 22 et 23 mars (Y. Baccouche, H. Michel, P. Vagner *et al.*).

1994 Seine-et-Marne - La Tombe, ad., 28 au 30 octobre (*cf. Ornithos* 2 : 154), également Misy-sur-Yonne, 31 octobre (A. Perthuis).
(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Retour à la « normale », avec un oiseau au printemps et un autre à l'automne.

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (5/5 - 1/1)

Vendée - Bouin, ad., 14 août (J.L. Dourin, J.Y. Frémont, A. Verneau).
(Amérique du Nord). Avec cet adulte en Vendée, il s'agit de la septième mention française, la plus précoce en automne.

BÉCASSEAU D'ALASKA *Calidris mauri* (0/0 - 1/1)

Vendée - pointe de l'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., phot., 22 et 23 juillet (D. Desmots, J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*).
(Amérique du Nord). Seconde donnée française. La première – un jeune – avait été obtenue les 18 et 19 septembre 1973 au Vougo/Plouguerneau, Finistère.

BÉCASSEAU MINUSCULE *Calidris minutilla* (2/2 - 1/1)

Pas-de-Calais - Les Attaques, juv. muant 1er hiver, phot., 26 octobre au 11 novembre (G. Flohart *et al.*).
(Amérique du Nord). Huitième mention française, la plus tardive à ce jour, bien qu'un oiseau ait été noté en février 1982 à Oléron, Charente-Maritime.

BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (3/3 - 1/1)

Morbihan - Hoëdic, juv., 25 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont, G. Rault *et al.*).
(Amérique du Nord). Également une huitième donnée française, la précédente remontant à juin 1991 (!) en Loire-Atlantique. On remarquera la similitude de date avec l'espèce précédente.

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (7/7 - 1/1)

Morbihan - Hoëdic, juv., 11 et 12 septembre (G. Rault).
(Amérique du Nord). Douzième donnée française. L'île d'Hoëdic confirme qu'elle est un lieu privilégié pour l'observation de limicoles néarctiques. Avec Ouessant, elles ne sont sans doute pas les seules.

3. Bécasseau minuscule *Calidris minutilla*, Les Attaques, Pas-de-Calais, novembre 1995 (R. Tonnel). *Least Sandpiper.*



BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (135/148 - 7/7)

Finistère - Nérizélec/Plovan, 16 août (B. Bargain) ; baie de Goulven, juv., 21 septembre (G.J. Genovesi, F. Jiguet).
Maine-et-Loire - La Ménitré, 29 juillet (J.P. Buron, M. Baillergeau, O. Loir).
Haute-Marne - Droyes, ad., 23 au 27 juillet (Ch. et R. Riols *et al.*).
Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, juv., 4 et 5 août (G. Flohart *et al.*) ; Framzelle/Audinghen, phot., juv., 22 août au 8 septembre (G. Flohart *et al.*).
Vendée - pointe de l'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, 24 juillet (S. Guérin, A. Thomas *et al.*).
1992 Finistère - étang de Laoual/Cléden-Cap-Sizun, juv., 22 au 27 septembre, et non 22 au 29 septembre comme indiqué précédemment (*Ornithos* 1 : 9-10).
1994 Finistère - étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, juv., 25 au 31 août (J.Y. Péron) et non 29 août seulement (*Ornithos* 2 : 155) ; Ouessant : réservoirs Saint-Michel, juv., 8 au 10 septembre (J.Y. Péron) et non 8 septembre seulement (*Ornithos* 2 : 155).

(Amérique du Nord, Sibérie). Année numériquement très moyenne, mais on retiendra une arrivée groupée fin juillet/début août, avec au moins un jeune oiseau (et peut-être trois) et deux données du quart nord-est de la France, ce qui plaiderait en faveur d'oiseaux sibériens plutôt que nord-américains.

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (74/103 - 7/9)

Bouches-du-Rhône - Camargue : salines de Salins-de-Giraud, ad., 26 et 27 avril (G. Olioso *et al.*) ; étang de la Quarantaine, ad., 15 mai (F. Lescuyer, M. Thibaut) ; Baisse de Quenin, ad., 6 et 7 août (E. Berthollon, M. Thibaut) ; Salin de Badon, juv., 11 au 14 août (X. Rufray, M. Thibaut) ; 3 juv., 29 août, 4 juv., 30 août, un juv. 1er septembre (M. Thibaut, P. Thouy *et al.*).
Vendée - Le Collet/Bouin, 30 avril (J.Y. Frémont, Y. Trévoux).

(Europe septentrionale). Belle série d'observations en Camargue avec notamment 4 individus en automne, proche du record (5 oiseaux les 23 et 24 juillet 1978, toujours en Camargue).

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (54/59 - 8/10)

Finistère - Nérizélec/Plovan, 2 juv.,phot., 2 et 3 septembre, un ind. bagué le 3 septembre (B. Bargain, J.Y. Frémont, A. Larousse *et al.*) ; étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, 2 ind., 4 septembre (B. Bargain), sans doute les mêmes oiseaux ; Trunvel/Tréogat, juv., 8 et 9 septembre (B. Bargain, S. Guérin) ; Ouessant : Créac'h, juv., capturé et bagué, 14 au 16 septembre (B. Bargain, Y. Guermeur), probablement contrôlé les 17 et 18 septembre à la pointe de la Torche/Plomeur (*cf.* ci-dessous) ; pointe de la Torche/Plomeur, 2 dont un juv. au moins, 12 septembre, 5 ind., sans doute tous juv., 15 septembre, 4 ind. dont un nouveau, bagué, probablement à Ouessant (*cf.* ci-dessus), 17 et 18 septembre, encore 2 ind., 23 septembre au 2 octobre (S. Guérin, F. Jiguet, C. et M. Vergès *et al.*).
Deux-Sèvres - lac du Cébron/Saint-Loup-sur-Thouet, juv., 28 septembre au 8 octobre (A. Armouet *et al.*).

(Amérique du Nord). 1995 est la meilleure année depuis la création du CHN avec 10 individus différents (bien que la comptabilité en baie d'Audierne ait été cette année plutôt délicate). Vingt ans plus tôt, en 1975, pas moins de 17 ou 18 oiseaux avaient été notés, dont 8 ensemble en baie d'Audierne le 9 septembre. L'oiseau bagué de la pointe de la Torche est, selon les dires des observateurs, celui qui avait séjourné auparavant à Ouessant.

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (21/22 - 1/1)

Haute-Corse - Macinaggio, 8 mai (G. Bonaccorsi, B. Recorbet).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Un faible passage semble se produire fin avril/début mai dans le sud de la France notamment. Il existe deux autres mentions de Bécassines doubles en Corse, à la mi-mai 1956, près d'Aléria.

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (12/12 - 1/1)

Morbihan - Falguérec/Séné, juv., phot., 2 au 24 octobre (J. David, J.Y. Frémont, A. Larousse *et al.*).

(Amérique du Nord). Curieusement, cette espèce a été annuelle entre 1984 et 1991. Mais c'est la première mention — à une date parfaitement classique pour ce limicole depuis lors.

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* (31/32 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de la Quarantaine, ad., 12 au 17 juillet (Y. Kayser, M. Thibaut *et al.*).
Vendée - pointe de l'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 14 au 23 juillet (J.M. Gillier, A. Thomas *et al.*).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Peu de données cette année, mais à des dates fort similaires. La pointe de l'Aiguillon, en Vendée, a accueilli simultanément bien des oiseaux rares en cette fin juillet (un Gravelot mongol *Charadrius mongolus* est encore en circulation au sein du CHN) qui ont attiré de nombreux observateurs.

CHEVALIER GRIVELÉ *Actitis macularia* (7/8 - 2/2)

Morbihan - Bangor/Belle-Île-en-Mer, juv., 12 octobre (A. Rouge).
Pas-de-Calais - Les Attaques, ad., 5 au 12 novembre (G. Flohart, J.A. Leclercq *et al.*).

(Amérique du Nord). Huitième et neuvième mentions françaises pour ce limicole néarctique dont la première observation remonte seulement à... 1987 ! Belle Île confirme qu'elle est aussi un excellent lieu pour l'observation de limicoles nord-américains.



fig 2. Limicoles néarctiques : nombre d'espèces, de données et d'individus par an en France (1981-95).
Annual numbers of species, records and birds of north-american waders in France (1981-95).

À nouveau une année correcte en ce qui concerne les limicoles néarctiques. Avec 11 espèces, 1995 arrive en seconde position derrière 1991 (12 espèces), tandis que le nombre de données (27) est identique à celui de l'an dernier. Enfin, avec 29 individus, 1995 se situe légèrement au-dessus de la moyenne (23 ind./an), le record étant de 38 oiseaux en 1984.

tandis que le site du Pas-de-Calais a lui aussi attiré des limicoles rares, mais également des observateurs peu discrets, ce qui a eu pour conséquence la fermeture du site (privé) et un fort risque de poursuites judiciaires pour ceux qui tenteraient d'enfreindre cette interdiction. Dommage...

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor* (37/40 - 3/3)

Haute-Marne - étang d'Aigremont/Droyes, fem., 24 au 27 mai (Ch. Hervé, E. Plantier, B. Vitry).
Pas-de-Calais - Les Attaques, 1er hiver, phot., 5 au 19 novembre (C. et M. Vergès *et al.*).
Somme - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, fem., phot., 25 juin au 2 juillet (Ph. Carruette, L. Taverne *et al.*).
(Amérique du Nord). Trois oiseaux, après l'année « blanche » de 1994, et sans doute un seul fraîchement arrivé. On notera que, pour une fois, l'ouest de la France n'a pas le privilège de cette espèce.

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (101/320 - 12/26)

Hérault - Lido de Pierreblanche/Villeneuve-les-Maguelonne, subad., trouvé blessé et mort en soins, phot., 8 août (V. et X. Rufray).
Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 2 ad. au moins et un juv., 2 septembre (M. Narcy), juv., 1er octobre (Ph.J. Dubois *et al.*).
Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, juv., 16 août (G. Flohart), juv., 24 août (G. Flohart), 3 juv., 27 août (O. Bardet, G. Flohart *et al.*), 7 juv., un phot., 28 août (G. Flohart, D. Hentz, R. Tonnel *et al.*), juv., 30 août (B. et Ch. Boutrouille, P.R. Legrand, Ph. Vanardois), juv., 2 septembre (G. Flohart), juv., 1er octobre (G. Flohart *et al.*), 4 juv., 19 octobre (G. Flohart *et al.*).
Seine-Maritime - Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, 2 juv., un phot., 26 août (Ph.J. Dubois, M. Duquet).
1993 Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 4 juv. au moins, 5 septembre (H. Davière, E. Lapous), juv., 6 septembre (H. Davière, E. Lapous).
1994 Var - salins des Pesquiers/Hyères, ad., 26 mai (J.L. Pratz, J.Ph. Siblet), précédemment refusée (*Ornithos* 2 : 165), acceptée après réexamen.
(Circumboréal). En des temps assez récents, 26 individus dans un automne faisaient figure de record. Depuis 1990, les choses ont considérablement changé avec la meilleure connaissance de terrain des oiseaux juvéniles et 1995 doit donc se situer comme une année normale. L'essentiel du passage s'est déroulé fin août. La jetée du Clipon semble avoir été quelque peu désertée cette année... à moins que les observations ne soient pas encore parvenues au CHN ?

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (6/13 - 1/1)

En dehors du littoral méditerranéen :
Haute-Savoie - Coudrée/Excenevex, ad., 12 mai (Y. Schmidt).
1993 Gironde - Certes/Audenge, ad., 26 avril (F. Dupuy).
(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). Fin avril et surtout début mai, un petit mouvement vers le nord est décelable, tant dans la région Rhône-Alpes que sur la moitié sud de la façade atlantique.

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (60/78 - 7/8)

Alpes-Maritimes - embouchure du Var/Saint-Laurent-du-Var, 2ème été, 21 mai (M. et M. Boët, L. Clair *et al.*).
Aude - étang de Pissevaches/Fleury, ad., 10 avril (J. Maout), 2ème été, phot., 20 mai (Ph.J. Dubois, V. Guidoux).
Bouches-du-Rhône - Camargue : Baisse de Quenin/Salins-de-Giraud, 2ème été, phot., 26 avril au 20 mai (P. Defos du Rau, F. Jiguet *et al.*) ; Grenouillet, ad. et 2ème été, 19 au 25 juin (Y. Kayser *et al.*) ; Baisse de 500 Francs, 3ème été, 10 août (Y. Kayser).
Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer et environs, 3ème été probable, phot., 15 juin au 27 août (T. Hoogendoorn *et al.*) ; Hardelot, 3ème été probable, 13 juillet (L. Barbier), le même oiseau.

Pyrénées-Orientales - Cerbère, 2ème été, 7 mai (C. Bonnet, P. Crouzier).
1994 Gironde - pointe de Grave/Le Verdon-sur-Mer, 2ème été, 28 avril (Y. Le Bris, J.P. Urcun).
(Circum-méditerranéen). Malgré un accroissement toujours important de la colonie du delta de l'Ebre en Espagne, le nombre d'oiseaux vus en France continentale stagne. Même le site audois de Pissevaches a accueilli cette année bien peu de Goélands d'Audouin et seuls quelques subadultes ont fréquenté le littoral méditerranéen. Finalement le vrai événement de l'année aura été la présence d'un oiseau dans le port de Boulogne-sur-Mer au cours de l'été, constituant sans doute la donnée la plus septentrionale pour l'espèce (*Ornithos* 2 : 136-139).

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (121/93 - 9/2)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).
Charente-Maritime - Château d'Oléron, ad., 18 mars (F. Jiguet).
Finistère - Lampaul-Ploudalmézeau, 2ème hiver*, 11 mars (Ph. Pondaven).
Gironde - Arcachon, 2 ad., 30 décembre et 1er janvier 1996 (B. Lamothe).
Loire-Atlantique - parc paysager de Saint-Nazaire, ad., 5 janvier au 18 février (J.Y. Frémont, J. Pourreau *et al.*).
Morbihan - Pénestin, ad., 25 et 26 février (J.Y. Frémont, A. Larousse), ad., 17 septembre au 7 octobre (J.Y. Frémont, A. Larousse *et al.*), le même oiseau.
Pas-de-Calais - Le Portel, ad., phot., 15 janvier au 1er mars (F. Jiguet *et al.*).
Essonne - étang de Saclay, subad.*, 24 février, peut-être présent également le 29 janvier (D. Bouchet, P. Le Maréchal).
Val-de-Marne - lac de Saint-Mandé et parc floral/Vincennes, ad., 26 décembre au 15 mars 1996 (L. Spanneut *et al.*).
1992 Finistère - Ouessant : Kun, 2ème hiver*, 17 décembre (Y. Guermeur).
1993 Landes - Hossegor et Capbreton, ad., phot., 18 novembre au 16 février 1994 (P. Grisser *et al.*), ad., phot., 22 novembre au 31 décembre au moins (P. Grisser) et non un seul ad., 23 au 26 janvier 1994 (*cf. Ornithos* 2 : 157).
1994 Gironde - ad., phot., 23 octobre au 4 décembre, 2 ad., 11 novembre au 12 février 1995, 2ème hiver*, phot., 4 décembre au 12 février 1995 (M.F. Canevet *et al.*).
1994 Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, ad.*, 13 février (M.F. Canevet, P. Grisser, S. Labatut), ad., phot., 13 novembre au 15 février 1995 (B. Delprat, R. Duguet, P. Grisser *et al.*).
1994 Pas-de-Calais - Le Portel, ad., présent jusqu'au 20 mars (G. Flohart), et non jusqu'au 18 mars (*cf. Ornithos* 2 : 10).
(Amérique du Nord). Sur les 9 oiseaux vus en 1995, seulement deux sont (probablement) nouveaux. Aucun oiseau de 1er hiver signalé. L'individu de Pénestin est vu pour la 12ème année !

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (81/80 - 5/5)

Finistère - Ouessant : Le Stiff, 1er hiver, phot., 21 janvier (F. Cottrez, G. Fouque) ; Saint-Guénolé/Penmarc'h, 1er hiver, phot., 24 janvier au 3 mars (G. Rault) ; Roscoff, 1ère année probable, 5 avril (A. Keeble).
Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, 2ème hiver, 14 janvier (P. Defos du Rau, E. Gfeller, F. Jiguet), 1er hiver, phot., 15 janvier au 18 avril (F. Jiguet *et al.*), peut-être le même oiseau que celui de décembre 1994 (*cf.* ci-dessous).
Pyrénées-Atlantiques - Biarritz, 1er hiver, 29 janvier (J.F. Terrasse).

4. Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*, Boulogne, Pas-de-Calais, février 1995 (R. Tonnel). *Iceland Gull.*



5. Mergule nain *Alle alle*, Le Clipon/Loon-Plage, Nord, novembre 1995 (F. Desbordes). *Little Auks.*



1994 Gironde - pointe de Grave/Le Verdon-sur-Mer, 3ème hiver ou ad., 2 au 6 avril (L. Gougeon, J.P. Urcun).
1994 Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, 1er hiver, 18 décembre (S. Chambris, E. Gfeller, F. Jiguet).

(Arctique canadien, Groenland). Petite arrivée décelée sur les côtes à partir du 15 janvier. L'un des oiseaux du Pas-de-Calais semble bien avoir été présent dès le mois de décembre 1994.

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (8/8 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de Beauduc, ad., 28 mai au 2 juin (M. Thibaut, P. Defos du Rau).
1994 Corse-du-Sud Capitello/Porticcio, ad., 20 mai (G. Bonaccorsi).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). L'espèce semble régulière en Camargue, plutôt à l'automne d'ailleurs, mais ces deux observations printanières (dont la première pour la Corse), incitent à ouvrir l'œil à cette saison. Il y a donc eu 4 observations de cette sterne en 1994 !

STERNE « À BEC ORANGE » *Sterna maxima/bengalensis/elegans* (2/2 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Baisse de Quenin, ad., 7 août (E. Chaput).
Probablement une Sterne voyageuse ici et à cette époque.

GUILLEMOT À MIROIR *Cepphus grylle* (12/15 - 1/1)

Seine-Maritime - Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, ad., 13 mai (C. Lethuillier, F. Noël).
(Arctique, Atlantique nord). Toujours aussi rare et irrégulier en France (donnée plutôt tardive dans le cas présent).

MERGULE NAIN *Alle alle* (88/375 - 46/371)

Côtes-d'Armor - Perros-Guirec, trouvé mort, 4 novembre (L. Binet) ; Evran, phot., 19 novembre (P. Le Mao *et al.*).
Ille-et-Vilaine - La Ville-ès-Nonais/Vaubœuf, 2 ind., phot., 3 novembre (C. Felloni, Ch. Kerihuel).
Loire-Atlantique - La Turballe, trouvé mort, 21 février (J. Pourreau).
Manche - Querqueville, recueilli vivant, phot., 31 octobre, mort en soins le 1er novembre (A. Gherardi, D. et M. Lecuyer, L. Legrand) ; Saint-Vaast-la-Hougue, 2 ind., 3 novembre (A., D. et S. Dujardin).
Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 2 ind., 30 octobre (T. Deforêt, D. Michelat, F. Pouzergues *et al.*), 5 ind., 1er novembre (Ch. Gruwier, N. Selosse), 114 ind., qqs-uns phot., 2 novembre (F. Desbordes, Ch. Gruwier, N. Selosse), 34 ind., 3 novembre (Ch. Gruwier, N. Selosse), 5 ind., 4 novembre (M. Duquet, J.Y. Frémont), 5 novembre (B. Bril), 6 ind., 17 novembre (Ph.J. Dubois, V. Guidoux, S. Matthis), 71 ind., 18 novembre (Ph.J. Dubois, Ch. Gruwier, N. Selosse *et al.*), 3 ind., 19 novembre (Ch. Gruwier, N. Selosse) ; Rosendaël, un, recueilli vivant, 2 novembre, mort en soins (*fide* B. Bril) ; Saint-Pol-sur-Mer, recueilli vivant, 3 novembre, mort en soins (*fide* B. Bril) ; Pitgam/Zegerscappel, recueilli vivant, 3 novembre, mort en soins (*fide* B. Bril) ; Herzeele, recueilli vivant, 3 novembre, mort en soins (*fide* B. Bril) ; Malo-les-Bains, recueilli vivant, 4 novembre, mort en soins (*fide* B. Bril) ; bassin minéralier/Dunkerque, 24 ind. dont 2 trouvés morts, phot., 4 novembre (M. Duquet, J.Y. Frémont, M. Narcy), 2 ind., 18 et 19 novembre (Ph.J. Dubois, V. Guidoux, A. Louchart), 7 ind., 20 novembre (J.Y. Frémont, A. Larousse), 3 ind., 23 novembre (E. Gfeller, F. Jiguet), un seul, 26 novembre (B. Bril), sans doutes des oiseaux du premier groupe ayant séjourné ; port-est de Dunkerque, 4 novembre (M. Duquet, J.Y. Frémont), 14 novembre (D. Hars), 2 ind., dont un trouvé mort, 18 novembre (Ph.J. Dubois, V. Guidoux) ; digue du Braek/Dunkerque, 5 ind., trouvés morts, 5 novembre (F. Muller), trouvé mort, 24 décembre (J.L. Bigorne) ; plage du Clipon/Loon-Plage, 4 ind., trouvés morts, 16 novembre (B. Bril), 5 ind. au moins, trouvés morts, 3 décembre (B. Bril *et al.*) ; Leffrinckoucke, recueilli vivant, 18 novembre, mort en soins (*fide* B. Bril) ; Bray-Dunes, recueilli vivant, 18 novembre, mort en soins (*fide* B. Bril).
Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, 23 ind., 3 novembre (G. Flohart), 5 ind., 4 novembre (P. Camberlein, G. Flohart, D. Tirmarche), 5 ind., 16 novembre (G. Flohart), 4 ind., 17 novembre (G. Flohart), 3 ind., 19 novembre (Ph.J. Dubois, G. Flohart *et al.*) ; Wissant, trouvé mort, 4 novembre (*fide* B. Bril) ; Arques, recueilli vivant, 4 novembre (*fide* B. Bril).
Seine-Maritime - Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, 16 ind., 2 novembre, 9 ind., 3 novembre, 3 ind., 18 novembre, 2 ind., 19 novembre (O. Benoist).
Yvelines - Villepreux, recueilli vivant, phot., 3 novembre, mort en soins le 23 novembre (*fide* G. Grolleau, P. Le Maréchal).
1986 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, 23 novembre (G. Bonaccorsi).
1991 Pas-de-Calais - Merlimont, trouvé mort, 26 décembre (*in Le Héron* 28 : 120).
1994 Manche - Bricqueville-sur-Mer, trouvé mort, 2 mars (P. Sagot *in Le Cormoran* 43 : 181).
1994 Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, 17 novembre (G. Flohart).

(Circumboréal). 1995 restera sans nul doute une année mémorable pour cette espèce. Il s'agit apparemment du plus gros passage quantifié sur nos côtes, bien que ceux de décembre 1929 et février 1950 aient été semble-t-il très importants. Ces mouvements d'oiseaux ont été principalement notés sur le littoral du département du Nord, mais aussi sur celui du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime (curieusement pas dans la Somme...), et dans une moindre mesure jusqu'en Bretagne du Nord. C'est à la suite d'une très forte dépression centrée sur le nord de l'Allemagne, dans les premiers jours de novembre, que des vents violents de secteur nord rabattent les oiseaux vers la partie méridionale de la mer du Nord (côte est de l'Angleterre, Belgique, nord de la France, B. Bril *in litt.*). Des oiseaux sont vus à l'intérieur des terres dans le Nord (et jusqu'en Ile-de-France, constituant la première mention régionale) et stationnant sur des bassins protégés (jusqu'à 22 ensemble à Dunkerque). Un deuxième afflux,

de moindre ampleur, concerne le littoral du 17 au 19 novembre, en même temps que souffle un fort vent de secteur nord/nord-ouest. Beaucoup d'oiseaux sont récupérés mourants ou sont trouvés morts sur la plage. L'effectif total, qui égale celui comptabilisé depuis 1988 (date de l'homologation nationale de l'espèce), représente sûrement une partie seulement des oiseaux qui sont passés devant les côtes françaises, même si des doublons de comptage sont possibles. En effet, à la suite d'un avis publié dans *La Voix du Nord*, de nombreux témoignages d'observations d'oiseaux, morts ou vivants, ont été rapportés (B. Bril, *in litt.*), mais ils n'ont pas été pris en compte ici. Notons enfin pour mémoire (car non prise en considération dans la comptabilité du CHN) cette ancienne donnée en provenance de Corse, la seconde pour cette île.

HARFANG DES NEIGES *Nyctea scandiaca* (6/6 - 2/2)

Côtes-d'Armor - Sillon de Talbert/Pleubian, mâle, 25 et 26 juillet (J.M. Raoul *et al.*), peut-être l'oiseau d' Ouessant (*cf.* ci-dessous).
Finistère - Ouessant : Lann Vraz, mâle, phot., 11 mai au 30 juin (D. Pépin, Y. Guermeur *et al.*).

(Circumboréal). D'où viennent ces Harfangs des neiges en plein été ? Exceptionnelle en France jusqu'en 1989, cette chouette est devenue presque régulière depuis cette date. Il est tout à fait possible que les deux mentions bretonnes de 1995 ne concernent en fait qu'un seul et même individu. En effet, selon les descriptions faites, le plumage semble être à peu près le même dans les deux cas.

HIRONDELLE ROUSSELINE *Hirundo daurica* (212/414 - 0/0)

1990 Bouches-du-Rhône - Camargue : Entressen, 11 avril (R. Hearn, F. Thomas) ; Ligagneau, 2 ind., 24 mai, 27 mai (A. Mante *et al.*) ; Mas Thibert, 1er juillet (Y. Kayser).

(Sud et est de l'Eurasie, Afrique). Cette espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis 1991. Il s'agit d'anciennes données qui sont tardivement parvenues au CHN.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (86/100 - 18/22)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Lignagneau, 5 novembre (Ph. Pilard) ; Nouveau Carton/Saint-Martin-de-Crau, 3 ind., 29 décembre, puis 2 ind. jusqu'au 17 janvier 1996, mais à nouveau 3 ind., vers le 28 février 1996 (J.P. et M. Delapré, M. Thibaut *et al.*).
Finistère - Ouessant : Cost ar Reun et Pern, 12 au 14 octobre (A. Guyot, P. Yésou) ; Ker Ouad et Niou Izella, 2 ind., 27 au 29 octobre (Ph.J. Dubois, V. Guidoux, E. Lapous *et al.*) ; Yuzin, 2 novembre (Ph.J. Dubois, V. Guidoux).
Lot-et-Garonne - Estillac/aérodrome d'Agen, 2 ind., phot., 21 novembre au 9 février 1996, un seul jusqu'au 5 avril 1996 (S. Dulau).
Morbihan - Bangor/Belle-Île-en-Mer, 9 octobre (A. Rouge).
Nord - Dunkerque, 14 septembre (D. Hars).
Pas-de-Calais - Grand-Fort-Philippe, 22 avril (J.A. Leclercq), 29 avril (J.A. Leclercq) ; Fond Pignon/Sangatte, 7 octobre (P. Camberlein, G. Flohart, J.A. Leclercq), Audinghen, 15 octobre (G. Flohart), 22 octobre (G. Flohart *et al.*).
Pyrénées-Orientales - Alénya, 7 mai (J.Y. Frémont).
Seine-Maritime - baie de Seine/Le Havre, 15 octobre (O. Benoist).
Vendée - pointe du But/Yeu, ad., 17 avril (X. Hindermeyer, M.P. Vignault) ; La Gachère/Brétignolles-sur-Mer, 9 octobre (D. Desmots) ; pointe du Devin puis La Fosse/Noirmoutier, 14 octobre (J.Y. Frémont).
1994 Finistère - Ar Picard, 10 octobre (E. Lapous, O. Pichard) ; Ar Guizou, 19 et 22 octobre (Th. Monchâtre, A. Perthuis).



6. Harfang des neiges *Nyctea scandiaca*, mâle, Lann Vraz, île d'Ouessant, Finistère, juin 1995 (D. Laloi). *Male Snowy Owl.*

1994 Pas-de-Calais - Audinghen, 2 ind., 23 novembre (G. Flohart).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). Après le passage exceptionnel de l'automne 1995 (et 42 oiseaux pour cette année-là), on constate d'une part un nouvel hivernage de 5 individus (3 en Crau, 2 près d'Agen) - après celui des hivers 1990/91 et 1991/92 dans le Tarn-et-Garonne - et un petit passage printanier (4 oiseaux). Il y a eu cependant 13 individus cet automne (ce qui est bien) pour un total annuel de 22 Pipits de Richard, ce qui place 1995 en seconde place derrière 1994. Cela est peut-être en rapport avec une meilleure connaissance de l'espèce de la part des ornithologues de terrain. À noter l'individu très précoce de Dunkerque.

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava* (23/23 - 0/0)

Mâle présentant les caractéristiques de la race *feldegg* :

1983 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, 4 avril (G. Bonaccorsi), 30 avril (G. Bonaccorsi).
1984 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, 22 avril (G. Bonaccorsi).

(Balkans, mer Noire). Belle série d'observations un peu anciennes, à des dates typiques (notamment début avril), sur un site peu connu et d'une richesse remarquable.

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (4/4 - 1/1)

Vendée - La Belle-Henriette/La-Faute-sur-Mer, juv., 9 septembre (P. Yésou).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). Cinquième donnée française, la seconde pour la façade atlantique, la première étant également une jeune, vue le 2 septembre 1990 en baie d'Audierne, Finistère.

TRAQUET RIEUR *Oenanthe leucura* (3/3 - 1/1)

En dehors de la zone de reproduction des Pyrénées-Orientales :

Aude - Feuilla, mâle, 12 mai (A. Jonard).

(Pyrénées-Orientales, Espagne, Afrique du Nord). Curieusement, un oiseau avait déjà été vu en avril 1989 dans cette localité !

GRIVE À DOS OLIVE *Catharus ustulatus* (0/0 - 1/1)

Finistère - Ouessant : Ty Cren, juv., phot., 16 au 18 octobre (J.P. Delapré, P.P. Evrard, R. Muguet *et al.*).

(Amérique du Nord). Cet oiseau, bien observé par les observateurs présents à Ouessant à ce moment, semble être le troisième pour la France. Un oiseau est signalé au 19ème siècle et un a été vu le 17 février 1979 à Versailles, Yvelines.

GRIVE OBSCURE *Turdus obscurus* (2/2 - 1/1)

Territoire de Belfort - Ballon d'alsace/Lepuix, mâle 1er été chanteur, 9 au 23 avril (H. Bertin, D. Michelat, J.M. Rémy).

(Sibérie). Remarquable observation printanière d'un individu apparemment cantonné quelque temps dans un milieu proche de sa taïga natale. C'est la 11ème mention française.

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (7/7 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Ligagneau, ad., capturé, phot., 31 octobre (L. Barbier, J.L. Lucchesi).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Huitième mention pour cette espèce presque annuelle en France. Un oiseau avait déjà été capturé au Ligagneau, le 2 octobre 1993.



7. Grive à dos olive *Catharus ustulatus*, juvénile, Ty Crenn, île d'Ouessant, Finistère, octobre 1995 (M. Vergès). *Juvenile Swainson's Thrush.*

FAUVETTE SARDE *Sylvia sarda* (5/5 - 1/1)

Var - La Londe, ad. probable, 10 mai (Ph. Orsini).

(Méditerranée). Après la série d'observations en mars dans les Alpes-Maritimes, première mention pour le Var, à une date plutôt tardive.

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (11/11 - 3/3)

Finistère - Ouessant : Stang Meur, juv., 31 octobre (Ph. et G. de Grissac, J.L. Jacquemin *et al.*).
Hérault - Saint-Aunès, juv., 22 septembre (X. Rufray).
Morbihan - Hoëdic, juv., 22 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Trois données en France dans la même année font presque figure de record... Il y avait plus de mentions dans les années 1960 et 1970, en particulier dans le Pas-de-Calais.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (17/19 - 3/3)

Finistère - Ouessant : Pount Salaün, 31 octobre (Ph.J. Dubois).
Pas-de-Calais - Framzelle/Audinghen, phot., 28 octobre (D. Michelat *et al.*).
Somme - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, 15 novembre (Ch. Lebrun).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Toujours rare quoique régulier ou presque (pas de données pour 1983, 1984, 1986 et 1992 depuis la prise en compte des informations du CHN en 1981). L'observation de la Somme est l'une des plus tardives avec celle de l'Hérault le 2 décembre 1990.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (410/440 - 26/29)

Finistère - Ouessant : Cost ar Reun, 11 octobre (P. Yésou *et al.*) ; Arland, 19 octobre (Y. Guermeur *et al.*), 22 octobre (A. Guyot), 13 au 16 novembre (Y. Guermeur) ; Ar Reun, 20 octobre (Y. Guermeur) ; Park Raden, 2 ind., 20 octobre, un seul jusqu'au 23 octobre (Y. Guermeur *et al.*), 2 ind., 25 et 26 octobre, un seul le 27 octobre (Y. Guermeur *et al.*) ; Stang Porz Gwenn, 21 octobre (H. Darmandieu), 28 octobre au 2 novembre (B. Bougeard, J.Ph. Siblet) ; Poull Brac, 23 octobre (D. Desmots), 26 au 29 octobre (D. Laloi, A. Pignocchi), 5 au 9 novembre (Th. de Thiers) ; Ty Crenn, 27 octobre au 1er novembre (B. Brunner *et al.*), 5 novembre (Y. Guermeur), 8 novembre (Y. Guermeur) ; Gerhuel, 28 octobre au 4 novembre (D. Laloi, A. Pignocchi) ; Ar Picard, 29 octobre (R. Dujardin, M. Lambert) ; Stang Bihan, 29 et 30 octobre (Ph.J. Dubois *et al.*) ; Ker Radennec/Stang ar Stiff, 31 octobre (J. et Ph.J. Dubois) ; Pount ar Rodez, 1er novembre (Y. Guermeur *et al.*) ; Parkou, 2 novembre (Ph. de Grissac, Ph.J. Dubois). Batz, 22 octobre (A. Larousse).
Pas-de-Calais - Cran de Quette/Audinghen, 17 octobre, 2 ind., 18 octobre (G. Flohart *et al.*).
Vendée - Les Agaures/Les Sables d'Olonne, 14 novembre (D. Desmots).
1994 Côtes-d'Armor - Hillion, 11 décembre (J.Y. Péron).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Avec 26 données totalisant 29 individus (dont 23 à Ouessant...), 1995 est une année parfaitement normale. Les habitués d'Enez Eussa auront remarqué le peu d'oiseaux observés dans le vallon d'Arland cette année, et les autres noteront, qu'à son tour, l'île de Batz accueille un Pouillot à grands sourcils, après la quasi-totalité des îles du Ponant. À nouveau des données du Pas-de-Calais et de Vendée.

POUILLOT DE HUME *Phylloscopus (inornatus) humei* (2/3 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la race (ou espèce ?) *humei* :

Morbihan - Hoëdic, juv., phot., 24 au 30 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont, J.Y. Péron *et al.*).

(Nord-est de l'Afghanistan à la Chine centrale). Troisième mention (et 4ème individu) de cette race (ou, plus probablement, espèce). Les précédentes, d'Ouessant, sont : 2 ind. du 22 au 24 novembre 1988, puis un seul du 2 au 6 décembre 1988 et un ind. les 29 mars et 1er avril 1989.

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (10/11 - 1/1)

1994 Finistère - Sein, 5 novembre (J.Y. Péron).

(Asie centrale et septentrionale). Avec un peu de retard, la 11ème donnée française, à une date classique.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

Pouillots véloces de type sibérien (61/64 - 16/16)

Bouches-du-Rhône - Vacccarès/Roquemaure, 16 novembre (Y. Kayser).
Finistère - Ouessant : Gerhuel, 18 octobre (Y. Guermeur), 13 novembre (Y. Guermeur) ; Arland, 19 octobre (Y. Guermeur) ; Ar Reun, 25 octobre (Y. Guermeur) ; Stang Meur, 28 octobre (Ph.J. Dubois), 7 et 9 novembre (Y. Guermeur) ; Prad Meur, 29 au 31 octobre (Y. Guermeur, J.Ph. Siblet), 9 et 14 novembre (Y. Guermeur) ; Park Raden, 30 octobre (Y. Guermeur), 13 novembre (Y. Guermeur) ; Ty Crenn, 14 novembre (Y. Guermeur).
Morbihan - Hoëdic - 27 au 30 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont, G. Rault).
Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, 31 octobre (D. Michelat, Ch. Piotte, J.Ch. Weidmann) ; parc de la Falaise/Le Portel, 4 au 7 novembre (M. Duquet, J.Y. Frémont *et al.*) ; Cran de Quette/Audinghen, 23 novembre (G. Flohart).



8. Pouillot de Hume *Phylloscopus (inornatus) humei*, 1er hiver, île d'Hoëdic, Morbihan, octobre 1995 (M. Duquet). First-winter Hume's Yellow-browed Warbler

1988 Maine-et-Loire - Andard, capt., phot., 20 novembre (M. Gys).
1990 Eure - Poses/Val-de-Reuil, 23 décembre, donnée précédemment acceptée (*Alauda* 59 : 243), refusée après réexamen.
1991 Finistère - Ouessant : Porz Gwenn, 19 octobre, donnée précédemment acceptée (*Alauda* 60 : 216), refusée après réexamen.
1992 Drôme - Donzère, 15 mars, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 1 : 16), refusée après réexamen.
(Sibérie). Bonne année avec 16 individus, le record restant tout de même en 1988 (31 oiseaux). Aucune donnée certaine d'oiseaux du groupe « *fulvescens/tristis* » cette année. Pour celui capturé en 1988 en Maine-et-Loire, certains critères diagnostiques de *tristis* n'ont pu être vérifiés en main.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (129/132 - 30/32)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Sémaphore/Salins-de-Giraud, 14 octobre (P.A. Crochet, P. Defos du Rau).
Finistère - Ouessant : Prad Meur, juv., 2 octobre (M. Baumann, E. Didner), 2 juv., 3 octobre (M. Baumann), juv., 12 octobre (E. Gfeller *et al.*), juv., 27 au 30 octobre (Y. Guermeur *et al.*) ; Arland, juv., 12 octobre (G. Sinz), juv., 21 novembre (Y. Guermeur) ; Kerc'here, juv., 13 et 14 octobre (E. Gfeller *et al.*) ; Poull Gueguen, 13 octobre (C. Bellanger, S. Dulau) ; Stang Porz Gwenn, juv., 13 octobre (E. Gfeller), juv., 24 octobre au 2 novembre (B. Helsens *et al.*), juv., 9 novembre (Y. Guermeur) ; Ty Crenn, juv., 13 octobre (G. Sinz), juv., 22 au 27 octobre (H. Davière, E. Lapous) ; Kervasdoué, 13 octobre (L. Gavory) ; Pount ar Rodez, juv., 14 et 15 octobre (P.P. Evrard, P. Yésou) ; Ker Radennec/Stang ar Stiff, juv., 18 octobre (P. Beveière, A. Verneau) ; Stang Korz, juv., 20 octobre (Y. Guermeur) ; Parkou, juv., 20 octobre (O. du Prey, X. Jupiot, L. Spanneut) ; Pount Salaün, juv., 20 octobre (L. Spanneut *et al.*), juv., 31 octobre et 1er novembre (Ph.J. Dubois *et al.*) ; Ar Reun, juv., 21 octobre (A. Guyot) ; Stang Meur, juv., 25 octobre (Y. Guermeur *et al.*), 2 juv., 28 octobre (Ph. J. Dubois *et al.*) ; Porz Paol, juv., 28 octobre (A. Guyot) ; Park Raden, juv., 31 octobre (Y. Guermeur) ; Gerhuel, juv., 31 octobre (B. Brunner). Sein, juv., phot., 20 octobre (Ph.J. Dubois, A. Perthuis).
Hérault - Le Grand Travers, 29 octobre (P. Defos du Rau, N. Jaeger, F. Thiebaut).
Morbihan - Hoëdic, juv., phot., 22 octobre (M. Duquet, J.Y. Frémont).
(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Avec 32 Gobemouches nains, 1995 constitue l'année record depuis la création du CHN (et même auparavant) dépassant largement 1984, où un mini-afflux avait entraîné l'observation de 19 oiseaux différents, et 1988 (17 ind.). Évidemment, Ouessant se taille la part du lion (88 % des oiseaux), mais on notera d'une part la présence de l'espèce sur les îles d'Hoëdic et de Sein et d'autre part en Camargue et même dans l'Hérault (mais aucun dans le Nord/Pas-de-Calais). À Ouessant, des arrivées groupées sont notées les 13 (5 ind.) et 20 octobre (3 ind.). Également un oiseau tardif sur cette île, le 21 novembre.

ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (39/107+-3/4)

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuve de reproduction) :
Aude - Lapalme, 2 ad. avec becquée, 12 mai (C. Bonnet, P. Crouzier).
Pyrénées-Orientales - Saint-Cyprien, ad., 17 mai (Ph.J. Dubois, V. Guidoux) ; Argelès-sur-Mer, mâle chanteur, 31 octobre (G. Olioso).
(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). La reproduction ne semblait pas être connue de Lapalme. Les nouvelles localités intéressent toujours le CHN qui essaie de contribuer au suivi de l'expansion de l'espèce en France continentale.

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (28/35 -2/2)

Morbihan - Locmaria/Belle-Île-en-Mer, juv., 12 octobre (A. Rouge).
Var - Villepey/Fréjus, 1er été, phot., 11 avril (H. Sablerolle, K. Straatman *et al.*).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Observations dans le Morbihan et le Var, comme l'an dernier. Cette dernière est la plus précoce du printemps (précédente : 12 avril 1987 en Camargue), bien qu'un oiseau ait séjourné du 25 février au 15 avril 1990 à Saintes, Charente-Maritime.

MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (6/6-2/7)

Corse-du-Sud - Bonifacio, mâle, phot., 2 mai (Ph.J. Dubois).
Seine-Maritime - Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, 4 mâles et 2 fem., phot., 1er et 2 mai au moins (A. Guillemont *et al.*).
1994 Corse-du-Sud - Bonifacio, mâle, phot., 20 septembre (Th. Fournet).

(Canaries, pourtour de la Méditerranée, Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient). Les six oiseaux d'Antifer sont probablement arrivés ici avec l'aide d'un « super-tanker » en provenance de Méditerranée (*cf. Birding World* 8 : 355). Il s'agit en tout cas de la première mention française au nord de la façade méditerranéenne. La publication des données du sud de la Corse peut paraître à première vue anecdotique. Il semble pourtant que cette espèce ne soit plus aussi régulière que par le passé (*cf. Les Oiseaux de Corse*, J.C. Thibault, 1983). Le CHN encourage les observateurs locaux ou de passage à soumettre d'éventuelles observations de Moineau espagnol en Corse (y compris anciennes), afin de préciser son statut réel, en dehors de la présence d'oiseaux hybrides avec le Moineau cisalpin *P. (domesticus) italiae*.

VIRÉO À ŒIL ROUGE *Vireo olivaceus* (4/4 - 1/1)

Finistère - Ouessant : Ty Crenn, juv., 10 octobre (C. Sinz).

(Amérique du Nord). Cinquième mention française à Ouessant comme les précédentes et à une date tout à fait similaire (précédentes : 19-21 octobre 1983, 17 octobre 1985, 10 octobre 1988 et 12-16 octobre 1988).

ROSELIN CRAMOISI* *Carpodacus erythrinus* (54/96+ - 18/19+)

Doubs - Labergement-Sainte-Marie, mâle 1ère année chanteur, 23 mai au 8 juin (E. Cosson, B. Tissot) ; La Rivière-Drugeon, mâle ad. chanteur, 25 mai au 6 juillet (N. de Marre, D. Michelat *et al.*), mâle 1ère année, 5 juin (D. Michelat) ; Sainte-Colombe, 2 couples avec mâles ad. 25 mai au 12 juillet (N. de Marre, M. Duquet, D. Michelat *et al.*) ; Malbuisson, mâle ad., 26 mai au 8 juin (B. Tissot) ; La Cluse-et-Mijoux, mâle chanteur, 27 mai au 18 juin (M. Duquet; J.Y. Frémont *et al.*), couple et un autre mâle chanteur, 19 juin (D. Michelat) ; Bannans, 2 mâles chanteurs dont un 1ère année, 3 juin (D. Michelat, M. Montadert) ; Granges-Narboz, 2 ind., 6 juillet (P. Marguet, D. Michelat).
Jura - Les Rousses et Bois d'Amont, 12 mâles (dont 9 ad. et un 1ère année), phot., 2 fem., 2 juv., 25 mai au 22 juillet (P. Crouzier *et al.*).
Manche - Chausey/Granville, mâle 1ère année chanteur, 8 et 9 juin (L. Demongin).
Pas-de-Calais - cap Blanc-Nez, mâle, 13 mai, 5 mâles (4 ad. et un 1ère année) chanteurs et 2 fem., entre le 26 mai et le 27 juin (P. Camberlein, D. Tirmarche *et al.*).
Haut-Rhin - See d'Urbès, 2 mâles 1ère année chanteurs, phot., 5 au 16 juin (D. Daske, R. Sané), mâle ad., 17 et 18 juin (D. Daske, R. Sané).
1987 Haut-Rhin - Huningue, mâle ad. chanteur, 23 mai (G. Preiswerk).
1994 Nord - forêt de Mormal/Locquignol, mâle ad. chanteur, 25 mai au moins (B. Hiolle).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Encore une espèce pour laquelle la comptabilité s'annonce compliquée... L'année 1995 aura vu des résultats contrastés. Dans le Pas-de-Calais, on passe de 10-13 mâles en 1994 à 5 seulement cette année, sans preuve de reproduction et – apparemment – une disparition précoce des oiseaux (*cf. Ornithos* 2 : 179). En revanche en Franche-Comté, le Roselin cramoisi consolide ses bastions jurassiens (reproduction notée) et semble même en expansion dans le Haut-Doubs ; de même en Alsace, où il n'y a malheureusement pas encore de preuve de reproduction. Dans cette région, il serait judicieux de (re)chercher l'espèce là où elle a été signalée en 1987 (*cf.* ci-dessus). Enfin, l'oiseau de Chausey montre bien que se poursuit sans doute sa vague expansive vers l'Ouest.

**pour les mâles, l'âge est donné si l'oiseau a été vu ou si cela est précisé par l'observateur. Sont comptabilisés les nouveaux ad., les mâles de 1ère année et les juv. sur les sites connus et tous les oiseaux sur les nouveaux sites.*

Légendes des photos ***9*** à ***13*** (page suivante) :

9. Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus*, Framezelle/Audinghem, Pas-de-Calais, octobre 1995 (R. Tonnel). *Pallas's Warbler.*

10. Gobemouche nain *Ficedula parva*, île de Sein, Finistère, octobre 1995 (A. Perthuis). *Red-breasted Flycatcher.*

11 & 12. Moineau espagnol *Passer hispaniolensis*, mâle (11) et femelle (12), Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, Seine-Maritime, mai 1995 (A. Guillemont). *Male (11) and female (12) Spanish Sparrow.*

13. Bruant rustique *Emberiza rustica*, marais de la Mazière/Aiguillon, Lot-et-Garonne, novembre 1995 (A. Dal Molin). *Rustic Bunting*

9 ***10*** ***11*** ***12*** ***13***











PARULINE À COLLIER *Parula americana* (1/1 - 1/1)

Finistère - Ouessant : sémaphore du Stiff, juv., 21 octobre (D. Desmots, J. Maout).

(Amérique du Nord). Seconde donnée française (et ouessantine) pour ce superbe parulidé qui ne s'est montré qu'à deux heureux observateurs et dans un site où l'on chercherait plutôt les Bruants des neiges *Plectrophenax nivalis* que les parulines ! La précédente mention était du 17 au 27 octobre 1987. Les observations de passereaux américains en France à l'automne 1995 ne sont, une fois encore, qu'un pâle reflet de ce qui a été noté dans les îles Britanniques.

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* (13/13 - 1/1)

Lot-et-Garonne - La Mazière/Aiguillon, juv. probable, capturé, phot., 4 novembre (A. Dal Molin).

(Scandinavie, Sibérie). Un oiseau avait déjà été capturé sur le même site – également dans un dortoir de Bruants des roseaux *E. shoeniclus* – le 2 novembre 1990 !

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (41/41 - 1/1)

Pas-de-Calais - La Drève/Audinghen, 30 octobre (P. Camberlein).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Bien maigre année au regard de 1994 qui avait vu l'homologation de 8 oiseaux.

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (28/30 - 2/2)

Corse-du-Sud - Girolata/Osani, mâle, 23 mai (G. Girola).
Finistère - étang de Kerloc'h/Crozon, mâle chanteur, 9 mai (J.Y. Péron).
1994 Ville de Paris- Jardin des Plantes/Paris, mâle, 11 octobre (V. Cudo).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Les dates de printemps sont classiques (celle de Bretagne, assez précoce, mais l'espèce a déjà été vue fin avril). Quant à l'oiseau de Paris, son origine ne fait pas de doute et il n'a pas été comptabilisé dans les totaux ci-dessus...

Annexe 1 - Espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie (catégorie D1)

La catégorie D1 regroupe les espèces dont l'origine naturelle est possible, mais pas certaine, compte-tenu des mentions disponibles. Leur arrivée en France a vraisemblablement été aidée par l'homme, ou bien il s'agit d'échappés de captivité (*cf. Ornithos* 2 : 42-43 & 128-134).

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (21/22 - 2/2)

Pyrénées-Atlantiques - Saint-Jean-de-Luz, ad., phot., 4 août (D. Domec).
Vendée - Saint-Mathurin, ad. probable, 4 août (J. Barten, C. Brochard, H. Joslain).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). La coïncidence de date est fortuite, et l'oiseau des Pyrénées-Atlantiques semble bien montrer des traces de captivité...

PÉLICAN GRIS *Pelecanus rufescens* (7/7 - 0/0)

1989 Ille-et-Vilaine - étang du Boulet/Fleins, 18 janvier (localité non précisée dans le rapport, *Ornithos* 1 : 18).

(Afrique tropicale et présence quasi continue dans le sud de l'Egypte).

PÉLICAN INDÉTERMINÉ *Pelecanus sp.* (9/9 - 1/1)

Seine-Maritime - Antifer, imm., 11 août (O. Benoist).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Cet oiseau, en vol vers le nord-est, n'a rien à voir avec celui du port d'Antifer, présent depuis 1981.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (103/160 - -/-)

1994 Nord - Thumeries, couple, 12 avril (F. Cohen).

(Afrique du Nord, Europe du Sud-Est, Asie occidentale). Depuis le 1er janvier 1995, l'espèce n'est plus à homologuer à l'échelon national, mais les observations antérieures à cette date sont et seront toujours les bienvenues.

FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (17/17 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Enfore de la Vignolle et Grenouillet, ad. ou subad., 3 au 21 novembre (E. Didner, Y. Kayser *et al.*).
1994 Aude - étang de Campignol/Gruissan, imm., 16 novembre au 5 février 1995 (A. Guillaumet, E. Rousseau).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). Il s'agit des premières observations depuis 1990 (voir plus haut le commentaire fait après la donnée de Faucon sacre).

BRUANT À TÊTE ROUSSE *Emberiza bruniceps* (6/6 - 1/1)

Moselle - mâle, capturé, phot., 12 juillet (J. Meguin, P. Vagner *et al.*).

(Asie centrale et orientale). Encore une donnée de début d'été pour ce bruant qui reste en souffrance dans la catégorie D1...

ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possibles, même si *a priori*, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

1995

Plongeon à bec blanc *Gavia adamsii* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage, ad., 24 décembre.
Puffin semblable *Puffinus assimilis* - Finistère - Ouessant : localité non précisée, 4 octobre ; Creac'h, 20 octobre.
Fou à pieds bleus *Sula nebouxii* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage, juv., 13 septembre.
Canard à front blanc *Anas americana* - Pyrénées-Orientales - Le Barcarès, mâle, 9 avril.
Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* - Yonne - étang de Galetas/Domats, fem., 16 septembre.
Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris* - Marne - lac du Der/Chantecoq, juv., 23 août.
Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* - Meuse - Corniéville, mâle, 11 juin.
Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* - Bas-Rhin - Gerstheim, imm., 15 mars.
Buse féroce *Buteo rufinus* - Gironde - Les Alains, 24 mai.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Manche - Le Flet-Les-Veys, adulte, 14 au 16 janvier et 10 février. Yonne - Bléneau, 27 janvier. Pas-de-Calais - Equihen-Plage, 1er au 15 janvier. Somme - Brighton, juv., 16 août.
Aigle criard *Aquila clanga* - Bas-Rhin - Rhinau, ad. probable, 11 novembre.
Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* - Aude - Treilles, forme sombre, 15 août.
Faucon lanier *Falco biarmicus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : bois de la Ville, ad. ou subad., 3 et 4 novembre, 3 décembre.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Doubs - Abbans-Dessus, ad., 16 et 22 avril ; Boujeons, ad., 17 octobre.
Faucon gerfaut *Falco rusticolus* - Creuse - Saint-Julien-La-Genête, imm., 28 novembre.
Marouette poussin *Porzana parva* - Doubs - lac de Remoray, mâle chanteur, 28 mai. Vendée - La Belle-Henriette/La-Faute-sur-Mer, mâle imm., 13 août.
Marouette poussin ou **de Baillon** *Porzana parva* ou *P. pusilla* - Corse-du-Sud - Caldaniccia/Afa, 23 au 25 mars.
Gravelot à long bec *Charadrius placidus* - Charente-Maritime - Clérac, 9 juin.
Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* - Pas-de-Calais - Lillers, ad. ou subad., 15 avril.
Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla* - Loire-Atlantique - Saint-Brévin-les-Pins, juv. probable, 24-25 août. Pas-de-Calais - Les Attaques, juv. ou ad. en plum. d'hiver, 6 novembre. Vendée - pointe de l'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, 30 juillet et 1er août.
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* - Indre-et-Loire - lac de Rillé, juv., 9 octobre.
Chevalier bargette *Tringa cinerea* - Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, 7 mai.
Chevalier grivelé *Actitis macularia* - Seine-Maritime - marais du Hode/Le Havre, 12 février.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Landes - Capbreton, juv., 15 octobre. Seine-Maritime - Dieppe, imm., 27 août, juv., 1er novembre.
Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 2ème été ou ad., 6 août.
Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* - Finistère - Saint-Guénolé, 1er hiver, 20 janvier. Pyrénées-Atlantiques - Bayonne, 24 et 29 janvier.
Sterne bridée *Sterna anaethetus* - Landes - Tarnos, 3 ad., 25 juin.
Guillemot à miroir *Cepphus grylle* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 1er hiver, 28 septembre.
Guêpier de Perse *Merops persicus* - Drôme - Dieulefit, 3 ind., 4 mai.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - mâle présentant les caractéristiques de la race *feldegg* - Haute-Corse - étg. de Biguglia/Borgo, 16 avril. Indre - étang de Gabriau, 14 mai.
Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* - ind. présentant les caractéristiques des races orientales *ochruros/semirufus/phoenicuroides* - Doubs - Le Grand Taureau/Pontarlier, mâle, 28 avril.
Tarier pâtre *Saxicola torquata* - ind. présentant les caractéristiques des races orientales *maura/stejnegeri* - Manche - Les Veys, fem., 22 novembre au 1er décembre.
Grive obscure *Turdus obscurus* - Loire-Atlantique - Saint-Brévin-les-Pins, 5 février.
Locustelle de Pallas *Locustella certhiola* - Pas-de-Calais - Fond Pignon/Sangatte, 7 octobre.
Pouillot verdâtre *Phylloscopus trochiloides* - Aude - Gruissan, 8 avril.
Pouillot de Pallas *Phylloscopus* proregulus - Doubs - Osselle, 20 septembre. Morbihan - Ploëmeur, 2 ind., 18 novembre.
Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* - Pas-de-Calais - Fond Pignon/Sangatte, 7 octobre.
Pouillot de Schwarz *Phylloscopus schwarzi* - Yvelines - Toussus-le-Noble, 25 août.
Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* - ind. présentant les caractéristiques des oiseaux de type sibérien - Finistère - Molène, 29 octobre ; Sein, 2 ind., 31 octobre. Hérault - étang du Maire/Mauguio, 2 ind., 17 décembre. Haute-Savoie - lac du Bourget/Conjux, 17 décembre.
Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* - Pyrénées-Orientales - Prades, 2 ind., 26 mai.
Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* - Var - Comps-sur-Arluby, couple, 17 février.
Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla* - Finistère - Ouessant : Kadoran, juv., 2 novembre.

1994

Puffin semblable *Puffinus assimilis* - Finistère - Ouessant : Penn ar Roc'h, 5 avril.
Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Eure-et-Loir - Ecluzelles-Mézières, forme grise, 6 février.
Canard à front blanc *Anas americana* - Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, juv., 30 octobre.
Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* - Moselle - étang de Lindre, 2 imm., 18 février ; Obervisse, imm., 17 octobre.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Pas-de-Calais - Vimy, ad., 23 août.
Aigle pomarin ou **criard** *Aquila pomarina* ou *A. clanga* - Loire -Villars, 2 octobre.
Faucon lanier *Falco biarmicus* - Aude - étang de Campignol/Gruissan, ad., 23 décembre. Manche - Beauguillot/Sainte-Marie-du-Mont, imm., 20 novembre au 8 avril 1995. Marne - Giffaumont, juv., 6 novembre. Var - salins d'Hyères, imm., 22 décembre.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Landes - Orx, 11 novembre.
Marouette poussin *Porzana parva* - Manche - Urville-Nacqueville, mâle chanteur, 24 juillet. Tarn - Cambounet-sur-Sor, mâle ad., 14 mai.
Marouette de Baillon *Porzana pusilla* - Indre - Rosnay, 3 ind., 12 août.
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* - Maine-et-Loire - Le Marillais, juv., 3 septembre.
Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* - Ain - Birieux, juv., 4 septembre. Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, ad., 17 juillet.
Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes* - Bouches-du-Rhône - Camargue : étang du Grenouillet, 4 septembre.
Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* - Aube - Réservoir Aube/Radonvilliers, 20 novembre.
Goéland d'Audouin *Larus audouinii* - Var - Toulon, 13 décembre.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Aube - Réservoir Aube/Radonvilliers, ad., 29 août. Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, 2ème hiver, 13 février.
Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* - Manche - environ 4 miles au sud-est de Chausey, ad., 15 juillet. Nord - Dunkerque, 3ème hiver, 20 décembre au 13 février 1995.
Mouette blanche *Pagophila eburnea* - Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, ad., 17 octobre.
Sterne royale *Sterna maxima* - Finistère - baie de Morlaix, ad., 6 août.
Mergule nain *Alle alle* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 20 novembre.
Martinet cafre *Apus caffer* - Lozère - Le Rozier, 29 mai.
Gobemouche nain *Ficedula parva* - Haute-Saône - étang de Cintray, mâle ad., 2 novembre.
Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* - Mayenne - Mayenne, mâle, 7 août.

1993

Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus* - Gironde - Cap Ferret, 25 septembre.
Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Gard - étang des Caïtives/Aigues-Mortes, race schistacea, forme blanche, 8 juin. Hérault - étang de l'Or, forme grise, 7 février.
Oie rieuse *Anser albifrons* - ind. présentant les caractéristiques de la race *flavirostris* - Ille-et-Vilaine - Châtillon-en-Vendelais, juv., 20 novembre.
Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* - Vendée - Bouin, juv., 23 août.
Fauvette sarde *Sylvia sarda* - Pyrénées-Orientales - Tour Madeloc/Banyuls, 5-6 ind., 18 et 19 août.

1992

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Vendée - Bouin, forme grise, 14 au 16 août.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Nord - nouvel avant-port de Dunkerque/Loon-Plage, 2ème hiver ou ad., 29 décembre.
Fauvette sarde Sylvia sarda - Pyrénées-Orientales - Tour Madeloc/Banyuls, couple, 28 août.

1991

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Vendée - Bouin, race *schistacea*, forme blanche, 22 et 23 juin, précédemment acceptée, à présent refusée après réexamen.
Buse variable *Buteo buteo* - individu présentant les caractéristiques de la race *vulpinus*, appelée « Buse des steppes » - Marne - Ognes, 2 ind., 31 mars.
Pipit farlousane *Anthus rubescens* - ind. présentant les caractéristiques de la race *japonicus* - Finistère - Ouessant : Porz Paol, 31 octobre et 1er novembre.

1990

Fauvette épervière *Sylvia nisoria* - Pas-de-Calais - Waringzelle/Audinghen, juv., 30 août.

1988

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de Fournelet, forme « bigarrée », 7 avril.
Aigle pomarin ou **criard** *Aquila pomarina* ou *A. clanga* - Marne - Sompuis, imm., 17 août.

1986

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Pont-de-Gau, juv., forme grise, 30 août au 25 octobre.

1984

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Ain - Birieux, 4 et 15 août, précédemment acceptée, à présent refusée après réexamen. Vendée - Olonne-sur-Mer, forme sombre, 21 juin, précédemment acceptée, à présent refusée après réexamen.
Goglu des prés *Dolichonyx oryzivorus* - Deux-Sèvres - près de Niort, 28 août ou « octobre ».

1983

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Vendée -Le Collet/Bouin, forme sombre, 19 septembre, précédemment acceptée, à présent refusée après réexamen.

1982

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Charente-Maritime - baie d'Yves, forme blanche, 10 au 12 septembre, précédemment acceptée, à présent refusée après réexamen.

1975

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Ardèche - barrage du Pouzin, forme sombre, 17 mai.

1952

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Bouches-du-Rhône - Camargue : La Capelière, forme sombre, 21 novembre.

ANNEXE 3 - ESPÈCES INSCRITES DANS AUCUNE CATÉGORIE

Figurent ici les espèces inscrites dans aucune catégorie, mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour. Ne figurent pas les espèces pour lesquelles une origine sauvage est totalement invraisemblable.

Sterne inca *Larosterna inca* – 1994 Pas-de-Calais : Boulogne-sur-Mer, 2 ad., présents dès le 1er août (P. Raevel) et non à partir du 11 septembre seulement (*cf. Ornithos* 2 : 167). 1994 Vendée : pointe des Corbeaux/île d'Yeu, 2 ad., un phot., 18 au 20 août (E. Bouron, *fide* A. Thomas).

Roselin rose *Carpodacus roseus* - Vesoul, Haute-Saône, mâle ad., trouvé mort, phot., 29 novembre 1994 (L. Faucoup *fide* D. Michelat et M. Montadert).

REMERCIEMENTS

Le CHN remercie vivement ceux qui, au cours de l'année 1995, ont contribué à son bon fonctionnement :
- la **Ligue pour la Protection des Oiseaux** (LPO) pour l'aide matérielle et financière nécessaire au Comité et à son Secrétariat,
- **Bushnell** et **Bausch & Lomb** pour l'aide financière qu'ils ont apporté au fonctionnement du CHN, notamment pour la réalisation des modèles de fiches actuelles,
- **ZEISS-France**, partenaire du CHN pour la publication du rapport, qui se trouve enrichi de photographies en couleurs,
- William S. Clark qui a été sollicité comme expert,
- Christian Dronneau, Pascal Grisser, Yvon Guermeur, Alban Guillaumet, Yves Kayser, Robert Lécaille, Christian Riols, qui ont apporté des informations complémentaires ainsi que tous les responsables de Centrales Ornithologiques ou de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) qui ont transmis des données et Alban Larousse, responsable du répondeur du « Coin des Branchés »,
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

SUMMARY

Rare birds in France in 1994. *This report deals with 1995 rare birds. During this year, no new species has been added on the French List, but a late first from 1994 has been accepted : Pacific Golden Plover* Pluvialis fulva. *During this year, interesting records include : 2nd records of Pied-billed Grebe* Podilymbus podiceps, *Western Sandpiper* Calidris mauri *and Northern Parula* Parula americana. *This is also the 3rd record for Swainson's Thrush* Catharus ustulatus *and the 4th for Black Scoter* Melanitta (nigra) americana. *11 species of Nearctic waders have been observed in France. Record numbers include 49 Ruddy Ducks* Oxyura jamaicensis, *371 Little Auks* Alle alle, *32 Red-breasted Flycatchers* Ficedula parva. *No less than 10 Buff-breasted Sandpipers* Tryngites subruficollis *were recorded. A Pallas's Rosefinch* Carpodacus roseus *observed in 1994 was not included in any category. The two first numbers in parentheses following the latin name of each species indicate respectively the total numbers of records and birds for 1981-94 period and the others the same for the current year (1995).*

Comité d'Homologation National, LPO,
La Corderie Royale, BP 263, 17305 Rochefort Cedex

ZEISS

La publication du rapport annuel du CHN est soutenue par ***Zeiss-France***.