Les oiseaux rares en France en 1997

Rapport du Comité d'Homologation National



par Philippe J. Dubois, Jean-Yves Frémont et le CHN

Introduction

Il s'agit du 16e rapport du Comité d'Homologation National (CHN) qui couvre l'année 1997. Cette année, le nombre de fiches examinées par le CHN est de **649**, total proche de celui de 1996 (+ 4,7 %). Le taux d'acceptation est de 85 %, chiffre un peu supérieur à celui des années précédentes. Le CHN continue donc à travailler intensément, d'autant qu'il est également amené à réexaminer des fiches ou des séries de fiches concernant une espèce donnée. En 1997, c'était le poste de Pierre Yésou, qui effectuait un second mandat, qui était vacant. Co-fondateur du CHN, Pierre a longtemps œuvré à son bon fonctionnement. Qu'il soit chaleureusement remercié. Pour lui succéder, Guy Flohart a été élu. En 1997, le CHN se composait donc de : Yvon Créau, Pierre Crouzier, Philippe J. Dubois (Président), Guy Flohart, Thierry Fournet, Dominique Michelat, Serge Nicolle, Alain Rouge ainsi que Jean-Yves Frémont (Secrétaire, non-votant). Un poste a été pourvu en 1998 et un doit l'être en 1999. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du CHN avant le *1er mars 1999*.

Travaux et décisions du CHN

Le CHN a publié un long article sur son fonctionnement au cours de cette année (*Ornithos* 4-2 : 80-85). De même, il a déjà été publié la liste des espèces qui, à compter du 1er janvier 1998 n'étaient plus soumises à homologation nationale, à savoir l'Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*, le Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* et le Mergule nain *Alle alle*, ainsi que le Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* (sur la frange littorale méditerranéenne). En 1997, le CHN a également été contacté par le Ministère de l'Environnement au sujet du plan d'éradication de l'Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* en France. Là encore, un article fait largement le point sur le sujet et précise le rôle du CHN (*Ornithos* 4-2 : 49-53). Enfin, le CHN rappelle une fois encore qu'il est recommandé de rédiger la fiche (nouveau modèle) dès que possible après l'observation et de préférence avant le 31 décembre de l'année en cours. Ceci évite la publication très tardive de données anciennes. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s).

Les faits marquants

En 1997, deux espèces ont été ajoutées à la Liste Française, le Goéland ichthyaète *Larus ichtyaetus* et l'Hirondelle paludicole *Riparia paludicola*. En 1996, une sous-espèce a été également inscrite sur la liste : le Goéland de Kumlien *Larus glaucoides kumlieni*. L'année 1997 a également été celle de la première observation pour ce siècle d'un Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis*, de la seconde mention du Canard à faucilles *Anas falcata* (catégorie D1), et de la cinquième donnée du Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii* et du Bécasseau à échasses *Micropalama himantopus* . En outre, des effectifs records ont été notés pour plusieurs espèces : 3 Sarcelles de Caroline (ou à ailes vertes) *Anas crecca carolinensis*, 8 Fuligules à bec cerclé *Aythya collaris*, 73 Buses pattues *Buteo lagopus*, 5 Vanneaux sociables *Chettusia gregaria*, 3 Bécasseaux de Bonaparte *Calidris fuscicollis*, 9 Traquets du désert *Oenanthe deserti*, 10 Fauvettes sardes *Sylvia sarda* en dehors de Corse, 9 Pouillots de Pallas *Phylloscopus proregulus* et 8 Bruants à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* ensemble. Enfin une Bernache à cou roux *Branta ruficollis* baguée en 1979 en Sibérie a été tuée (!) en France en 1984...

Liste systématique des données acceptées (catégories A et C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.

2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre de données homologuées depuis 1981

(1997 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers, la même chose pour 1997.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Observateur(s), sauf exception, limité à 3 (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe/dessinateur).
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de Voous (1978, *The List of the Birds of the Western Palearctic*), modifiée par la *Liste des Oiseaux de France* (CAF 1997).
11. Les données concernant les races sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la race concernée.
12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 1997. Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Pétrel de Bulwer, un individu le 19 mai 1997 à Sète, Hérault (D. Michelat *et al.*, *in* Dubois, Frémont et le CHN 1998).

GRÈBE À BEC BIGARRÉ *Podilymbus podiceps* (4/4 - 0/0)

1996 Finistère - étang de Trunvel/Tréguennec, du 22 décembre au 24 janvier 1997 au moins (A. Desnos, S. Guérin, J.-Y. Péron, G. Rault *et al.*).

(Amériques). Quatrième mention française de l'espèce. Malgré un séjour pour une fois assez long, il semble que peu d'observateurs aient été au courant de la présence de cet oiseau.

ALBATROS INDÉTERMINÉ *Diomedea sp.* (5/5 - 0/0)

1995 Var - En mer, au sud de l'île de Porquerolle, imm., 4 mai (J.-M. Bompar).

(Mers de l'hémisphère Sud). Encore un oiseau qui restera sans nom spécifique. Il s'agit de la première mention française d'un albatros en mai et de la seconde dans les eaux méditerranéennes.

PÉTREL DE BULWER *Bulweria bulwerii* (1/1 - 1/1)

Hérault - Sète, 19 mai (E. Cosson, D. Michelat *et al.*).

(Océans Pacifique et Atlantique. Niche jusqu'aux Canaries et à Madère.). Cinquième mention française et quatrième en Méditerranée. Les précédentes dans cette région étaient de mai et juin.

AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (20/13 - 2/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas-d'Agon et Basses-Méjanes, ad. race *gularis*, forme sombre, phot., du 4 mai au 6 août (L. Dietrich, G. Durand, Y. Kayser *et al.*) ; Pont-de-Gau/Saintes-Maries-de-la-Mer, ad. en plumage nuptial, race *gularis*, forme sombre, phot., 24 juillet (P.J. Dubois, F. et R. Lamouroux).

(Afrique, Asie). L'oiseau du Mas-d'Agon et de Basses-Méjanes est certainement celui vu au même endroit en 1996. Celui du Pont-de-Gau en revanche est soit un nouvel oiseau, soit peut-être celui observé l'an passé en Camargue gardoise.

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (181/316 - 20/21)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Pont-de-Gau/Saintes-Maries-de-la-Mer, 26 janvier (A. Renaudier, D. Tissier), 10 ind. du 26 avril au 23 mai, 1 couple nicheur, 9 juin avec abandon vers le 23 juin, puis de 4 à 7 ind. du 29 juin au 24 juillet, encore 6 ind. le 15 août (R. & F. Lamouroux) ; Le Vigueirat, 3 mai (J.-L. Lucchesi), 4 ind., 13 septembre (A. Mante) ; Basses-Méjanes et Mouvefiech 12 et 15 mai (P. Defos du Rau, Y. Kayser, N. Sadoul) ; Carrelet, 27 mai (Y. Kayser, C. Tourenq *et al.*), 1 couple nicheur, 11 juin avant abandon (Y. Kayser) ; St-Seren, juv., du 9 au 14 juillet (L. Dietrich, Y. Kayser, A. Olivier) ; Petit-Badon, 4 ind., 10 août (H. Hafner).
Gard - Camargue : marais de La Musette, 2 mai (H. Hafner) ; Scamandre, 3 mai (H. Hafner).
Hérault - Les Cayrelles/Lansargues, 2 ad., 14 juin (L. Veyrunes) ; marais du Grès/Lansargues, 1 ad. du 12 juillet au 25 juillet (F. et L. Veyrunes).
Pyrénées-Atlantiques - Momas et Artix, du 13 au 24 octobre (S. Duchateau, S. Hommeau *et al.*).
1996 Rhône - Feyzin, 4 mai (J.-M. Gillier, F. Corre).

(Cosmopolite, les colonies les plus proches dans les Balkans et probablement en Hongrie. Aussi delta du Pô et Sardaigne. A niché en Camargue et dans l'Aude.). Alors que l'espèce n'est plus soumise à homologation en 1998, cette dernière année est conforme à la moyenne nationale (21 oiseaux par an en France, 1981-97).

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (21/61 - 5/7)

Charente-Maritime - Moëze, 19 décembre (P. Poiré, N. Boileau *et al.*).
Marne - lac du Der/Ecollemont, 8 février (R. Riols) ; lac du Der/Giffaumont, 1er novembre (J. Piette).
Somme - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, ad., 23 janvier (V. Bawedin, M. Sengez *et al.*).
Nord - Le Puythouck/Dunkerque, 3 ind., 2 janvier (T. Fournet).
1995 Haute-Marne - lac du Der/Braucourt, ad., du 19 octobre au 20 février 1996 (R. Riols, C. Riols) et non du 19 octobre au 22 janvier 1996 uniquement (*Ornithos* 4 : 144).
1996 Aube - lac de la Forêt-d'Orient/Piney, ad., du 14 janvier au 17 mars (S. Paris, C. Riols) et non du 14 janvier au 17 février uniquement (*Ornithos* 4 : 144).
1996 Landes - Orx, 7 décembre (G. Blake).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Rien de bien nouveau, sinon la confirmation de la grande rareté de cette oie, sa présence plus ou moins régulière sur les grands lacs champenois ou non loin de son aire d'hivernage habituelle.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (17/11 - 3/1)

Individus présentant les caractéristiques de la race *nigricans*, appelée « Bernache (cravant) du Pacifique » :

Charente-Maritime - Château-d'Oléron/Ile d'Oléron, ad., 19 janvier (S. Guérin).
Côtes-d'Armor - Baie de St-Brieuc, ad., phot., 21 décembre (H. Davière, J.-F. Darras, E. Lapous).
Loire-Atlantique - Guérande et Le Croisic, ad., phot., du 15 novembre au 25 février 1998 au moins (A. Fossé, J.-Y. Frémont, A. Gentric, Y. & J.-P. Trévoux *et al.*).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Seul l'oiseau de Loire-Atlantique est comptabilisé comme nouveau venu (mais rien ne le prouve réellement). Pas de nouvelles en revanche de l'oiseau rétais, fidèle au site depuis 1985.

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis* (13/13 - 3/2)

Bas-Rhin - Krafft-Plobsheim, 2 ad., 6 février (J.-M. Bronner, J. Calas) ; Beinheim, ad., du 9 février au 1er mars (C. Dronneau), probablement l'un des oiseaux du Haut-Rhin noté du 24 décembre 1996 au 10 janvier 1997 (*Ornithos* 4 : 144).
Haute-Saône - étang du Beuchot/Fontaine-lès-Luxeuil, 22 février (F. Vernier).
1984 Gironde - Carcans, ad., tuée à la chasse le 17 août (?), baguée ad. dans la péninsule du Taïmir, Russie, entre le 1er et le 10 juillet 1979 (*info.* CRBPO).

(Sibérie). On peut toujours s'interroger sur l'origine des oiseaux observés, surtout en des lieux bien atypiques. Cependant la donnée de Gironde constitue la première preuve d'origine sauvage de cette espèce (protégée...) en France. La date de « reprise » est cependant douteuse et doit en fait correspondre à la date d'information parvenue au CRBPO.

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (15/16 - 1/1)

Marne - Cloyes, mâle au moins, 27 mars (F. Noël).

(Amérique du Nord). Date typique au printemps pour ce canard néarctique qui s'observe en moyenne... une fois par an en France (période 1981-1997).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (14/11 - 3/3)

Mâles présentant les caractéristiques de la race américaine *carolinensis*, appelée « Sarcelle de Caroline » :

Loiret - île de Cuissy/Lion-en-Sollias, imm. ou ad. en fin de plumage d'éclipse, 5 décembre (D. Chavigny).
Haute-Saône - Lure, ad., 16 avril (J.-M. Gatefait).
Somme - Hâble d'Ault, ad., 10 avril (P. Triplet).
1996 Finistère - étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, ad., du 26 février au 18 mars au moins (J.-P. Delapré, M. & C. Vergès *et al.*).

(Amérique du Nord). Dates classiques et année record avec 3 données. Celle de la Somme est troublante (*cf.* Sarcelle à ailes bleues).

SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors* (24/26 - 3/3)

Charente-Maritime - Saint-Denis-d'Oléron/Ile d'Oléron, mâle ad., du 17 au 19 mai (P. Trotignon).
Gironde - Le Teich, mâle ad., 27 avril (G. Blake, C. Feigné, A. Fleury, P. Grisser).
Somme - Hâble d'Ault, mâle ad., du 5 au 12 avril (O. Bardet, J.-L. Bigorne, J.-C. Robert *et al.*).
1996 Landes - Pontonx, mâle ad., 29 mars (G. Blake, P. Grisser).

(Amérique du Nord). Là encore, des dates assez typiques (tardive en mai). Avec une nouvelle donnée de 1996, cette année détient le record d'observations (5). Curieusement – et en peu de temps – il y a eu au Hable d'Ault, dans la Somme, une Sarcelle de Caroline et un Fuligule à bec cerclé avec la Sarcelle à ailes bleues. Oiseaux sauvages ou échappés d'un des élevages de la région ?...

SARCELLE MARBRÉE *Marmaronetta angustirostris* (8/8 - 2/2)

Ain - Dombes : Villars-les-Dombes, imm., 10 août (F. & M. Poumarat).
Maine-et-Loire - Longué-Jumelles, du 20 octobre au 16 novembre (H. Cozannet, G. Mourgaud).

(Méditerrannée, Moyen-Orient, Inde du Nord). On peut toujours conjecturer sur l'origine de ces oiseaux. Point troublant

cependant : la plupart des données françaises sont uniquement automnales... Ce qui n'exclut pas des échappés, tel cet adulte porteur d'une bague rouge, observé du 22 au 27 septembre 1997 à Méry-sur-Oise, Val-d'Oise par D. Dujardin et G. Jardin.

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (50/43 - 8/6)

Charente-Maritime - Rochefort, mâle ad., du 11 au 14 janvier (P. Trotignon *et al.*).
Doubs - Frasne, mâle ad., 23 mars et du 27 mars au 6 avril (M. Gauthier-Clerc, D. Michelat, C. Piotte *et al.*).
Eure - Léry-Poses, 1er hiver, du 22 janvier au 11 février (L. Demongin *et al.*), mâle ad., 13 mars et du 28 au 30 mars, puis du 10 au 23 avril (L. Demongin *et al.*).
Bas-Rhin - Strasbourg, mâle ad., phot., 12 janvier (M. Brignon, R. Muratin *et al.*).
Somme - Hâble d'Ault, mâle ad., 10 avril, (P. Triplet) ; Bouvaincourt-sur-Bresle, mâle ad., 23 avril (S. Botto, R. Legrand).
Vendée - Les Landes-Genusson, mâle ad., du 19 au 29 décembre au moins (S. Mérand), le même qu'en 1996.
1996 Sarthe - Marçon, mâle, phot., du 18 novembre au 14 décembre (*Ornithos* 4 : 145) également M. Leroux parmi les observateurs.

(Amérique du Nord). 1997 est une année record pour ce canard. Les oiseaux de Charente-Maritime et de Vendée sont des revenants. Le mâle adulte de l'Eure l'est peut-être également bien qu'aucun mâle n'ait été observé ici depuis 1993. Voir la Sarcelle à ailes bleues pour celui de la Somme. L'oiseau d'Alsace enfin est le second pour cette région après celui de 1988.

FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (2/2 - 0/0)

(Amérique du Nord). L'observation du mâle de Camargue, du 20 au 24 novembre 1993 constitue désormais la première mention française. En effet, après réexamen et consultation d'experts, la donnée de 1992, précédemment publiée (*Ornithos* 3-1 : 43-45), n'a pas été confirmée (de même qu'une observation, inédite de 1986, toujours en Camargue).

EIDER À TÊTE GRISE *Somateria spectabilis* (4/4 - 1/1)

1996 Nord - Le Clipon/Loon-Plage, fem., 22 décembre (L. Spanneut *et al.*).

(Océan glacial arctique). C'est la cinquième mention française pour ce siècle, la dernière est du Finistère en 1992. Rappelons qu'un mâle adulte avait été vu au même endroit en 1986, un... 22 décembre.

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (13/13 - 4/2)

Charente-Maritime - Anse de la Maleconche/St-Georges-d'Oléron (Ile d'Oléron), mâle ad., du 26 février au 16 mars (P. Trotignon).
Somme - Cayeux-sur-Mer, mâle ad., 4 janvier et les 11 et 12 janvier (P. Defos du Rau, L. Gavory, J.-C. Robert *et al.*).
Vendée - La Terrière/La Tranche-sur-Mer, mâle ad., du 9 au 30 mars et mâle imm., du 22 au 25 mars (H. Dufourny, J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas *et al.*).

(Amérique du Nord). Difficile de faire la part des oiseaux qui reviennent de ceux qui sont nouveaux sur le littoral centre-atlantique. Les femelles et les jeunes restent toujours aussi rares.

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (149/301 - 13/29)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, juv., du 15 janvier au 5 février (Y. Kayser) ; étang du Réaltor/Cabriès-Calas, mâle ad., 23 février et 20 avril (O. Ibora, Y. Roy), mâle, 11 novembre et 6 décembre (Y. Roy) ; étang des Aulnes/St-Martin-de-Crau, mâle ad., éradiqué, du 4 janvier au 17 février (Y. Kayser).
Eure - Léry-Poses, fem., du 9 février au 11 mars (L. Demongin, C. Gérard, F. Malvaud *et al.*), imm., du 22 octobre au 8 février 1998 (L. Demongin *et al.*).
Finistère - étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, fem./imm., du 14 février au 15 mars (S. Provost).
Hérault - étang du Maire/Pérols, fem./imm. éradiqué, du 20 au 24 novembre (P.-Y. Henry).
Loire-Atlantique - lac de Grand-Lieu, 1 couple et 7 canetons d'une semaine, août, 4 mâles et 1 fem., août (S. Reeber).
Maine-et-Loire - étang des Haies/Jumelles, fem. ad. et 7 jeunes, 1 oiseau éradiqué, 17 septembre (P. Raboin), 6 jeunes, 3 oiseaux éradiqués, octobre (P. Raboin).
Manche - Beauguillot/Ste-Marie-du-Mont, fem./imm. éradiqué, du 10 au 12 décembre (E. Caillot, J.-F. Elder).
Somme - Hautebut-Woignarue, fem. ad., phot., 28 octobre (J. Bellard, J.-C. Robert).
1996 Bouches-du-Rhône - étang du Réaltor/Cabriès-Calas, mâle, 19 octobre (Y. Roy) ; Camargue : Roquemaure, fem./imm., du 18 novembre au 17 février 1997 (M. Thibault, Y. Kayser *et al.*).
1996 Loiret - St-Père-sur-Loire, fem./imm., du 27 octobre au 2 novembre (D. Chavigny).
1996 Maine-et-Loire - lac de Maine/Angers, 6 ind., 15 novembre (F. Halligon).
1996 Mayenne - étang de la Rincerie/Ballots, fem. ad., 29 novembre (J.-F. Arcanger).
1996 Pyrénées-Orientales - St Cyprien, fem./imm., du 27 novembre au 14 janvier 1997 (Y. Allemand, J. At, J.-P. Pompidor).
1996 Vendée - lagune des Mattes/Bouin, fem., 21 et 22 décembre (P. Lavoué).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). Le nombre d'individus vus annuellement en France reste élevé depuis 1994. Rappelons qu'un programme d'éradication a été engagé en France et ailleurs en Europe et que le Ministère de l'Environnement a confié au CHN le soin de publier toutes les informations recueillies. C'est pourquoi, malgré le nombre important de données annuelles, le Comité continue à homologuer l'espèce.



1. Buse pattue *Buteo lagopus*, mâle adulte, Goncourt, Haute-Marne, février 1997 (B. Théveny).
Adult male Rough-legged Buzzard.



2. Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*, 1er hiver, Chambéon, Loire, décembre 1997 (D. Décousu).
First-winter White-tailed Eagle.

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (16/15 - 0/0)

1996 Moselle - étang de Lindre/Tarquimpol, fem. imm., 15 et 16 décembre (R. Locusse, V. Palomares *et al.*).

(Circum-méditerranéen : Espagne, Tunisie, Turquie, dans les Balkans [?]. Également au nord de la Caspienne). Curieusement, cette donnée de 1996 a été recueillie en même temps que celle des Yvelines (*Ornithos* 4-4 : 146).

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (30/51 - 3/8)

Drôme - Crépol, 26 septembre (A. Traversaz).
Landes - localités tenues secrètes, 4 couples nicheurs (2 ayant mené chacun 2 nichées, 2 ayant échoué) produisent 6 jeunes à l'envol (G. Blake, P. Grisser).
Puy-de-Dôme - Orcival, 18 avril (A. & S. Jacquet).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). En dehors du bastion landais, les observations se multiplient, le plus souvent – comme c'est le cas ici – en avril ou en début d'automne. Les 6 jeunes ont été comptabilisés dans les statistiques du CHN.

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (236/187 - 8/7)

Loire - Chambéon, 1er hiver, phot., du 4 novembre au 1er mars 1998 (A. Ulmer *et al.*).
Marne - Outines, subad., 1er mars (E. Gazave, P.-Y. Henry).
Bas-Rhin - Lauterbourg, imm., 6 février (M. de Montgolfier) ; Rhinau-Kappel, imm., 23 et 24 octobre (A. Willer).
Rhône - Lucey, ad., 6 et 9 février (O. Gibaru).
Savoie - À l'ouest du lac du Bourget, le même que celui observé dans le Rhône aux mêmes dates : ad., 6 et 9 février (O. Gibaru).
Deux-Sèvres - Bougon, imm., 15 et 30 janvier (K. Guerbaa *et al.*).
Yonne - lac du Bourdon/Saint Fargeau, imm., 17 février (P. Dagnas).
1996 Bas-Rhin - Rhinau-Kappel, imm., du 23 décembre au 9 mars 1997 (J.-P. Hiss, F. Schmitt, D. Vieuxtemps *et al.*).

(Europe septentrionale et centrale, Islande, sud-ouest du Groenland). Bel hivernage dans la Loire. Pour sa dernière année dans le rapport du CHN, l'espèce fait pâle figure avec seulement 8 données. Dommage que manquent les observations des grands lacs champenois...

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (6/6 - 3/3)

Aisne - Versigny, bagué couleur, phot., début juin (R. Deballe, *fide* O. Bardet).
Aveyron - Peyreleau, bagué en Espagne, du 23 juin à décembre au moins (C. Bagnolini).
Pyrénées-Atlantiques - Achouria, celui vu à partir du 23 juin dans l'Aveyron, 1er mai (B. Delprat).

(De l'Espagne à la Chine). Confirmation des échanges entre la population introduite des Cévennes et celle d'Espagne. Quant à celui de l'Aisne, bagué couleur, il vient sans doute de la même région...

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (8/8 - 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » ou « Buse des steppes » :

Aube - Mathaux, 1er février (C. Hervé).

Haute-Marne - Semilly, ad., phot., du 30 janvier au 3 février (B. Théveny).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). Cette sous-espèce semble se montrer assez régulièrement en France, notamment en hiver. À noter la simultanéité des dates et des régions.

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (4/4 - 0/0)

1995 Corse-du-Sud - Baleone, 3 novembre (G. Bonaccorsi).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Il s'agit de la 8e mention française et de la première pour la Corse.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (170/180 - 64/73)

Aube - Mesnil-Sellières : 24 janvier, heurtée par un camion, récupérée et confiée à un centre de soins (D. Crickboom, G. Grolleau *in litt.*) ; Lentilles, ad., 21 janvier (F. Noël) ; Rouilly-Sacey et Bouy-Luxembourg, ad., du 31 janvier au 16 février (P. Albert, A. Millon, J.-M. Thiollay *et al.*) ; Mesnil-Sellières et Rouilly-Sacey, mâle ad. probable, du 1er février au 8 février (P. Albert, A. Millon, J.-M. Thiollay *et al.*) ; Montmorency-Beaufort, fem. ad., 2 février (F. Noël) ; Yevres-le-Petit, fem. 2e hiver, 2 et 8 février (C. & R. Riols, B. Theveny) ; Rosnay-L'Hopital, mâle ad., 2 février (F. Noël, B. Theveny).

Doubs - Besançon : fem. ad. probable, 5 janvier (J.-P. Paul, J.-C. Weidmann) ; Houtaud et Pontarlier : 2e année, du 25 janvier au 6 février (D. Michelat *et al.*), mâle ad., du 25 janvier au 8 février (E. Cosson, D. Michelat, M. Montadert *et al.*), 2e année, du 25 janvier au 16 février (E. Cosson, D. Michelat, M. Montadert *et al.*) ; Bannans : fem. ad., 25 janvier (E. Cosson, D. Michelat, M. Montadert *et al.*), revue avec 1 ind. de 1re année et 1 imm. les 31 janvier et 4 février, encore 1 ind. de 1re année le 5 février (E. Cosson, J. François, D. Michelat) ; Bouverans : mâle ad., du 25 janvier au 8 février (M. Montadert *et al.*), 1re année, du 31 janvier au 24 mars (E. Cosson, J. François, D. Michelat), 1re année, du 2 février au 8 février (D. Lecornu, D. Michelat) ; Courvières : 2e année, les 26 et 29 janvier (D. Michelat *et al.*) ; Boujailles : 1er hiver, les 26 et 29 janvier (C. Piotte *et al.*), fem. ad., du 29 novembre au 30 décembre (D. Michelat, M. Montadert) ; Avoudrey : mâle ad. et 1er hiver, les 29 et 30 janvier (D. et J.-M. Michelat) ; Bulle : mâle ad., fem. ad., 2 ind. de 2e hiver et 1 ind. de 1er hiver, 31 janvier (E. Cosson, J. François, D. Michelat), 1 mâle ad., 1 ind. de 1er hiver et 1 ind. de 2e hiver revus le 2 mars (E. Cosson, M.O. Debros, D. Michelat), 1 imm. revu le 30 mars (F. Lonchampt, D. Michelat), 1er hiver, du 7 au 14 décembre (L. Belingheri, B. Feuvrier, D. Michelat *et al.*) ; Amancey : mâle ad., 1er février (D. Michelat) ; La Vrine : 2e année, 2 février (D. Michelat) ; Frasne : mâle ad., du 2 au 28 février (D. Michelat), 2 ind. de 1er hiver, du 8 au 28 février (D. Lecornu, D. Michelat) ; La Rivière-Drugeon : fem. ad., du 2 février au 2 avril (E. Chaput, D. Michelat), 2e année, du 2 février au 4 avril (D. Lecornu, D. Michelat), imm., 2 mars (E. Cosson, M.O. Debros, D. Michelat), peut-être un oiseau de Bouverans (non comptabilisé) ; Pessans : fem. ad., 3 et 4 février (J.-P. Paul).

Charente-Maritime - Brouage, mâle ad. probable, du 11 au 14 mars (J. Chevereau, X. Rufray, J. Sériot).

Jura - Nozeroy, 2 ind., 13 février (E. Chaput).

Marne - Arrigny, 1er hiver probable, 6, 7 et 13 janvier (F. Noël, C. Riols) ; Songy, fem. imm., du 19 janvier au 5 février (C. Hervé, F. Noël) ; Songy et Vitry-la-Ville, fem. imm., du 22 janvier au 16 février (C. Cabon, C. Hervé, F. Noël) ; Fontaine-sur-Coole/Sompuis, fem. imm., 19 et 25 janvier (F. Noël) ; Noirlieu, mâle ad., 25 janvier (R. Riols, B. Theveny) ; Somme-Vesle, fem. ad., 25 janvier (C. Loyrette, C. & R. Riols, B. Theveny) ; St-Ouen-Domprot, mâle ad., 26 janvier (F. Noël) ; Courtisols, mâle ad., 26 janvier (C. Riols, B. Theveny) ; Le Meix-Tiercelin, fem. ad., 26 janvier (F. Noël) ; Scrupt, imm., 1er février (C. Riols) ; Mairy-sur-Marne, fem. 2e année, du 2 au 27 février (H. Deglaire, D. Petit *et al.*).

Haute-Marne - Droyes, fem. ad., du 15 janvier au 19 février (F. Noël, R. Riols, B. Theveny), mâle, 19 janvier (R. Riols, B. Theveny) ; Semilly, fem. ad., phot., du 22 janvier au 7 février (B. Theveny), Morionvilliers, mâle ad., phot., 27 janvier (B. Theveny), Goncourt, mâle ad., phot., 10 et 11 février (B. Theveny), 1er hiver, 12 février (B. Theveny), fem. ad., phot., 26 février (B. Theveny) ; ouest du lac du Der, mâle ad., 30 décembre (P. Geoffray).

Meurthe-et-Moselle - Sponville, mâle ad. probable, 26 janvier (J. François, J.-M. Kopp *et al.*) ; étang du Haut-Fourneau, 24 mars (R. Locusse) ; Laneuvelotte, 5 octobre (F. Prud'homme).

Moselle - Rombas, fem. ad., 12 janvier, récupérée affaiblie, phot. (J.-M. Debrycke, J.-L. Gauthier, J.-Y. Schneider).

Nord - Villeneuve-d'Ascq, ad. probable, 21 octobre (P.-R. Legrand).

Pas-de-Calais - Pont-d'Ardres, 1er hiver (G. Flohart) ; Camiers et Dannes, 1er hiver, 14 octobre (M. Guerville) ; baie de Canche/Camiers, 2 imm., 28 octobre (M. Guerville) ; Floringzelle/Audinghen, juv., 28 octobre (D. Cohez).

Bas-Rhin - Wolxheim, 6 janvier, récupérée blessée, phot. (N. Buhrel, M. Lippert, B. Roth) ; Munchhausen, imm., 2 mars (C. Dronneau).

Haute-Saône - Cognières, mâle ad., 28 janvier (F. Maillot).

Somme - St-Quentin-en-Tourmont, imm., 18 octobre (T. Rigaux) ; baie d'Authie/Fort-Mahon, mâle de 2e hiver probable, 7 décembre (O. Bardet, L. Gavory *et al.*).

1985 Loiret - St-Cyr-en-Val, 18 février (D. Muselet), précédemment refusée, maintenant acceptée après révision.

1986 Aube - Bar-sur-Seine, 26 octobre (R. Guichon), précédemment refusée, maintenant acceptée après révision.

1987 Moselle - Sarrebourg, 25 janvier (P. Sornette), précédemment refusée, maintenant acceptée après révision.

1987 Haut-Rhin - Wintzenheim, 14 janvier (Y. Despert *et al.*), précédemment refusée, maintenant acceptée après révision.

1990 Doubs - Maîche, juv., 29 décembre (N. Jeannot), précédemment refusée, maintenant acceptée après révision.
1996 Ardennes - Liart, 28 octobre (M. Dichamp).
1996 Nord - Loon-Plage, 2 ind. de 2e année, 15 septembre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse).
1996 Pas-de-Calais - Fond-Pignon/Sangatte, mâle ad., 20 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse).
1996 Bas-Rhin - Lauterbourg, 23 janvier (P. Koenig), Niederbronn, imm., 5 mars (M. Schneider).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Invasion sans précédent en France en début d'année 1997, remarquable par ses effectifs et par sa localisation très limitée. Elle a fait l'objet d'un article détaillé (*Ornithos* 5-2 : 82-85). On notera également la série d'observations fin octobre dans le nord de la France. Au total, 1997 draine à elle seule 29 % des effectifs enregistrés au CHN depuis 1981 et 22,6 % de ceux du XXe siècle ! De même, on relèvera l'observation très précoce de septembre 1996 dans le Nord (égalant le record de 1961 dans le Loir-et-Cher). Enfin, le CHN a réexaminé certaines fiches précédemment refusées : ainsi 5 données ont été nouvellement acceptées.

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (23/24 - 2/1)

Meuse - Lachaussée, âge incertain, du 22 juin au 20 septembre (J. François, J.-P. Harly *et al.*).
Pyrénées-Atlantiques - col d'Organbidexka/Larrau, 1re année, 4 octobre (P. Grisser)
1996 Marne - Sogny-en-l'Angle, ad., 30 juillet (N. Petitjean).
1996 Meuse - étang des Petites-Parois/Lachaussée, 29 juin (D. Ambroise, S. Lestan), et non 2 septembre seulement (*Ornithos* 4-4 : 148).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). L'individu de l'étang de Lachaussée semble bien être revenu sur son site d'élection. Hélas, seul... Quant à celui d'Organbidexka, il suit à peu près jour pour jour, l'oiseau observé sur ce site le 9 octobre 1986. Notons pour finir que 1996 est désormais l'année record avec 5 mentions !

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (91/69 - 9/5)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas-d'Agon et Basses-Méjanes, ad., 11 et 25 janvier (A. Charpentier, S. Jouarre, N. Sadoul *et al.*) ; Bardouine, imm., 31 janvier (Y. Kayser) ; Bomborinette, 7 février (N. Beck) ; étang Redon, subad., du 31 octobre au 16 mars 1998 (H. Kowalski, A. Olivier *et al.*) ; Le Vigueirat, subad., du 2 novembre au 10 mars 1998 (A. Mantes *et al.*).
Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, ad., du 19 janvier au 17 février (E. Hiriart).
Loire-Atlantique - Petit Mars, imm., 31 mai (S. Dulau, Y. Trévoux *et al.*).
Maine-et-Loire - St-Georges-sur-Loire, 1er hiver, 22 novembre (D. & P. Bizien *et al.*).
Haut-Rhin - Wolschwiller, ad., 24 octobre (F. Schmitt).
1994 Moselle - étang de Lindre/Tarquimpol, ad., du 11 novembre au 20 mars 1995 (P.E. Engel, J. François).



3. Faucon crécerellette *Falco naumanni*, mâle adulte, Wimille, Pas-de-Calais, mars 1997 (R. Tonnel). *Adult male Lesser Kestrel.*

1995 Moselle - étang de Lindre/Tarquimpol, ad., du 5 novembre au 7 avril 1996 (J. Ancelin, J. François, H. Michel *et al.*).
1996 Haut-Rhin - Kembs, juv., 19 novembre (R. Sané, A. Hurstel)
1996 Saône-et-Loire - Couches, imm., 1er novembre (R. Masson).

(Pologne à la Sibérie orientale). Trois des 5 oiseaux de Camargue n'ont pas été comptabilisés, étant probablement des oiseaux revenant hiverner sur place ; c'est également le cas de l'oiseau des Landes. La donnée de Loire-Atlantique est, de loin, la plus tardive connue à ce jour en France. De même, record d'oiseaux pour 1996 (10). La présence dans la moitié ouest du pays semble se confirmer d'année en année, comme la fidélité à certains sites d'hivernage.

AIGLE IMPÉRIAL *Aquila heliaca* (3/3 - 0/0)

1996 Alpes-Maritimes - Parc National du Mercantour/St-Etienne-de-Tinée, juv., phot., 1er décembre (G. Caratti).

(Balkans, Turquie jusqu'en Asie centrale, Mongolie). C'est la cinquième donnée française, mais aussi la seconde pour 1996 et qui n'est pas de Camargue.

FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (37/42 - 2/2)

Hors Crau :

Corse-du-Sud - cap Rosso/Piana, mâle, 1er mai (P. Crouzier).
Pas-de-Calais - Wimille, mâle ad., phot., du 24 mars au 19 avril (G. Flohart, R. Tonnel *et al.*).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). Si l'observation de Corse est somme toute normale, celle du Pas-de-Calais, l'est nettement moins. C'est la seconde au nord de la Loire pour le XXe siècle, la première étant du 11 septembre 1927 dans le... Pas-de-Calais (Boulogne-sur-Mer) ! En Crau, 48 couples nicheurs ont produit 60 jeunes à l'envol (J. Sériot : Suivi quantitatif annuel des espèces nicheuses rares et menacées en France, *Ornithos* : à paraître).

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonorae* (242/321 - 6/7)

Alpes-Maritimes - La Turbie, 2 ind., 24 juillet (J. François).
Ardèche - St-Georges-les-Bains, forme sombre, 1er juin (G. Grassi, V. Vincent).
Aude - Leucate, ad., forme sombre, 21 avril (P. Rousset, L. Spanneut) ; Campignol, forme pâle, 21 juin (D. Clément), 27 juillet (D. Clément *et al.*), forme sombre (revu à L'Ile St-Martin), 14 août (S. Albouy, D. Clément *et al.*), forme pâle, 26 août (D. Clément), 30 août (D. Clément *et al.*) ; Narbonne, forme sombre, 28 juin (D. Clément).
Aveyron - Millau, fem. ad., forme pâle, 17 mai (E. Cosson, D. Michelat, R. Sané *et al.*).
Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas-d'Agon, forme pâle, 28 avril (Y. Kayser) ; Tour-du-Valat, forme pâle, 8 et 9 mai (T. Bino, A. Olivier, N. Sadoul) ; St-Seren et alentours Tour-du-Valat, 3 ind. de forme pâle, 28 août (Y. Kayser), 2 ind. de forme pâle revus jusqu'au 14 septembre (L. Dietrich, Y. Kayser).
Corse-du-Sud - Capitello, 18 avril (G. Bonaccorsi).
Morbihan - Hoëdic, forme pâle, 5 septembre (G. Rault).
Pyrénées-Orientales - Le Barcarès, ad. forme sombre, 14 mai (D. Clément).
1985 Corse-du-Sud - Capitello, 23 mars (G. Bonaccorsi), 4 ind., 21 août (G. Bonaccorsi).
1986 Corse-du-Sud - Capitello, 31 août (G. Bonaccorsi), 2 ind., 25 septembre (G. Bonaccorsi).
1988 Corse-du-Sud - Capitello, 29 août (G. Bonaccorsi), 8 septembre, 25 septembre (G. Bonaccorsi).
1989 Corse-du-Sud - Campo Dell'Oro, 5 ind., 17 septembre (G. Bonaccorsi).
1993 Corse-du-Sud - Capitello, 12 septembre (G. Bonaccorsi).
1994 Corse-du-Sud - Balleone, 2 ind., 9 septembre (G. Bonaccorsi).
1996 Corse-du-Sud - Capitello, 3 ind., 13 septembre (G. Bonaccorsi).
1996 Var - cap Sicié/Six-Fours-les-Plages, au moins 2 ind., 13 août (R. de Liedekerke).
1996 Var - Ollioules, 15 août (R. de Liedekerke).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Pour la dernière année du Faucon d'éléonore sur la liste nationale du CHN (en Méditerranée), rien de bien nouveau à signaler, la moyenne annuelle depuis 1981 se situant à 16 données pour 21 oiseaux. En revanche, arrivée « massive » de données en provenance de Corse, où l'espèce est donc bien régulière aux deux passages (avec notamment la date du 23 mars 1985, la plus précoce jamais notée en France). L'observation du Morbihan est tout à fait remarquable, mais ce n'est pas la première.

FAUCON SACRE *Falco cherrug* (7/7 - 1/1)

Somme - Hable d'Ault, 28 mai (J. Bellard, J.-C. Robert).

(Hongrie, Tchécoslovaquie, Turquie jusqu'en Sibérie centrale et méridionale). Encore un oiseau dont l'origine peut être discutable...

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (104/122 - 15/20)

Alpes-Maritimes - fem. ad., Mougins, 14 avril (M. Boët).
Aude - Leucate, mâle ad., du 20 au 24 avril (P. Rousset, L. Spanneut), fem. ad., phot., du 2 au 4 mai (G. Bruneau, M. & P. Sengez, M. & C. Vergès *et al.*), mâle ad., 5 mai (S. Nicolle).
Haute-Corse - Macinaggio/Rogliano, fem., 28 avril (B. Recorbet), 2 fem., 29 avril (B. Recorbet), 1 mâle et 2 fem., 2 mai

(G. Bonaccorsi, B. Recorbet).
Corse-du-Sud - Capitello, fem., 10 et 11 mars (G. Bonaccorsi), de 1 à 2 mâles, du 14 mars au 14 avril (G. Bonaccorsi), juv., 29 et 31 octobre (G. Bonaccorsi) ; Casavona/Grosseto Prugna, 2 mâles, 12 avril (G. Bonaccorsi, B. Recorbet).
Hérault - St-Nazaire-de-Pezan, mâle ad., 2 et 5 mai (X. Rufray).
Isère - Lagunage de la Buisse, mâle ad., 16 et 23 mars (G. Bruneau, N. Vincent-Martin).
Meuse - étang meusien (localité tenue secrète), 8 juin (J. François, J.-P. Harly).
Saône-et-Loire - Ratenelle, fem., 24 mars (N. Pointecouteau).
1986 Corse-du-Sud - Capitello, juv., 3 novembre au moins (G. Bonaccorsi).
1987 Corse-du-Sud - Capitello, 3 mâles et 2 fem., 29 mars (G. Bonaccorsi).
1988 Corse-du-Sud - Capitello, fem., du 4 au 17 avril (G. Bonaccorsi).
1990 Corse-du-Sud - Capitello, mâle, 25 février, 2 mâles et 2 fem., 14 avril (G. Bonaccorsi).
1992 Corse-du-Sud - Capitello, fem., du 22 au 26 février (G. Bonaccorsi).
1995 Bouches-du-Rhône - Les Saintes-Maries-de-la-Mer, tuée, phot., automne (R. Lamouroux *fide* Y. Kayser).
1995 Corse-du-Sud - Capitello, mâle, 1er et 2 avril (G. Bonaccorsi), mâle, 12 avril (G. Bonaccorsi), fem., 21 avril (G. Bonaccorsi), fem., 5 mai (G. Bonaccorsi), mâle, 12 mai (G. Bonaccorsi).
1995 Meuse - Madine, mâle chant., du 6 mai au début juin (G. Frêne, R. Lécaille).
1996 Corse-du-Sud - Capitello, mâle, 26 mars (G. Bonaccorsi), mâle et fem., du 27 mars au 24 avril (G. Bonaccorsi), mâle, 1er et 2 juin (G. Bonaccorsi).
(Europe, Asie centrale). L'arrivée des données corses change singulièrement le pattern d'apparition de l'espèce en France : d'une part la moyenne annuelle est de plus de 8 individus par an depuis 1981 (et de près de 20 depuis 3 ans avec 24 oiseaux en 1996), d'autre part, les mentions précoces semblent assez nombreuses en Corse, tel cet oiseau vu le 22 février 1992, le plus hâtif enregistré à ce jour. Sinon toujours aussi peu de chanteurs en période de reproduction...

MAROUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (31/33 - 0/0)

1987 Corse-du-Sud - Capitello, ad., du 7 avril au 24 mai (G. Bonaccorsi).
1996 Corse-du-Sud - Capitello, ad., du 27 mars au 8 avril (G. Bonaccorsi).
(Europe, Asie centrale, Japon). La bonne nouvelle c'est l'arrivée de ces observations de Corse (où l'espèce reste occasionnelle), la mauvaise c'est qu'il n'y a eu aucune donnée pour 1997.

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (26/39 - 3/18)

Pyrénées-Orientales - Canet, 2 janvier (J.-P. Pompidor *fide* Y. Aleman), minimum d'une dizaine de couples avec notamment, 12 ad. et 6 juv., 20 août (Y. Aleman, J.-M. Algrin), encore 2 ad. et 1 poussin âgé de moins d'une semaine, 26 septembre (Y. Aleman, J.-M. Algrin, J. At).
1995 Gard - Pont-de-Gallician/Vauvert, tuée à la chasse et naturalisée, phot., 10 janvier (S. Colombaud, D. Petit *fide* R. Mathevet).
(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). La reproduction se poursuit sur Canet, tandis que les données continuent à se multiplier ailleurs dans le Midi méditerranéen.

GLARÉOLE À AILES NOIRES *Glareola nordmanni* (10/8 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/St-Martin-de-Crau, 18 mai (E. Didner).
(Asie occidentale). La Camargue et ses abords restent la région privilégiée pour observer cette glaréole au printemps.

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (14/15 - 1/1)

Vendée - St-Hilaire-de-Riez, du 1er au 10 avril (G. Besseau, D. Desmots, A. Levesque).
(Amérique du Nord). Seconde observation française (et vendéenne !) au printemps et première en avril (la précédente était de fin mai 1991).

PLUVIER BRONZÉ/FAUVE *Pluvialis dominica/fulva* (7/7 - 1/1)

Vendée - Le Poiré-sur-Velluire, ad., 5 mai (D. Casseron, C. Gonin, C. Petit).
(Amérique du Nord, Sibérie). La Vendée se distingue pour ces pluviers à axillaires grises !

VANNEAU SOCIABLE *Chettusia gregaria* (29/29 - 5/5)

Indre - Mézières-en-Brenne, imm., 11 novembre (P. Cabard, N. Macaire).
Landes - Miramont-Sensac, phot., 22 février (S. Duchateau).
Loiret - Sandillon, juv./1er hiver, 19 octobre (S. Branchereau, A. Loiseau)
Meuse - Mouzay, du 16 février au 21 mars (J. Cesarini, G. Fortier, D. & E. Landragin).
Vendée - St-Denis-du-Payré, 1er hiver, 22 novembre (E. Gfeller, A. Thomas).
(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Nouvelle année record avec 5 oiseaux différents. Dates et lieux plutôt classiques avec une mention spéciale pour le long stationnement de l'oiseau meusien (qui serait peut-être mort sur place...).

BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (11/11 - 3/3)

Charente-Maritime - Moëze, juv./1er hiver, 18 septembre (M. Jonis, X. Rufray) ; Breuil-Magné, 1er hiver, 8 novembre (P. Trotignon).

Vendée - Landelène/Marans, phot., du 24 au 26 juillet (S. Dulau, J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas *et al.*).

(Amérique du Nord). Chiffre record pour la France. À nouveau 3 oiseaux en France dans une année. La donnée du 8 novembre est la plus tardive à ce jour.

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (13/13 - 1/1)

Vendée - pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, juv., 30 août (E. Gfeller, A. Thomas, P. Trotignon).

1996 Pas-de-Calais - Platier-d'Oye/Oye-Plage, ad., phot., du 31 juillet au 2 août puis du 16 au 23 août (A. Pataud) et non jusqu'au 21 août comme précédemment indiqué (*Ornithos* 4-4 : 150).

(Amérique du Nord). Retour aux choses « normales » après la bonne année 1996.

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (151/165 - 5/5)

Loire-Atlantique - île de la Maréchale/Frossay, juv., du 10 au 13 septembre (O. Marié, D. Pilvin, Y. Trévoux).

Loiret - Pithiviers-le-Vieil, juv., phot., du 4 au 8 septembre (S. Branchereau, J. Martinez).

Marne - lac du Der-Chantecoq/Arrigny, juv., du 8 au 10 septembre (C. Loyrette, C. & R. Riols, G. Rollin).

Somme - Hable d'Ault, juv., 7 septembre (L. Bellanger, J.-L. Bigorne) ; Marquenterre/St-Quentin-en-Tourmont, juv., phot., 12 septembre (D. Chatelain, J. Dufour, S. Hazebrouk).

1996 Haute-Marne - lac du Der/Ste-Livière, juv., du 29 septembre au 6 octobre (C. Riols) et non le 29 septembre uniquement (*Ornithos* 4-4 : 151).

(Amérique du Nord, Sibérie). Année bien moyenne, dont la seule particularité est l'arrivée groupée au début du mois de septembre (les deux observations de la Somme concernent-elles le même oiseau ?).

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (85/116 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : They-de-Ste-Ursule, juv., 20 août (N. Vincent-Martin, G. Bruneau *et al.*).

Seine-Maritime - Marais du Hode/Sandouville, ad., 12 mai (O. Benoist).

1996 Bouches-du-Rhône - Camargue : étang du Fangassier, 2 juv., du 21 au 28 août (P. Defos du Rau, E. Didner, Y. Kayser, *et al.*).

1996 Pas-de-Calais - Platier-d'Oye/Oye-Plage, au moins 4 ad., 20 septembre (D. Rosair).

(Europe septentrionale). Pas grand chose de nouveau cette année (le marais du Hode reste un lieu assez régulièrement visité par l'espèce). La donnée de 4 adultes en septembre 1996 dans le Pas-de-Calais est remarquable.



4. Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*, 1er hiver, Le Hâvre, Seine-Maritime, octobre 1997 (P. Sabine). *First-winter Lesser Yellowlegs.*



fig. 1. Limicoles néarctiques, nombre d'espèces, de données et d'individus par an en France (période 1981-1997).
Annual numbers of species, records and individuals of North-American waders in France from 1981 through 1997.

L'année 1997 restera comme un petit cru pour les limicoles néarctiques dans notre pays : 7 espèces différentes et seulement 13 données (et individus).

BÉCASSEAU À ÉCHASSES *Micropalama himantopus* (4/4 - 1/1)

Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad. plum. nupt., 26 juillet (N. Selosse).

(Amérique du Nord). Cinquième mention française et seconde concernant un adulte : le précédent avait été observé le 23 juillet 1989 au Teich, Gironde (c'était d'ailleurs la première mention française).

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (69/76 - 0/0)

1995 Finistère - Trunvel/Tréogat et Loc'h ar Stang/Tréguennec, ad., phot., du 14 au 22 mai (S. Provost), et non en 1996 (*Ornithos* 4-4 : 151).

1995 Finistère - Ouessant : Créac'h, juv., phot., capturé et bagué, du 14 au 16 septembre (*Ornithos* 3-4 : 162), également F. Legendre.

1996 Finistère - pointe de la Torche/Plomeur, 18 septembre (Y. Bernard).

1996 Bouches-du-Rhône - plaine de la Crau, juv., phot., 28 septembre (G. & M.-N. Balança, X. Rufray).

(Amérique du Nord). C'est (pour l'instant du moins) la première année « blanche » pour le Bécasseau rousset depuis la création du CHN !

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (23/24 - 1/1)

Haute-Corse - Macinaggio, ad., 6 mai (R. Jordan).

1995 Hérault - Marais du Grès/Lansargues, tuée à la chasse et naturalisée, phot., 15 octobre (*fide* P.-A. Crochet, F. & L. Veyrunes).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Cette bécassine semble bien être devenue définitivement rarissime en France, et les prélèvements cynégétiques ne sont pas finis... À noter l'observation corse au même endroit et quasiment à la même date que celle de 1995.

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (13/13 - 1/1)

Gironde - Certes/Audenge, phot., 7 mai (F. Dupuy, P. Nape).

(Amérique du Nord). Début mai semble propice à l'observation printanière de ce limicole, dont la rareté se maintient depuis quelques années.

CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (9/9 - 1/1)

Seine-Maritime - estuaire de la Seine/Le Havre, juv./1er hiver, phot., du 25 octobre au 9 novembre (O. Benoist, A. Guillemont, P. Sabine *et al.*).

(Amérique du Nord). Avec un peu plus d'un oiseau vu en France tous les 2 ans (depuis 1981), ce chevalier néarctique reste, lui aussi, d'une grande rareté. Les stationnements automnaux sont souvent prolongés.

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* (40/40 - 6/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : baisses de Quenin et de Piémanson, They-de-Ste-Ursule, phot., du 15 mars au 14 juin (P.-A. Crochet, E. Didner, G. Durand, Y. Kayser *et al.*) ; du 9 août au 21 septembre (G. & M.-N. Balança, G. Bruneau, A. Flitti, M. Parent, N. Vincent-Martin *et al.*), sans doute le même oiseau que le précédent.

Charente-Maritime - Esnandes, ad., 8 mai (A. Reille).



5. Mouette de Franklin *Larus pipixcan*, 2e année, Boulogne, Pas-de-Calais, mars 1997 (P. Camberlein).
Second-year Franklin's Gull.



6. Goéland d'Audouin *Larus audouinii*, 2e été, au large de Palavas-les-Flots, Hérault, mai 1997 (G. Bruneau).
Second-summer Audouin's Gull.

Var - Giens/Hyères, ad., 19 septembre (J.-G. Robillard).
Vendée - Pointe de l'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 19 mai (J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas), sans doute le même oiseau que celui observé en Charente-Maritime, ad., du 4 au 6 juillet (A. Thomas *et al.*), peut-être toujours le même oiseau.
1995 Finistère - Locquénolé, ad., phot., 20 au 22 mai (J. Chevereau, J. Maout, B. Prouff).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Une donnée de janvier 1997 en Camargue, non soumise au CHN, accrédite l'idée d'un hivernage dans cette région, suivi d'un stationnement remarquablement long et d'un probable estivage ! Quant aux oiseaux de Vendée et sans doute du Var, il est très possible qu'il s'agisse de « revenants ». La donnée bretonne est remarquable, l'espèce est très rare dans cette région (dernière observation en septembre 1987).

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (145/441- 27/41)

Aude - Port-la-Nouvelle, 11 mai (G. Olioso).
Bouches-du-Rhône - Camargue : plage de Piémanson, ad., 6 mai (Y. Kayser) ; phare de Beauduc, ad., 25 mai (P.-A. Crochet, Y. Kayser) ; plage de la Comtesse, ad., 12 juillet (G. Bruneau).
Finistère - baie de Goulven, juv., 30 et 31 août (Y. Créau, J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*) ; île de Batz, 1re année, 11 septembre (P. Crouzier) ; pointe de Penvins/Sarzeau, subad./ad., phot., trouvé mort, 13 décembre (S. Provost).
Hérault - au large de Palavas-les-Flots, ad., phot., 4 mai (G. Bruneau, P.-A. Crochet *et al.*).
Haute-Marne - Villegusien-le-lac, juv., 7 septembre (J.-C. Weidemann).
Nord - Clipon/Loon-Plage, juv., 6 septembre (C. Gruwier, B. Portier), 5 juv., 2 octobre, 2 juv., 11 octobre, 5 juv., 12 octobre, 2 juv. et 2 ad., 13 octobre (J.-A. Leclercq, N. Selosse *et al.*).
Pas-de-Calais - Calais, juv., 18 septembre (E. Cappe) ; cap Gris-Nez/Audinghen, juv., 6 septembre (observateur inconnu), juv., 13 septembre (D. Cohez, G. Flohart), juv., 14 septembre (G. Flohart), 1er hiver, 30 septembre (D. Lecornu), juv., 2 octobre (E. Cappe), juv. pâle, 5 octobre (G. Flohart, J.-A. Leclercq), 3 juv. sombres, 12 octobre (G. Flohart, D. Tirmarche), juv., 13 octobre (D. Tirmarche) ; Fort-Mahon/Bleriot-Plage, juv., 4 octobre (P.J. Dubois).
Haute-Savoie - col de Bretolet/frontière suisse, juv., 29 août (C. Schönbächler *et al.*).
Seine-Maritime - port d'Antifer/St-Jouin-Bruneval, juv., 1er septembre (G. Béteille).
Vendée - Longeville-sur-Mer, juv., 16 octobre (A. Thomas).
1995 Nord - jetée du Clipon/Loon-Plage, 8 juv., 25 août (N. Selosse), 7 juv., 28 août (N. Selosse), 2 juv., phot., 29 août (N. Selosse), juv., 10 septembre (N. Selosse), 3 juv., 29 septembre (N. Selosse), 8 juv., 6 novembre (N. Selosse).
1996 Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, juv., 10 septembre (N. Selosse), juv., 11 septembre (N. Selosse).
1996 Nord - jetée du Clipon/Loon-Plage, juv., 1er septembre (L. Spanneut *et al.*), 6 juv., 12 septembre (N. Selosse), juv., 13 septembre (N. Selosse), juv., 14 septembre (N. Selosse).

(Circumboréal). L'espèce confirme sa parfaite régularité sur les côtes de la mer du Nord. À noter aussi sa présence dans le Finistère, notamment dans le secteur Batz/Goulven et surtout celle en Méditerranée, au printemps : début mai semble idéal pour observer des adultes parfaits.

GOÉLAND ICHTHYAÈTE *Larus ichtyaetus* (0/0 - 1/1)

Corse-du-Sud - Capitello, 2e hiver, 3 novembre (G. Bonaccorsi).

(De la mer Noire au Tibet, en passant par l'Asie centrale et la Chine). Première mention française pour ce laridé attendu. L'espèce s'observe davantage en Europe centrale et jusqu'en Allemagne et en Italie. À quand (et où ?) le prochain ?

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (7/7 - 2/2)

Manche - phare de Gatteville, ad., 1er novembre (C. Kerihuel).
Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, 2e année, phot., 16 et 17 mars (G. Flohart *et al.*).

(Amérique du Nord). C'est la première fois que 2 oiseaux sont vus la même année. Il y a désormais 10 mentions en France, qui cadrent bien avec les dates de celles-ci. À noter que l'observation de la Manche est la première pour la Normandie.

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (7/14 - 2/2)

En dehors du littoral méditerranéen :

Charente-Maritime - pointe de Lizay/île de Ré, 1er été, 8 mars (J. Chevereau, X. Rufray).
Puy-de-Dôme - Clermont-Ferrand, ad., 20 mai (E. Boitier).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). Alors que l'observation du Puy-de-Dôme est remarquable par sa localisation, celle de Charente-Maritime l'est par la précocité de sa date.

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (75/94 - 9/13)

Aude - Pissevaches/Fleury-d'Aude, 2e été, phot., 2 mai (G. Bruneau, P.-A. Crochet, E. Didner *et al.*), 2e été, 10 mai (D. & C. Laloi) ; La Franqui, 2e été, 2 mai (G. Bruneau, P.-A. Crochet, E. Didner *et al.*).
Bouches-du-Rhône - Camargue : plage de Piémanson, ad., 20 avril (E. Didner) ; baisse des Cinq Cents Francs, ad., 17 mai (L. Majorel *et al.*) ; Grenouillet, 5 ad., 12 juin (Y. Kayser) ; baisse de Quenin et Grau de Piémanson, 3e été ou ad. usé, 14 et 20 juillet (P. Defos du Rau, P.J. Dubois).
Hérault - Au large de Palavas-les-Flots, 2e été, phot., 4 mai (G. Bruneau, P.-A. Crochet *et al.*) ; Sète, 1er été, 19 mai (E. Cosson, D. Michelat).
1993 Bouches-du-Rhône - Camargue : plage d'Arles, ad., 6 avril (R. & M. Ertel).
1995 Alpes-Maritimes - St-Laurent-du-Var, ad., 10 juin (M. & M. Boët, Y. Kolbeinsson).

(Circum-méditerranéen). Avec guère plus de 6 oiseaux par an depuis 1981, le Goéland d'Audouin n'a décidément pas l'intention de passer la « vitesse supérieure » dans notre pays. L'étang de Pissevaches et la Camargue restent les sites de prédilection de l'espèce en France métropolitaine.

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (154/107 - 11/5)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).
Charente-Maritime - Breuil-Magné, ad.*, 6 février (P. Trotignon).
Finistère - étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, ad.*, du 22 au 30 mars (C. Hervé, S. Provost).
Loire-Atlantique - St-Nazaire, ad., du 28 novembre au 14 mars 1998, 2 ad., les 5 et 20 décembre (J. Pourreau, Y. & J.-P. Trévoux).
Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., du 13 septembre au 14 mars 1998 (Y. & J.-P. Trévoux).
Moselle - Metz, ad.*, du 9 au 14 janvier (M. Vaslin *et al.*).
Pas-de-Calais - Calais, 1er été*, phot., du 2 au 20 juin (E. Cappe *et al.*) ; Eurotunnel/Coquelles, 2e hiver*, 5 décembre (P.J. Dubois).
Paris - parc floral de Vincennes, ad., 9 janvier au 7 mars, 6 au 27 décembre au moins (M. Zucca *et al.*).
Vendée - pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., du 30 août au 6 septembre (E. Gfeller, A. Thomas, P. Trotignon).
1993 Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., du 19 septembre au 1er mars 1994 (Y. & J.-P. Trévoux) et non 19 et 24 septembre 1993 seulement (*Ornithos* 2 : 10) .
1994 Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., du 26 septembre au 1er octobre au moins (Y. & J.-P. Trévoux).
1995 Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., du 30 août au 24 février 1996 (Y. & J.-P. Trévoux) et non du 17 septembre au 7 octobre 1995 seulement (*Ornithos* 3 : 164)
1996 Finistère - Stang Alarc'h/Brest, ad., du 22 janvier au 10 mars (J. Maout) et non jusqu'au 6 mars seulement (*Ornithos* 4 : 154).
1996 Gironde - Arcachon, 3 ad. du 30 novembre au 21 décembre, puis 2 ad., jusqu'au 24 décembre (C. Feigné, O. & P. Le Gall) et non jusqu'au 14 décembre seulement (*Ornithos* 4-4 : 154) ; 1er hiver*, 29 décembre (A. Rouge).
1996 Loire-Atlantique - St-Nazaire, 2 ad. dont 1 nouveau*, 14 et 15 décembre, 1 seul ad. observé jusqu'au 15 mars 1997 (J. Pourreau, Y. & J.-P. Trévoux).
1996 Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., du 7 septembre au 15 mars 1997 (Y. & J.-P. Trévoux).
1996 Vendée - pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad.*, 25 et 29 août (E. Gfeller, A. Thomas, P. Trotignon).

(Amérique du Nord). À retenir (en dehors de la comptabilité infernale des oiseaux) : 1°) 5 nouveaux oiseaux en 1997 dont un 1er été (à noter un nouveau 1er hiver à Arcachon en 1996...) ; 2°) le retour de l'oiseau de Pénestin (âgé d'au moins 15 ans !) ; 3°) la donnée de Moselle remarquable (première pour la Lorraine) : il n'y aura bientôt plus aucune région française qui n'ait accueilli cette espèce ; enfin 4°) les observations de la région de Calais concernent peut-être les mêmes oiseaux.

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (91/90 - 3/3)

Eure - Léry-Poses, 1er hiver, 25 janvier (Y. Créau).
Nord - Cantin, 1er hiver probable, 1er février (C. Boutrouille).
Vendée - Bourgenay, 1re année, 1er et 2 février (J. & C. Gonin).

Individus présentant les caractéristiques de la race *kumlieni*, appelée « Goéland de Kumlien ».

1996 Nord - Villeneuve-d'Ascq, ad., 28 février (P.-R. Legrand).

(Arctique canadien, Groenland). Classiquement, les arrivées en France sont assez groupées et font suite à des tempêtes prolongées. Les 2 données intérieures sont remarquables. L'observation d'un Goéland de Kumlien est la première pour la France. Elle est comptabilisée avec les Goélands à ailes blanches.

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (11/11 - 1/1)

Gironde - banc d'Arguin/Arcachon, ad., du 7 juin au moins au 22 juin au moins (J.-J. Boubert, O. Chastel, F. Jiguet).

(Méditerranée, Océan indien, Australie). La Sterne voyageuse était devenue un mythe sur le banc d'Arguin, puisque l'oiseau à bec orange découvert en 1974 et identifié comme tel était en fait une Sterne élégante *S. elegans*. Le mythe semble bien tombé cette fois-ci .

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (7+/3 - 0/0)

1995 Gironde - banc d'Arguin/Arcachon, ad., baguée couleur, 12 au 21 juin au moins (V. Primault *fide* P. Grisser).
1996 Gironde - banc d'Arguin/Arcachon, ad., baguée couleur, 8 juin au 8 juillet (J.-J. Boubert, O. Chastel, C. Clément *et al. fide* P. Grisser).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). Il semble que l'oiseau bagué en 1987 n'ait pas été revu depuis 1996 inclus. Cette année-là et la précédente, il a été vu en compagnie d'un poussin. En revanche, depuis 1995 (et jusqu'en 1998 au moins) stationne dans la colonie du banc d'Arguin une sterne au bec rouge-orange, non baguée. Est-ce un oiseau hybride ? Une Sterne élégante ? Aucune description ni photographie ne sont parvenues à ce jour au CHN. Dommage...

STERNE BRIDÉE *Sterna anaethetus* (6/6 - 0/0)

1996 Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, ad., 5 août (D. Tirmarche).

(Des Caraïbes à l'Afrique de l'Ouest, Australie). Date classique pour une grande rareté. C'est aussi la seconde mention pour le cap Gris-Nez après celle du 19 août 1991 !

MERGULE NAIN *Alle alle* (173/1583 - 5/5)

Aude - Port-la-Nouvelle, 11 mai (G. Olioso).
Landes - Lespecier/Mimizan, trouvé mort, phot., 17 janvier (B. Lamothe, C. Raymond).
Manche - Gatteville-le-Phare, 25 octobre (C. Berment, J. Jean Baptiste), 30 octobre (A. & V. Verneau).
Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, 2 octobre (B. Lebrun).
1991 Nord - jetée du Clipon/Loon-Plage, 7 ind., 19 octobre (M. Ameels *et al.*), 56 ind., 20 octobre (M. Ameels *et al.*) ; Dunkerque, 2 ind., 20 octobre (M. Ameels *et al.*).
1996 Landes - Capbreton, 3 ind., 1er novembre, 2 ind., 2 novembre (G. Blake, P. Grisser) et non un seul (*Ornithos* 4-4 : 156), 5 ind., 21 novembre (P.-A. Crochet, R. Julliard, V. Ruffray).
1996 Nord - jetée du Clipon/Loon-Plage, 2 novembre, 290 ind., 13 novembre (N. Selosse) et non 73 ind. seulement (*Ornithos* 4 : 156), 9 ind., 14 novembre (N. Selosse).

(Circumboreal). Dernière année (peu glorieuse) de présence de cette espèce sur la liste nationale du CHN, à l'exception de la remarquable donnée audoise. L'année 1996 restera en revanche dans les annales avec 549 oiseaux (et 372 en 1995).

ENGOULEVENT À COLLIER ROUX *Caprimulgus ruficollis* (0/0 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Barbegal, mâle, trouvé mort, 12 juin (O. Badan, Y. Kayser, H. Kowalski *et al.*)

(Espagne, Afrique du Nord). Première mention du siècle pour cet engoulevent capturé plusieurs fois au siècle dernier (voir note dans le présent numéro).

HIRONDELLE PALUDICOLE *Riparia paludicola* (0/0 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Mas de la Forgette/Crau, 25 septembre (Y. Kayser).

(Afrique du Nord jusqu'en Asie centrale). Première mention française pour cette hirondelle, réputée d'ordinaire sédentaire (bien que les oiseaux d'Asie centrale puissent effectuer des déplacements). L'espèce a été placée en catégorie A de la liste des oiseaux de France. (*Ornithos* 5 : 148-149).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (116/134 - 8/15)

Bouches-du-Rhône - plaine de la Crau/Entressen, de 2 à 4 ind., phot., du 16 au 27 février (G. & M.-N. Balança, E. Didner *et al.*) ; Le Grand-Mas/Entressen, de 1 à 4 ind., phot., du 11 octobre au 7 décembre au moins (P.-A. Crochet, F. Jiguet, Y. Kayser *et al.*) ; Le Vigueirat, 2 ind., 10 et 11 puis 27 novembre (E. Didner, J.-L. Lucchesi).
Corse-du-Sud - étang d'Urbino, 11 janvier (G. Bonaccorsi, B. Recorbet) ; Capitello, 23 octobre (G. Bonaccorsi).

Manche - Cosqueville, 1er hiver, 2 novembre (A. Larousse, A. & V. Verneau).
Pas-de-Calais - Mont-aux-Loups/Audinghen, juv./1er hiver, 18 octobre (P. J. Dubois, G. Flohart, D. Tirmarche).
Var - Fréjus, phot., 28 novembre (C. Bury).
1995 Corse-du-Sud - Capitello, 1er novembre (G. Bonaccorsi).
1996 Bouches-du-Rhône - Mas-Blanc/plaine de la Crau, 2 ind., 2 novembre (M. Thibault, F. Lescuyer).
1996 Corse-du-Sud - Capitello, 8 mai (G. Bonaccorsi).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). La présence désormais régulière (et hivernale) de l'espèce en Crau ne facilitera sans doute pas la comptabilité future, certains oiseaux étant peut-être des « revenants ». À noter aussi la présence régulière et également hivernale en Corse. À ce propos et au vu des observations récentes, l'hivernage de l'espèce en France tient plus de la régularité que de l'exception.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (25/25 - 2/3)

Mâle présentant les caractéristiques de la race *feldegg* :
Ain - Ambronay, 2 ind., 2 mai (A. Bernard).
Aude - Leucate, 24 avril (P. Rousset).

(Balkans, mer Noire). Données assez classiques pour la France, mais – une fois encore – on s'attendrait à observer l'espèce un peu plus tôt sur notre territoire, puisqu'il s'agit d'une sous-espèce de passage assez précoce.

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (6/6 - 0/0)

1996 Corse-du-Sud - Capitello, mâle 1er été, 11 mai (G. Bonaccorsi).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). Lentement, les données s'accumulent en France. Il s'agit, bien entendu, de la première mention corse. Le sud du pays reste pour l'heure le seul endroit où l'on observe cette bergeronnette au printemps.

TARIER PÂTRE *Saxicola torquata* (14/14 - 0/0)

Oiseaux présentant les caractéristiques des races orientales *maura/stejnegeri*, appelées couramment « Tarier pâtre sibérien ou oriental ».

1996 Bouches-du-Rhône - Camargue : Grau-de-la-Dent, fem. 1er hiver, 4 novembre (M. Thibault).

(Mer Blanche, Sibérie). Date classique et première observation pour le Midi méditerranéen.

TRAQUET ISABELLE *Oenanthe isabellina* (5/5 - 1/1)

Finistère - Ile de Sein, 1er hiver, phot., 25 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse).

(De la Grèce et la Roumanie à la Sibérie et la Mongolie). Il s'agit de la 7e mention française et de la troisième pour la Bretagne (et le Finistère, les 2 autres d'Ouessant). C'est également la plus tardive.



7. Traquet isabelle *Oenanthe isabellina*, 1er hiver, Sein, Finistère, octobre 1997 (M. Duquet). *First-winter Isabelline Wheatear.*

TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (10/10 - 9/9)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Galabert, mâle ad., du 4 décembre au 10 février 1998 (P.-A. Crochet, L. Dietrich, Y. Kayser, N. Macaire *et al.*) ; Beauduc, mâle ad., 6 et 7 décembre (P.-A. Crochet, P. Defos du Rau, P. Geniez *et al.*)
Finistère - cap Pen Hir/Camaret-sur-Mer, fem. ad. en plumage d'hiver, 17 novembre (M. Förschler, E. Weber) ; Ouessant, fem./1er hiver, phot., 30 novembre (C. Kerbiriou, I. Le Viol).
Gard - salins d'Aigues-Mortes, fem., phot., 20 mai (P. Defos du Rau, N. Mathon, J. Roché).
Morbihan - île d'Hoëdic, mâle 1er hiver, phot., du 26 au 30 octobre (O. Bardet, Y. Créau, G. Flohart *et al.*) ; Penvins/Sarzeau, mâle 1er hiver, phot., du 29 décembre au 28 janvier 1998 au moins (J. P. Artel, J. Y. Frémont, S. Guérin *et al.*) ; Kerzine/Plouhinec, fem., du 27 décembre au 5 janvier 1998 (O. Bardet, L. Gavory, B. Nicolas *et al.*).
Pas-de-Calais - Audinghen, mâle, 19 novembre (G. Flohart).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). Exceptionnelle année en France, comme ce fut aussi le cas ailleurs en Europe, avec 9 données dont 8 entre le 26 octobre et le 27 décembre. Dans la plupart des cas, les oiseaux ont été largement observés et même souvent photographiés. Il serait intéressant qu'une synthèse européenne de cet événement sans précédent connu voie le jour...

GRIVE DORÉE *Zoothera dauma* (1/1 - 1/1)

Finistère - Ouessant : Stang ar Stiff, 19 octobre (P. Crouzier, D. Desmots *et al.*).

(Sibérie centrale et septentrionale). Cette grive mythique a été revue sur Ouessant, Fnistère, dix ans jour pour jour après sa première apparition sur l'île. Les coïncidences sont parfois troublantes ! Faudra-t-il attendre dix autres années pour y voir la prochaine ?

GRIVE DE NAUMANN *Turdus naumanni* (4/4 - 0/0)

1996 Paris - bois de Boulogne (16e arrondissement), mâle ad., sous-espèce *naumanni*, 7 janvier (J. Penot).

(Sibérie). Comme quoi, on peut observer des oiseaux rares en des lieux curieux ! Celui-ci rappelle une Grive obscure *T. obscurus* vue le 21 mars 1990 dans la Capitale.

GRIVE À GORGE NOIRE *Turdus ruficollis* (8/8 - 0/0)

1996 Drôme - St-Julien-en-Vercors, mâle chanteur, sous-espèce *atrogularis*, 16 mai (R. Gonzalez).

(Sibérie). Si le lieu d'observation est remarquable, la date l'est encore plus ! Elle évoque également celle d'un mâle de Grive obscure *T. obscurus* qui avait chanté dans le Territoire de Belfort du 9 au 23 avril 1995.

8. Pipit de Richard *Anthus richardi*, Le Grand-Mas/Entressen, Bouches-du-Rhône, janvier 1998 (M. Duquet).
Richard's Pipit.



9. Traquet du désert *Oenanthe isabellina*, femelle, Aigues-Mortes, Gard, mai 1997 (J. Roché).
Female Desert Wheatear.







10 & 11. Fauvette épervière *Sylvia nisoria*, 1er hiver, Ouessant, Finistère octobre 1997 (O. Penard).
First-winter Barred Warbler.

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (10/10 - 3/3)

Finistère - Trunvel/Tréogat, 1re année, capturée, phot., 16 octobre (B. Bargain, B. Trébern).
Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat, juv., capturée, phot., 22 septembre (E. Didner, J.-L. Lucchesi, D. Tatin), juv., capturée, phot., 27 septembre (E. Didner, N. Hecker, J.-L. Lucchesi).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). L'espèce est désormais régulière en France ; elle est notée surtout là où le baguage des passereaux paludicoles est intense.

FAUVETTE SARDE *Sylvia sarda* (6/6 - 11/10)

Alpes-Maritimes - jardin botanique de Nice, mâle ad., 5 et 6 avril et fem. ad., 6 et 7 avril (M. & M. Boët, G. Chiquet, B. Lequette *et al.*).
Aude - phare de Leucate, mâle, 13 avril (E. Cozic, R. Debel, J.-P. Meuret) ; Les Coussoules/Leucate, mâle, 13 avril (J.-G. Robillard) ; sémaphore de Leucate, mâle ad., 23 avril (observateur anonyme *fide* P. Orsini).
Bouches-du-Rhône - Camargue : embouchure du Grand-Rhône, mâle, 8 avril (M. Riondet, M. Thibault) ; salins d'Aigues-Mortes, mâle, 9 avril (Y. Kayser, L. Tatin) ; étang de Beauduc, mâle ad., 10 avril (Y. Kayser) ; phare de Beauduc, mâle ad. (le même ?), 11 avril (Y. Kayser, A. Olivier) ; Vaufrèges/Marseille, mâle ad., phot., 24 mai (A. Bastien, R. Crofton).
Var - La Verdière, fem. ad., 1er et 3 juin (J.-M. Bompar, F. Dhermain, P. Orsini *et al.*).

(Méditerranée). Incontestablement, il y a eu ce printemps 1997 un afflux de Fauvettes sardes sur le littoral méditerranéen continental. Il s'est produit surtout dans les premiers jours d'avril (période classique), mais n'a pas laissé de « traces » tangibles à l'exception de ce mâle noté fin mai près de Marseille et de cette femelle début juin dans le Var. Cela n'exclut pas qu'il y ait peut-être eu reproduction quelque part dans la région... L'oiseau de Beauduc n'a été comptabilisé qu'une seule fois.

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (14/14 - 1/1)

Finistère - Ouessant : Le Niou, 1er hiver, phot., 24 octobre (D. Desmots, B. Helsens, O. Penard *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Décidément cette fauvette s'obstine à rester d'une grande rareté en France. Pourtant, en Belgique toute proche, elle est régulièrement capturée (et observée) chaque fin d'été...

POUILLOT BORÉAL *Phylloscopus borealis* (6/6 - 1/1)

Finistère - île de Sein, 19 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*).

(De la Scandinavie au Japon et à l'Alaska). Il s'agit seulement de la 7e donnée française, la précédente remontant à... 1988. Toutes sont des îles bretonnes et singulièrement d'Ouessant.



12. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, mâle 1er hiver, Hoëdic, Morbihan, octobre 1997 (J. Gonin).
First-winter male Desert Wheatear.



13. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, mâle 1er hiver, Sarzeau, Morbihan, décembre 1997 (J.-P. Artel).
First-winter male Desert Wheatear.



14. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, mâle 1er hiver, Sarzeau, Morbihan, janvier 1998 (D. Ledan).
First winter male Desert Wheatear.



15. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, mâle 1er hiver, Sarzeau, Morbihan, janvier 1998 (S. Guérin).
First-winter male Desert Wheatear.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (25/27 - 8/9)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Montilles-du-Platelet, 26 avril (P. Defos du Rau , M. Thibault *et al.*).
Finistère - île de Sein, 20 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, G. Léotard *et al.*) ; Ouessant : Arland, phot., 20 et 21 octobre (P. Crouzier, P.-P. Evrard, O. Penard *et al.*) ; Kerbrad, phot., 22 octobre (O. Penard *et al.*) ; Ar Picard, 2 ind., 23 octobre (P. Crouzier, E. Didner, L. Spanneut *et al.*).
Manche - Gatteville-le-Phare, 22 octobre (V. Verneau).
Pas-de-Calais - Audinghen, phot., 16 octobre (G. Flohart, D. Tirmarche), 23 octobre (G. Flohart).
1996 Finistère - Ouessant : Arland, également 31 octobre (E. Bobbe, F. Delmont, R. Plat) et non 1er novembre seulement (*Ornithos* 4-4 : 157).
1996 Morbihan - île d'Hoëdic, 1er hiver, phot., du 1er au 3 novembre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Six oiseaux avaient été notés en 1994 en France et c'était un record (!). Avec 9 individus cette année, il est battu ! On notera, outre la présence désormais classique dans les îles bretonnes, celle (régulière ?) dans l'extrême nord de la France, la seconde observation normande après celle de l'an passé et enfin – et surtout – cette mention remarquable d'un oiseau en Camargue au mois d'avril !

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (483/518 - 25/29)

Bouches-du-Rhône - Arles, 14 janvier (E. Didner).
Finistère - Ouessant : Park Raden, 2 octobre (Y. Guermeur), 21 au 23 octobre (Y. Guermeur) ; Arland, 19 au 23 octobre (B. Helsens), 2 ind., 24 octobre , 1 seul le 25 octobre (Y. Guermeur) ; Stang ar Stiff/Ker Radennec, 10 octobre (Y. Guermeur), 22 et 23 octobre (C. Sinz) ; Stang Korz, 18 octobre (R. Dohogne et al.) ; Kernigou, 22 octobre (B. Helsens), 2 ind., 23 octobre, 1 seul du 24 au 26 octobre (L. Spanneut) ; Ru Lann, du 20 au 22 octobre (D. Desmots, B. Helsens), 2 ind., 11 novembre, 1 seul du 12 au 18 novembre (Y. Guermeur, F. Noël *et al.*) ; Parkou, 4 ind., le 22 octobre, 1 ind., les 23 et 24 octobre (J.-F. Arcanger, D. Desmots, B. Helsens *et al.*), 2 ind., 26 octobre (E. Didner) ; Stang Meur, 22 octobre (L. Spanneut), 24 octobre (D. Desmots) ; Ar Reun, 23 octobre (J.-P. Delapré) ; Kervasdoue, 23 octobre (C. Sinz) ; Ti Crenn, 26 et 27 octobre (E. Didner, E. Gfeller) ; Prad Meur, 28 octobre (J.-P. Siblet) ; Poull Brac, du 8 au 14 novembre (J. Jean Baptiste, L. Legrand, P. Spiroux *et al.*).
Indre-et-Loire - Yzeures-sur-Creuse, 22 février (P. Cabard, L. Legal).
Loire-Atlantique - Pen Bron/La Turballe, 14 novembre (A. Levesque, P. Péron).
Pas-de-Calais - Framezelle/Audinghen, 25 septembre (G. Flohart), 23 octobre (G. Flohart) ; Audinghen, 18 octobre (L. Chevallier).
1996 Manche - Gatteville-le-Phare, 26 octobre (A. Larousse, A. & V. Verneau).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Année tout à fait classique pour le nombre d'oiseaux (moyenne annuelle de 32, 1981-1997). Également nette arrivée vers le 22 octobre, là encore à une date classique. À noter, un oiseau dès fin septembre dans le Pas-de-Calais, encore un ou deux à la mi-novembre, un en janvier en plein Arles (!) et surtout la surprenante observation hivernale d'un oiseau en Indre-et-Loire !

POUILLOT DE SCHWARZ *Phylloscopus schwarzi* (5/5 - 1/1)

Finistère - Ouessant : Le Niou, 23 octobre (J.-F. Arcanger, P. Crouzier, B. Helsens *et al.*).
1996 Morbihan - île d'Hoëdic, 1er hiver, phot., 26 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont) ; 1er hiver, phot., 29 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, G. Rault *et al.*).

(Sibérie centrale et sud-orientale). On notera les dates groupées pour ces trois données. Celles de 1996 sont intéressantes, car elles montrent manifestement – au travers de documents photographiques de qualité – que deux oiseaux différents se sont succédé sur l'île d'Hoëdic. Peut-être une observation trop brève aurait-elle pu les faire passer pour un seul et même individu. Le « syndrome du deuxième oiseau » n'est sans doute pas (toujours) un mythe !

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (15/15 - 0/0)

1996 Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin-de-Badon, 21 novembre (P. Defos du Rau, H. Kowalski, M. Thibault *et al.*).

(Asie centrale et septentrionale). Troisième donnée pour 1996, en même temps qu'il s'agit de la date la plus tardive connue à ce jour en France et de la première mention pour le Midi méditerranéen.



Légendes des photos ***16*** à ***21*** (page suivante)

16. Alban Larousse dessinant un Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* 1er hiver sur le terrain, Hoëdic, Morbihan, novembre 1996 (M. Duquet). *Alban Larousse watercolouring a Pallas's Warbler in the field.*

17 & 18. Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus*, Ouessant, Finistère, octobre 1997 (O. Penard). *Pallas's Warbler.*

19. Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus*, Audinghen, Pas-de-Calais, octobre 1997 (G. Flohart). *Pallas's Warbler.*

20. Pouillot de Schwarz *Phylloscopus schwarzi*, 1er hiver, Hoëdic, Morbihan, 26 octobre 1997 (M. Duquet). Individu différent de celui de la photo 21. *First-winter Radde's Warbler, a different individual from that in plate 21.*

21. Pouillot de Schwarz *Phylloscopus schwarzi*, 1er hiver, Hoëdic, Morbihan, 29 octobre 1997 (M. Duquet). Individu différent de celui de la photo 20. *First-winter Radde's Warbler, a different individual from that in plate 20.*















22. Bruants à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*, mâles, Camargue, Bouches-du-Rhône, janvier 1997 (E. Didner).
Male Pine Buntings.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

1 – Individus présentant les caractéristiques du groupe *tristis/fulvescens* (4/5 - 2/3)

Aude - Homps, chant., 11 avril (S. Nicolle).

Hérault - étang de Capestang, 2 ind., chant., 3 mars, encore un ind., les 27 mars et 10 avril (S. Nicolle, F. Ronzier).

(Sibérie). Belle série d'oiseaux chanteurs dans le Languedoc-Roussillon. Il semble avéré que cette sous-espèce hiverne en tout petit nombre dans le Midi méditerranéen.

2 – Pouillots véloces de type sibérien (89/92 - 4/5) :

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, du 7 au 13 mars (Y. Kayser, A. Olivier), 2 ind., 1er avril (Y. Kayser), 21 novembre (L. Dietrich, Y. Kayser).

Finistère - Ouessant : Pount Salaun, 13 novembre (F. Noël).

1996 Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat, phot., du 24 novembre au 10 février 1997 (E. Didner, Y. Kayser et al.).

1996 Morbihan - île d'Hoëdic, 28 et 29 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont).

1996 Seine-Maritime - Anneville-Ambourville, phot., 8 décembre (Y. Créau).

(Sibérie). Pattern tout à fait classique pour ces oiseaux.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (178/185 - 8/8)

Finistère - île de Sein, 1er hiver, 19 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*) ; 1er hiver, phot., 24 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse) ; Ouessant : Pount Salaun, du 24 au 28 octobre (C. Sinz) ; Park Raden, 25 octobre (L. Spanneut) ; Stang Porsguen, 1er hiver, 27 et 28 octobre (B. Lebascle, O. Marié) ; Poull Brac, 1er hiver, phot., du 28 octobre au 14 novembre (J. Jean Baptiste, D. Laloi, S. Zucca *et al.*).

Manche - Gatteville-le-Phare, 1er hiver, 25 et 26 octobre (A. & V. Verneau, D. Wooldridge *et al.*).

1996 Bouches-du-Rhône - Camargue : plage de Piémanson, 1er hiver, 21 septembre (Y. Kayser, M. Thibault, C. Tourenq *et al.*) ; Salin-de-Badon, 1er hiver, 4 octobre (H. Kowalski, M. Thibault).

1996 Finistère - Ouessant : Cost Ar Reun, 14 septembre (M. & C. Vergès).

1996 Haut-Rhin - Masevaux, mâle chant., 16 mai (P. Rivière).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Année bien moyenne après les 2 grands « crus » des années précédentes (32 ind. en 1995 et 20 en 1996). Ouessant n'a plus le monopole de l'espèce et la donnée de 1996 d'un mâle chanteur en Alsace en mai est remarquable.

PIE-GRIÈCHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (5/5 - 1/1)

Hérault - Pérols, fem./imm., 29 novembre (G. Balança, P.-Y. Henri).

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). Cette sixième mention française est aussi la plus tardive.

ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (43/115+ - 1/1)

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuve de reproduction) :

Haute-Garonne - Vaudreuille, ad., 5 juin (H. Darmandieu).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). Il n'y a plus guère d'informations nouvelles sur le littoral méditerranéen, mais cette mention, bien à l'intérieur des terres, est remarquable : prémices d'une installation future ?...

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (33/40 - 5/6)

Finistère - pointe du Raz/Plogoff, 1re année, 16 septembre (P. Crouzier) ; île de Sein, 2 juv., phot., 16 septembre (M. Ameels, J.-A. Leclercq, N. Selosse) ; pointe de la Torche/Plomeur, 1re année, 13 octobre (G. Rault) ; Ouessant : aérodrome, juv., 25 octobre (E. Didner, L. Spanneut).

Vendée - île d'Yeu, juv., 8 septembre (D. Desmots).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Belle moisson d'observations avec essentiellement des données automnales. On peut s'interroger pour savoir si l'oiseau de la pointe du Raz était ou non l'un des deux vus le même jour sur Sein, les Étourneaux sansonnets *S. vulgaris* faisant la navette entre l'île et le continent.

MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (9/13 - 1/2)

Corse-du-Sud - Bonifacio, 2 mâles, 29 avril (P. Crouzier).

(Canaries, pourtour de la Méditerranée, Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient). Rien n'indique finalement s'il s'agit ou non du (des) même(s) oiseau(x) qui stationne(nt) à Bonifacio. Les deux oiseaux ont donc été comptabilisés. Il conviendrait de chercher l'espèce ailleurs sur l'île.

ROSELIN GITHAGINE *Rhodopechys githaginea* (3/3 - 2/2)

1993 Haute-Corse - Barcaggio, mâle, 10 mai, 2 mâles, 12 mai (G. Faggio, J. & H. Mole), précédemment refusée (*Ornithos* 2 : 166), acceptée après réexamen.

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Cette remarquable observation a été longuement étudiée par le CHN qui l'a finalement homologuée. La même année, un oiseau avait été vu en avril en Camargue.

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (86/122+ - 6/10)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).

Finistère - Ouessant : Ar Reun, mâle ad. chant.*, 16 septembre (E. Didner) ; Ti Crenn, Kernigou et réservoirs, juv.*, 16 et 17 septembre (E. Didner, Y. Guermeur, L. Spanneut).

Jura - Bois-d'Amont, 3 mâles (2 rouges et 1 gris*) chant., du 26 mai au 19 juin (P. & J.-B. Crouzier, A. Joveniaux, M. & F. Poumarat) ; Les Rousses, 8 mâles (dont 2 rouges) chant. et 1 fem., du 26 mai au 21 juin (P. & J.-B. Crouzier, A. Joveniaux, M. & F. Poumarat).

Morbihan -île d'Hoëdic, 1er hiver*, du 26 au 28 octobre (G. Flohart, T. Fournet, J. Gonin *et al.*).

Haute-Savoie - Sixt-Fer-à-Cheval, 2 mâles* (dont 1 rouge), fem. ad.* et 3 juv.*, phot., du 18 juin au 12 juillet (J.-F. Cornuet, J.-F. Desmet, J.-J. Richard-Pomet).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Après avoir rapidement colonisé certains sites du nord et de l'est de la France, le Roselin cramoisi semble marquer le pas dans le Pas-de-Calais, le Jura et le Doubs. En période postnuptiale, il n'y a à peu près qu'Ouessant qui fournit des données. À noter enfin la reproduction en Haute-Savoie. Comme quoi, tout n'est pas perdu.

BRUANT À CALOTTE BLANCHE *Emberiza leucocephalos* (2/2 - 1/8)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas de l'Auricet, jusqu'à 8 ind. (5 mâles et 3 fem.), du 31 janvier au 14 février (E. Didner, Y. Kayser *et al.*).

(Sibérie). La découverte d'un petit groupe d'oiseaux hivernants en Camargue aura été sans nul doute l'un des événements majeurs de cette année 1997. Il est probable, au vu des données anciennes de baguage dans les années 1960, que l'espèce a hiverné déjà par le passé dans cette région. Le fait-elle régulièrement ? Là est la question...

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (43/43 - 3/3)

Finistère - Ouessant : Le Niou, 29 octobre (M. & S. Zucca).

Hérault - pointe de Salaison, 22 mars (P.-A. Crochet, V. Ruffray, F. & L. Veyrunes).

Puy-de-Dôme - Aubière, 4 et 5 janvier, phot., tué par un chat le 5 janvier (B. Alliot).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Les données hivernales en France sont très rares : décembre 1956/janvier 1957 en Camargue, janvier 1979 en Charente-Maritime, février-mars 1980 dans les Deux-Sèvres, janvier 1988 dans le Finistère, décembre 1991 en Maine-et-Loire. La donnée du Puy-de-Dôme est d'autant plus remarquable qu'elle est très continentale. La fin accidentelle de cet oiseau est regrettable...

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (31/33 - 3/3)

Haute-Corse - Barcaggio, mâle ad., phot., 15 mai (J.-L. Clavier, G. & N. Faggio, G. Gargallo).

Eure - Léry-Poses, mâle ad., 29 mai (B. Nicolas).

Vendée - île d'Yeu, mâle ad., 17 et 19 mai (S. Péres, Y. Saille).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Trois dates conformes au pattern d'apparition printanière en France. « Classique » en Corse, la présence de ce bruant en Vendée et surtout dans l'Eure est remarquable. En fait, on peut sans doute le découvrir partout au printemps.

Annexe 1 - Espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie (catégorie D1)

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (26/27 - 1/1)

Eure - Léry-Poses, ad., 9 et 10 avril (L. Demongin *et al.*).

1996 Bouches-du-Rhône - étang de Berre, ad., 26 juin au moins (Y. Kayser *et al.*).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). L'oiseau de 1996 est en fait resté dans le secteur pendant longtemps (depuis le mois de mars et jusqu'en août), mais le CHN n'a rien reçu à ce sujet...

PÉLICAN GRIS *Pelecanus rufescens* (9/9 - 1/1)

Loir-et-Cher - Averdon, phot., du 28 octobre au 15 novembre au moins (A. Perthuis *et al.*)

(Afrique tropicale et présence quasi continue dans le sud de l'Égypte). Sans doute encore un échappé (mais bien peu d'information reçue à son sujet).

PÉLICAN INDÉTERMINÉ *Pelecanus sp.* (10/10 - 1/1)

Aude - étang de Campignol/Gruissan, 31 mai (S. Burch).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Un Pélican gris de Sigean ?

OIE DES NEIGES *Anser caerulescens* (15/23 - 1/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : St-Seren, 2 ad., du 8 décembre au 4 février 1998 au moins (Y. Kayser, H. Kowalski, M. Thibault *et al.*).

1996 Pas-de-Calais - Compagne-lès-Hesdin, 9 ind., 15 octobre (W. Dutriaux, S. Leroy).

1996 Somme - Hable d'Ault, 3 ad., forme blanche (1 mâle et 2 fem.), phot., du 6 au 18 mai (J. Bellard, J.-C. Robert) et non 6 mai seulement (*Ornithos* 4-4 : 161).

(Amérique du Nord, Groenland, Sibérie orientale). Il est possible que les oiseaux camarguais soient les mêmes que ceux vus auparavant dans le delta de l'Ebre, Espagne (Y. Kayser, com. pers.). La donnée de 1996 dans le Pas-de-Calais (origine inconnue, hélas !) porte à 13 le nombre d'individus vus cette année, non loin du record de 1988 (20 ind.).

CANARD À FAUCILLES *Anas falcata* (1/1 - 1/1)

Marne - lac du Der/Giffaumont, mâle ad., 15 et 16 février (F. Barrault, F. Noël *et al.*).

(Sibérie orientale). Toujours très rare en France, la dernière (et première !) mention de cet anatidé date de novembre et décembre 1986 en Camargue. Quelle origine ?

HARLE COURONNÉ *Mergus cucullatus* (3/3 - 1/1)

Ardennes - Chooz, fem., 11 et 16 janvier (M. Dichamp).

(Amérique du Nord). La première donnée française provenait déjà des Ardennes et déjà le découvreur nommé ci-dessus était l'un des observateurs. Là encore, l'origine est douteuse, d'autant que ce canard est fréquemment tenu en captivité.

GRUE DEMOISELLE *Anthropoides virgo* (6/6 - 0/0)

1996 Aube - lac Temple-Auzon/Radonvilliers, ad., 13 octobre (A. Millon *et al.*).

(De la Turquie au nord de la Chine, Maroc). Une fois passés la surprise de la découverte et le plaisir de l'observation, restent les questions sur l'origine de l'oiseau...

TOURTERELLE MAILLÉE *Streptopelia senegalensis* (4/4 - 1/1)

Finistère - Ouessant, juv., 20 octobre (P. Crouzier, J.-P. Delapré, Y. Guermeur).

1985 en mer - au large de Menton, Alpes-Maritimes (43°25'2"N/7°51'8"E), 2 ind., 13 mai (C. Leboulanger).

(Afrique, Asie mineure, Istanbul). Si l'oiseau ouessantin est sûrement un échappé de captivité (porteur d'une bague colorée), les deux oiseaux qui se sont posés pendant une heure sur un bateau, en pleine mer Méditerranée méritent question.

BRUANT À TÊTE ROUSSE *Emberiza bruniceps* (7/7 - 1/1)

Finistère - Treguennec, mâle ad., 31 août (N. Macheffer).

(Asie centrale et orientale). Date assez tardive, mais il existe plusieurs données de septembre en France pour ce bruant mal aimé de la Liste Officielle...

ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possibles, même si a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

Note importante : les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée sont fournies aux observateurs ayant joint une enveloppe timbrée à leur adresse en demandant à être informés de la décision du CHN.

1997

Puffin semblable *Puffinus assimilis* - Finistère - Ouessant - 12 octobre.
Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Bouches-du-Rhône - Sylvereal - forme « bigarrée », 16 février. Pyrénées-Orientales - Salses et Rivesaltes - forme sombre, du 21 au 28 avril. Vaucluse - Beaumont de Pertuis - phot., du 19 mai au 15 juin.
Oie naine *Anser erythropus* - Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer - 8 février.
Canard à front blanc *Anas americana* - Meuse - Heudicourt - 27 juillet.
Macreuse noire *Melanitta nigra* - Individu présentant les caractéristiques de la race *americana*, appelée « Macreuse à bec jaune » : Charente-Maritime - La Tremblade - mâle ad., 9 juillet.
Garrot d'Islande *Bucephala islandica* - Manche - Cherbourg - 2 fem., du 25 janvier au 9 février.
Élanion blanc *Elanus caeruleus* - Pyrénées-Orientales - Canohès - imm., 23 février.
Busard pâle *Circus macrourus* - Bouches-du-Rhône - Camargue - fem. ad., 22 avril. Pyrénées-Orientales - Salses - mâle imm., 29 mars.
Buse variable *Buteo buteo* - individu présentant les caractéristiques de la race *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » ou « Buse des steppes » : Finistère - Ouessant - ad., phot., 10 octobre. Marne - Songy - 2e année, 7 mai.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Aube - Chavanges - 2 février. Côte-d'Or - Détain - 30 novembre. Landes - Orx - ad., 13 janvier. Marne - Soudron - du 2 au 10 février ; Blaise-sur-Arzillières - fem./imm., 11 avril. Pas-de-Calais - Dannes - imm., du 3 septembre au 13 décembre ; Le Portel - juv., 3 novembre. Haut-Rhin - Ingersheim - juv., 27 septembre. Haute-Savoie - Lugrin - 2 mars ; Lugrin - imm., 3 mars.
Aigle pomarin *Aquila pomarina* - Jura - Neublans-Abergement - 17 août. Vendée - Noirmoutier-en-l'île - imm., 20 juillet.
Aigle sp *Aquila sp* - Haute-Savoie - Lugrin - 2 mars.
Faucon d'Eléonore *Falco eleonorae* - Isère - étang du Grand-Lemps - ad. forme sombre, 9 septembre. Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer - ad. forme sombre, 3 août.
Faucon lanier *Falco biarmicus* - Bouches-du-Rhône - Camargue - imm., 22 février.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Jura - Champrougier - ad., 12 avril. Moselle - Tarquimpol et Gélucourt - 1er et 9 novembre.
Marouette poussin *Porzana parva* - Maine-et-Loire - Villevêque - 30 avril.
Marouette de Baillon *Porzana pusilla* - Haute-Corse - Rogliano - 2 mai. Isère - La Buisse - 6 et 7 avril.
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* - Charente-Maritime - Yves - 7 septembre.
Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* - Seine-Maritime - Antifer/Saint-Jouin-Bruneval - 3 octobre.
Mouette atricille *Larus atricilla* - Finistère - étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern - 1er hiver, 30 octobre.
Mouette de Franklin *Larus pipixcan* - Alpes-Maritimes - Villeneuve-Loubet - 1er hiver, 9 février.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Charente-Maritime - Dolus-d'Oléron - 1er été, 7 juin. Manche - Cherbourg - 2e hiver, 9 janvier. Vendée - Pointe de l'Aiguillon-sur-Mer - 1er été, 15 juillet.
Goéland argenté *Larus argentatus* - Individu présentant les caractéristiques de la race néarctique *smithsonianus* : Vendée - Les Sables d'Olonne - 1er hiver, 2 novembre.
Mergule nain *Alle alle* - Charente-Maritime - St-Denis-d'Oléron - 2 ind., 19 octobre.
Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor* - Manche - Ravenoville-sur-Mer - fem., 11 avril.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Finistère - Ouessant - 18 octobre. Var - Forcalqueiret - 17 avril. Vendée - Noirmoutier-en-l'île - 2 ind., 18 mai.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg* : Jura - Les Deux-Fays - fem., 26 avril. Marne - St-Rémy-en-Bouzemont, phot., 25 avril. Oise - Moru - mâle, 3 mai.
Tarier pâtre *Saxicola torquata* - mâle présentant les caractéristiques des races *maura/stejnegeri* : Gard - Pompignan - 23 février.
Traquet pie *Oenanthe pleschanka* - Vaucluse - Robion - mâle ad., 1er mai.
Grive à gorge noire - *Turdus ruficollis* - Haute-Loire - Craponne-sur-Arzon - 3 ind., race *atrogularis*, 6 décembre.
Fauvette orphée *Sylvia hortensis* - Hérault - St-Maurice-Navacelles - race *crassirostris*, chant., 23 avril.
Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* - Isère - Grenoble - race *orientalis*, 10 et 11 mai.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* gr. *tristis/fulvescens* - Gard - Camargue : Scamandre - 16 mars. Morbihan - Hoëdic, 1er novembre. Pyrénées-Orientales - Canet-en-Roussillon - 30 décembre.
Gobemouche nain *Ficedula parva* - Loire-Atlantique - Carquefou - ad., 20 août. Yonne - Joigny - 24 mars.
Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* - Hérault - Les Cayrelles - 8 juin.
Bec-croisé perroquet *Loxia pytyopsittacus* - Gironde - Lacanau - 22 août.
Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* - Haut-Rhin - Habsheim - fem., 2 octobre.
Bruant de Pallas *Emberiza pallasi* - Meurthe-et Moselle - Macheren - 1 à 5 ind., du 19 octobre au 5 novembre.

1996

Albatros sp *Diomedea sp* - Loire-Atlantique/Morbihan - entre Le Croisic et Hoëdic, 2 août.
Puffin semblable *Puffinus assimilis* - Côtes-d'Armor - phare des Triagoz - 13 septembre.
Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* - Marne - Châtillon-sous-Broué, du 25 février au 15 mars et non le 6 mars seulement (*Ornithos* 4 : 161).
Oie naine *Anser erythropus* - Landes - Orx - 7 décembre.
Sarcelle d'hiver *Anas crecca* - Mâle présentant les caractéristiques de la race américaine *carolinensis*, appelée « Sarcelle de Caroline » : Bouches-du-Rhône - Camargue - phot., 10 avril. Il s'agit d'un hybride probable *crecca* x *carolinensis*.
Fuligule à tête rouge *Aythya americana* - Savoie - lac du Bourget - mâle imm., phot., 19 et 26 octobre.
Buse pattue *-Buteo lagopus* - Sarthe - Saint-Maixent, 2 janvier et non Deux-Sèvres (*Ornithos* 4 : 161).
Aigle criard *Aquila clanga* - Hérault - Villeneuve-les-Maguelone - subad., 13 octobre. Marne - lac du Der/Giffaumont - subad., 3 novembre.
Faucon lanier *Falco biarmicus* - Bouches-du-Rhône - Camargue - 26 décembre.
Marouette poussin *Porzana parva* - Loire - St-Sulpice - 5 juin.
Talève sultane *Porphyrio porphyrio* - Bouches-du-Rhône - Camargue : La Capelière, cris, 1er et 5 avril ; entre Basse-Méjanes et le Mas du Cabassolle, cris, 3 avril, 2 ind., cris, 4 avril.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage - 2 juv., 3 août.
Mouette atricille *Larus atricilla* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage - 1er hiver, 27 octobre.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Pas-de-Calais - Oye-Plage - ad., 24 février ; Le Portel, 1er hiver, 22 novembre. Pyrénées-Atlantiques - Hendaye - ad., 31 décembre.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Finistère - Ouessant - 15 octobre. Pas-de-Calais - Oye-Plage - trouvé mort, phot., 24 novembre.
Locustelle de Pallas *Locustella certhiola* - Côtes-d'Armor - Île Grande/Trebeurden - 3 septembre.
Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus* - Isère - Fontaine - du 24 novembre au 1er décembre.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* gr. *tristis/fulvescens* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin-de-Badon - capt. et phot., 26 novembre. Hérault - Montferrier-sur-Lez - 31 octobre.
Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* - Doubs - Boujeons - fem., 17 août.
Étourneau roselin *Sturnus roseus* - Haute-Marne - Rouvroy-sur-Marne - 20 à 25 ind., 28 octobre.
Bruant nain *Emberiza pusilla* - Manche - Portbail - 10 novembre.

1993

Faucon lanier *Falco biarmicus* - Aube - lac de la Forêt-d'Orient - fem. ad., février.

1992

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* - Bouches-du-Rhône - Pont-de-Gau - mâle, phot., 9 février, précédemment acceptée, à présent refusée après réexamen.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Mâle présentant les caractéristiques de la race *feldegg* : Bouches-du-Rhône - Camargue - 11 avril.
Durbec des sapins *Pinicola enucleator* - Ardennes - St-Laurent - 20 décembre.

1991

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Bouches-du-Rhône - Les Saintes-Maries-de-la-Mer - 1re année, phot., 16 mai.

1986

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* - Bouches-du-Rhône - Pont-de-Gau - mâle, phot., 5 février.

Annexe 3 - Espèces inscrites dans aucune catégorie

Figurent ici les espèces inscrites dans aucune catégorie mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour. Ne figurent pas les espèces pour lesquelles une origine sauvage est totalement invraisemblable.

• **Flamant nain** *Phoenicopterus minor* - Seine-Maritime - marais du Hode/Le Havre, ad., phot., 15 et 16 novembre (O. Benoist, F. Malvaud, L. Philippe *et al.*).

• **Bernache du Canada** *Branta canadensis* - Individus présentant les caractéristiques des races *minima/hutchinsii/parvipes* : Maine-et-Loire - lac de Maine/Angers, 6 ind., 15 et 16 février (J.-C. Beaudoin et al). Pas-de-Calais - Platier-d'Oye/Oye-Plage, 6 ind., phot., 19 avril, puis de 0 à 8 ind. jusqu'à la fin de l'année au moins (P.J. Dubois, T. Fournet et al.). Vendée - St-Denis-du-Payré, ad., 16 mars au moins (C. & J. Gonin, A. Thomas).

Le CHN souhaite recueillir les données de « petites » Bernaches du Canada et incite les observateurs à envoyer toute description de ce type d'oiseau.

• **Sarcelle cannelle** *Anas cyanoptera* - Essonne - Bruyères-le-Chatel, mâle ad., 24 juillet (E. Le Roy).

• **Tourterelle masquée** *Oena capensis* - Aude - Cuxac d'Aude, fem. ad., tuée à la chasse, 2 novembre (A.J. & V. Loiseau).

REMERCIEMENTS

Le CHN remercie vivement ceux qui, au cours de l'année 1997, ont contribué à son bon fonctionnement :
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière nécessaire au Comité et à son Secrétariat, ainsi que la revue *Ornithos* pour la prise en charge des photos couleur qui illustrent ce rapport,
- Marc Duquet, Paul Lehman et Keith Vinicombe pour leurs avis d'experts, Christian Dronneau, Pascal Grisser, Yvon Guermeur, Yves Kayser, Robert Lécaille, Christian Riols qui nous ont apporté des informations complémentaires ainsi que tous les responsables de Centrales Ornithologiques ou de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) qui nous ont transmis des données,
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

SUMMARY

Rare birds in France in 1997. *During this year, two new species have been added to the French List : Greater Black-headed Gull* Larus ichtyaetus *and Plain Martin* Riparia paludicola. *It also includes the first record of Red-necked Nightjar* Caprimulgus ruficollis *for this century, the second-ever record of Falcated Duck* Anas falcata *(Category D), the fifth record of Bulwer's Petrel* Bulweria bulwerii *and Stilt Sandpiper* Micropalama himantopus . *In 1996, a new sub-species was accepted for France, Kumlien's Gull Larus* Glaucoides kumlieni.
Record numbers in 1997 include a total of 3 Green-winged Teals Anas crecca carolinensis, *8 Ring-necked Ducks* Aythya collaris, *73 Rough-legged Buzzards* Buteo lagopus, *5 Sociable Plovers* Chettusia gregaria, *3 White-rumped Sandpipers* Calidris fuscicollis, *9 Desert Wheatears* Oenanthe deserti, *10 Marmora's Warbler* Sylvia sarda *outside Corsica, 9 Pallas's Warblers* Phylloscopus proregulus *and 8 Pine Buntings* Emberiza leucocephalos *together. At last, a Red-breasted Goose* Branta ruficollis, *ringed in 1979 in Siberia, was recovered (shot) in France in 1984.*
The two first numbers in parentheses following the scientific name of each species indicate respectively the total numbers of records and birds for 1981-1996 period : the others numbers represent the same for the current year (1997).

Comité d'Homologation National, LPO,
La Corderie Royale, BP 263, 17305 Rochefort Cedex



23. Gobemouche nain *Ficedula parva*, 1er hiver, île de Sein, Finistère, octobre 1997 (M. Duquet) *First-winter Red-breasted Flycatcher.*