Les oiseaux rares en France en 1998

Rapport du Comité d'Homologation National

par Jean-Yves Frémont et le CHN



Introduction

Il s'agit du 17e rapport du Comité d'Homologation National (CHN) qui couvre l'année 1998. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 1998 est de **483** (baisse sensible par rapport à l'année précédente, en raison du retrait de quatre espèces le 1er janvier 1998). Cela représente néanmoins un travail toujours très important pour les membres, le Secrétaire et le Président du CHN. Le taux d'acceptation est de 82 %, chiffre inférieur à celui de 1997 mais comparable à celui des années précédentes. En 1998, c'était le poste de Jean Sériot, dont l'intérim de deux ans avait été assuré par Yvon Créau depuis sa démission, qui était vacant. Pour lui succéder, Yves Kayser a été élu. En outre, Yvon Créau s'est vu attribuer le poste de Thierry Fournet, démissionnaire, ce qui lui permettra d'effectuer la totalité de son mandat. En 1998, le CHN se composait donc des membres suivants : Yvon Créau, Pierre Crouzier, Philippe J. Dubois (Président), Guy Flohart, Yves Kayser, Dominique Michelat, Serge Nicolle, Alain Rouge ainsi que Jean-Yves Frémont (Secrétaire, non-votant). Un poste a été pourvu en 1999 et un autre doit l'être en 2000. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du Secrétaire du CHN avant le *5 mars 2000*.

Travaux et décisions du CHN

Il a déjà été publié la liste des espèces qui, à compter du 1er janvier 2000, verront leur statut modifié vis-à-vis de l'homologation nationale (voir *Ornithos* 6-3 : 131), à savoir l'Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*, qui ne sera plus soumis à homologation dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude (il le reste ailleurs, afin de suivre sa progression éventuelle), et le Vautour moine *Aegypius monachus* dans les Cévennes. En revanche, le Traquet rieur *Oenanthe leucura*, disparu de la faune française en tant que nicheur, sera à nouveau soumis à homologation sur tout le territoire.

Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (nouveau modèle) dès que possible après l'observation et de préférence avant le 31 décembre de l'année en cours. Ceci évite la publication très tardive de données anciennes. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s).

Les faits marquants

En 1998, trois espèces ont été ajoutées à la Liste Française, le Bécassin à bec court *Limnodromus griseus*, l'Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor* et le Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii*, tandis que deux autres l'ont été pour 1997, l'Accenteur à gorge noire *Prunella atrogularis* et la Paruline obscure *Vermivora peregrina*. En outre, le Chevalier semipalmé *Catoptrophorus semipalmatus* enregistre, en 1998, sa première mention pour le XXe siècle (qui est aussi la seconde mention française). L'année 1998 a vu également le troisième Garrot albéole *Bucephala albeola*, la deuxième Locustelle de Pallas *Locustella certhiola*, les troisième et quatrième mentions pour le Pluvier fauve *Pluvialis fulva* et le Bécasseau d'Alaska *Calidris mauri*, alors que la Paruline rayée *Dendroica striata* et la Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* enregistrent leur deuxième donnée respectivement en 1995 et 1994.

Des effectifs records ont été notés pour les espèces suivantes : 4 Canards à front blanc *Anas americana*, 9 Fuligules à bec cerclé *Aythya collaris*, 92 Érismatures rousses *Oxyura jamaicensis*, un groupe de 4 Outardes barbues *Otis tarda*, 5 Vanneaux sociables *Vannellus gregarius*, 13 Bécasseaux tachetés *Calidris melanotos*, 117 Labbes à longue queue *Stercorarius longicaudus*, 3 Bergeronnettes citrines *Motacilla citreola*, 4 Pouillots verdâtres *Phylloscopus trochiloides*, un groupe de 5 Bruants nains *Emberiza pusilla* chanteurs. Enfin le plus long séjour en France du Plongeon à bec blanc *Gavia adamsii* a été enregistré, soit 128 jours.

Liste systématique des données acceptées (catégories A et C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.

2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre de données homologuées depuis 1981 (1998 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers, la même chose pour 1998.

3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.

4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).

5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.

6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).

7. Date(s) d'observation.

8. Observateur(s), sauf exception, limité à 3 (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe ou dessinateur).

9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.

10. La séquence taxonomique est celle de Voous (1978, *The List of the Birds of the Western Palearctic*), modifiée par la *Liste des Oiseaux de France* (CAF 1997).

11. Les données concernant les races sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la race concernée.

12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 1998. Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Pouillot verdâtre - un le 27 septembre 1998 à Hoëdic, Morbihan (S. Guérin & G. Rault, *in* Frémont et le CHN 1999).

PLONGEON À BEC BLANC *Gavia adamsii* (7/7 - 1/1)

Bas-Rhin - Illkirch-Graffenstaden et Plobsheim, 1er hiver, phot., du 9 décembre au 15 avril 1999 (E. Buchel, G. Paulus, R. Jordan).

(Sibérie, Alaska). Non signalé depuis 1995, cet oiseau, bien rare en France, a suscité un bel engouement parmi les ornithologues venus nombreux pour l'observer. Il faut dire que la durée exceptionnelle de son séjour, et sur un site intérieur (troisième mention de ce type), sont tout à fait remarquables.

OCÉANITE DE WILSON *Oceanites oceanicus* (6/6 - 1/1)

Morbihan - entre Belle-Île-en-Mer et Quiberon, 10 octobre (G. Olioso).

(Îles de l'Antarctique. En période internuptiale, tous les océans, y compris l'Atlantique). Toujours aussi peu observé en France (dernière donnée de 1994), cet océanite serait sans doute à rechercher plus activement en fin d'été au large des îles d'Ouessant et de Sein, zone très fréquentée par les « satanites » aux dires des pêcheurs du secteur (Y. Guermeur, comm. pers.).

AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (23/15 - 2/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas d'Agon et Basses-Méjanes, ad. race *gularis*, forme sombre, du 12 mai au 10 août (A. Chevalier, L. Dietrich, Y. Kayser *et al.*).

Charente-Maritime - Moëze, ad. race *gularis*, forme sombre, phot., du 26 avril au 12 mai (N. Boileau, P. Delaporte *et al.*).

1987 Corse-du-Sud - Capitello, race *gularis*, forme sombre, phot., 29 et 30 mai (G. Bonaccorsi).

(Afrique, Asie). L'oiseau camarguais est probablement celui déjà vu sur ce secteur en 1996 et 1997. Celui de la réserve de Moëze-Oléron constitue en revanche la première donnée pour le site. Quant à l'aigrette de Corse, il est intéressant de constater qu'elle a été vue une année où l'espèce ne fut pas observée en Camargue.

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (28/72 - 1/1)

Somme - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, ad., 24 mai au moins (A. & J. Piette).

1997 Haute-Marne - lac du Der/Arrigny, 1er hiver, du 23 octobre au 7 novembre (P. Albert, E. Le Roy, C. Riols).

1993 Finistère - Loc'h ar Stang/Tréguennec, 3 ind., du 20 au 28 novembre (A. Desnos, G. Rault).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). La date tardive de l'oiseau de baie de Somme jette un doute sur son origine. Beaucoup plus conformes au pattern d'apparition de l'espèce en France sont en revanche les données de 1997 et 1993, cette dernière étant remarquable par la région et le nombre d'individus.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (20/12 - 4/2)

Individus présentant les caractéristiques de la race *nigricans*, appelée « Bernache (cravant) du Pacifique » :

Charente-Maritime - Île de Ré : Saint-Clément des Baleines, du 22 décembre au 31 janvier 1999 au moins (P. Trotignon).

Loire-Atlantique - traicts du Croisic et de Pen Bé/Assérac, ad., phot., du 11 novembre au 9 mars 1999 (J.-L. Dourin, Y. Trévoux).

Morbihan - Séné et Conleau/Vannes, ad., du 2 au 23 janvier (O. Bardet, L. Gavory, J.-M. Gillier).
Nord - Le Clipon/Loon-Plage, ad., 1er novembre (R.-M. Lafontaine, J.-A. Leclercq *et al.*).
(Amérique arctique, Sibérie orientale). Les oiseaux de Charente-Maritime et de Loire-Atlantique sont connus. Le golfe du Morbihan a déjà hébergé un adulte en 1990, 1991 et 1994 ; quant à l'oiseau du Nord, il a été vu en vol vers le sud-sud-ouest dans un groupe de 80 Bernaches cravants au cours d'une journée de passage important de bernaches à la jetée du Clipon.

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (16/17 - 3/4)

Charente-Maritime - marais d'Yves, mâle, du 6 février au 22 mars (A. Doumeret, P.-P. Evrard, P. Trotignon *et al.*).
Loire-Atlantique - lac de Grand-Lieu/Saint-Lumine-de-Coutais, mâle ad., 19 et 24 mars (S. Reeber).
Seine-Maritime - marais du Hode/Le Havre, mâle et fem. ad., du 20 au 26 mars (O. Benoist, L. Philippe, V. Quertier).
(Amérique du Nord). Bonne année pour ce canard peu fréquemment observé en nos contrées. La concordance des dates d'arrivées (classiques) des oiseaux de Grand-Lieu et du Hode est frappante. À noter que les oiseaux de baie de Seine étaient appariés. Quant à l'oiseau d'Yves, des bruits ont couru qu'il pourrait s'agir d'un échappé de captivité. Comme d'habitude, difficile de faire le tri...

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (21/18 - 1/1)

Mâles présentant les caractéristiques de la race américaine *carolinensis*, appelée « Sarcelle à ailes vertes » ou « S. de Caroline » :
Finistère - Goulven, ad., du 2 au 26 février (F. Barrault, D. Combrisson).
1997 Finistère - étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, ad., du 20 octobre au 1er avril 1998 (A. Desnos, E. Didner).
1996 Finistère - étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, ad., du 23 février au 27 mars (A. Desnos) et non du 26 février au 18 mars uniquement (*Ornithos* 5-4 : 155), du 30 décembre au 3 février 1997 (A. Desnos).
1994 Finistère - Loc'h ar Stang/Tréguennec (A. Desnos).
(Amérique du Nord). *Quid* de l'habituel oiseau de Plonéour-Lanvern au cours de l'hiver 1998/1999 ?

SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors* (27/29 - 2/3)

Loire-Atlantique - Saint-Mars-du-Désert, mâle ad., phot., du 25 avril au 4 mai et fem., phot., du 3 au 7 mai (R. Balej, S. Dulau, Y. Trévoux).
Pas-de-Calais - Ardres, mâle ad., du 4 juin au 28 juillet (P.J. Dubois, G. Flohart).
(Amérique du Nord). C'est en observant le mâle présent depuis une semaine sur ce site de Loire-Atlantique que la femelle fut découverte, apparemment appariée à un mâle de Canard souchet. La suite de l'histoire n'est pas connue ! Quant à la donnée du Pas-de-Calais, il s'agit de l'une des rares mentions estivales en France.

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (63/51 - 8/9)

Ain - Chalamont, mâle ad., du 8 au 22 mars (P. & J.-B. Crouzier *et al.*).
Bouches-du-Rhône - Camargue : bassins de décantation des Saintes-Maries-de-la-Mer et étang du Vaccarès/Roquemaure, mâle ad., du 2 novembre au 28 février 1999 (P. Crouzier, Y. Kayser, M. Thibault *et al.*).
Eure - Léry-Poses, mâle ad., du 5 novembre au 6 janvier 1999 (L. Demongin *et al.*).
Loire-Atlantique - Petit Mars, mâle et fem. ad., 31 mars (S. Dulau).
Moselle - Benestroff, 4 ind., 21 et 22 novembre (G. Joannès, V. Palomares *et al.*).



1. Bernache cravant du Pacifique (à droite) *Branta bernicla nigricans*, traicts du Croisic, Loire-Atlantique, décembre 1998 (J.-L. Dourin). *Brent Goose of race* nigricans.

Yvelines - Saint-Quentin-en-Yvelines, mâle ad., 19 avril (E. Fenart-Beghin, L. Veyrunes).
Somme - Hâble d'Ault, mâle ad., 4 et 5 avril, (J.-L. Bigorne, C. Louvet).
Vendée - Parc Soubise/Mouchamps, mâle ad., du 23 janvier au 28 mars (A. Fossé, T. You), oiseau présent depuis novembre 1997 sur l'étang des Boucheries/Les Landes-Genusson (le même qu'en 1996).
1997 Eure - Léry-Poses, mâle ad., du 20 décembre au 26 avril 1998 (L. Demongin, R. Lery *et al.*), mâle ?, du 27 octobre au 26 février 1998 (L. Demongin *et al.*).
1996 Finistère - Pont-l'Abbé, fem., 25 décembre (J. Maout).
1994 Finistère - Le Relecq-Kerhuon, mâle, du 19 au 31 décembre (Y. Créau, J. Maout).
1992 Finistère - Pont-Croix, mâle, 25 novembre, puis 2 mâles, phot., du 4 décembre au 4 avril 1993 (A. Desnos, P. Hamon, G. Rault), et non du 1er janvier au 4 avril 1993 uniquement (*Ornithos* 2-1 : 4).

(Amérique du Nord). Parmi les quatre individus de Moselle (observation somme toute surprenante), trois présentaient des caractères de femelles ; il est néanmoins permis d'être réservé sur le sexe de ces oiseaux à cette date (mâles en éclipse ou immatures possibles). Les oiseaux de l'Eure, de la Somme et de Vendée sont des revenants. À noter la présence simultanée de deux individus sur les plans d'eau de l'Eure dont un oiseau présentant à la fois des caractères de mâle et de femelle, sans signe apparent d'hybridation (mue arrêtée ?).

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (17/15 - 3/3)

Finistère - Ouessant : Yusin et An Aod Meur, fem. 1er hiver, phot., du 23 octobre au 3 novembre (G. Flohart *et al.*).
Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, fem. 1er hiver, phot., du 29 décembre au 9 janvier 1999 (P. Camberlein *et al.*).
Vendée - pointe du Grouin du Cou/La Tranche-sur-Mer, fem. imm., 29 et 30 décembre puis 30 janvier 1999 (A. Thomas, P. Trotignon).

(Amérique du Nord). Manifestement des nouveaux venus en Europe ; où sont passés les mâles adultes de ces dernières années sur le littoral centre-atlantique ?

GARROT ALBÉOLE *Bucephala albeola* (1/1 - 1/1)

Cantal - Espinassol - Ytrac, mâle ad., 5 novembre (H. Verne).

(Amérique du Nord). Troisième mention française, la dernière remontant au 30 janvier 1987 dans le nouvel avant-port de Dunkerque, Nord. À signaler qu'un autre oiseau, non encore soumis au CHN, aurait fréquenté le lagunage de Rochefort, Charente-Maritime, à la même époque... Quoi qu'il en soit, à l'instar de nos proches voisins, la CAF a reconsidéré le statut de cette espèce en France : précédemment en catégorie D1 (espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie), elle vient d'être inscrite en catégorie A de la liste des oiseaux de France (voir « *En direct de la CAF* » dans le présent numéro).

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (174/338 - 24/92)

Charente-Maritime - lagunage de Rochefort-sur-Mer, du 12 au 14 novembre, éradiqué, (C. Bouchet).
Eure - Léry-Poses, fem., du 7 au 29 septembre, fem. (ou mâle en éclipse) le 21 septembre (B. Nicolas, L. Demongin), mâle ad., du 6 novembre à mars 1999 (L. Demongin), mâle imm., du 13 décembre à mars 1999 (L. Demongin).
Finistère - étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, fem., 16 février (A. Desnos) ; Trunvel/Tréogat, 2 ind., 5 septembre (A. Desnos).
Indre - étang du Gabriau/Lingé, 2 fem. imm., 1 oiseau éradiqué, du 11 au 13 février, (F. Bourguemestre).



2. Macreuse à front blanc *Melanitta perspicillata*, femelle 1er hiver, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, décembre 1998 (P. Camberlein).
First-winter female Surf Scoter.

Loir-et-Cher - étang de L'Arche/Chémery et étang de Sudais/Pontlevoy, fem./imm., du 11 au 16 octobre (F. Pelsy, A. Perthuis).
Loire-Atlantique - Mazerolles/Saint-Mars-du-Désert, fem., 13 et 15 février (C. Bellanger, S. Dulau) ; lac de Grand-Lieu : maximum de 10 mâles et de 21 fem. entre le 16 et le 24 janvier, de 12 mâles et de 24 fem. entre le 11 et le 26 février, 14 mâles et 9 fem. le 6 mars (S. Reeber) ; Malsaine/Saint-Lumine-de-Coutais, 2 mâles, 20 au 22 mai (Charpentier) ; saison de nidification au lac de Grand-Lieu : 8 nichées (32 poussins), une trentaine d'ad., courant juillet (S. Reeber).
Maine-et-Loire - étang des Hayes/Longué-Jumelles, fem. ad., du 2 septembre au 21 octobre (J.-C. Beaudoin, D. Bizien).
Manche - Les Moitiers-en-Bauptois, fem., 31 janvier (J. Desmares).
Mayenne - étang de la Grande Métairie/Jublains et étang de Beaucoudray/Aron, mâle ad., 16 avril, 25 juin et 2 juillet (J.-F. Arcanger, S. Legrand, L. Morlier).
Oise - Pont-Point/Moru, fem., 5 décembre (P. Malignat).
Deux-Sèvres - étang de la Grue/Moutiers-sur-Argenton, du 6 au 16 juin (M. Fouquet).
Somme - Hâble d'Ault, 2 ind., septembre (L. Gavory).
Vendée - La Tranche-sur-Mer, du 28 août au 6 septembre, éradiqué (A. Thomas), 4 fem./imm., 3 oiseaux éradiqués, 8 et 9 septembre (J. Gonin, A. Thomas).
1997 Eure - Léry-Poses, mâle ad., 13 au 26 juillet (C. Gérard, B. Nicolas).
1997 Finistère - étang de Saint-Vio/Tréguennec, fem., du 20 décembre au 7 février 1998 (A. Desnos).
1997 Ille-et-Vilaine - barrage de la Rance/Richardais, de décembre au 13 janvier 1998 (Melec).
1997 Indre-et-Loire - étang des Ténières/Saint-Nicolas-de-Bourgueil, du 17 au 22 novembre (S. Vallée).
1997 Rhône - Miribel-Jonage/Meyzieu, fem./imm., 25 et 26 octobre (T. Besançon).
1997 Vendée - étang des Boucheries/Les Landes-Genusson, fem. ad., du 19 au 23 décembre (S. Merand).
1996 Finistère - étang de Trunvel/Tréogat, fem./imm., du 24 décembre au 9 février 1997 (A. Desnos).
1995 Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, fem./imm., 29 novembre (Y. Kayser, M. Thibaut).
1995 Finistère - étang de Kergalan/Tréogat, mâle, 25 août (A. Desnos) ; Le Drennec/Sizun, mâle et fem., du 19 au 25 novembre puis 16 décembre (J. Maout, J.-Y. Péron).
1994 Finistère - étang de Trunvel/Tréogat, fem./imm., 13 novembre (A. Desnos).
1993 Finistère - étang de Trunvel/Tréogat, imm., 4 décembre (A. Desnos).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). Le nombre d'individus vus annuellement en France reste élevé depuis 1994. Comme l'an dernier, rappelons qu'un programme d'éradication a été mené en France et ailleurs en Europe et que le Ministère de l'Environnement a confié au CHN le soin de publier toutes les informations recueillies. C'est pourquoi, malgré le nombre important de données annuelles, le Comité continue à homologuer l'espèce. La comptabilité du lac de Grand-Lieu n'est pas simple, seuls les maxima ont été considérés, à savoir une donnée de 14 mâles et de 24 femelles et une donnée de 32 poussins, soit 2 données pour 70 oiseaux, ce qui contribue à faire de 1998 une année record pour cette espèce (92 individus, chiffre sous-estimé puisqu'il est difficile de faire la part des hivernants/migrateurs et des nicheurs à Grand-Lieu). Par ailleurs, la baie d'Audierne semble accueillir le même oiseau depuis 1993, c'est pourquoi un seul a été comptabilisé en 1998 sur les deux individus présents.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (33/59 - 6/10)

Ain - au nord de Bourg-en-Bresse, 14 mai (P.-P. Evrard).
Aveyron - Roussennac, 13 avril (T. Biteau, V. Courrege).
Loire-Atlantique - Saint-Hilaire-de-Chaléons, du 13 mai au 2 août (J. & A. Gernigon, G. Piton *et al.*).
Landes - localités tenues secrètes, 3 couples nicheurs n'ont produit qu'un seul jeune à l'envol (G. Blake, P. Grisser).
Saône-et-Loire - Sens-sur-Seille, 13 mai (A. Desbrosse).
« **Grands Causses** » - département tenu secret, 1 couple produit 4 jeunes à l'envol (L. Malthieux).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). Ce qui est bien sûr à souligner cette année, c'est la reproduction réussie de ce nouveau couple dans les Grands Causses (voir *Ornithos* 6-1 : 50-52) ; la diminution d'un couple dans les Landes n'est pas forcément réelle mais traduit sans doute un déplacement des oiseaux (G. Blake & P. Grisser, comm. pers.). Les données à un jour d'intervalle de la Saône-et-Loire et de l'Ain concernent sans doute le même individu.

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (253/198 - /)

1997 Aube - lacs aubois, ad., du 24 octobre au 31 décembre au moins (C. Riols).
1997 Loire - Magneux-Haute-Rive, imm., du 11 novembre au 7 décembre au moins (B. Di Natale, R. Faure *et al.*).
1997 Marne - lac du Der/Chantecoq, ad., du 30 octobre au 23 novembre, 1er hiver, du 29 octobre au 31 décembre au moins, ad., du 9 novembre au 31 décembre au moins, ad., du 14 novembre au 31 décembre au moins, imm. de 2e hiver, du 26 au 31 décembre (C. & R. Riols, E. Le Roy, B. Theveny *et al.*) ; Outines, mâle ad., jusqu'au 11 mars (C. Riols, E. le Roy) et non subad., 1er mars (*Ornithos* 5-4 : 157), il s'agit en fait d'un des deux ad. hivernant depuis le 30 octobre 1996 (*Ornithos* 4-4 : 146).
1997 Meurthe-et-Moselle - Neuves-Maisons, ad., 19 mars (J.-B. Schweyer).
1997 Savoie - Lucey, ad., 6 et 9 février (O. Gibaru) et non dans le Rhône (*Ornithos* 5-4 : 157).

(Europe septentrionale et centrale, Islande, sud-ouest du Groenland). L'oiseau de la Loire est sans doute celui qui avait longuement hiverné l'an passé à Chambéon. Rappelons que l'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 1998. Les nouvelles observations de 1997 portent la comptabilité des pygargues à 253 données pour 198 individus.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (28/28 - 3/2)

Aube - Poivres, mâle ad., 21 mars (J.-P Couasné).
Loire-Atlantique - Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, mâle ad., 26 février (S. Reeber).
Marne - Soudé, mâle ad., 21 mars (J.-P Couasné), le même oiseau que celui de l'Aube.

(Asie centrale, à l'ouest jusqu'en Roumanie). Après une année blanche, 1998 renoue avec un nombre de données plus habituel, bien que l'observation de Loire-Atlantique soit, quant à elle, à une date tout à fait extraordinaire tant au plan français qu'européen.

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (10/10 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » ou « Buse des steppes » :

Marne - lac du Der/Giffaumont-Champaubert et Arrigny, 8 et 15 novembre (F. Barrault, B. Isaac).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B.b. buteo*). Cette région semble accueillir régulièrement cette sous-espèce en hiver. Attention ! une grande partie des individus reste difficile à déterminer.

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (5/5 - 0/0)

1997 Bouches-du-Rhône - Camargue : Grenouillet, ad., race *cirtensis*, du 24 décembre au 18 mars 1998 (L. Dietrich, Y. Kayser *et al.*).
1995 Corse-du-Sud - Baleone, 3 septembre (G. Bonaccorsi) et non le 3 novembre (*Ornithos* 5-4 : 158).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Il s'agit de la première mention française de cette race d'Afrique du Nord, observation bien circonstanciée.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (240/259 - 5/6)

Doubs - Avoudrey, fem. ad., 31 janvier (D. Michelat) ; La Rivière-Drugeon, mâle ad. et imm. 1re année, du 4 au 11 février (P. Gayet, D. Michelat, M. Montadert).
Lozère - sommet du mont Aigoual, 1er hiver, 9 décembre (L. Malthieux).
Nord - Thumeries, 1er hiver, 24 et 25 janvier (C. Capelle, I. Willem) ; Warneton, 1er hiver, phot., 14 et 15 février (C. Capelle, I. Willem).
1997 Pas-de-Calais - Pont-d'Ardres, 1er hiver, 1er janvier (G. Flohart), date précédemment omise (*Ornithos* 5-4 : 158) ; Mont-Bernenchon, du 30 décembre au 16 janvier 1998 (D. Arnould).
1997 Seine-Maritime - Le Havre, 1er hiver, 28 octobre (V & G. Simont).
1996 Meuse - Brocourt-en-Argonne, 11 décembre (G. Suy).
1987 Loire-Atlantique - Vioreau/Joué-sur-Erdre, phot., 8 septembre (Y. Garino), précédemment refusée, maintenant acceptée après révision.
1987 Moselle - entre Postroff et Fénétrange, 30 janvier et 6 février (P. Sornette), précédemment refusée, maintenant acceptée après révision.
1986 Pas-de-Calais - Merlimont, 29 novembre (G. Flohart, F. Lambert, G. Terrasse) précédemment refusée, maintenant acceptée après révision.

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Retour à la normale, après l'invasion sans précédent du début de l'année 1997, année qui compte désormais 66 données pour 75 individus ! On notera l'observation de Lozère dans un secteur pour le moins inhabituel. Quant à l'observation de 1987 en Loire-Atlantique, elle constitue désormais la mention la plus précoce enregistrée en France.

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (100/74 - 10/4)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Bardouine, subad./ad., 29 janvier (L. Dietrich, Y. Kayser) ; étang de Cosécannière, 1er hiver, 5 et 20 février (E. Didner), subad./ad., 20 février (E. Didner) ; Le Vigueirat, 2 dont 1 subad., du 10 février au 10 mars (G. Massez, D. Tatin), juv., 24 novembre puis du 17 décembre au 25 janvier 1999 (E. Didner, J.-L. Lucchesi), l'oiseau vu précédemment à Paudure et à Romieu, ad., du 12 décembre au 25 janvier 1999 (Y. Kayser *et al.*) ; étang Redon/Bois de la Ville, ad., 14 janvier (E. Didner), subad., du 1er novembre au 1er janvier 1999 au moins (P. Geniez, Y. Kayser *et al.*) , revu une fois au Vigueirat le 7 novembre (G. Massez) ; Peaudure et Romieu, juv., du 16 au 21 novembre (N. Beck, J.-P. Paul) ; Tour du Valat, juv., 16 décembre (A. Johnson, L. Zimmermann), l'oiseau vu précédemment le 24 novembre au Vigueirat.

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Difficile de faire la part des choses en Camargue entre les revenants, les oiseaux baladeurs et ceux qui n'effectuent qu'un bref séjour : quatre nouveaux oiseaux ayant visité la région est à considérer comme une possibilité... Par contre, où sont passés les aigles des autres secteurs traditionnels comme la Lorraine ou les Landes ?

FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (39/44 - 4/3)

Hors Crau :

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, mâle ad., 27 septembre (A. Blasco).
Haute-Corse - Broncole/Biguglia, mâle imm., 1er mai (D. Ducruet, R. Jordan, D. Ricol).
Gard - Générac, de 15 à 18 ind., 30 septembre (R. Dallard, J.-L. Hentz).
Pyrénées-Orientales - Eyne, mâle ad., 22 septembre (W. Belis *et al.*).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). En Crau, sur un total de 50 couples nicheurs,

27 couples ont produit 92 jeunes à l'envol (J. Sériot, comm. pers.). Il est fort probable que le groupe du Gard corresponde à la dispersion des oiseaux de Crau.

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonorae* (248/328 - /)

Corse-du-Sud - Capitello, 18 avril (G. Bonaccorsi) et non 18 avril 1997 (*Ornithos* 5-4 : 160).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Aucune mention cette année, en dehors du pourtour méditerranéen dont les observations ne sont plus soumises au CHN depuis le 1er janvier 1998 (elles le restent bien sûr ailleurs) ; la donnée corse de 1998 n'est donc pas comptabilisée ; un article sur le statut de ce faucon en France a récemment été publié (*Ornithos* 6-3 : 119-121).

FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (23/23 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Vigueirat/Mas Thibert, juv., du 8 novembre au 24 janvier 1999 (Y. Kayser, J.-L. Lucchesi, G. Massez *et al.*).
Doubs - Doubs, subad./ad., 18 octobre (D. Michelat *et al.*).
1997 Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas Thibert, juv., 2 mars (E. Didner).
1995 Corse-du-Sud - Capitello, imm., 3 décembre (G. Bonaccorsi).
1995 Loire-Atlantique - marais de Guérande, fem. ad. probable, 7 octobre (Y & J.-P. Trévoux).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). L'espèce figure désormais en catégories A (Liste Française) et D1 (voir *Ornithos* 5-1 : 39-41). Si les données méditerranéennes et de l'ouest de la France sont plutôt classiques, la mention de Franche-Comté est plus étonnante.

FAUCON SACRE *Falco cherrug* (8/8 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Crau : Peau-de-Meau, imm., 21 août (D. Lecornu, J.-P. Paul), juv., du 29 décembre au 20 février 1999 (Y. Kayser, N. de Marre, D. Michelat, J.-G. Robillard, T. & H. de Thier *et al.*).

(Hongrie, Tchécoslovaquie, Turquie jusqu'en Sibérie centrale et méridionale). Il semble y avoir eu deux oiseaux différents en Crau. Une mise au point vient d'être faite sur les exigences que le CHN est tenu de requérir en matière de description de grands faucons (voir *Ornithos* 6-3 : 131).

MAROUETTE POUSSIN *Porzana parva* (124/147 - 17/17)

Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, fem. ad., du 25 mars au 10 avril (M. Boët) ; Nice, fem., phot., 1er avril, trouvée épuisée dans un jardin, baguée et relâchée le 4 avril (C. Hycnar, J. Pineau)
Aude - Pissevaches/Fleury d'Aude, juv., 7 septembre (E. Roy).
Corse-du-Sud - Capitello, fem., du 20 mars au 6 avril (G. Bonaccorsi), mâle, du 21 mars au 13 avril (G. Bonaccorsi), fem., du 27 mars au 12 avril (G. Bonaccorsi), fem., du 28 mars au 13 avril (G. Bonaccorsi), fem., les 30 et 31 mars (G. Bonaccorsi), fem., 11 avril (G. Bonaccorsi), mâle, 3 mai (G. Bonaccorsi) ; Campo Dell'Oro, mâle, du 23 au 30 mars (G. Bonaccorsi, B. Recorbet) ; Baleone, fem., du 30 mars au 13 avril (G. Bonaccorsi) ; Maccinaggio, fem., 2 mai (G. Bonaccorsi, B. Recorbet).
Isère - étang des Grandes Îles/Montbonnot, fem. ad., 8 avril (G. Bruneau, L. Majorel) ; Raymure/Vif, mâle ad., 26 avril (J. Bailly, G. Bruneau).
Seine-et-Marne - Ourdy/Le Plessis-Picard, mâle ad. probable, les 20 et 21 avril (J.-P. Delapré, V. Cudo).
Var - Hyères, mâle ad., 11 mai (J.-G. Robillard).
1995 Meuse - Madine, fem. ad., 1er septembre (P. Mariatte).
1985 Corse-du-Sud - Capitello, mâle, les 22 et 23 mai (G. Bonaccorsi).
1984 Corse-du-Sud - Capitello, fem., du 8 au 10 avril (G. Bonaccorsi).
1983 Corse-du-Sud - Capitello, mâle, les 23 et 24 avril, fem., 5 mai (G. Bonaccorsi).

(Europe, Asie centrale). La Corse tient toujours le haut du pavé pour cette espèce, suivie par les Alpes-Maritimes et l'Isère, départements où il y a d'assidus chercheurs de marouettes, il faut quand même le souligner. En revanche, la nidification en Lorraine semble, à notre connaissance, appartenir au passé.

MAROUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (32/35 - 4/4)

Alpes-Maritimes - localité tenue secrète, ad., phot., du 12 au 14 avril (M. & M. Boët, L. & S. Clair, A. Vernier), ad., les 13 et 14 avril (M. Boët, L. & S. Clair), ad., du 14 au 20 avril (M. Boët, L. Clair).
Corse-du-Sud - Capitello, ad., 22 mars (G. Bonaccorsi).
1994 Somme - Villers-sur-Authie, 2 ind., du 23 au 28 mai (G. Flohart, J. Mouton).

(Europe, Asie centrale, Japon). Trois individus ont donc été vus simultanément ce 14 avril sur un site des Alpes-Maritimes, et le 16, un heureux observateur (sans doute le premier en France) a même vu un des oiseaux chanter !

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (29/57 - 2/18)

Bouches-du-Rhône - Camargue, mi-août, tuée à la chasse et naturalisée (*fide* A. Blasco).
Pyrénées-Orientales - Canet, entre 10 et 15 couples possibles, avec notamment 21 ad. et 8 juv. le 20 juillet (J.-M. Algrin *fide* Y. Aleman).

(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). Les choses se passent plutôt bien dans les Pyrénées-Orientales, moins bien en Camargue, où malheureusement ce « dérapage » n'est pas le premier. À l'étang de Canet, neuf nouveaux adultes et les huit juvéniles ont été comptabilisés.

OUTARDE BARBUE *Otis tarda* (5/7 - 1/4)

Bouches-du-Rhône - Crau : piste du Vallon/Saint-Martin-de-Crau, 2 mâles et 2 fem., phot., 6 avril (R. Aye, M. Retter, T. Sacher, A. Strübe).

(Europe centrale et méridionale, Turquie). La dernière observation remonte au 5 novembre 1994 en Meurthe-et-Moselle, après celle de Saône-et-Loire, où un mâle immature était resté du 28 décembre 1992 au 20 février 1993... À noter ici, le caractère remarquable de la donnée.

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva* (2/2 - 2/2)

Ain - Le Plantay, 26 avril (J.-L. Cathala, P. Crouzier).
Bouches-du-Rhône - Camargue : Baisse des Cinq cents francs, ad., du 16 au 18 août (P.-A. Crochet, E. Didner, Y. Kayser *et al.*).
1995 Vendée - Les Sables-d'Olonne, 1er été ou ad. en mue, phot., du 9 au 14 août (Y. & J.-P. Trévoux).

(Sibérie, Alaska). Année faste avec deux données, alors que la première mention de l'espèce date de 1994. Entre temps, l'oiseau de Vendée précédemment accepté comme « bronzé ou fauve » a été réexaminé à la lumière de photos et de nouveaux éléments fournis par des observateurs, ce qui a permis de trancher : il s'agit donc de la seconde mention française de Pluvier fauve.

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (15/16 - 1/1)

Finistère - Plounéour-Trez, juv., 18 septembre (P. Crouzier).

(Amérique du Nord). Beau doublé de la part de l'observateur qui a observé les deux pluviers à sous-alaires grises la même année ! À part cela, date classique dans un site (baie de Goulven) qui ne l'est pas moins.

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (34/34 - 5/5)

Loir-et-Cher - Chemery, phot., du 3 au 6 août (F. Pelsy, A. Perthuis, A. Pollet).
Loiret - île de Cuissy/Lion en Sullias, 26 février (D. Chavigny).
Moselle - Tarquimpol, juv., du 3 au 10 octobre (J. François, G. Joannès, F. Kubina)
Oise - Vauciennes, ad., du 23 mai au 6 juin (J.-P. Bonnel, P. Sengez).
Haute-Saône - Vaivre, ad., du 9 au 12 mars (D. Lecornu *et al.*).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Bonne année avec à nouveau cinq données, comme en 1997 (moyenne de 2,17 observations par an). Le Loiret avait déjà accueilli un oiseau à l'automne 1997.

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (7/7 - 0/0)

1995 Vendée - pointe de L'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 1er août (Y. Trévoux).

(Amérique du Nord). Une semaine après, et sur le même site, les observations conjuguées d'un Bécasseau d'Alaska, d'un Gravelot mongol et d'un Chevalier bargette... Date la plus précoce pour la migration postnuptiale mais conforme au pattern d'apparition des adultes en Europe de l'Ouest.

BÉCASSEAU D'ALASKA *Calidris mauri* (1/1 - 2/2)

Loire-Atlantique - marais de Guérande, juv., phot., les 20 et 21 septembre (J.-L. Dourin, B. Lebascle, Y. Trévoux, A. Verneau).
Vendée - Les Sables d'Olonne, juv., du 9 au 12 septembre (D. Desmots *et al.*).

(Amérique du Nord). Troisième et quatrième mentions françaises (la seconde pour la Vendée) après une belle série de dépressions d'ouest.



3. Bécasseau d'Alaska *Calidris mauri*, juvénile, Sissable, Loire-Atlantique, septembre 1998 (Y. Trévoux).
Juvenile Western Sandpiper.





4 & 5. Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*, juvénile, Ouessant, Finistère, septembre 1998 (G. Bruneau). Juvenile Baird's Sandpiper.

BÉCASSEAU MINUSCULE *Calidris minutilla* (4/4 - 0/0)

1997 Loire-Atlantique - Le Migron/Frossay, juv., 6 septembre (Y. & J.-P. Trévoux).

(Amérique du Nord). Neuvième mention française mais seulement la quatrième depuis 1981, année de la création du CHN : une de février 1982 en Charente-Maritime, une de septembre 1992 dans le Morbihan et une autre d'octobre 1995 dans le Pas-de-Calais. C'est peu !

BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (15/15 - 0/0)

1996 Loire-Atlantique - marais de Guérande, juv., phot., 13 octobre (Y. & J.-P. Trévoux).

(Amérique du Nord). Pas de donnée en 1998, mais cette mention de 1996 est la quatrième pour la Loire-Atlantique (deux de mai-juin, deux d'octobre).

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (16/16 - 1/1)

Finistère - Ouessant : Porz Paol et Korz, juv., phot., du 12 au 16 septembre (G. Bruneau, J.-P. Jordan *et al.*).
1995 Finistère - Ouessant : Cadoran et marais du Créac'h, juv., 13 et 14 septembre (B. Bargain, Y. Guermeur, F. Legendre).
1994 Loire-Atlantique - Pont d'Armes/Assérac, juv., phot., 26 septembre (Y. & J.-P. Trévoux).

(Amérique du Nord). Encore un bécasseau nord-américain sans doute apporté par la queue du cyclone « *Bonny* » ayant dévasté la Caroline du Nord quelques jours plus tôt (*cf.* les Bécasseaux d'Alaska arrivés à la même époque).

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (160/174 - 11/13)

Finistère - île de Sein, juv., 17 septembre (P. Crouzier) ; étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, juv., du 1er au 12 octobre (G. Balança, A. Desnos, J.-Y. Frémont, A. Larousse).
Indre-et-Loire - Rillé, juv., 24 septembre (P. Cabard).
Loire-Atlantique - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 2 juv., 7 septembre (S. Reeber), juv., du 21 au 24 septembre (S. Reeber).
Loiret - Saint-Denis-en-Val, juv., phot., les 5 et 6 septembre (S. Branchereau *et al.*).
Manche - baie du Mont-Saint-Michel/Huisnes-sur-Mer, juv., phot., 17 septembre (P. & S. Provost).
Morbihan - Le Duer/Saint-Colombier, juv., 3 septembre (X. Hindermeyer).
Oise - Chevrières, ad., 11 octobre (A. Rouge).
Pas-de-Calais - Conchil-le-Temple, juv., phot., du 16 au 18 septembre (D. Cohez).
Vendée - La Guittière/Talmont-Saint-Hilaire, 2 juv., du 21 septembre au 3 octobre (O. Girard *et al.*).
1997 Finistère - étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, 31 août (A. Desnos, J.-Y. Péron).
1997 Loire-Atlantique - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, ad., 5 mai (S. Reeber).
1997 Marne - lac du Der-Chantecoq/Arrigny, 8 septembre (C. Hervé, E. Le Roy).
1997 Somme - Woignarde, juv., phot., du 2 au 13 septembre (O. Bardet, E. Dansette, L. Gavory).





6 & 7. Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Saint-Denis-en-Val, Loiret, septembre 1998 (S. Branchereau). Pectoral Sandpiper.

1994 Finistère - étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, juv., du 25 août au 2 septembre (A. Desnos) et non du 25 au 31 août uniquement (*Ornithos* 3-4 : 162).

(Amérique du Nord, Sibérie). Bon automne, sans doute dû aux conditions météorologiques précitées, avec 13 individus dont la première vague d'arrivées s'est située début septembre , suivie d'une seconde vers le 17 du même mois. À signaler la donnée printanière (toujours rare) de début mai 1997 sur le lac de Grand-Lieu, site au demeurant attractif (trois individus en septembre 1998).

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (88/119 - 9/8)

Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, juv., 8 et 14 septembre (A. Vernier).
Aude - Gruissan, ad., 23 avril (S. Albouy).
Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de Quarantaine, juv., du 16 au 22 août (P. Cabard, E. Didner, N. Vincent-Martin) ; Fangassier, 2 ind., 1er septembre (G. Haas), 4 septembre (E. Franc), 9 septembre (L. Dietrich, Y. Kayser).
Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, phot., 26 et 27 mai (A. Driencourt, G. Flohart), ad., 24 et 25 juillet (G. Flohart).
Saône-et-Loire - lac de la Sorme/Les Bizots, 28 août (P. Notteghem).
1997 Bouches-du Rhône - Camargue, 6 mai (H. Meek).

(Europe septentrionale). Mis à part la Saône-et-Loire, les autres départements visités restent des classiques aux époques concernées. Difficile de savoir combien d'oiseaux ont fréquenté le Fangassier début septembre en raison des contradictions formulées sur leur âge.

BÉCASSEAU À ÉCHASSES *Micropalama himantopus* (6/6 - 0/0)

1997 Loire-Atlantique - Le Migron/Frossay, juv., phot., 11 octobre (Y. & J.-P. Trévoux).

(Amérique du Nord). Avec cette nouvelle donnée, 1997 compte deux oiseaux (un adulte et un jeune) de part et d'autre de l'estuaire de la Loire.

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (71/78 - 7/8)

Finistère - île de Sein, juv., phot., 6 septembre (P. & S. Provost) ; pointe de la Torche/Plomeur, 2 ind., 9 septembre (F. & L. Veyrunes) ; Trunvel/Tréogat, juv., 10 et 11 septembre (F. & L. Veyrunes) ; Kergalan/Tréogat, phot., 18 et 21 septembre (G. Rault).
Manche - Réthoville, juv., phot., 4 septembre (P. Crouzier).
Morbihan - Erdeven, juv., 16 septembre (S. Guérin).
Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, juv., phot., du 20 au 28 septembre au moins (L. Chevallier, B. Lebrun, R. Tonnel).
1997 Vendée - baie de l'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 13 août (P. Geoffray).
1995 Loire-Atlantique - étang des Gâtineaux/Saint-Michel Chef-Chef, juv., phot., 19 et 20 septembre (Y. & J.-P. Trévoux).

(Amérique du Nord). Année classique ; les deux sites bretons sont traditionnels, celui du Pas-de-Calais l'est moins. Quant à l'oiseau





8 & 9. Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*, Tréogat, Finistère, septembre 1998 (G. Rault). Buff-breasted Sandpiper.

du nord Cotentin, il avait rapidement fait connaissance avec la courtoisie légendaire d'une certaine catégorie de Français, puisque sa patte droite était brisée et son aile gauche abîmée... La donnée de 1997 est la seule pour l'année et s'avère plutôt inhabituelle quant à l'âge, la date et le milieu fréquenté (vaste vasière).

BÉCASSIN À BEC COURT *Limnodromus griseus* (0/0 - 1/1)

Morbihan - Séné, ad. en plumage d'hiver, de fin août au 10 octobre (J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*).

(Amérique du Nord). Ce bécassin, jugé plutôt bizarre pour un « long bec » par certains observateurs, a fini par être déterminé grâce à ses cris (diagnostiques) entendus lors de vols successifs au-dessus de sa saline de prédilection, le 4 octobre en soirée. Cet adulte de Bécassin à bec court constitue la première mention française connue (mais les données du XIXe siècle vont être révisées prochainement par le CHN et la CAF). Dommage que les découvreurs de l'oiseau, environ un mois et demi plus tôt, alors que celui-ci devait avoir conservé des traces de plumage nuptial, n'aient pas tiré la sonnette d'alarme à ce moment-là ! À noter qu'un juvénile de la même espèce était aux Açores les 5 et 6 septembre (*Birding World* 11 : 337).

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (14/14 - 1/1)

Finistère - Goulven, juv., du 17 septembre au 2 octobre (P. Crouzier, Y. Lecorre).

(Amérique du Nord). Une bonne date et un bon coin pour une espèce, somme toute bien rare.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (214/364 - /)

1987 Corse-du-Sud - Capitello, de 3 à 5 ind., du 23 au 28 avril (G. Bonaccorsi).
1987 Haute-Corse - Barcaggio, 2 ind., 1er mai (G. Bonaccorsi).

(Europe du Sud-Est, Asie). Données anciennes parvenues au CHN. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 1991.

CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (11/11 - 1/1)

Finistère - Quistillic/Henvic, ad., tué à la chasse, 1er janvier (E. de Kergariou *fide* J. Maout).
1997 Finistère - Le Band/Henvic, ad. ou 1er hiver, 16 mars (E. de Kergariou, J. Maout, G. Moal).

(Amérique du Nord). Encore un limicole nord-américain qui a eu une fin précipitée sur notre sol ; il avait eu la mauvaise idée d'accompagner une bande de Chevaliers gambettes... Sinon, le Finistère reste décidément le département français pour le Chevalier à pattes jaunes !

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* (47/42 - 9/3)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Fangassier, La Dame, Galabert et Quarantaine, ad., du 13 avril au 9 juillet (L. Dietrich, D. Laloi, G. Paulus, M. Thibault *et al.*) , puis du 17 au 30 août (N. Vincent-Martin) ; Bardouine et Les Enfores de la Vignolle, juv., du 30 août au 4 octobre (Y. Kayser, H. Kowalski *et al.*).



10. Bécasseau de Bonaparte (en haut) *Calidris fuscicollis*, juvénile, et Bécasseaux minutes *Calidris minuta*, marais de Guérande, Loire-Atlantique, octobre 1996 (J.-P. Trévoux). *Juvenile White-rumped Sandpiper (top) with Little Stints.*

Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, phot., 23 et 24 avril (A. Driencourt) ; Les Escardines/Oye-Plage, phot., du 31 juillet au 7 août (E. Parmentier).
Vendée - pointe de L'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 1er et 7 mai (N. Morgenstern, A. Thomas).
1983 Haute-Corse - Tambolo Bianco/Biguglia, 4 septembre (G. Bonaccorsi).
(Europe du Nord-Est, Sibérie). L'adulte de Camargue pourrait être présent dans la région depuis janvier 1997 ! Les observations postnuptiales du Pas-de-Calais peuvent tout à fait concerner le même oiseau qu'au printemps. L'oiseau vendéen est sans doute le même depuis 1995.

CHEVALIER GRIVELÉ *Actitis macularia* (11/13 - 0/0)

1993 Loire-Atlantique - étang du Pin/Le Pin, 2 juv., 14 septembre (Y. Trévoux).
(Amérique du Nord). La physionomie particulièrement attractive de l'étang à cette époque après quelques jours de violentes tempêtes d'ouest a permis cette observation remarquable de deux individus ensemble, lesquels étaient accompagnés d'un Bécasseau tacheté ! Par ailleurs, rappelons que deux adultes ensemble avaient été homologués le 20 août de la même année à Saint-Guénolé, Finistère.

CHEVALIER SEMIPALMÉ *Catoptrophorus semipalmatus* (0/0 - 1/1)

Vendée - lagune de La Belle Henriette/La Faute-sur-Mer, juv. en plumage de transition vers le 1er hiver , les 12 et 13 septembre (J.-F. Darras, J.-P. Delapré, J.-Y. Frémont, F. Pouzergues, L. Spanneut *et al.*).
(Amérique du Nord). Là encore, on ne peut qu'évoquer la situation météorologique particulièrement agitée sur l'Atlantique en cette fin d'été pour avoir dérouté autant de limicoles nord-américains aussi rares vers nos côtes. Celui-ci n'avait jamais été vu au XXe siècle en France, puisque la seule donnée concerne un oiseau capturé au XIXe siècle près d'Abbeville, Somme. Les autres mentions européennes sont de Finlande (1983) et de Norvège (1992 et 1993). L'oiseau n'est malheureusement resté que deux jours au grand dam de nombreux observateurs arrivés tardivement sur le site...

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor* (40/43 - 1/1)

Gironde - domaine de Certes/Audenge, phot., 15 septembre (F. Dupuy, P. Nadé).
(Amérique du Nord). Septembre 1998 nous aura aussi gratifiés de ce phalarope devenu une grande rareté dans notre pays.

LIMICOLES NÉARCTIQUES

Avec 10 espèces pour 27 données et 30 individus, l'année 1998 est l'une des trois meilleures (avec 1991 et 1995) pour les limicoles nord-américains. Elle est aussi sans doute le millésime du siècle pour en avoir réuni les plus rares : le Chevalier semipalmé qui n'avait pas été vu en France depuis le siècle dernier, le Bécassin à bec court dont c'est la première mention française ou le Bécasseau d'Alaska qui fournit ses troisième et quatrième données pour notre pays !

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (172/482- 30/117)

Charente-Maritime - île d'Oléron : pointe de Chassiron/Saint-Denis d'Oléron, juv., 29 octobre (P. Trotignon).
Finistère - pointe de Beg Pol/Brignogan, 2 juv., 24 août, 2 juv., 26 août, 4 juv., 27 août (P.J. Dubois), imm., 10 septembre, 2 imm., 14 septembre (P. Crouzier) ; Plougasnou, juv., 13 septembre (J. Maout).
Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 3 juv., 21 août, 8 juv., 22 août, 27 juv., 24 août (J.-A. Leclercq *et al.*), 2 ad. et 2 juv., 26 août



11. Chevalier semipalmé *Catoptrophorus semipalmatus*, La Faute-sur-Mer, Vendée, septembre 1998 (J.-F. Darras). *Willet.*

12. Chevalier semipalmé *Catoptrophorus semipalmatus*, La Faute-sur-Mer, Vendée, septembre 1998 (J.-Y. Frémont). *Willet.*





13. Goéland d'Audouin *Larus audouinii*, 2e été, Port-Vendres, Pyrénées-Orientales, mai 1998 (S. Zucca). *Second-summer Audouin's Gull.*

(D. Cohez), 9 juv., 27 août, 2 juv., 29 août (J.-A. Leclercq *et al.*), 8 juv., phot., 30 août (J.-F. & A. Darras), 3 juv., 12 septembre, 5 juv., 13 septembre, 13 juv., 18 octobre, juv., 1er novembre (J.-A. Leclercq *et al.*).
Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen, 2 juv., 22 août, juv., 24 août, 3 juv., 27 août (G. Flohart *et al.*), juv., 28 août (P. Camberlein, D. Cohez , P.-R. Legrand, D. Tirmarche), 5 ind., 13 septembre, juv., 17 septembre, juv., 15 novembre (G. Flohart *et al.*) ; Merlimont, juv., 8 septembre, juv., 18 septembre (D. Cohez) ; Fort Mahon/Blériot-Plage, 3 juv., 1er novembre (P.J. Dubois).
Haute-Savoie - lac Léman : au large de Thonon-les-Bains, juv., phot., 19 septembre (R. Jordan, D. Lenganey).
Somme - Hâble d'Ault, juv., 10 octobre (J. Birard, D. Laloi, M. Zucca).
1997 Morbihan - pointe de Penvins/Sarzeau, subad./ad., phot., trouvé mort, 13 décembre (S. Provost) et non dans le Finistère comme indiqué précédemment (*Ornithos* 5-4 : 164).
(Circumboréal). Il est maintenant bien établi que l'espèce est régulière sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais à l'automne mais le passage est également effectif dans le Finistère avec, ici, 12 oiseaux pour une période de moindre suivi. La donnée du Léman est à mettre en relation avec celle du col de Bretolet à la frontière suisse le 29 août 1997 (*Ornithos* 5-4 : 164).

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (11/11 - 3/3)

Finistère - île de Béniguet/Le Conquet, ad., 20 et 21 mai (J. Leclerc, C. Lethuilier, P. Yésou).
Vendée - port des Brochets/Bouin, ad., 3 et 4 août (Y. Bourgaut, F. Le Caro) ; La Fosse/île de Noirmoutier, 1er hiver, 31 octobre (J. Gonin, X. Hindermeyer).
(Amérique du Nord). Année faste avec trois oiseaux différents, dont deux en Vendée, et deux adultes !

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (9/9 - 1/1)

Charente-Maritime - Île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines et Les Portes-en-Ré, ad., du 18 au 24 août (S. Maisonhaute, H. Robreau).
(Amérique du Nord). Observation inattendue pour la France d'un adulte à cette époque, puisque les données y sont habituellement plutôt hivernales. Signalons toutefois un certain nombre de mentions entre mai et juillet ailleurs en Europe. Cette donnée est la première pour le département (les départements voisins de la Vendée et de Loire-Atlantique n'ont curieusement jamais été visités par l'espèce à ce jour).

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (9/16 - /)

1990 Corse-du-Sud - Capitello, 1er avril (G. Bonaccorsi).
1989 Corse-du-Sud - Capitello, de 1 à 5 ind., du 4 au 9 avril (G. Bonaccorsi).
1988 Corse-du-Sud - Capitello, ad., phot., 5 au 13 mars (G. Bonaccorsi), 1 ind., 15 avril, 2 ind., 25 avril (G. Bonaccorsi).
1987 Corse-du-Sud - Capitello, 2 ind., 20 avril (G. Bonaccorsi), 29 septembre (G. Bonaccorsi).
1985 Haute-Corse - Biguglia, 20 avril (G. Bonaccorsi), 14 septembre (G. Bonaccorsi).
1984 Haute-Corse - Biguglia, 4 ind., 15 avril, 2 ind., 29 avril (G. Bonaccorsi).
(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). Pas de donnée en 1998 en dehors du littoral méditerranéen, où l'espèce n'est plus soumise à homologation depuis le 1er janvier 1991.



14. Goéland d'Audouin *Larus audouinii*, juvénile, lac Léman, Haute-Savoie, septembre 1998 (R. Jordan). *Juvenile Audouin's Gull.*

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (84/107 - 6/6)

En dehors de la Corse :

Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, ad., 10 avril (M. Boët).
Aude - Les Ayguades/Gruissan, 3e été, 15 avril (P.J. Dubois) ; Pissevaches/Fleury d'Aude, 2e été, 5 mai (J.-P. & M. Delapré).
Bouches-du-Rhône - Camargue : plage de Piémanson, 2e été, phot., 21 mai (J. Duplain, I. Henry).
Pyrénées-Orientales - Cap Béar/Port-Vendres, 2e été, phot., 8 mai (C. & D. Laloi, M. & S. Zucca).
Haute-Savoie - lac Léman, au large de Thonon-les-Bains, juv., phot., du 6 au 8 septembre (G. & R. Jordan).

(Circum-méditerranéen). L'année 1998 est conforme aux précédentes avec six oiseaux dans les départements habituels. Une mention particulière tout de même pour ce juvénile photographié sur le lac Léman et qui avait été découvert trois jours plus tôt sur un enrochement à Préverenges dans le canton de Vaud en Suisse (B. Volet *in litt.*).

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (169/113 - 13/6)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).

Calvados - Merville-Franceville, ad.*, 10 octobre (R. Rolland).
Charente-Maritime - Cabane de Moins/Breuil-Magné, ad., 5 et 6 février (P. Trotignon) ; île d'Oléron : La Beaudissière/Dolus d'Oléron, ad., du 19 septembre au 10 février 1999 au moins (M. Caupenne, P. Trotignon).
Finistère - Douarnenez, ad.*, phot., du 16 janvier au 17 février (G. Rault) ; Saint-Renan, 1er hiver*, phot., du 29 janvier au 13 mars (F. Barrault, E. Parmentier).
Gironde - Arcachon et La Teste, de 1 à 2 ad., 11 et 16 janvier (B. Lamothe, M. Thibault).
Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, 2e hiver*, 1er janvier (S. Duchateau).
Morbihan - Ploemeur, ad., phot., de fin janvier au 18 février (S. Guérin) ; Le Bronzais/Pénestin, ad., du 9 au 26 septembre au moins (J.-Y. Frémont, S. Guérin, Y. Trévoux).
Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 2e hiver*, 10 octobre (J.-A. Leclercq *et al.*).
Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, 1er été*, 12 avril (M. Narcy).
Vendée - pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., du 23 août au 4 octobre (E. Gfeller, J. Gonin, A. Thomas).
1997 Charente-Maritime - île d'Oléron : La Beaudissière/Dolus d'Oléron, ad., phot., du 30 septembre au 23 mars 1998 (X. Rufray *et al.*).
1997 Finistère - étang du Pont/Kerlouan, 2e été*, 31 juillet et 17 août (Y. Créau).
1996 Gironde - Arcachon, 1er hiver* et 2 ad., 29 décembre (A. Rouge) et non 1er hiver* seulement (*Ornithos* 5-4 : 165).
1995 Finistère - Stang Alar/Brest, ad., 5 février (J. Maout).
1993 Finistère - Stang Alar/Brest, ad., 25 janvier (J. Maout).
1992 Finistère - Pont l'Abbé, ad., phot., du 7 décembre au 28 mars 1993 (A. Desnos) et non du 24 décembre au 27 février 1993 uniquement (*Alauda* 61 [4] : 246).

(Amérique du Nord). Comme d'habitude, beaucoup de revenants, le doyen doit être celui de Pénestin particulièrement bien

suivi (*a priori* un mâle) dont la première observation en tant qu'adulte date du 22 septembre 1984. Sinon, tout de même six nouveaux oiseaux en 1998 dont un nouveau 1er hiver dans le Finistère et un adulte dans le Calvados, département jusqu'ici oublié par l'espèce.

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (98/97 - 6/6)

Charente-Maritime - Meschers-sur-Gironde, 1er hiver, 28 février (J.-M. Frolet).
Finistère - Saint-Guénolé, Douarnenez et Trunvel/Tréogat, 2 ind. de 1er hiver (un troisième 1er hiver, phot., le 1er avril), phot., du 1er février au 10 mai (F. Barrault, A. Desnos, E. Lapous, G. Rault).
Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, 1er hiver, du 15 au 22 février (G. Flohart *et al.*).
Vendée - Noirmoutier-en-l'Île, 1er hiver, phot., du 16 février au 14 mars au moins (C. Kérihuel, S. Pérès, F. Signoret).
1997 Vendée - Les Sables-d'Olonne, 1er hiver, 22 décembre (D. Desmots).
1996 Loire-Atlantique - marais de Grée/Ancenis, 1er hiver, phot., 8 janvier (Y. & J.-P. Trévoux).
1994 Finistère - Locquirec, 1er hiver, 2 janvier (J. Maout) ; Saint-Guénolé, 1er hiver, 19 mars et 9 avril (A. Desnos).

(Arctique canadien, Groenland). Les pérégrinations des oiseaux finistériens ont été difficiles à suivre : le premier est arrivé le 1er février et le second le 5 mars, tous deux dans le port de Saint-Guénolé, secteur qu'ils ont fréquenté ensemble jusqu'au 17 avril au moins avant d'aller prospecter les environs (ils étaient à nouveau réunis le 5 mai dans le même port, date fort tardive pour l'espèce). Avec six oiseaux (tous des individus de 1er hiver), 1998 est une bonne année en dehors des afflux résultant d'accidents météorologiques (3-4 individus en moyenne ces dernières années).

MOUETTE DE ROSS *Rhodostethia rosea* (0/0 - 1/1)

1994 Pyrénées-Atlantiques - baie de Chingoudy/Hendaye, ad. en plumage d'hiver, phot., 7 avril (D. Calleja Marcos *fide* A. Larousse).

(Circum-arctique.Hiverne dans l'océan glacial Arctique). Deuxième donnée française de ce laridé mythique qui a séjourné du 6 au 11 avril sur l'aéroport de Fuenterrabia (Espagne) jouxtant la baie de Chingoudy à Hendaye. Cette mouette a bien sûr été vue en vol (par des Espagnols !) côté français de la baie. Pour mémoire, un autre adulte (en plumage nuptial celui-ci) a été observé 40 km plus à l'ouest six jours plus tard ! Les deux données ont été homologuées par le Comité d'homologation espagnol (Eduardo de Juana A. *in litt.*). Difficile d'imaginer que la côte basque française n'ait pas également été visitée en dehors de l'observation d'Hendaye. Il n'y avait apparemment pas d'observateurs à la réception !

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (12/12 - 1/1)

Côtes-d'Armor - Plouha, ad., 14 août (C. Hervé).

(Méditerranée, Océan indien, Australie). Cet oiseau a été vu à la pointe de la Tour pendant 15 minutes avant de continuer à longer la côte. Cette observation doit-elle être mise en relation avec celle du 4 mai dans le Sussex, Angleterre ? (Rogers *et al. in litt.*).



15. Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*, 1er hiver, Saint-Guénolé, Finistère, mai 1998 (G. Rault). Oiseau différent de celui de la photo 16.
First-winter Iceland Gull, a different individual from that in plate 16.

STERNE « À BEC ORANGE » *Sterna maxima/bengalensis/elegans*

Gironde - Banc d'Arguin/Arcachon, ad., du 22 mai au 24 juin (P. Grisser).
Landes - Tarnos, ad., 16 août (A. Guyot).
Pyrénées-Atlantiques - Ciboure, ad., 16 août (A. Larousse).

La sterne du banc d'Arguin avait des comportements de nicheur mais aucune preuve de nidification n'a pu être apportée. Quant aux observations du 16 août, elles se rapportent sans aucun doute au même oiseau qui a été vu en vol devant les falaises de Ciboure avant d'être revu quelques heures plus tard devant la digue de Tarnos par deux observateurs différents qui ont appris l'événement, le soir, par le répondeur du *Coin des branchés*.

GUILLEMOT À MIROIR *Cepphus grylle* (17/21 - 1/1)

Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 1er hiver, 18 octobre (J.-A. Leclercq *et al.*).
1997 Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, 1er décembre (D. Cohez).

(Arctique, Atlantique Nord). Les deux observations concernent des oiseaux vus en vol sur deux sites de « *seawatching* » classiques des côtes de la Manche (et de la mer du Nord).

TOURTERELLE ORIENTALE *Streptopelia orientalis* (2/2 - 1/1)

Deux-Sèvres - Vouillé, ad., 18 mai (F. Jiguet).

(Asie centrale et Extrême-Orient). Troisième donnée française, complètement déconnectée des précédentes qui étaient toutes deux d'octobre (1981 dans le Finistère et 1988 dans la Drôme). Cet oiseau était en compagnie d'une Tourterelle des bois avec laquelle elle semblait appariée...

ENGOULEVENT D'AMÉRIQUE *Chordeiles minor* (0/0 - 1/1)

Finistère - Ouessant, fem. ad., phot., du 17 au 28 septembre (F. Veyrunes *et al.*)

(Amérique du Nord et centrale). Première mention française pour cet engoulevent dont l'apparition est sans nul doute liée aux conditions météorologiques évoquées précédemment pour les limicoles nord-américains. À noter que trois oiseaux furent également observés à la même époque en Angleterre. Un article relatant cet événement a été publié dans *Ornithos* (n°6-3 : 134).

GUÊPIER DE PERSE *Merops persicus* (2/2 - 1/1)

Corse-du-Sud - Capitello, 17 et 18 septembre (G. Bonaccorsi).
1997 Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas Thibert, phot., 27 juin (K. Lessells, A. Mante).

(Afrique du Nord et de l'Ouest, Moyen-Orient, sous-continent indien). Quatrième et cinquième données du siècle (dont déjà deux de Camargue), la dernière observation remontant au 15 octobre 1993 à Ouessant.



16. Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*, 1er hiver, Saint-Guénolé, Finistère, mars 1998 (G. Rault). Oiseau différent de celui de la photo 15.
First-winter Iceland Gull, a different individual from that in plate 15.



17. Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii*, 1er hiver, Entressen, Bouches-du-Rhône, janvier 1998 (M. Duquet).
First-winter Blyth's Pipit, the first for France.



18. Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii*, 1er hiver, île de Sein, Finistère, octobre 1998 (M. Duquet).
First-winter Blyth's Pipit, the second for France.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (126/151 - 8/24)

Bouches-du-Rhône - Crau : Grand Mas/Entressen, de 1 à 3 ind. du 2 au 11 janvier, puis de 8 à 14 ind., phot., du 12 janvier au 1er février et de 2 à 5 ind. jusqu'au 21 février (P.-A. Crochet, F. Jiguet, Y. Kayser *et al.*) ; canal de Craponne/Aureille, 23 février (P. Boyer) ; Mas Blanc et Mas Chauvet, de 1 à 3 ind., du 23 octobre au 30 janvier 1999 (Y. Kayser, N. Vincent-Martin) ; calanque du Cancéou/Marseille, 1er mai (A. Flitti).
Finistère - Trunvel/Tréogat, 2 ind., 12 octobre (G. Rault) ; Ouessant : Le Kun, 18 octobre (J.-P. Delapré, R. Muguet).
Lot - Saint-Matré, 3 ind., 24 septembre (F. Garcia).
Morbihan - Hoëdic, 14 novembre (M. South, P. Yésou).
Vendée - Le Château-d'Olonne, 7 octobre (D. Desmots).
1996 Landes - Capbreton, 1er novembre (G. Blake, P. Grisser).
1994 Côtes-d'Armor - Plounérin, 22 septembre (J. Maout)

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). La présence des premiers oiseaux de Crau de l'hiver 1997/1998 date du 11 octobre (*Ornithos* 5-4 : 166) mais les effectifs se renforcent subitement à partir du 12 janvier pour atteindre le chiffre record de 14 individus le 15 de ce mois. Contrairement aux oiseaux automnaux de passage, d'ordinaire très farouches, ces hivernants confiants permirent de beaux coups d'œil aux nombreux observateurs venus également « cocher » le Pipit de Godlewski les accompagnant. À souligner aussi ces trois oiseaux du Lot, département peu coutumier de ce genre d'observations.

PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewskii* (0/0 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Crau : Grand Mas/Entressen, 1er hiver, phot., du 16 janvier au 25 février (P.-A. Crochet, F. Jiguet, Y. Kayser *et al.*).
Finistère - île de Sein, 1er hiver, phot., du 17 au 19 octobre (E. Lapous, J.-Y. Péron *et al.*).

(Sud de la Sibérie, Chine et nord-est de l'Inde). À la fois la première et la deuxième mention de cette espèce en France. Soulignons le séjour prolongé de l'oiseau de Crau parmi les Pipits de Richard, qui a attiré bon nombre d'observateurs dont certains ont également vu l'oiseau finistérien. Deux notes sur ces observations ont récemment été publiées dans *Ornithos* (6-3 : 135 & 137).

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (276/472 - /)

1990 Corse-du-Sud - Capitello, de 1 à 4 ind., du 23 avril au 15 mai (G. Bonaccorsi).
1989 Corse-du-Sud - Capitello, de 1 à 2 ind., du 15 avril au 4 mai (G. Bonaccorsi).
1988 Corse-du-Sud - Capitello, de 1 à 3 ind., du 20 avril au 5 mai (G. Bonaccorsi).
1987 Corse-du-Sud - Capitello, de 1 à 7 ind., du 18 avril au 30 mai (G. Bonaccorsi), 8 septembre, 2 ind., 10 et 11 octobre (G. Bonaccorsi).
1986 Corse-du-Sud - Capitello, de 1 à 3 ind., du 21 avril au 5 mai (G. Bonaccorsi).

1985 Corse-du-Sud - Capitello, de 1 à 3 ind., du 30 avril au 15 mai (G. Bonaccorsi).
1984 Corse-du-Sud - Capitello, 25 et 26 avril, 29 avril, 2 mai (G. Bonaccorsi).
1983 Corse-du-Sud - Capitello, 20 avril, 30 avril (G. Bonaccorsi).

(Eurasie arctique). Belle série de données en provenance de Corse qui complètent bien nos connaissances en matière de passage de l'espèce en France, les premières arrivées se situant autour du 20 avril avec un maximum d'individus noté entre le 6 et le 10 mai ; le bon suivi du site a permis d'appréhender au plus près les oiseaux qui séjournent et ceux qui ne s'attardent pas, soit 60 nouvelles données pour 62 individus.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (28/29 - 1/1)

Mâle présentant les caractéristiques de la race *feldegg* :

Bouches-du-Rhône - Marignane, mâle, 20 avril (A. Flitti).
1997 Moselle - Guermange, mâle, 10 mai (B. Buono, J.-P. Buron, M. Vaslin).

(Balkans, mer Noire). La donnée des Bouches-du-Rhône cadre tout à fait avec le passage de cette race orientale qui est assez précoce. Celle de Lorraine est conforme aux données plus tardives déjà recueillies dans l'est de la France.

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (6/6 - 3/3)

Aude - Lapalme, mâle 1er été, 4 mai (M. Vergès).
Finistère -Trunvel/Tréogat, 1er hiver, phot., du 27 août au 2 septembre (P. & S. Provost).
Morbihan -Penthièvre, fem. ad., 13 mai (P. & S. Provost).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). Trois données la même année, voilà qui constitue un record ; deux oiseaux en Bretagne, découverts par les mêmes observateurs en est un second ! À noter qu'un immature de 1er hiver avait déjà été observé en baie d'Audierne le 2 septembre 1991. Quant au département de l'Aude, il a déjà fourni deux mentions au printemps.

ACCENTEUR À GORGE NOIRE *Prunella atrogularis* (0/0 - 1/1)

1997 Aisne - Chézy-sur-Marne, mâle 1er hiver, phot., du 7 au 24 décembre, puis du 10 janvier au 20 février 1998 et le 18 mars 1998 (C. Delville, J. Moréniaux *et al.*).

(Oural, Asie centrale). Observation extraordinaire de cet accenteur sibérien autour de mangeoires dans un jardin privé, non loin d'un bois. La présence de bordures crème entre la bavette noire et les parties inférieures orangées plaide en faveur d'un individu de la race *atrogularis* originaire de l'Oural, par ailleurs migratrice. Cette donnée est une première pour la France et a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la Commission de l'Avifaune Française (voir « *En direct de la CAF* » dans le présent numéro).



19. Accenteur à gorge noire *Prunella atrogularis*, 1er hiver, Chézy-sur-Marne, Aisne, février 1998 (A. Guillemont). *First-winter Black-throated Accentor, the first for France.*

TRAQUET ISABELLE *Oenanthe isabellina* (6/6 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Crau : Grand Carton, 1er hiver probable, 8 novembre (S. Befeld, Y. Kayser).
Corse-du-Sud - Capitello, phot., vidéo, du 21 au 28 septembre (G. Bonaccorsi, B. Recorbet, J.-F. Seguin).

(De la Grèce et la Roumanie à la Sibérie et la Mongolie). Première mention pour la Corse de ce traquet ayant séjourné une semaine sur le site. La donnée de Crau (la troisième) est la plus tardive jamais enregistrée en France.

GRIVE DE NAUMANN *Turdus naumanni* (5/5 - 0/0)

1997 Var - Ginasservis, tuée à la chasse, intermédiaire entre les sous-espèces *naumanni* et *eunomus*, phot., 16 novembre (G. Coste *fide* G. Olioso).

(Sibérie). Donnée qui s'inscrit parfaitement dans ce qui est connu pour les apparitions de ce turdidé sibérien en France, à savoir époque, région et malheureusement aussi... méthode de découverte ! Un article sur le statut et l'identification des grives orientales en France est paru dans *Ornithos* en 1995 (2-1 : 20).

GRIVE À GORGE NOIRE *Turdus ruficollis* (8/8 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Piémanson, mâle ad., sous-espèce *atrogularis*, 15 février (Y. Kayser).

(Sibérie). À l'instar de ce qui s'observe malheureusement souvent chez nous pour les grives rares, celle-ci n'est restée que vingt minutes dans les parages de sa découverte...

LOCUSTELLE DE PALLAS *Locustella certhiola* (1/1 - 1/1)

Finistère - Ouessant : Stang Porz Gwenn, du 10 au 13 octobre (J.-F. Arcanger).

(Sibérie orientale). Deuxième mention française et ouessantine, la première étant du 31 août 1987.

LOCUSTELLE FLUVIATILE *Locustella fluviatilis* (4/4 - 1/2)

Nord - Proville, de 1 à 2 mâles chanteurs, du 7 au 23 mai (C. Van Appelghem *et al.*).

(Sud de la Baltique, Balkans, jusqu'en Sibérie occidentale). Cette donnée n'est pas sans rappeler celle de deux mâles chanteurs qui avaient séjourné dans la Marne en mai 1993. Une autre donnée de chanteur du 23 avril dans le Pas-de-Calais a été refusée par manque de précisions mais est néanmoins à garder en mémoire dans ce contexte.

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (14/14 - 2/2)

Hérault - étang du Bagnas, capturée, phot., 22 septembre (B. Poulain *et al.*).
Seine-Maritime - marais du Hode/Saint-Vigor d'Ymonville, capturée, phot., 20 août (V. Lieron, J. Pigeon).
1995 Finistère - Île de Sein, ad., phot., 31 octobre (Y. & J.-P. Trévoux) ; étang de Trunvel/Tréogat, juv., capturé, phot., 16 septembre (A. Desnos, J. Maout *et al.*) et non 1996 (*Ornithos* 4-4 : 157).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Le Hode avait déjà connu une capture de cette espèce le 25 août 1994 ; la baie d'Audierne, la Camargue et l'Hérault sont les autres secteurs fournisseurs de données grâce au baguage. Une mention spéciale toutefois pour cet oiseau photographié dans un roncier de l'île de Sein.



20. Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola*, île de Sein, Finistère, octobre 1995 (J.-P. Trévoux). *Paddyfield Warbler.*

FAUVETTE SARDE *Sylvia sarda* (17/16 - 2/2)

Hautes-Alpes - La Motte-en-Champsaur, 21 avril (E. & T. Joubert).
Alpes-Maritimes - Jardin botanique/Nice, mâle ad., 18 avril (M. Boët).

(Méditerranée). Encore deux Fauvettes sardes cette année après l'afflux remarquable de l'an passé, où d'ailleurs un mâle et une femelle avaient déjà été observés à Nice au même endroit. La proximité des dates des mentions de 1998 est notable, de même que la localité des Hautes-Alpes.

POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (9/9 - 4/4)

Finistère - Ouessant : Poull Bojer, 15 octobre (D. Desmots *et al.*).
Morbihan - Hoëdic, phot., 27 septembre (S. Guérin, G. Rault).
Pas-de-Calais - cap Blanc-Nez/Sangatte, phot., 24 août (C.-H. Born, M. Lambert) ; Tardinghen, 3 octobre (P.J. Dubois).

(De la Baltique à la Sibérie orientale). Bon crû pour ce pouillot avec quatre oiseaux observés sur les grands secteurs traditionnellement prospectés à cette époque pour les passereaux.

POUILLOT BORÉAL *Phylloscopus borealis* (7/7 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Beauduc, 30 août (J.-P. Paul, G. Paulus).

(De la Scandinavie au Japon et à l'Alaska). Donnée remarquable à plus d'un titre, puisque l'espèce reste rare, que toutes les données précédentes sont des îles bretonnes, et qu'il s'agit là de la date la plus précoce. À noter que les données britanniques s'échelonnent de la mi-août à la fin octobre.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (33/36 - 4/4)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Grau-de-la-Dent, 17 et 18 septembre (L. Dietrich, G. Hemery, Y. Kayser).
Finistère - île de Sein, phot., 18 octobre (H. Davière, J.-Y. Frémont, E. Lapous *et al.*).
Pas-de-Calais - Audinghen, 9 octobre (G. Flohart), 12 novembre (G. Flohart).
1997 Finistère - Ouessant : Arland, phot., 20 et 21 octobre (*Ornithos* 5-4 : 172) également N. Vincent-Martin parmi les observateurs.

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Les données du Pas-de-Calais et du Finistère sont désormais classiques, même si Ouessant a été désertée cette année au profit de Sein qui enregistre d'ailleurs là sa deuxième mention consécutive. Va-t-il maintenant falloir aussi compter avec la Camargue mais à des dates plus déroutantes : précocité de celle de 1998, donnée de printemps pour 1997 ?

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (509/548 - 31/35)

Calvados - Sallenelles, 9 et 10 octobre (J. Jean-Baptiste, C. Lebrun *et al.*).
Finistère - Ouessant : Stang Porz Gwenn, 2 ind., 10 octobre, 1 seul les 11 et 12 octobre (J.-F. Arcanger), 18 octobre (H. Darmandieu), 2 ind. 19 octobre, 1 seul du 20 au 22 octobre (P.-P. Evrard, Y. Guermeur) ; Ker Yegu, 15 octobre (D. Desmots) ; Gerhuel, du 17 au 19 octobre (E. Didner, P.-P. Evrard) ; Prad Meur : 5 février (Y. Guermeur), 2 ind., 18 octobre (H. Darmandieu, T. Pons), 1 seul le 19 octobre, 2 ind. du 20 au 23 octobre, 1 seul jusqu'au 26 octobre (P.-P. Evrard, Y. Guermeur) ; Pount Ar Rodez, 19 octobre (P.-P. Evrard), 21 et 22 octobre (Y. Guermeur) ; Arland, du 5 au 10 octobre (Y. Guermeur), 2 ind. du 19 au 22 octobre (R. Crofton, P.-P. Evrard), 1 seul du 23 au 25 octobre (Y. Guermeur) ; Park Raden, 7 octobre (Y. Guermeur), 15 octobre (B. Helsens) ; Poull Bojer, 15 octobre (L. Spanneut) ; Stang Korz, 10 octobre (Y. Bourgault), 15 et 16 octobre (M. Vergès), 21 et 23 octobre (Y. Guermeur) ; Kervasdoué, 17 octobre (E. Didner), 20 octobre (N. Vincent-Martin) ; Stang ar Stiff, 18 octobre (M. Vergès) ; Ty Crenn, 18 octobre (M. Vingerhoets) ; Ar Reun, 19 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois), 23 octobre (Y. Guermeur) ; Parkou Zini, 19 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois) ; Poull Brac, 2 ind., 20 octobre (P. Crouzier, H. Darmandieu, P.J. Dubois), 22 octobre (Y. Guermeur), du 25 au 27 octobre (Y. Guermeur) ; Kerlann, du 21 au 23 octobre (Y. Guermeur, C. Kerbiriou). Île de Sein, phot., 18 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*).
Nord - Lille, 28 septembre (F. Boca).
Pas-de-Calais - Audinghen, phot., 1er novembre (G. Flohart).
Vendée - Île d'Yeu : Port-Joinville, 25 octobre (X. Hindermeyer *et al.*).
1997 Morbihan - Hoëdic, 23 octobre (L. Legal, G. Sabatier).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Une année dans la moyenne pour le nombre d'oiseaux avec 35 individus. À noter encore un oiseau normand cette année avec la donnée du Calvados et un sur l'île d'Yeu qui se met donc au diapason des îles bretonnes. L'oiseau du Nord était dans un jardin privé en plein Lille !

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

1 - Individus présentant les caractéristiques du groupe *tristis/fulvescens* (6/8 - 1/1)

Gard - Camargue : marais de la Musette, chant., 26 mars (Y. Kayser).

(Sibérie). Encore un oiseau chanteur dans le Midi rappelant ceux de l'Aude et de l'Hérault de 1997 à la même époque.

2 - Pouillots véloces de type sibérien (94/98 - 16/18) :

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, 14 février (Y. Kayser) ; Salin-de-Badon, 2 ind. dont 1 capturé, phot., 13 et 14 novembre (P. Defos du Rau, Y. Kayser, M. Thibault).

Finistère - Ouessant : Ker Yegu, 22 octobre (E. Didner) ; Prad Meur, 5 novembre (Y. Guermeur), 11 novembre (Y. Guermeur) ; Stang Meur, 2 ind., 5 et 6 novembre (Y. Guermeur, Van Howe) ; Rumalic, 5 novembre (Y. Guermeur) ; Cost ar Reun, 6 novembre (Van Howe *et al.*) ; Ty Crenn, 6 novembre (Y. Guermeur) ; Park Raden, 10 novembre (Y. Guermeur) ; Arland, 16 et 24 novembre (Y. Guermeur), 11 décembre (Y. Guermeur) ; Poull Brac, 26 novembre (Y. Guermeur) ; Caraes, 27 novembre (Y. Guermeur) ; Porz Paol, 30 décembre (D. Simpson).
Gard - Camargue : marais de la Musette, 17 mars (Y. Kayser), peut-être l'oiseau capturé et identifié comme *tristis/fulvescens* le 26 mars.
Hérault - étang de Vendres, 17 avril (P.J. Dubois).
Morbihan - Île d'Hoëdic, 29 octobre (A. Perthuis *et al.*).
1997 Eure - Val-de-Reuil, 30 novembre (Y. Créau).

(Sibérie). L'oiseau de l'Hérault est peut-être un *tristis* non chanteur (*cf.* les oiseaux de l'an dernier sur ce secteur). À noter une arrivée autour des 5 et 6 novembre à Ouessant.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (189/196 - 7/8)

Finistère - Ouessant : Stang ar Stiff, 25 septembre (Y. Guermeur, J.-P. Jordan) ; Cost ar Reun, 26 et 29 septembre (J.-P. Jordan) ; Park Raden, 4 et 6 octobre (Y. Guermeur) ; Arland, 1er hiver, 5 octobre (C. Monnerat) ; Porz Noan, 2 ind., 5 octobre, 1 seul le 6 octobre (Y. Guermeur, G. Jardin) ; réservoir amont, 7 octobre (Y. Guermeur).
Pas-de-Calais - Audinghen, 1er hiver, 26 et 27 septembre (G. Flohart, P.S. Redman *et al.*).
1997 Finistère - île de Sein, 1er hiver, phot., 13 octobre (F. Jiguet)
1996 Manche - Gatteville-le-Phare, 1er hiver, 11 septembre (A. Searle *et al.*).
1995 Loire-Atlantique - Le Croisic, phot., 30 septembre (Y. & J.-P. Trévoux).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Petite année, comme en 1997, avec huit oiseaux ; à noter les arrivées concomitantes au Cap Gris-Nez et sur Ouessant. Quant à la mention de 1995 au Croisic, il y a longtemps que les observateurs du secteur l'attendaient. Par ailleurs, le record de 1995 s'établit désormais à 33 individus.

PIE-GRIÈCHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (6/6 - 1/1)

Gironde - Domaine de Certes/Audenge, 1er hiver, phot., du 27 novembre au 15 décembre (F. Dupuy, P. Nadé).

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). Cet oiseau qui s'est attardé sur ce coin tranquille en réserve, chantait à chaque passage des observateurs.

ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (45/118+ - 4/9)

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuve de reproduction) :
Aude - L'Ayrolle/Gruissan, 2 ad., 8 et 9 avril (S. & S. Albouy, J. Gonin) ; Ayguades/Gruissan, 12 et 13 avril (P.J. Dubois) ; Narbonne, 13 avril (P.J. Dubois).
Hérault - Lespignan, 3 ad. et 2 juv., 21 juin (L. Dietrich, Y. Kayser, A. Olivier).
1997 Aude - Gruissan, 2 ad., 29 décembre (G. Olioso).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). La colonisation continue le long du littoral du Languedoc ; l'oiseau de Narbonne a été vu sur un parterre près d'un hypermarché, et , *a priori*, il y a eu reproduction dans le village de l'Hérault. À compter du 1er janvier 2000, l'espèce ne sera plus soumise à homologation qu'en dehors de la Corse, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Il est donc intéressant de suivre maintenant son éventuelle progression dans l'Hérault par exemple, où l'espèce reste soumise à homologation.

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (39/47 - 2/2)

Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, 1 subad./ad., phot., 27 et 29 juillet puis 8 août (M. & M. Boët, Y. Kolbeinsson).
Finistère - Ouessant : Prad Meur, juv., 24 au 30 septembre (B. Isaac, J.-P. Jordan, A. Mera) ; An Aod Meur, Pern et Porz Noan, 1er hiver, phot., du 21 octobre au 6 novembre (P. Crouzier, P.J. Dubois, C. Gonin, N. Vincent-Martin *et al.*).
1997 Gard - Pujaut, subad./ad., 24 août (P. Traisnel).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). L'oiseau vu en estuaire du Var était porteur d'une bague métallique dont une lecture partielle a pu démontrer qu'il était échappé de chez un éleveur du département (il n'a donc pas été comptabilisé). Les deux autres, des juvéniles, ont été vus dans un site désormais classique, à une époque classique...

MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (13/21 - 1/1)

Corse-du-Sud - Bonifacio, 1 mâle, 6 mai (H. Davière, B. Helsens, E. Lapous).
1997 Corse-du-Sud - île de Cavallo, 3 mâles et 1 fem., 24 novembre (N. Vincent-Martin), mâle, 2 décembre (N. Vincent-Martin) ; Bonifacio, mâle, 6 décembre (N. Vincent-Martin).

(Canaries, pourtour de la Méditerranée, Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient). Il convient d'être extrêmement attentif en présence de cette espèce en Corse, compte tenu des nombreux hybrides avec le Moineau cisalpin *Passer domesticus italiae*. Néanmoins, il semble bien que l'espèce niche en petit nombre notamment sur les îles de Bonifacio... et dans la région de cette même ville (Thibault & Bonaccorsi, 1999, *Birds of Corsica*).



21. Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus*, 1er hiver, Audenge, Gironde, novembre 1998 (P. Nadé). *First-winter Isabelline Shrike.*

SIZERIN BLANCHÂTRE *Carduelis hornemanni* (3/3 - 2/2)

1996 Finistère - Quimper, du 7 janvier au 4 février (A. Desnos) et non uniquement jusqu'au 3 février (*Ornithos* 4-4 :160).

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (96/133+ - 8/3)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).

Doubs - Sainte-Colombe, mâle rouge chant., du 16 mai au 14 juillet, mâle et fem., 27 juin (D. & J.-M. Michelat *et al.*) ; La Rivière-Drugeon, mâle chant., du 21 au 23 mai (D. Michelat, C. Piotte *et al.*).
Jura - Les Rousses, 6 mâles (4 rouges, 1 gris et 1 chant.) et 1 fem., du 30 mai au 20 juin (J.-L. Cathala, P. & J.-B. Crouzier) ; Bois d'Amont, 4 mâles (3 chant., 1 gris), du 30 mai au 20 juin (J.-L. Cathala, P. & J.-B. Crouzier).
Haute-Loire - Bains, au moins 1 mâle imm., vidéo*, du 18 au 20 juin puis le 25 juin et le 2 juillet (A. Giraud, D. Vigier).
Manche - Grande Île de Chausey/Granville, mâle imm.*, 20 mai (L. Demongin).
Pas-de-Calais - Dannes, fem./imm.*, 25 mai (M. Guerville).
1997 Doubs - La Rivière-Drugeon, mâle rouge chant. et fem., du 22 mai au 2 juin (D. Michelat, C. Piotte *et al.*) ; Sainte Colombe, mâle rouge, du 22 au 25 mai, fem. 25 mai (D. Michelat, F. Lonchampt *et al.*).
1997 Haut-Rhin - Rothenbach-Wildenstein, mâle imm.*, 10 juin (V. Palomares).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Seuls deux sites (les mêmes) sont occupés dans le Haut-Doubs en 1997 et 1998. Dans le Haut-Jura, le total de 10 mâles chanteurs en 1998 est à peine inférieur à celui des années précédentes (11 en 1997). La rareté des femelles et l'absence de jeunes sont dues au caractère ponctuel de la prospection. La donnée de Haute-Loire aura-t-elle une suite heureuse ? À noter la proximité des dates pour les oiseaux de la Manche et du Pas-de-Calais.

PARULINE OBSCURE *Vermivora peregrina* (1/1 - 0/0)

1997 Finistère - île de Sein, phot., 25 avril (Y. & J.-P. Trévoux).

(Amérique du Nord). Remarquable observation, à la fois en tant que première française, mais aussi quant à l'époque où on n'attendait pas forcément une paruline... puisqu'il s'agit de la première donnée printanière en Europe.

PARULINE RAYÉE *Dendroica striata* (2/2 - 0/0)

1995 Finistère - île de Sein, 29 octobre (Y. & J.-P. Trévoux).

(Amérique du Nord). La dernière (et la première !) observation de l'espèce en France remonte à 1991 à Ouessant, où un oiseau a séjourné du 9 au 15 octobre ; celui de 1995 était manifestement plus pressé !

BRUANT À CALOTTE BLANCHE *Emberiza leucocephalos* (4/11 - 3/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas de l'Auricet, de 1 à 2 mâles, du 26 janvier au 14 février (Y. Kayser *et al.*), mâle et fem., du 2 décembre au 8 février 1999 (Y. Kayser, D. Laloi *et al.*) ; Mas de Jonquières/Sylvéréal, mâle ad., 22 février (F. & L. Veyrunes).

1997 Pas-de-Calais - Audinghen, fem. juv., 22 décembre (G. Flohart).

(Sibérie). Apparemment, une partie des oiseaux découverts au cours de l'hiver 1997/1998 sont revenus hiverner au même endroit, ils n'ont donc pas été comptabilisés ; en revanche, le mâle du Mas de la Jonquière, à 11 km du Mas de l'Auricet, a été pris en compte, au bénéfice du doute... (voir article dans le présent numéro). L'observation de l'oiseau de 1997 au cap Gris-Nez confirme qu'il y aurait sûrement des « choses » à trouver dans les bandes de fringilles et de bruants hivernant dans les friches et autres labours...

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* (14/14 - 3/3)

Finistère - Ouessant : Kadoran, fem./imm., 19 et 20 octobre (P. Crouzier, E. Didner, P.J. Dubois *et al.*). Île de Sein, mâle ad., 19 et 20 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*), fem./imm., 22 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse *et al.*).

(Scandinavie, Sibérie). Contrairement au Bruant nain, le Bruant rustique est loin d'être annuel en France (dernière mention le 4 novembre 1995 dans le Lot-et-Garonne). Aussi peut-on voir 1998 comme une bonne année avec trois oiseaux manifestement arrivés en même temps sur ces deux îles du Finistère.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (46/46 - 3/7)

Finistère - Roc'h Cléguer/Brasparts, 5 dont 4 chant., 26 avril et 3 mai (J. Maout) ; Ouessant : Prad Meur, phot., 7 et 8 octobre (J. Laesser, C. Monnerat).

Morbihan - Hoëdic, phot., 29 octobre (A. Perthuis *et al.*).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Les observations de ces oiseaux chanteurs dans une pessière calcinée des monts d'Arrée sont bien sûr tout à fait extraordinaires. Rappelons que les données printanières sont fort rares et concernent sans doute des oiseaux arrivés à l'automne précédent et ayant hiverné : pour mémoire, l'espèce a été trouvée dans le Finistère en janvier 1988 et d'autres hivernants ont été répertoriés depuis (Maine-et-Loire en 1991, Puy-de-Dôme en 1997).

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (35/37 - 2/2)

Finistère - Ouessant : Gouzoul, fem. ad., phot., du 5 au 13 septembre (G. Bruneau *et al.*).

Lozère - causse de Sauveterre/Champerboux, mâle ad., phot., 26 juin (F. Legendre).

1991 Lozère - col de Tartabisac/Le Pompidou, mâle internuptial, phot., 10 août (D. Cohez).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Mais que se passe-t-il donc en Lozère, même à sept ans d'intervalle ? La donnée post-nuptiale d'Ouessant est intéressante, les observations automnales étant plutôt rares en France. On peut souligner que ces trois nouvelles mentions ont toutes été appuyées par des photos.



22. Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala*, femelle adulte, Ouessant, Finistère, septembre 1998 (G. Bruneau). *Female Black-headed Bunting.*



23. Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*, femelle, Camargue, décembre 1998 (D. Laloi). *Female Pine Bunting.*

ANNEXE 1 - ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D1)

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (27/28 - 3/3)

Bouches-du-Rhône - Camargue : embouchure du Grand-Rhône, ad., phot., 21 mars (P. Ponel *fide* P. Orsini).
Charente-Maritime - Rochefort, ad., 16 mai (C. Boucher, P. Trotignon).
Vaucluse - Mondragon, ad., 31 décembre (Henon, G. Olioso).
1996 Bouches-du-Rhône - Étang de Berre, ad., phot., du 20 mars au 14 août (M.-C. Martin) et non uniquement le 26 juin (*Ornithos* 5-4 : 176).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). L'oiseau vu en Camargue (et aussi dans le Vaucluse) en 1998 pourrait être celui qui a séjourné en 1996 sur l'étang de Berre (?), mais rien ne le prouve.

PÉLICAN GRIS *Pelecanus rufescens* (13/13 - 4/4)

Charente - Saint-Germain-de-Confolens, ad., blessé et récupéré, 26 novembre (C & D. Frainnet).
Loire-Atlantique - lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, ad. probable, 5 octobre (S. Reeber).
Nord - Eppe-Sauvage, ad., 23 et 24 juillet (J. Piette).
Haute-Saône - Vaivre, ad., 31 août (D. Lecornu).
1997 Loir-et-Cher - Averdon, phot., du 28 octobre au 12 janvier 1998 (A. Perthuis *et al.*) et non uniquement jusqu'au 15 novembre (*Ornithos* 5-4 : 176).

(Afrique tropicale et présence quasi-continue dans le sud de l'Égypte). La radiographie pratiquée sur l'oiseau de Charente a révélé qu'il avait été atteint par des plombs de chasse ! En ce qui concerne l'individu du Loir-et-Cher, il présentait une mue bizarre à l'aile gauche et affichait une grande confiance, d'où le sentiment d'un échappé. À l'inverse, celui de Grand-Lieu était beaucoup plus farouche.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (104/161 - /)

1992 Morbihan - Falguérec/Séné et Pen an Toul/Larmor-Baden, mâle ad., 19 et 20 avril (J. Maout).

(Afrique du Nord, Europe du Sud-Est, Asie occidentale). Oiseau peu farouche... L'espèce n'est plus soumise à homologation depuis le 1er janvier 1995.

HARLE COURONNÉ *Lophodytes cucullatus* (6/6 - 0/0)

1997 Haut-Rhin - Hunningue, fem./imm., 10 mars (D. Holfert).
1992 Bas-Rhin - Steinbourg, 28 octobre (D. Roessler).

(Amérique du Nord). À chaque fois, les observations n'ont duré que quelques heures, et rien ne permet, dans ces deux cas, d'affirmer qu'il s'agit d'oiseaux échappés de captivité.

TOURTERELLE MAILLÉE *Streptopelia senegalensis* (5/5 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Arles, 30 août (M.D. Crewe), 2 ind., 6 septembre (A. van den Berg, C. Kightley).
(Afrique, Asie mineure, Istanbul). Il est vrai que deux Tourterelles maillées vues en Camargue méritent quand même une certaine attention d'autant que l'espèce est en expansion dans le nord-ouest africain. Cette espèce est donc particulièrement à surveiller.

ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, *a priori*, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

Note importante : les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée sont fournies aux observateurs ayant joint une enveloppe timbrée à leur adresse en demandant à être informés de la décision du CHN.

1998

Océanite de Swinhoe *Oceanodroma monorhis* - Morbihan - 10 octobre.
Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var - forme blanche, 4 avril. Var - Hyères - forme « bigarrée », du 29 avril au 5 mai.
Canard noir *Anas rubripes* - Yvelines - étangs de Saint-Hubert/Le Perray-en-Yvelines - mâle, 30 juin.
Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* - Eure - Igoville - mâle ad., 15 mars. Oise - Mello - mâle, 10 janvier.
Macreuse à front blanc *Melanitta perspicillata* - Vendée - Le Château d'Olonne - mâle, 8 mars.
Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* - Orne - Neauphe - mâle, 24 janvier.
Vautour moine *Aegypius monachus* - Haute-Loire - juv., 10 mars.
Busard pâle *Circus macrourus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : phare de La Gacholle - fem. 1er été, 21 avril.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Pas-de-Calais - Dannes - imm., 24 septembre. Seine-Maritime - Saint-Aubin-Celloville - 8 mars. Territoire-de-Belfort - Belfort - 14 février ; Anjoutey - 3 novembre.
Aigle criard *Aquila clanga* - Aude - Gruissan - 29 août.
Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* - Landes - Orx - ad. forme claire, 9 septembre.
Faucon lanier *Falco biarmicus* - Alpes-Maritimes - col des Champs/parc du Mercantour - 2 ind., 29 août. Bouches-du-Rhône - Crau : bergerie de Brune d'Arles - imm., 17 février.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Bouches-du-Rhône - Le Rove - ad., 1er novembre.
Marouette de Baillon *Porzana pusilla* - Pas-de-Calais - Romelaere - 16 mai.
Pluvier fauve *Pluvialis fulva* - Finistère - Ouessant : Punel - ad. plumage nuptial, 5 juillet.
Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis* - Vendée - La Faute-sur-Mer - 25 août.
Bécassine double *Gallinago media* - Haute-Marne - lac du Der/Eclaron - 4 ind., 20 septembre.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Landes - Tarnos - juv., 16 août. Manche - Carteret - 2 imm., 3 mai ; Gatteville-le-Phare - imm., 15 septembre. Haute-Savoie - lac Léman, au large de Thonon-les-Bains - juv., 18 septembre.
Mouette atricille *Larus atricilla* - Charente-Maritime - Île de Ré : Lebois-Plage en Ré - ad. plumage d'hiver, 25 août.
Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia* - Pyrénées-Orientales - Canet-en-Roussillon - ad., 14 avril.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Gironde - Arcachon - 1er hiver, 11 janvier. Indre-et-Loire - Rillé - ad., 14 janvier. Seine-Maritime - Le Hode/Le Havre - 1er été, 2 avril.
Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* - Charente-Maritime - Île de Ré : La Flotte en Ré - 1er été, 7 août , Les Portes-en-Ré - imm., phot., 10 septembre.
Sterne bridée *Sterna anaethetus* - Charente-Maritime - Saint-Just-Luzac - 2 ad., 17 septembre.
Guillemot à miroir *Cepphus grylle* - Finistère - Ouessant : Créac'h - 2 imm., 18 octobre.
Hirondelle à front blanc *Hirundo pyrrhonota* - Finistère - Ouessant : Lampaul - 27 octobre.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Basses-Méjannes - 9 février.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg* : Bouches-du-Rhône - Marignane - fem., 20 avril. Haute-Corse - Biguglia, 2 mâles ad., 5 mai. Isère - La Côte-Saint-André - mâle ad., 25 mai. Somme - Hâble d'Ault - mâle ad., du 3 au 17 mai.
Rossignol progné *Luscinia luscinia* - Jura - Les Deux-Fays - 24 avril.
Tarier pâtre *Saxicola torquata* - mâle présentant les caractéristiques des races *maura/stejnegeri* : Calvados - Ouistréham - 25 février ; Loire-Atlantique - Préfailles - 18 et 19 juillet.
Locustelle fluviatile *Locustella fluviatilis* - Pas-de-Calais - Gonnehem - 23 avril.
Hypolaïs pâle *Hippolais pallida* - Camargue : phare de La Gacholle - 2 ind., 23 mai ; Lambesc - 9 septembre.
Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* - Morbihan - La Croix Helléan - 9 février.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* gr. *tristis/fulvescens* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin de Badon - capturé, phot., 13 et 14 novembre. Eure - Le Manoir-sur-Seine, 6 avril.

Gobemouche nain *Ficedula parva* - Loire-Atlantique - Gétigné - 1er hiver, 26 septembre.
Bruant auréole *Emberiza aureola* - Oise - Morienval - 19 octobre.
Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* - Charente-Maritime - Île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines - 17 mai.

1997

Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* - Nord - lac du Héron/Villeneuve d'Ascq - 13 décembre.
Albatros à sourcils noirs *Diomedea melanophris* - Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen - ad., 20 août.
Pétrel gongon *Pterodroma feae* - Nord - Le Clipon/Loon-Plage - 15 octobre.
Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* - Oise - Saint-Vaast-les-Mello - mâle, 13 et 18 avril.
Eider à tête grise *Somateria spectabilis* - Finistère - Aber Wrac'h/Ploudalmezeau - 1er hiver, 26 février.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Ardennes - Le Chesne, ad., 25 octobre. Haute-Loire - Saint-Pierre-Eynac - 5 octobre. Rhône - Avenas - 28 juin.
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* - Pyrénées-Atlantiques - lac de L'Ayguelongue/Momas - juv., 15 août.
Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* - Pyrénées-Atlantiques - lac de L'Ayguelongue/Momas - juv., 15 août.
Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* - Haut-Rhin - Michelbach - ad., 10 août.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Ardennes - Les Mazures - ad., 28 décembre. Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen - ad., 16 septembre.
Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* - Finistère - Trunvel/Tréogat - imm., 25 mars.
Sterne bridée *Sterna anaethetus* - Vendée - Saint-Michel-en-L'Herm - ad., 6 août.
Guillemot à miroir *Cepphus grylle* - Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen - ad., 16 septembre.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* gr. *tristis/fulvescens* - Finistère - Cléden/Cap Sizun - phot., 8 et 9 novembre. Manche - Tirepied - 16 novembre.
Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* - Pas-de-Calais - Le Touquet - juv., phot., 30 octobre.
Moineau espagnol *Passer hispaniolensis* - Corse-du-Sud - Île de Cavallo - 3 mâles et 1 fem., 24 novembre, 5 mâles et 3 fem., 27 novembre, 3 mâles et 2 fem., 2 décembre, de 5 à 10 ind. du 4 au 11 décembre ; Bonifacio, mâle et 2 fem., 6 décembre ; Porto Vecchio, 2 mâles, 11 décembre.
Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* - Jura - Champrougier - 1er hiver, 2 novembre.

1996

Macreuse à front blanc *Melanitta perspicillata* - Pas-de-Calais - cap Gris-Nez/Audinghen - fem., 29 juillet.
Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* - Calvados - Amblie - ad., du 24 novembre au 1er décembre, précédemment acceptée (*Ornithos* 4-4 : 146), à présent refusée après réexamen.
Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* - Finistère - Le Conquet - ad., 26 octobre.
Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* - Calvados - Bonnebosq - 1 à 7 ind., phot., du 1er au 20 septembre.

1995

Faucon gerfaut *Falco rusticolus* - Ain - Birieux - 4 et 5 avril.

1990

Faucon sacre *Falco cherrug* - Savoie - Détrier/La Rochette - ad. probable, 23 décembre.

1982

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Bouches-du-Rhône - Camargue - forme sombre, phot., 25 juillet.

ANNEXE 3 - ESPÈCES INSCRITES DANS AUCUNE CATÉGORIE

Figurent ici les espèces inscrites dans aucune catégorie mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour. Ne figurent pas les espèces pour lesquelles une origine sauvage est totalement invraisemblable.

• **Flamant nain** *Phoenicopterus minor* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Fangassier, ad., du 17 avril au 26 juin, puis le 21 août (P.-Y. Henry *et al.*) ; étang de Brasol/salins d'Aigues-Mortes, ad., 23 novembre (L. Dietrich, Y. Kayser) ; Hérault - ad., phot., du 15 au 22 mars (M. Thibault, F. & L. Veyrunes)

• **Bernache du Canada** *Branta canadensis* - Individus présentant les caractéristiques des races *minima/hutchinsii/parvipes* : Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, 5 ind., 4 janvier (B. Lebrun). 1997 Marne - lac du Der-Chantecoq à Giffaumont-Champaubert, Arrigny, Sainte-Marie-du-lac-Nuisement, du 25 octobre au 22 février 1998 (E. Le Roy, C. & R. Riols, B. Theveny *et al.*).

Le CHN souhaite recueillir les données de « petites » Bernaches du Canada et invite les observateurs à envoyer toute description se rapportant à ce type d'oiseau.

Remerciements

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 1998, ont contribué à son bon fonctionnement :
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière nécessaire au Comité et à son Secrétariat, ainsi que la revue *Ornithos* pour la prise en charge des photos couleur qui illustrent ce rapport,
- Guillaume Bruneau, Christian Dronneau, Pascal Grisser, Yvon Guermeur, Yves Kayser, Robert Lécaille, David Loose, Dominique Michelat, Christian Riols qui nous ont apporté des informations complémentaires ainsi que tous les responsables de Centrales Ornithologiques ou de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) qui nous ont transmis des données,
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

Summary

Rare birds in France in 1998. *A total of 3 new species were added to the French List in 1998 : Short-billed Dowitcher* Limnodromus griseus, *Common Nighthawk* Chordeiles minor *and Blyth's Pipit* Anthus godlewskii. *In 1997, 2 new species were accepted for France, Black-throated Accentor* Prunella atrogularis *and Tennessee Warbler* Vermivora peregrina. *1998 also included the first record of Willet* Catoptrophorus semipalmatus *this century, the third-ever records of Bufflehead* Bucephala albeola, *the second Pallas's Grasshopper* Warbler Locustella certhiola, *the third and fourth records of Pacific Golden Plover* Pluvialis fulva *and Western Sandpiper* Calidris mauri ; *the second records of Ross's Gull* Rhodostethia rosea *and Blackpoll Warbler* Dendroica striata *occurred in 1994 and 1995 respectively.*
Record numbers included a total of 4 American Wigeons Anas americana, *9 Ring-necked Ducks* Aythya collaris, *92 Ruddy Ducks* Oxyura jamaicensis, *4 Great Bustards* Otis tarda, *5 Sociable Plovers* Vanellus gregarius, *13 Pectoral Sandpipers* Calidris melanotos, *117 Long-tailed Skuas* Stercorarius longicaudus, *3 Citrine Wagtails* Motacilla citreola, *4 Greenish Warblers* Phylloscopus trochiloides *and 5 singing Little Buntings* Emberiza pusilla *together. At last, the longest recorded stay (of 128 days) of White-billed Diver* Gavia adamsii *in France.*
The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of records and individuals for the period 1981-97 ; the other pair relate to the current year (1998).

Comité d'Homologation National c/o LPO
La Corderie Royale, BP 263, 17305 Rochefort Cedex



24. Chevalier semipalmé *Catoptrophorus semipalmatus* La Faute-sur-Mer, Vendée, septembre 1998 (J.-F. Darras). *Willet.*