Les oiseaux rares en France en 1999



Rapport du Comité d'Homologation National

par Jean-Yves Frémont et le CHN

Introduction

Il s'agit du 18e rapport du Comité d'Homologation National (CHN), qui couvre l'année 1999. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 1999 est de **443** et le taux d'acceptation est de 81,3 %, des chiffres comparables à ceux de 1998. En 1999, c'était le poste de Philippe J. Dubois (Président) dont le mandat arrivait à expiration qui était vacant. Pour lui succéder, Marc Duquet a été élu. En outre, Philippe J. Dubois ne souhaitant pas conserver le titre et les fonctions de Président, c'est Pierre Crouzier qui lui a succédé. En 1999, le CHN se composait donc des membres suivants : Yvon Créau, Pierre Crouzier (Président), Marc Duquet, Guy Flohart, Yves Kayser, Dominique Michelat, Serge Nicolle, Alain Rouge, ainsi que Jean-Yves Frémont (Secrétaire, non-votant). Un poste a été pourvu en 2000 et un autre doit l'être en 2001. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du Secrétaire du CHN avant le 1er mars 2001.

Travaux et décisions du CHN

(Voir à ce sujet l'article « *En direct du CHN* » dans le présent numéro.) Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (modèle à demander éventuellement au secrétariat du CHN) dès que possible après l'observation (**que vous soyez le découvreur ou simple observateur**) et de préférence avant le 31 décembre de l'année en cours. Ceci évite la publication très tardive de données anciennes. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s).

Les faits marquants

En 1999, une espèce a été ajoutée à la Liste française, la Sterne de Forster *Sterna forsteri*, et l'Aigle ibérique *Aquila adalberti* a enregistré sa première mention pour le XXe siècle. L'année 1999 a en outre fourni à la France son deuxième Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* (le premier avait été « collecté » par un chasseur...) et ses



1. Le CHN 1999 au complet, lors de la réunion plénière des 13 et 14 mai 2000 à Paris (J-Y. Frémont). De gauche à droite : P. Crouzier, D. Michelat, A. Rouge et Y. Créau (assis) S. Nicolle et Y. Kayser (debout), J.-Y. Frémont, G. Flohart et M. Duquet (accroupis).
French Rarities Committee, annual meeting, Paris, May 2000.

deuxième et troisième données de Gravelot mongol *Charadrius mongolus*. En 1999, des effectifs records ont été notés : 6 Macreuses à front blanc *Melanitta perspicillata* dont un groupe de cinq individus, 128 Érismatures rousses *Oxyura jamaicensis*, 4 Busards pâles *Circus macrourus*, 24 Marouettes poussins *Porzana parva*, 6 Bécasseaux de Bonaparte *Calidris fuscicollis*, 133 Labbes à longue queue *Stercorarius longicaudus*, 8 Pouillots bruns *Phylloscopus fuscatus*. Par ailleurs, l'année 1998 a accueilli le deuxième Traquet pie *Oenanthe pleschanka* et le quatrième Garrot albéole *Bucephala albeola* pour la France. De plus, une sous-espèce, la Bergeronnette grise du Maroc *Motacilla alba subpersonata*, observée en 1997 en Corse, a également été ajoutée à la Liste des Oiseaux de France.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A ET C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.

2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre de données homologuées depuis 1981 (1999 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers, la même chose pour 1999.

3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.

4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).

5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.

6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).

7. Date(s) d'observation.

8. Observateur(s), sauf exception, limité à 3 (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe ou dessinateur).

9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.

10. La séquence taxonomique est celle de Voous (1978, *The List of the Birds of the Western Palearctic*), modifiée par la *Liste des Oiseaux de France* (CAF 1997).

11. Les données concernant les races sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la race concernée.

12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 1999. Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Pouillot verdâtre - un le 27 septembre 1998 à Hoëdic, Morbihan (S. Guérin & G. Rault, *in* Frémont et le CHN 1999).

PUFFIN SEMBLABLE *Puffinus assimilis* (13/13 - 2/2)

Finistère - Île d'Ouessant : Porz Doun, 23 septembre (J. Duplain).
Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, 4 octobre (G. Flohart).

(La race *baroli* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries et aux Açores). Ces deux données interviennent après deux ans d'absence de l'espèce. En revanche, dates et lieux d'observation sont habituels.

OIE A BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (29/73 - 2/3)

Maine-et-Loire - Saint-Jean-de-la-Croix, 8 février (P. Boisteault).
Marne - Lac du Der/Larzicourt, 2 ad., du 30 décembre au 9 janvier 2000 (A. Audevard, B. Theveny).
1998 Finistère - Lac du Drennec/Sizun, du 18 février au 1er mars (F. Barrault, P. Le Mao).
1997 Marne - Lac du Der/Arrigny, 1er hiver, du 23 octobre au 7 novembre (P. Albert, J. Piette, E. Le Roy, C. Riols) et non dans la Haute-Marne comme indiqué précédemment (*Ornithos* 6-4 : 146), en outre, cette donnée est la même que celle mentionnée uniquement le 1er novembre (J. Piette) dans le rapport 1997 (*Ornithos* 5-4 : 155).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Le nombre de données et d'oiseaux s'inscrit dans la moyenne. La donnée du Maine-et-Loire est intéressante par sa localisation. La dernière mention finistérienne date de 1993 avec 3 individus.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (28/18 - 2/0)

Individus présentant les caractéristiques de la race *nigricans*, appelée « Bernache (cravant) du Pacifique » :

Charente-Maritime - Île de Ré : Ars-en-Ré, 24 décembre au moins (J.-Y. Frémont, Y. & J.-P. Trévoux *et al.*).
Loire-Atlantique - Traicts du Croisic, ad., du 27 octobre au 7 mars 2000 (Y. & J.-P. Trévoux).
1998 Charente-Maritime - Île d'Oléron, jusqu'à 5 ind., du 16 octobre au 8 mars 1999 (A. Kim).

ZEISS *Le rapport du CHN est publié avec le soutien de Carl Zeiss Division Jumelles*

1998 Côtes-d'Armor - Anse d'Yffiniac, ad., le 22 novembre au moins (S. Mauvieux).
1997 Charente-Maritime - Île d'Oléron, ad., du 4 novembre au 16 mars 1998 (A. Kim).
1997 Côtes-d'Armor - Anse d'Yffiniac, ad., du 15 novembre au 26 décembre au moins (S. Mauvieux) et non baie de Saint-Brieuc, le 21 décembre uniquement (*Ornithos* 5-4 : 155).
1996 Charente-Maritime - Île d'Oléron, ad., 30 décembre (A. Kim).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). La comptabilité des oiseaux devient difficile entre les nouveaux et les « revenants ». Pour 1999, Le Croisic et l'île de Ré ont accueilli leur hivernant habituel respectif. La baie de Saint-Brieuc héberge un adulte depuis 1996 (il n'a toutefois pas été signalé pour l'instant au cours de l'hiver 1999/2000). L'île d'Oléron a, quant à elle, connu une arrivée spectaculaire, puisqu'elle a abrité jusqu'à cinq oiseaux au cours de l'hiver 1998/1999, alors qu'un seul individu hivernait depuis 1995. Cet afflux pourrait corroborer la théorie de l'expansion vers l'ouest de la zone de nidification de cette race, favorisant ainsi la rencontre avec la race *bernicla* ; des individus de la race du Pacifique accompagneraient donc sur leurs lieux d'hivernage occidentaux, les oiseaux de la race type. Autre conséquence, des couples mixtes *nigricans* x *bernicla* ont été rapportés, ce qui doit désormais conduire les observateurs à une grande attention à cet égard (Syroechkovski *et al.* 1998).

BERNACHE A COU ROUX *Branta ruficollis* (16/15 - 0/0)

(Sibérie). Deux données (Charente-Maritime - Bourcefranc-Le Chapus, ad., 2 novembre, A. Kim ; 1997 Mayenne - Montenay, ad., phot., du 12 février au 5 mars, B. Duchenne & B. Roullois) n'ont pas été comptabilisées, en raison du fort doute existant sur l'origine sauvage des deux oiseaux dont l'un était porteur d'une bague rouge (oiseau charentais). Quant à l'autre, il stationnait sur le petit plan d'eau communal parmi une troupe de Canards colverts domestiqués, à une période, il est vrai, correspondant aux rares passages de Bernaches cravants en Mayenne.

CANARD A FRONT BLANC *Anas americana* (19/21 - 2/2)

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Lumine-de-Coutais, mâle 1re année, du 13 au 21 avril (S. Reeber).
Vendée - Olonne-sur-Mer, mâle 1re année, 6 avril (P. Yésou).

(Amérique du Nord). Après s'être montré plutôt timide en nos régions (3 données avant 1981 et en moyenne un par an depuis), ce canard néarctique devient plus régulier (6 mentions pour 7 individus entre 1995 et 1998). Le lac de Grand-Lieu avait déjà accueilli l'espèce l'an passé.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (24/21 - 3/2)

Mâles présentant les caractéristiques de la race américaine *carolinensis*, appelée « Sarcelle à ailes vertes » :
Finistère - Étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, ad., du 18 octobre au 24 janvier 2000 (A. Desnos, G. Rault, J.-Y. Péron *et al.*).
Deux-Sèvres - Lac du Cébron/Saint-Loup-sur-Thouet, ad., 22 mars (A. Armouet, M. Fouquet).
Vendée - Champclou/L'Île d'Olonne, ad., 19 novembre (M. Fouquet, O. Girard, B. Trolliet).
1998 Finistère - Étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, ad., du 22 octobre au 24 février 1999 (A. Desnos, P. Le Mao, G. Rault *et al.*).
1998 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, 2 ad. au moins, du 1er au 25 janvier (J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas *et al.*).

(Amérique du Nord). Un oiseau (le même ?) fréquente le secteur de Plonéour-Lanvern depuis 1994. Quant aux oiseaux de Saint-Denis-du-Payré, ils furent peut-être trois à séjourner sur la réserve en cet hiver marqué par les tempêtes.

SARCELLE A AILES BLEUES *Anas discors* (30/33 - 4/5)

Bouches-du-Rhône - Camargue, mâle 1er hiver bagué au Québec le 19 août 1999 et tué à la chasse le 19 septembre (*info.* Y. Kayser, O. Pineau).
Calvados - Colleville-Montgomery, mâle et fem., phot., du 1er au 7 avril (J. Jean Baptiste, S. Poncet).
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Lumine-de-Coutais, mâle ad., 3 mars (S. Reeber).
Vendée - Le Poiré-sur-Velluire, mâle ad., du 4 au 16 mars (P.-P. Evrard, C. & J. Gonin *et al.*).

(Amérique du Nord). Merci à ce chasseur camarguais de nous avoir montré que toutes les Sarcelles à ailes bleues vues sur notre territoire n'étaient pas que des oiseaux de « basse-cour ». On aurait toutefois préféré qu'il nous le prouve autrement ! Les oiseaux de l'ouest de la France sont manifestement arrivés ensemble. La femelle vue dans le Calvados portait une bague de couleur à la patte droite et une en aluminium à la gauche. Origine ?

FULIGULE A BEC CERCLE *Aythya collaris* (70/61 - 4/3)

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, fem. ad. probable, 1er octobre (S. Reeber).
Nord - Les Prés-du-Hem/Armentières et Warneton, fem. ad., phot., du 23 octobre au 1er mars 2000 (C. Capelle *et al.*).
Pas-de-Calais - Eurotunnel/Coquelles, fem. ad., 26 avril (P.J. Dubois).
Vendée - Parc Soubise/Mouchamps, mâle ad., du 1er au 22 février (T. You), oiseau présent depuis novembre 1997 sur l'étang des Boucheries/Les Landes-Genusson (le même qu'en 1996).

(Amérique du Nord). L'oiseau vendéen est bien connu et a déjà fréquenté l'étang des Boucheries aux Landes-Genusson. En revanche, pas d'oiseau signalé cette année dans l'Eure ; le bon suivi des plans d'eau de Léry-Poses se serait-il arrêté ? Au cours de l'hiver, et en fonction des dérangements, la femelle du Nord a fréquenté différents sites de part et d'autre de la frontière naturelle franco-belge formée par la Lys.



2. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris,* femelle, Armentières, Nord, novembre 1999 (C. Capelle). *Female Ring-necked Duck.*

FULIGULE A TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (5/2 - 1/1)

Jura Desnes, fem., du 20 novembre au 5 février 2000 (D. Michelat, M. Giroud *et al.*).

(Amérique du Nord). Nombreux ont été les observateurs à se rendre sur cette sablière de Franche-Comté, où ce fuligule américain a semble-t-il aimé passer l'hiver. Il s'agit de la deuxième femelle de l'espèce en France, pour un seul mâle vu.

EIDER A TÊTE GRISE *Somateria spectabilis* (5/6 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Saintes-Maries-de-la-Mer, fem., 27 et 28 mars (H. Schielzetg).

(Océan glacial arctique). Curieux lieu de villégiature pour cette espèce toujours aussi rare (2 données au XIXe siècle, 5 depuis 1981) ; c'est la première fois qu'elle est vue en Méditerranée. La dernière mention est de 1996 dans le Nord.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (4/4 - 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la race *americana*, appelée « Macreuse à bec jaune » :

Manche - Carolles, mâle, 28 février (P. & S. Provost).

Vendée - Bouin, mâle, 15 mars (O. Girard).

(Amérique du Nord, Sibérie). L'inspection des bandes de Macreuses noires peut toujours réserver des surprises, si elles sont vues dans de très bonnes conditions...

MACREUSE A FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (20/18 - 3/6)

Finistère - Baie de Sainte-Anne-la-Palud, fem. imm., 5 décembre (G. Rault) ; anse du Ris/Kerlaz, 4 imm., phot., un mâle 2e hiver se joint au groupe à compter du 26 février 2000, du 29 décembre au 22 avril 2000 (J.-Y. Frémont, J. Maout, J.-Y. Péron, G. Rault *et al.*).

(Amérique du Nord). La baie de Douarnenez a été le théâtre d'un événement sans précédent en France (jusqu'à cinq oiseaux ensemble). Il est vrai que la violence des tempêtes de fin décembre était, elle aussi, exceptionnelle. Après avoir tenu le devant de la scène, la Vendée semble aujourd'hui désertée (n'est-ce qu'une apparence ?).

GARROT ALBEOLE *Bucephala albeola* (3/3 - 0/0)

1998 Charente-Maritime - Lagunage de Rochefort-sur-Mer, mâle ad., du 10 au 16 novembre (J. Fillonneau, F. Sardain, P. Trotignon).

(Amérique du Nord). Une deuxième donnée pour 1998, à la même époque que la précédente dans le Cantal, ce qui plaide pour une arrivée naturelle de l'espèce.

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (196/446 - 26/128)

Ain - Birieux, fem., 6 novembre (P. Crouzier, A. Lamy) ; Bouligneux, fem./imm., 15 novembre (P. Varagnat).

Calvados - Saint-Martin-aux-Chartrains, 25 et 26 décembre (V. Renvoise).

Charente-Maritime - Île d'Oléron : Saint-Denis d'Oléron, mâle ad. et 6 fem./imm., le 23 septembre dont 1 fem./imm. jusqu'au 1er octobre (éradiquée) (P. Trotignon) ; lagunage de Rochefort-sur-Mer, mâle ad., 19 octobre, + fem./juv., 20 octobre (mâle ad. éradiqué), 4 ind., (4 éradiqués), 27 octobre (C. Bouchet).
Ille-et-Vilaine - Paintourteau/Erbrée, 3 fem./imm., 31 octobre (S. Guérin).
Loir-et-Cher - Étang de L'Arche/Chémery et étang de Sudais/Pontlevoy, du 14 au 16 octobre (A. Perthuis).
Loire-Atlantique - Les Moutiers-en-Retz, mâle ad., 15 août (J.-Y. Frémont, A. & J. Gernigon), 2 juv., 28 août (J.-Y. Frémont, Y. Trévoux), juv., 12 septembre (J.-Y. Frémont) ; lac de Grand-Lieu : 45 ind. le 14 janvier, maximum de 82 ind. le 4 février, encore 67 ind. le 13 mars, environ 50 ind. dont la moitié de juv., le 15 août, 57 ind. les 27 octobre et 9 novembre, 65 ind. le 29 novembre et 85 ind. le 5 décembre (21 mâles et 64 fem./imm.) (J. Gernigon, S. Reeber) ; saison de nidification au lac de Grand-Lieu : 5 à 9 couples, au moins 5 nichées ayant produit 26 poussins (S. Reeber). Par ailleurs, 20 oiseaux ont été éradiqués sur le lac.
Mayenne - Étang de la Grande Métairie/Jublains, mâle ad., 8 et 16 juin (J.-F. Arcanger), mâle ad. (sans doute le même) et fem. ad. du 29 juillet au 5 août (J.-F. Arcanger) ; étang des Landes/Sainte-Suzanne, fem. ad. (sans doute la même), 12 août (J.-F. Arcanger) ; étang de la Chaussée, mâle ad., 10 et 11 juin (J.-F. Arcanger).
Moselle - Étang du Bischwald/Bistroff, mâle ad., du 7 mars au 7 avril (J. Charennat, A. Knochel, G. Schmitt).
Nord - Étang du Hayon/Trélon, fem./imm., du 8 septembre au 16 octobre (J. Piette).
Pas-de-Calais - Ardres, 5 ind. (dont au moins 2 juv.), 25 septembre (P.J. Dubois), 4 ind. revus le 6 octobre (J.-A. Leclercq, C. Prangere).
Haute-Saône - Saint-Loup-sur-Semouse, fem., 20 novembre (R. Scheifler).
Haute-Savoie - Lac d'Annecy, du 15 au 29 janvier (éradiqué) (MM Revillard & Rocher).
Var - Étang des Pesquiers/Hyères, imm., du 31 décembre au 3 janvier 2000 (A. Blasco, A. Pérennou, J.-G. Robillard).
Vendée - Bouin, juv., 22 août (J.-Y. Frémont, A. Larousse) ; étang des Boucheries/Les Landes-Genusson, 2 mâles et 5 juv. (4 ind. éradiqués), du 8 au 10 octobre (anonyme), 3 ind. (1 ind. éradiqué) les 12 et 13 octobre (H. Belier).
1998 Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu, 84 ind., le 3 décembre (S. Reeber).
1998 Oise - Pontpoint/Moru, fem., les 5 et 6 décembre (J. & M. Votte) et non uniquement le 5 décembre (*Ornithos* 6-4 : 149).
1998 Deux-Sèvres - Étang de la Grue/Moutiers-sous-Argenton, fem. ad., du 5 juin au 15 juillet (M. Fouquet) et non uniquement du 6 au 16 juin (*Ornithos* 6-4 : 149) ; lac du Cébron/Saint-Loup-sur-Thouet, fem./imm., 14 décembre (M. Fouquet).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). Encore une année record pour cette espèce dont les chiffres sont pourtant sous-estimés, ceci étant en partie dû aux difficultés d'appréhender avec exactitude le nombre d'oiseaux fréquentant le lac de Grand-Lieu. En 1999, ce dernier a vu, comme les années précédentes, un pic en février avec une chute régulière jusqu'à la reproduction, où une trentaine d'oiseaux étaient présents. L'effectif augmente à nouveau en juillet-août avec l'envol des jeunes qui essaiment également sur des sites périphériques comme la station d'épuration des Moutiers-en-Retz ou la lagune des Mattes à Bouin. Décembre voit à nouveau des chiffres très élevés. Pour la comptabilité de ce site, 85 individus ont été retenus pour 1999 (3 données), et 14 (1 donnée) ont été ajoutés en 1998 au 70 comptabilisés précédemment. Pour les autres départements, à retenir l'oiseau de Haute-Saône qui fournit la première mention de Franche-Comté. La Mayenne est toujours fréquentée avec assiduité (pour le décompte des données, à noter que le mâle de l'étang de la Chaussée est différent de celui vu en juin et en juillet à la Grande Métairie). Enfin, comme pour le Fuligule à bec cerclé, l'absence de mention cette année dans l'Eure est plutôt surprenante.

ERISMATURE A TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (17/15 - 1/1)

Eure - Neaufles-Saint-Martin, fem. ad., phot., du 24 octobre au 11 novembre (C. Jobin, R. Lery *et al.*).

(Circum-méditerranéenne : Espagne, Tunisie, Turquie, dans les Balkans, également au nord de la Caspienne ; en cours de réintroduction en Corse/France). La population espagnole est en nette augmentation, et des oiseaux sont maintenant régulièrement signalées dans la partie nord de l'Espagne. L'oiseau de l'Eure est-il un avant-coureur ?

ELANION BLANC *Elanus caeruleus* (41/70 - 5/12)

Landes & Pyrénées-Atlantiques - Localités tenues secrètes, 6 sites occupés, mais seulement 4 occupés par un couple ; seuls 2 couples ont niché, produisant chacun 3 jeunes à l'envol (E. Bounine, S. Duchateau, P. Grisser *et al.*).
Loir-et-Cher - Saint-Julien-sur-Cher, ad., phot., du 28 au 30 mars (A. Perthuis *et al.*).
Maine-et-Loire - Localité tenue secrète, 2 ad., du 7 au 10 novembre au moins (encore 1 ind. le 1er avril 2000) (J.-C. Beaudoin, A. Fossé *et al.*).
Mayenne - Chammes, ad., 23 mai (D. Tavenon).
Deux-Sèvres - Bougon, ad., 22 juin (P. Trotignon).
Val-d'Oise - Baillet-en-France, imm., 16 avril (H. Szwaicer).
1997 Deux-Sèvres - Moutier-sous-Argenton, ad., 22 et 23 septembre (J.-Y. Airaud, M. Fouquet).
1997 Vendée - Le Boupère, ad., 12 novembre (M. Fouquet).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). Fidèle à elle-même, cette espèce continue à se montrer un peu partout en France, même aux endroits les plus inattendus comme cette donnée en Île-de-France. La présence de deux individus en Anjou a laissé espérer un moment une nidification, à l'instar du couple du marais Vernier en 1994. Quant aux observations de 1997, elles peuvent se rapporter au même individu.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (254/200 - /)

1997 Marne -Passavant-en-Argonne, ad., 19 octobre (C. Riols).

(Europe septentrionale et centrale, Islande, sud-ouest du Groenland). Rappelons que l'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 1998.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (31/30 - 4/4)

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de Sainte-Anne/Salin de Giraud, mâle ad., 10 avril (N. Vincent-Martin) ; Faraman/Salin de Giraud, fem. ad., 14 avril (Y. Kayser).
Nord - Loon-Plage et Mardyck, mâle 1er été, phot., du 9 au 24 juillet (J.-A. Leclercq *et al.*).
Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer, juv., 21 août (J.-Y. Frémont, A. Larousse, Y. Trévoux).

(Asie centrale, à l'ouest jusqu'en Roumanie). Quatre mentions pour 1999, c'est plutôt la marque d'un bon millésime (moins de deux données en moyenne par an pour la période 1981-1998). Les deux observations camarguaises à quelques joursd'intervalle sont remarquables.

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (12/12 - 4/4)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » :
Aube - Onjon, ad., trouvé mort, phot., 6 novembre (P. Albert, A. Millon, C. Riols *et al.*).
Bouches-du-Rhône - Camargue : Romieu, ad., 19 et 27 décembre (J.-P. Paul).
Marne - Lac du Der/ Giffaumont-Champaubert, ad., 4 novembre (R. Riols).
Var - Villepey/Saint-Aygulf, 4 décembre (D. Huin).
1998 Marne - lac du Der/Giffaumont-Champaubert et Arrigny, 8 novembre (F. Barrault, B. Isaac) et non également le 15 novembre comme indiqué précédemment (*Ornithos* 6-4 : 150).
1997 Aude - Bages, 18 février (G. Olioso).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). La mort de l'oiseau trouvé au pied d'un pylône EDF remontait à environ cinq jours. À noter les arrivées début novembre en Champagne-Ardenne et les observations de décembre d'oiseaux ayant « glissé » vers le sud de la France.

BUSE FEROCE *Buteo rufinus* (5/5 - 2/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas Neuf, 1er hiver, phot., du 20 février au 23 avril (J. Gernigon, J. Gonin, J. Piette *et al.*), 2e hiver (le même oiseau), du 20 octobre au 19 février 2000 (Y. Kayser, A. Le Nevé *et al.*).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Les séjours prolongés de cet oiseau camarguais (V. note dans ce numéro) ont fait le bonheur de nombreux observateurs.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (247/266 - 12/13)

Indre-et-Loire - Pernay, 21 et 22 novembre (R. Baeta).
Marne - Châtillon-sur-Broué, 1er hiver, 17 octobre (C. Riols).
Haute-Marne - Joinville, 1er hiver, 1er novembre (B. Theveny).
Moselle - Tarquimpol, imm., 13 novembre (J.-P. Harly).
Nord - Gravelines, Loon-Plage, Mardyck, 1er hiver, phot., du 3 janvier au 28 février (C. Capelle *et al.*) ; Thumeries, fem. ad. probable, 28 février (C. Capelle) ; Quesnoy-sur-Deûle, 1er hiver, 25 septembre (V. Van Halst).
Pas-de-Calais - Dannes, fem. et imm., 15 et 16 février (M. Guerville), mâle ad., 14 septembre (M. Guerville).
Seine-Maritime - Le Havre, juv., 2 septembre (L. Philippe).
Haute-Vienne - Sauviat-sur-Vige, fem. ad., 20 novembre (M. Barataud).
Essonne - Boissy-le-Sec, imm., 5 novembre (B. Di Lauro).
1998 Oise - Saint-Leu-d'Esserent, mâle ad., 22 novembre (Y. Bas).
1998 Pas-de-Calais - Fiennes, ad., 31 mars (E. Cappe).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Année qui se situe dans la moyenne (1981-1998 : environ 14 données pour 15 individus par an) avec des oiseaux dans les départements classiquement fréquentés par l'espèce. Seuls l'Indre-et-Loire, la Haute-Vienne et l'Essonne font figure d'exception mais à des dates (toutes en novembre) toutefois habituelles. La donnée de Seine-Maritime est désormais la plus précoce jamais enregistrée en France.



3. Buse pattue *Buteo lagopus*, 1er hiver, Loon-Plage, Nord, février 1999 (C. Capelle).
First-winter Rough-legged Buzzard.

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (26/25 - 4/4)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, imm., 13 mai (J.-P. Paul).
Charente-Maritime - Saint-Seurin-d'Uzet, ad., 25 août (R. Plat).
Haute-Corse - Barcaggio, 10 mai (G. Bonaccorsi, C. Jolin, S & P. Provost).
Maine-et-Loire - Montreuil-Bellay, subad./ad., 16 juillet (F. Jiguet).
1998 Meuse - Lachaussée, ad., du 1er mai au 11 juillet (D. Ambroise).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Avec quatre oiseaux observés, 1999 se montre plutôt une bonne année par rapport à la moyenne (1981-1998 : moins de 2 oiseaux par an) ; les dates sont « classiques » ainsi que les régions fréquentées. L'individu lorrain de 1998 est le même qu'en 1997.

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (104/77 - 8/6)

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang Redon, ad., du 14 novembre au 23 février 2000 (Y. Kayser, N. Vincent-Martin *et al.*) ; Tour du Valat, 1er hiver, du 14 au 27 décembre (V. Lemoine, J.-P. Paul, C. Pin) ; Vigueirat, ad., du 2 décembre au 24 février 2000 (Y. Kayser, G. Massez, E. Vialet *et al.*).
Drôme - Montjoyer, ad., 31 mars (G. Olioso).
Hérault - Étang de Capestang, ad. probable, 13 mars (S. Nicolle).
Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, 1er hiver, du 10 janvier au 19 février (J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas *et al.*), 2e hiver, du 8 novembre au 17 février 2000 (P. Grisser, A. Guyot, E. Hiriart *et al.*), ad., du 25 novembre au 27 janvier 2000 (P. Grisser *et al.*).
1998 Bouches-du-Rhône - Camargue : Peaudure et Romieu, juv., du 16 au 21 novembre (N. Beck, J.-P. Paul), également phot. (F. Legendre) (*Ornithos* 6-4 : 150).
1998 Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, ad., du 26 novembre au 19 février 1999 (J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas *et al.*).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). La Camargue a accueilli trois oiseaux différents en ce début d'hiver 1999/2000, et l'adulte de la réserve de Saint-Martin-de-Seignanx, un habitué, a été rejoint début janvier par un jeune oiseau qui est revenu l'hiver suivant.

AIGLE IBERIQUE *Aquila adalberti* (0/0 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Grenouillet, 1er hiver, 14 janvier (L. Dietrich, Y. Kayser, J.-P. Paul).

(Péninsule Ibérique). Séjour éclair, malheureusement, pour cet aigle qui constitue la première mention pour le XXe siècle ; au moins quatre données existent au XIXe siècle.

FAUCON CRECERELLETTE *Falco naumanni* (41/55 - 3/10)

Hors Crau :
Aude - Leucate, mâle ad., 9 avril (G. Olioso).
Bouches-du-Rhône - Camargue : Salins de Badon, mâle et fem., 17 avril (P. Crouzier).
Haute-Corse - Barcaggio, jusqu'à 7 ind. ensemble, phot., du 13 au 16 mai (S. Provost *et al.*).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). En Crau, le nombre de couples nicheurs n'a été que de 39 au lieu des 50 couples nicheurs l'année précédente ; en revanche, succès record de la reproduction avec 30 couples ayant réussi à élever 103 jeunes jusqu'à l'envol, dont 96 furent bagués (P. Pilard *in litt.*). Les autres observations concernent des départements habituels, même si le groupe de sept oiseaux (un seul mâle adulte) en Corse est à souligner.

FAUCON D'ELEONORE *Falco eleonorae* (274/364 - 1/2)

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 2 ad., 25 octobre (S. Reeber).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). À l'instar de l'Élanion blanc, force est de constater que cette espèce peut apparaître un peu partout en France (en dehors de la zone méditerranéenne), la façade atlantique restant toutefois privilégiée. Rappelons que les observations de cette espèce ne sont plus soumises à homologation sur le pourtour méditerranéen depuis le 1er janvier 1998 mais qu'elles le restent bien sûr ailleurs.

FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (25/25 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Vigueirat/Mas Thibert, 1er hiver, 19 février (L. Dietrich, Y. Kayser).
Pas-de-Calais - Boiry-Sainte-Rictrude, ad., du 31 août au 5 septembre (B. Tailliez *et al.*).
1998 Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Vigueirat/Mas Thibert, juv., du 8 novembre au 19 février 1999 (Y. Kayser, J.-L. Lucchesi, G. Massez *et al.*) et non jusqu'au 24 janvier (*Ornithos* 6-4 : 151).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). Après une donnée de Franche-Comté l'an passé, voici maintenant un oiseau fréquentant le nord de la France ! La donnée camarguaise est en revanche plus conforme à ce que l'on connaît des apparitions de cette espèce dans notre pays.

MAROUETTE POUSSIN *Porzana parva* (140/163 - 19/24)

Ain - L'Étournel/Pougny, jusqu'à 2 mâles ad., phot., du 20 au 25 avril (B. Mex, B. Piot *et al.*).
Alpes-Maritimes - Localité tenue secrète, fem. ad., 12 avril (J. François), mâle de 2e année probable, 22 avril (P. Crouzier).



4. Marouette poussin *Porzana parva*, mâle, Pougny, Ain, avril 1999 (B. Mex). *Male Little Crake.*

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, fem. ad., 26 mars (R. Dohogne) ; Le Puy-Sainte-Réparade, fem., 31 mars (G. & E. Durand).
Corse-du-Sud - Capitello, mâle, 9 avril, fem., du 10 au 16 avril, mâle, du 14 au 16 avril, mâle, 20 avril, fem., du 22 avril au 4 mai (G. Bonaccorsi), juv., du 13 au 16 octobre (G. Bonaccorsi) ; Campo Dell'Oro/Bastelicaccia, fem., du 10 au 14 avril (G. Bonaccorsi, R. Jordan, G & D. Tissier) ; Caldaniccia/Sarrola Carcopino, mâle les 13 et 14 avril, fem., 14 avril, de 1 à 3 fem., du 16 au 25 avril (G. Bonaccorsi, B. Recorbet).
Haute-Corse - Canna Gradugine, mâle ad. et 2 juv., 7 septembre (G. Bonaccorsi, R. Jordan).
Savoie - Motz, juv., 13 août (D. & M. Ducruet).
Var - Étang de Villepey/Fréjus, mâle, phot., 10 et 11 avril (C. Caritey *et al.*) ; Macany-Hyères, mâle ad., 19 avril (J.-G. Robillard).
(Europe, Asie centrale). L'espèce est régulière en Corse au printemps, mais la découverte d'oiseaux lors de la migration postnuptiale est en revanche un fait nouveau. En effet, le mâle du 7 septembre représente la seule mention d'un adulte en Corse à l'automne, époque où l'espèce est de toutes façons très rare dans l'île de Beauté (la mention de trois juvéniles en 1999 est donc un record, G. Bonaccorsi *in litt.*). La Lorraine semble (momentanément ?) abandonnée.

MAROUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (36/39 - 4/4)

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, juv., 30 août (S. Reeber).
Maine-et-Loire - Sainte-Gemmes-sur-Loire, chant., 15 et 16 mai (J.-C. Beaudoin).
Pas-de-Calais - Tardinghen, mâle ad., 27 mai (G. Flohart).
Bas-Rhin - Munchhausen, juv., capturé, phot., 28 août (S. Samtmann, L. Schmitter).
(Europe, Asie centrale, Japon). Année honorable quant au nombre d'oiseaux (moyenne 1981-1998 : 2 mentions pour un peu plus de 2 individus par an) ; les zones fréquentées n'ont, en outre, rien de surprenant. Un regret : pas de nouvelles cette année de la localité tenue secrète des Alpes-Maritimes, qui avait vu la fréquentation simultanée de trois individus l'an passé, ce qui pouvait laisser présager une suite heureuse...

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (31/75 - 2/2)

Aude - Le Petit-Castélou/Narbonne, ad., 17 février (D. Clément, J. Gonin).
Hérault - Étang de l'Estagnol/Villeneuve-lès-Maguelone, ad., 2 mai (F. Veyrunes *et al.*).
(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). Les marais de Gruissan dans l'Aude seraient apparemment fréquentés depuis trois ans environ, mais aucune donnée circonstanciée n'est parvenue au CHN. La donnée de l'Hérault fait le lien avec la Camargue. La population de l'étang de Canet (Pyrénées-Orientales) est stable (J.-P. Pompidor, comm. pers.).

GLAREOLE A AILES NOIRES *Glareola nordmanni* (12/10 - 0/0)

1998 Aude - Pissevaches/Fleury-d'Aude, ad., 5 septembre (E. Roy, X. Ruffray).
(Asie occidentale). En moyenne, moins d'une observation par an depuis 1981, cette espèce reste donc d'une grande rareté chez nous. La dernière observation d'automne remonte au 30 septembre 1985, où un oiseau avait séjourné jusqu'au 6 octobre à Blanzy (Saône-et-Loire).

GRAVELOT MONGOL *Charadrius mongolus* (1/1 - 2/2)

Pas-de-Calais - Hemmes-de-Marck, ad., phot., du 7 au 10 août (G. Flohart, J.-A. Leclercq *et al.*).
Seine-Maritime - Le Havre, ad., phot., du 29 août au 2 septembre (D. Laloi, P. Sabine *et al.*).
(Asie centrale jusqu'en Extrême-Orient). Alors, un ou deux oiseaux ? En tout cas, l'individu du Pas-de-Calais avait encore des traces de plumage nuptial (bande pectorale orange délavé), alors que celui de baie de Seine l'avait quasiment perdu. (Le CHN n'a pu déterminer s'il s'agissait du même oiseau ou de deux oiseaux différents, mais pour la comptabilité, c'est l'option de deux individus qui a été retenue.) À noter qu'un oiseau de type Leschenault/Mongol avait été noté en vol vers le sud-ouest le matin du 7 août à la digue du Clipon à Loon-Plage (Nord) dans un groupe d'une vingtaine de Grands Gravelots. Il avait été recherché quelques heures plus tard aux Hemmes-de-Marck, sans succès. Ces deux données arrivent quatre ans après la première mention française qu'avait constituée l'oiseau de la pointe de L'Aiguillon-sur-Mer en Vendée, les 21 et 22 juillet 1995 (Guérin 1998).

PLUVIER BRONZE *Pluvialis dominica* (16/17 - 3/3)

Finistère - Île d'Ouessant : Kun, ad. nuptial, phot., 16 et 17 juillet (B. Helsens) ; aérodrome, juv., du 16 au 21 octobre (P.-P. Evrard, A. Larousse).
Vendée - Le Fenouiller/Saint-Hilaire-de-Riez, juv., du 16 au 26 octobre (G. Besseau, J.-Y. Frémont, J. Gernigon, Y. Trévoux *et al.*).
(Amérique du Nord). Une autre donnée ouessantine d'un oiseau vu du 19 au 24 septembre mais parvenue tardivement au CHN est encore en circulation. En Vendée, le plan d'eau des Vallées, alors en vidange, a accueilli plusieurs limicoles américains.

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva* (4/4 - 1/1)

Yonne - Chéroy, 23 octobre (B. Bougeard, J.-P. Siblet).
(Sibérie, Alaska). Observation intéressante (la cinquième française) par sa situation ; un article concernant cette donnée a récemment été publié dans *Ornithos* (Bougeard & Siblet 2000).

PLUVIER BRONZE/FAUVE *Pluvialis dominica/fulva* (9/9 - 1/1)

Charente-Maritime - Île d'Oléron : lagunage de Saint-Denis-d'Oléron, 9 octobre (P. Trotignon).
1996 Corse-du-Sud - Capitello, 15 mars (G. Bonaccorsi).
(Amérique du Nord, Sibérie). Vu uniquement en vol, l'oiseau d'Oléron n'a pu être diagnostiqué avec certitude. La donnée corse est, quant à elle, surprenante.

5. Gravelot mongol *Charadrius mongolus*, adulte, Le Havre, Seine-Maritime, août 1998 (P. Sabine). *Adult Lesser Sand Plover*



VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (39/39 - 4/4)

Charente-Maritime - Rochefort-sur-Mer, ad., du 12 février au 3 mars (M. Caupenne, J. Fillonneau, P. Trotignon).
Indre - Rosnay, ad., 30 octobre (P. Boyer, D. Ingremeau *et al.*).
Indre-et-Loire - Rillé, 28 octobre (J.-M. Thibault).
Vendée - Olonne-sur-Mer, ad., 3 novembre (J. Chevallier)

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Le nombre d'oiseaux vus annuellement en France est manifestement en augmentation depuis quelques années. L'année 1999 ne contredit pas cette assertion, d'autant que deux autres mentions sont encore à l'étude, une des deux concernant d'ailleurs peut-être deux oiseaux différents (un adulte et un jeune) en Seine-et-Marne.

BECASSEAU SEMIPALME *Calidris pusilla* (7/7 - 3/3)

Finistère - Île de Sein, ad., 7 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, Y. Kayser, A. Larousse).
Vendée - Pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., 15 août (A. Larousse, P. Trotignon) ; Les Sables-d'Olonne, juv. probable, 24 octobre (F. Portier).
1995 Vendée - Pointe de L'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 30 juillet et 1er août (A. Thomas, Y. Trévoux) et non le 1er août uniquement (*Ornithos* 6-4 : 152).

(Amérique du Nord). Bonne année pour ce limicole néarctique, sans doute le plus difficile à déterminer sans pratique, mais il faut dire que la fin de l'été a vu un afflux sans précédent au Royaume-Uni avec 14 (!) oiseaux pour le seul mois de septembre (*Birding World* 12-9 : 347).

BECASSEAU MINUSCULE *Calidris minutilla* (5/5 - 0/0)

1998 Charente-Maritime - Île d'Oléron : Les Arceaux, 17 mai (X. Rufray).

(Amérique du Nord). La Charente-Maritime accueille son deuxième oiseau, par ailleurs toujours aussi rare dans notre pays ; les données printanières de limicoles néarctiques ne sont en outre pas légion.

BECASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (12/12 - 5/6)

Finistère - Île d'Ouessant : réservoir amont, An Aod Meur et Yusin, ad., 23 et 24 octobre (O. Bardet, L. Gavory, A. Larousse, G. Rault *et al.*) ; Saint-Guénolé/Penmarch, 2 ind., le 24 octobre, 1 seul, phot., le 25 octobre (E. Le Viol) ; île de Sein, juv., phot., vidéo, du 2 au 4 novembre (J. & C. Gonin, Y. & J.-P. Trévoux *et al.*).

6. Gravelot mongol *Charadrius mongolus*, adulte, Le Havre, Seine-Maritime, août 1998 (P. Sabine). *Adult Lesser Sand Plover*





7. Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis* (à droite) et Bécasseau minute *Calidris minuta*, Saint-Guénolé, Finistère, octobre 1999 (E. Le Viol). *White-rumped Sandpiper.*

Vendée - Les Sables-d'Olonne, juv., du 23 au 29 octobre (J.-Y. Frémont, F. Portier, Y. Trévoux) ; Le Fenouiller/Saint-Hilaire-de-Riez, juv., phot., du 27 au 30 octobre (G. Besseau, J. Gernigon, F. Portier).
1998 Loire-Atlantique - Marais salants de Guérande, juv., 18 octobre (G. Dessomme).

(Amérique du Nord). Année record pour ce bécasseau américain qui a effectué une arrivée groupée le 23 octobre. Par ailleurs, le « trou » de l'année 1998 est maintenant comblé par cette cinquième mention pour la Loire-Atlantique, qui est en même temps la troisième d'octobre dans ce département.

BECASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (18/18 - 0/0)

1996 Loiret - Pithiviers-le-Vieil, juv., phot., du 3 au 8 octobre (J.-Y. Frémont, A. Larousse, G. Léotard *et al.*).

(Amérique du Nord). Donnée parvenue tardivement au CHN mais fort intéressante par sa localisation (en pleine Beauce) ; il faut dire que les bassins de décantation du secteur étaient très attractifs cette année-là, notamment par le nombre inhabituel de Bécasseaux minutes *Calidris minuta* qui s'y activaient, témoin de l'afflux de cette espèce en France à l'époque (Larousse 1998).

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (172/189 - 13/13)

Ain - Marlieux, juv., 23 septembre (P. Crouzier).
Calvados - Le Gast, juv., du 19 au 21 septembre (S. Lecocq, S. Letessier).
Loire-Atlantique - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Saint-Lumine-de-Coutais, du 2 au17 mai (J. & A. Gernigon, B. Lebascle, S. Reeber) ; Guérande, juv., 15 et 18 septembre (A. Gentric, G. Guédon), juv., 2 octobre (Y. & J.-P. Trévoux) ; étang des Gâtineaux/Saint-Michel-Chef-Chef, juv., 18 septembre (Y. & J.-P. Trévoux).
Haute-Marne - Lac du Der/Éclaron-Brancourt-Sainte-Livière, juv., 2 octobre (C. Riols).
Meuse - Lac de Madine/Heudicourt, juv., du 16 au 19 septembre (T. Besançon *et al.*).
Morbihan - Pénestin, juv., phot., du 6 au 15 septembre (J.-L. Dourin *et al.*).
Moselle - Étang de Lindre/Tarquimpol, juv., 24 octobre (H. Michel).
Saône-et-Loire - Barrage de la Sorme/Blanzy, juv., 15 septembre (J.-M. Frolet, P. Gayet), un autre ind. du 24 au 28 septembre (P. Gayet).
Vendée - Réserve de Saint-Denis-du-Payré, juv., 19 septembre (J.-Y. Frémont, A. Larousse, P. Trotignon).
1998 Aude - Gruissan, 2 juv., phot., 13 et 14 septembre (R. Riols).
1998 Somme - Hâble d'Ault, juv., 2 septembre (E. Dansette).
1997 Marne - Lac du Der/Arrigny, juv., du 8 au 10 septembre (C. Hervé, E. Le Roy, C. Loyrette, C. & R. Riols, G. Rolin), concerne le même oiseau que celui signalé uniquement le 8 septembre dans le rapport précédent (*Ornithos* 6-4 : 153) et déjà mentionné du 8 au 10 septembre dans le rapport 1997 (*Ornithos* 5-4 : 162), une de ces deux données a donc été retranchée de la comptabilité.

(Amérique du Nord, Sibérie). Encore un début d'automne animé pour cette espèce, résultant sans doute du passage de la dépression « Floyd » sur les côtes bretonnes. Si l'arrivée groupée d'oiseaux autour du 15 septembre est manifeste, 1999 sera aussi l'année du nombre d'apparitions loin des rivages maritimes. Comme l'an dernier, à noter une donnée printanière sur le lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique. La mention de deux oiseaux dans l'Aude en 1998 est intéressante par sa localisation.



8. Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis*, Sein, Finistère, novembre 1999 (J.-P. Trévoux). *White-rumped Sandpiper.*



9. Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis*, Sein, Finistère, novembre 1999 (J. Gonin). *White-rumped Sandpiper.*



10. Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis*; St-Guénolé, Finistère, octobre 1999 (E. Le Viol). *White-rumped Sandpiper.*

BECASSEAU A QUEUE POINTUE *Calidris acuminata* (0/0 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Fangassier, phot., du 10 au 24 avril au moins (P. Geniez, Y. Kayser, N. Vincent-Martin *et al.*).

(Sibérie nord-orientale). Deuxième donnée française, mais la première depuis la création du CHN, et surtout la première observation d'un oiseau vivant (précédente mention : un adulte tué le 18 septembre 1972 en baie de l'Aiguillon en Vendée). Ce limicole a occasionné une belle translation d'observateurs vers le delta du Rhône avec, comme d'habitude, des heureux et des malchanceux...

BECASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (100/132 - 5/5)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Galabert, ad., 26 et 27 avril (J.-P. Paul) ; Piémanson, ad., 9 et 11 mai (Y. Kayser, B. Lebrun) ; Les Termes, Quenin, juv., du 4 au 14 août (T. Perrier, N. Vincent-Martin *et al.*) ; They de Sainte-Ursule, Quarantaine, ad., du 4 au 19 août (A. Pataud, J.-P. Paul, N. Vincent-Martin *et al.*).
Savoie - Motz, 13 août (D. & M. Ducruet).
1997 Bouches-du Rhône - Camargue : Quenin et Faraman, du 9 au 11 mai (M. Duquet, J.-Y. Frémont, Y. Kayser, A. Larousse).

(Europe septentrionale). Année bien moyenne pour cette espèce qui, en dehors de la Camargue, reste un limicole rare chez nous. À noter quand même cette donnée de Savoie tout à fait inhabituelle.

BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (76/84 - 6/6)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Quarantaine, phot., 13 et 14 mai (Y. Kayser, M. Thibault *et al.*).
Finistère - Trunvel/Tréogat, 22 août (G. Rault) ; île d'Ouessant : Porz Doun, juv., 8 et 9 septembre (Y. Guermeur) ; pointe de la Torche/Plomeur, phot., du 21 au 24 septembre (G. Rault).
Loire-Atlantique - Sissable/Batz-sur-Mer, 10 et 11 octobre (M. & F. Poumarat *et al.*).
Pas-de-Calais - Oye-Plage, 18 septembre (A. de Broyer).

(Amérique du Nord). L'espèce est déjà rare au printemps, mais une apparition à cette époque en Camargue, l'est encore plus. Le site du Pas-de-Calais est fréquenté pour la deuxième année consécutive.

BECASSINE DOUBLE *Gallinago media* (24/25 - 2/2)

Corse-du-Sud - Caldaniccia/Sarrola Carcopino, 14 et 17 avril (G. Bonaccorsi, B. Recorbet).
Haute-Corse - Barcaggio, phot., 12 et 13 mai (P. & S. Provost *et al.*).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Les seules données de l'espèce proviennent cette année encore de Corse. Il faut préciser qu'elle est une migratrice assez régulière sur les côtes d'Italie (Toscane, Latium) qui lui font face (A. Corso, comm. pers.).

BECASSIN A BEC COURT / A LONG BEC *Limnodromus griseus/scolopaceus* (9/10 - 1/1)

Finistère - Baie de Goulven : Tréflez/Plouescat, ad., du 31 janvier au 5 mars (A. Le Nevé *et al.*).
1998 Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 22 août (J.-A. Leclercq *et al.*).
1996 Vendée - L'Île d'Olonne, 29 octobre (O. Girard).

(Amérique du Nord). Il est quand même frustrant que le long séjour de l'oiseau finistérien n'ait pas permis de diagnostiquer l'espèce. Quant à celui de 1998, il a été vu en vol devant la digue du Clipon.

---

11 & 12. Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata*, Camargue, avril 1999 (G. Bruneau).*Sharp-tailed Sandpiper.*







13. Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*, juvénile (à droite) et Bécasseaux minutes *Calidris minuta*, Pithiviers-le-Vieil, Loiret, octobre 1996 (A. Larousse). *Juvenile Baird's Sandpiper.*

CHEVALIER A PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (12/12 - 1/1)

Vendée - L'Île d'Olonne, du 13 au 22 octobre (J. Gernigon, O. Girard).

(Amérique du Nord). L'espèce a, pour une fois, abandonné le Finistère, son secteur de villégiature privilégié, pour les marais vendéens. Une observation avait déjà eu lieu dans ce département le 4 juillet 1984.

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* (56/46 - 8/8)

Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, juv., 30 et 31 août (A. Vernier *et al.*).
Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de la Dame (entre autres), ad., du 28 mars au 25 avril (D. Laloi, H. Schielzeth, M. Zucca) ; Quarantaine, ad., du 8 au 22 juillet (N. Vincent-Martin) ; Quarantaine, La Gacholle et Enfores de la Vignolle, ad., phot., du 15 août au 22 septembre (Y. Kayser, T. Perrier, N. Vincent-Martin).
Finistère - Île de Béniguet/Le Conquet, ad., 18 et 19 mai (J. Pichenot, P. Yésou).
Loire-Atlantique - Le Migron/Frossay, phot., du 12 au 14 mai (J.-P. Trévoux).
Pas-de-Calais - Hemmes-de-Marck, ad., 2 mai (G. Flohart).
Tarn-et-Garonne - Leojac, du 7 au 13 septembre (G. Bechard).
1998 Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, du 3 au 20 mai (L. Clair, A. Vernier *et al.*).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Avec huit oiseaux différents, 1999 est de loin la meilleure année pour cette espèce. Même l'archipel de Molène au large du Conquet a été visité. Donnée inhabituelle aussi dans le Tarn-et-Garonne. La Camargue a été fréquentée par un oiseau au printemps et deux adultes à l'automne (celui du printemps est sans doute un « récidiviste », peut-être même un hivernant).

CHEVALIER GRIVELE *Actitis macularia* (11/13 - 1/1)

Vendée - Île d'Yeu : plage des Illiaux, juv., 14 et 17 septembre (X. Hindermeyer).

(Amérique du Nord). Limicole toujours aussi rare mais dont la date d'observation, ici, s'inscrit le mieux avec ce que l'on connaît jusqu'à présent chez nous.

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor* (42/45 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Vieux Rhône sud, ad., 4 août (Y. Kayser).
Seine-Maritime - Le Havre, 25 juin (C. Aulert).
1997 Vendée - L'Île d'Olonne, 14 octobre (O. Girard).

(Amérique du Nord). Toutes ces nouvelles données se caractérisent par la brièveté du séjour des oiseaux. La Camargue n'avait pas vu l'espèce depuis 1993 (en août également) et la baie de Seine depuis 1991.

LIMICOLES NEARCTIQUES

Neuf espèces réunissant 35 données pour 36 individus ont jalonné le parcours des observateurs en 1999. Si le nombre d'espèces est plus faible que ces dernières années (mais néanmoins supérieur d'un point par rapport à la moyenne), le nombre de données et le nombre d'individus se situent à la première place, ce qui fait de 1999 un excellent cru. Avec l'arrivée tardive de quelques nouvelles mentions, 1998 comptabilise désormais 12 espèces pour 32 données et 36 individus.

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (200/601- 29/133)

Calvados - Ouistreham, juv., 3 octobre (J. Jean Baptiste).
Landes - Capbreton, 30 septembre (B. Delprat).
Loire-Atlantique - Batz-sur-Mer, imm., 19 septembre (S. Dulau).
Morbihan - Pénestin, 1er hiver, 27 août (D. Michelat, J.-M. Rémy).
Nord - Digue du Clipon/Loon-Plage, 2 juv. et 3 imm., 20 août, 2 juv., 21 août, 7 juv., 28 août, 5 juv., 31 août, 8 juv., 4 septembre, 3 juv., 1er octobre, 36 juv., 4 octobre, 21 juv. et 1 ad.., 5 octobre, juv., 6 novembre (C. Gruwier, J.-A. Leclercq, C. Prangere, L. Scalabre, N. Selosse).
Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, juv., 21 août (G. Flohart), 1er septembre (P. Gayet), 4 juv., 25 septembre (G. Flohart), 4 juv., 26 septembre (N. Selosse), juv., 3 octobre (D. Tirmarche), 14 ind., 4 octobre (G. Flohart), 3 ind., 5 octobre (G. Flohart) ; Fort Mahon/Blériot-Plage, ad. et juv., 26 septembre (P.J. Dubois) ; Biache-Saint-Vaast, juv. capturé épuisé, 30 septembre (S. Flochel) ; Calais : juv., 18 novembre (P.J. Dubois).
Haute-Savoie - Lac Léman : Excenevex, juv., 29 août (J. Duplain *et al.*) ; au large de Thonon-les-Bains, 2 juv. et 1 imm., phot., 19 septembre (L. Grillon, R. & J.-P. Jordan).
Deux-Sèvres - Trouvé dans le département et recueilli en centre de sauvegarde UNCS, phot., 14 septembre (C. & D. Frainnet).
Somme - Hâble d'Ault/Cayeux-sur-Mer, juv., 10 octobre (O. Bardet).
Vendée - L'Île d'Olonne, juv., 8 septembre (M. Fouquet) ; Les Sables-d'Olonne, ad., 21 septembre (O. Girard).
1992 Morbihan - Saint-Gildas-de-Rhuys, juv. trouvé mort, photo., 18 août, bagué poussin hors du nid le 1er juillet à Enontekio en Finlande (*fide* C. Kerbiriou) : il s'agit de quelques précisions par rapport à cette donnée déjà publiée (*Ornithos* 2-1 : 10).

(Circumboréal). Le littoral du Nord/Pas-de-Calais tient toujours le haut du pavé. Sinon, on constate une belle répartition des données obtenues sur le territoire français, ce qui contribue fortement à enrichir nos connaissances sur les migrations de cette espèce encore très mal connues il y a seulement quelques années.

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (14/14 - 2/2)

Finistère –Stang alac'h/Le Relecq-Kerhuon, 1er hiver, phot., du 2 février au 4 mars (F. Barrault, D. Laloi, A. Le Nevé).
Vendée - pointe de L'Aiguillon-sur-Mer, 2e hiver, 6 octobre (C. Gonin).
1998 Finistère - Île de Béniguet/Le Conquet, ad., du 19 mai au 8 juillet (J. Leclerc, C. Lethuilier, P. Yésou) et non les 20 et 21 mai uniquement (*Ornithos* 6-4 : 158).

(Amérique du Nord). Encore une donnée d'Atricille en Vendée cette année, un 2e hiver, après l'adulte et le 1er hiver de l'an passé ! Le long séjour de l'oiseau de Brest (Stang alac'h) a permis à de nombreux observateurs de faire connaissance avec ce laridé néarctique et d'en garder quelques beaux souvenirs photographiques.

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (10/10 - 2/2)

Allier - Vichy, 1er hiver, phot., 17 janvier, 4 et 10 février (D. Houston).
Indre-et-Loire - Saint-Pierre-des-Corps, ad., du 14 au 16 octobre (L. Le Gal *et al.*).

(Amérique du Nord). Deux données comme en 1997, c'est bien. Celles de 1999 se rapportent à des oiseaux vus en dortoirs avec des Mouettes rieuses. Pour la période 1981-1998, la moyenne est d'un oiseau tous les deux ans. Par ailleurs, il faut souligner qu'il s'agit encore de deux données intérieures, dont l'espèce semble assez coutumière en France.

GOELAND RAILLEUR *Larus genei* (9/16 - 2/3)

Pyrénées-Atlantiques - Baie de Chingoudy/Hendaye, imm., 27 avril (A. Guyot).
Rhône - Miribel-Jonage, 2 ad., 24 mai (D. Devidal).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). La donnée rhônalpine confirme le mouvement décelé à cette époque vers le nord-est. Quant à l'oiseau de la baie de Chingoudy, il « flirtait » allègrement avec la frontière espagnole, ce qui n'est pas sans rappeler (avec quelques sanglots !) une certaine Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* d'avril 1994 (*Ornithos* 6-4 : 160 et V. aussi « *En direct de la CAF* » dans le présent numéro).

---

14. Mouette atricille *Larus atricilla*, 1er hiver, Le Releck-Kerhuon, Finistère, février 1999 (A. Le Nevé). *First-winter Laughing Gull.*

15. Mouette atricille *Larus atricilla*, 1er hiver, Le Releck-Kerhuon, Finistère, mars 1999 (D. Laloi). *First-winter Laughing Gull.*

16. Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis, janvier 2000 (T. Perrier). *Ring-billed Gull.*

17. Goéland d'Audouin *Larus audouinii*, 2e été, Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône, mai 1998 (G. Bruneau). *Second-summer Audouin's Gull.*

18. Goéland argenté *Larus argentatus*, race *smithsonianus*, 2e hiver, Arcachon, Gironde, février 1999 (F. Jiguet). *Second-winter Herring Gull of nearctic race* smithsonianus.

19. Goéland argenté *Larus argentatus*, race *smithsonianus*, 2e hiver, Arcachon, Gironde, janvier 1999 (F. Jiguet). *Second-winter Herring Gull of nearctic race* smithsonianus.


14


15


16


17


18


19

GOELAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (95/118 - 4/4)

En dehors de la Corse :

Aude - Salins de Lapalme, 2e été, phot., 23 avril (J. Gonin *et al.*).

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang du Tampan, ad., 26 avril (D. Laloi, M. Zucca) ; étang du Grand-Rascaillan, 1er été, 24 mai (N. Vincent-Martin) ; étang de Sainte-Anne, 3e été, phot., 25 mai (N. Vincent-Martin).

1998 Bouches-du-Rhône - Au large des Saintes-Maries-de-la-Mer, 2e été, phot., 3 mai (G. Bruneau, P.-A. Crochet).

1998 Hérault - Palavas-les-Flots/La Grande-Motte, 2e été, 6 mai (X. Rufray) ; au large du cap d'Agde, 2e été, 3 juillet (X. Ruffray) ; Carnon-Plage, 2e été, 8 août (J.-P. Paul).

1998 Pyrénées-Atlantiques - Baie de Chingoudy/Hendaye, ad., 16 mai (A. Larousse).

(Circum-méditerranéen). Quatre données pour 1999 : ce goéland reste rare en France continentale, contrairement à des idées reçues. L'année 1998 s'enrichit de cinq nouvelles données, ce qui en fait un bon cru avec onze individus différents. À noter que l'oiseau d'Hendaye portait, à la patte gauche, une bague de plastique blanc, sans doute d'origine espagnole (delta de l'Ebre).

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis* (195/126 - 17/10)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).

Charente-Maritime - Cabane de Moins/Breuil-Magné, ad., du 13 février au 13 mars (P. Trotignon) ; Île d'Oléron : La Baudissière/Dolus-d'Oléron, ad., du 7 septembre au 30 janvier 2000 (M. Caupenne, P. Trotignon).

Côtes-d'Armor - Langueux, ad., du 31 janvier au 15 février (S. Mauvieux), ad. (le même), phot., du 21 septembre au 6 octobre au moins (S. Guérin, S. Mauvieux) ; port du Légué/Saint-Brieuc, ad., 27 février au moins (S. Mauvieux), mais 2 ad. (dont celui de Langueux ?) le 5 mars (J. Birard, D. Laloi).

Gironde - Arcachon : jetée Thiers, 4 ad., 10 janvier (J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas) ; Arcachon, La Hume et Gujan-Mestras, 8 ad.(3*) et un 2e hiver*, phot., du 11 janvier au 9 février (P. Defos du Rau, F. Jiguet), 9 ad., le 27 décembre (F. Jiguet), encore 2 ad. le 15 janvier 2000 (J.-F. Le Bihan).

Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., du 7 au 22 septembre au moins (J.-L. Dourin, J.-Y. Frémont, A. Gentric, Y. Trévoux).

Pas-de-Calais - Blériot-Plage, ad., phot., 28 février et mars (E. Dansette, V. Van Halst), 2e hiver/2e été*, 4 avril (J.-A. Leclercq).

Pyrénées-Atlantiques - Baie de Chingoudy/Hendaye, 3 ad. (dont 2*) et un 1er hiver*, 11 et 14 janvier (J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas).

Vendée - Pointe de L'Aiguillon/L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 15 février (M. Fouquet) ; L'Île d'Olonne, subad.*, 7 avril (M. Fouquet) ; pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., 30 août (F. Desage).

Seine-Saint-Denis - Noisy-le-Grand, ad., phot., (l'oiseau parisien ?) du 16 décembre au 15 janvier 2000 (S. Chambris, D. Laloi, T. Perrier).

1998 Gironde - Bassin d'Arcachon : plage de La Hume et Gujan-Mestras, 2 ad., 2 février (G. Blake, P. Grisser), ad., 20 décembre (G. Blake, P. Grisser) ; Arcachon, ad, et un 2e hiver*, 2 février (G. Blake, P. Grisser).

1998 Pas-de-Calais - Calais, 2e été, 5 mai et 1er juin (E. Cappe), puis revu ad., 8 septembre (E. Dansette).

1998 Vendée - Lagune de Bouin, ad.*, 18 novembre (O. Girard).

1997 Côtes-d'Armor - Port du Légué/Saint-Brieuc, ad., du 26 décembre au 10 février 1998 au moins (S. Mauvieux).

1997 Gironde - Bassin d'Arcachon, de 1 à 4 ad., du 7 décembre au 16 janvier 1998 au moins (P. Grisser, B. Lamothe, O. Le Gall, M. Thibault), et non 1 ou 2 ad., 11 et 16 janvier 1998 uniquement (*Ornithos* 6-4 : 159).

1997 Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, 2e hiver*, du 10 novembre au 1er janvier 1998 (S. Duchateau, P. Grisser) et non le 1er janvier 1998 uniquement (*Ornithos* 6-4 : 159).

1997 Vendée - L'Île d'Olonne, 1er hiver*, 16 avril (M. Fouquet) ; L'Armandèche et Le Tanchet/Les Sables-d'Olonne, 1er hiver*, 17 et 22 octobre (M. Fouquet).

1996 Landes - Capbreton et Hossegor, 1er hiver*, phot., du 9 novembre au 27 décembre (S. Dulau, P. Grisser, A. Guyot, G; & C. Pitault) et non du 9 au 21 novembre uniquement (*Ornithos* 4-4 : 154).

1995 Côtes-d'Armor - Port du Légué/Saint-Brieuc, ad.*, 18 février, puis du 7 décembre au 18 mars 1996 (S. Mauvieux *et al.*) et non du 7 décembre au 18 mars 1996 uniquement (*Ornithos* 4-4 : 154).

1994 Landes - Capbreton, ad, phot., du 13 novembre au 15 février 1995 (B. Delprat, R. Duguet, P. Grisser *et al.*) et non Saint-Martin-de-Seignanx (*Ornithos* 3-4 : 164).

(Amérique du Nord). La comptabilité des oiseaux du bassin d'Arcachon (notamment la part entre les revenants et les nouveaux oiseaux) est très difficile à établir : deux oiseaux de 2e hiver sont considérés comme nouveaux (un en 1998 et un en 1999), ainsi que trois adultes en 1999. Que se passe-t-il exactement aussi sur le secteur de Saint-Brieuc, y a-t-il des échanges entre Le Légué et Langueux ? Combien d'oiseaux sont-ils concernés ? En Île-de-France, l'adulte de Seine-Saint-Denis ne peut-il pas être « l'ex-Parisien » ? Plus simplement, le mâle de Pénestin est toujours fidèle au poste pour la seizième année consécutive. Enfin, il est intéressant de constater que des arrivées d'oiseaux de 1er hiver se produisent régulièrement.

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus* (3/3 - 2/1)

Individus présentant les caractéristiques de la race néarctique *smithsonianus* :

Gironde - Arcachon, 2e hiver, phot., 11 janvier et 9 février (P. Defos du Rau, F. Jiguet), 3e hiver (le même ?), 27 décembre (F. Jiguet).

1997 Pas-de-Calais - Le Portel, juv., 3 août (T. Fournet).

(Amérique du nord). Comme toujours, l'examen des bandes de laridés peut réserver des surprises. Avec la présence de neuf Goélands à bec cerclé sur le bassin d'Arcachon à cette époque, l'oiseau de Gironde a pu ainsi retrouver quelques-uns de ses congénères néarctiques...

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (102/101 - 5/5)

Finistère - Île Tudy et Loctudy, 1er hiver, phot., 29 et 30 décembre (G. Rault).
Landes - Tarnos et courant d'Huchet/Moliets, 1er hiver, du 28 décembre au 2 janvier 2000 (J.-L. Grangé, A. Guyot).
Nord - Digue du Braek/Dunkerque, 2e été, phot., 15 avril (E. Dansette) ; Gravelines, 1er hiver, 22 décembre (E. Dansette).
Pas-de-Calais - Le Portel, ad., 10 janvier (M. Guerville).
1998 Vendée - L'Île d'Olonne, 1er hiver, 19 février (M. Fouquet).
1996 Finistère - Trunvel/Tréogat, 1er hiver, phot., 10 avril (G. Rault).

Individus présentant les caractéristiques de la race *kumlieni*, appelée « Goéland de Kumlien » :

1993 Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, 2e été/3e hiver, phot., du 19 septembre au 8 novembre (P. Bernard, G. Flohart, R. Tonnel *et al.*), précédemment accepté comme *glaucoides* (*Ornithos* 2-1 : 11).
1992 Pas-de-Calais - Le Portel et Boulogne-sur-Mer, 1er été/2e hiver, phot., du 16 août au 6 mars (T. Hoogendoorn, J.-C. Robert *et al.*), précédemment accepté comme *glaucoides* (*Alauda* 61-4 : 247).

(Arctique canadien, Groenland). Le nombre d'oiseaux est dans la moyenne, les départements fréquentés sont classiques, le fait de voir un adulte comme au Portel, l'est moins. Par ailleurs à noter l'acceptation comme Goéland de Kumlien du Goéland à ailes blanches de Boulogne-sur-Mer des années 1992 et 1993, après moult consultations et rencontres...

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (13/13 - 2/2)

Charente-Maritime - Île d'Oléron : Boyardville, ad. et juv. hybride avec Sterne caugek, phot., 8 août (N. Vincent-Martin).
Gironde - Banc d'Arguin/Arcachon, fem. ad., phot., du 19 mai au 7 juillet (J.-J. Boubert, P. Grisser *et al.*).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). L'oiseau d'Arguin, une femelle, était apparié à une Sterne caugek *Sterna sandvicensis* ; un poussin fut observé à partir du 15 juin, celui-ci sera vu avec l'adulte sur la bordure de la plage le 7 juillet (J.-J. Boubert *in litt.*) ; peut-être les deux oiseaux observés un mois plus tard en Charente-Maritime ?

STERNE « A BEC ORANGE » *Sterna maxima/bengalensis/elegans*

1998 Gironde - Banc d'Arguin/Arcachon, ad., du 22 mai au 24 juin (J.-J. Boubert *fide* P. Grisser) et non P. Grisser comme auteur (*Ornithos* 6-4 : 161).
1997 Gironde - Banc d'Arguin/Arcachon, ad., phot., du 21 mai au 28 juillet (J.-J. Boubert *fide* P. Grisser) et non uniquement Sterne voyageuse, ad., du 7 au 22 juin au moins (*Ornithos* 5-4 : 166).

En 1997, la sterne « à bec orange » du banc d'Arguin a été identifiée comme Sterne voyageuse *Sterna bengalensis* à compter du 7 juin ; deux sternes « à bec orange » ont été vues le 8 juin, et le 22 juillet, la Sterne voyageuse était observée en parade, la colonie de Sternes caugeks sera abandonnée le 28 juillet (J.-J. Boubert *in litt.*).

STERNE DE FORSTER *Sterna forsteri* (0/0 - 1/1)

Charente-Maritime - Île de Ré : banc du Bûcheron/Les Portes-en-Ré, ad., du 11 au 26 décembre (L. & S. Clair, M. Thibault *et al.*).

(Amérique du Nord). Enfin la première mention française de l'espèce, mais dans le pertuis charentais et non pas en Bretagne, comme on aurait pu s'y attendre... Une Sterne de Forster, ça se mérite, et certains observateurs ont dû revenir plusieurs fois avant de faire l'heureuse rencontre ! Cette sterne a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la Commission de l'Avifaune Française.

STERNE FULIGINEUSE *Sterna fuscata* (7/7 - 0/0)

1997 Gironde - Banc d'Arguin/Arcachon, ad., phot., du 13 juin au 6 juillet (J.-J. Boubert *et al.*, *fide* P. Grisser).

(Mers tropicales). Ce n'est pas la première fois que cette sterne des mers chaudes fréquente la colonie de Sternes caugeks d'Arguin (1983, 1985 et 1987). La dernière mention de l'espèce remonte au 17 juin 1988, à Pissevaches dans l'Aude (*Alauda* 58-4 : 258).

HIRONDELLE ROUSSELINE *Hirundo daurica* (215/419 - /)

1988 Corse-du-Sud - Capitello, 3 ind., 17 avril (G. Bonaccorsi).
1986 Corse-du-Sud - Capitello, 3 septembre (G. Bonaccorsi).

(Sud et est de l'Eurasie, Afrique). Anciennes données parvenues tardivement au CHN. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 1991.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (137/179 - 25/31)

Bouches-du-Rhône - Crau : Mas Chauvet, de 1 à 3 ind., du 2 janvier au 21 février (Y. Kayser, J.-P. Paul, N. Vincent-Martin *et al.*), 1 ind., 4 octobre (Y. Kayser) ; Mas Blanc, 4 octobre (Y. Kayser).
Charente-Maritime - Moëze, juv., 15 octobre (P. Trotignon).
Finistère - Trunvel/Tréogat : Ty Palud, 7 octobre (G. Rault) ; Kerminigou, juv., 19 octobre (G. Rault), 7 novembre (G. Rault) ; île d'Ouessant : Yusin, du 17 au 22 octobre (P.-P. Evrard, Y. Guermeur) ; Porz Doun, 28 octobre (P. Defos du

Rau, F. Jiguet) ; Parluc'hen, 29 et 30 octobre (O. Bardet, L. Gavory) ; île de Sein, juv., du 7 au 11 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse).
Manche - Bouillon/Jullouville, 1er hiver, phot., 28 novembre (S. Provost) ; Foucault/Beauvoir, phot., 19 décembre (S. & P. Provost).
Morbihan - Île d'Hoëdic, phot., 26 avril (S. Dulau) ; Riantec, 11 novembre (S. Guérin).
Nord - Dunes du Braek/Dunkerque, 30 avril (C. Prangere).
Pas-de-Calais - Audinghen, 2 ind., 17 septembre (J.-P. Lejeune), 4 ind. dont 1 juv. (différents des précédents), du 19 au 22 septembre (P.J. Dubois, G. Flohart) ; Fond Pignon/Sangatte, 16 octobre (P.J. Dubois) ; Tardinghen, 2 ind., 7 novembre (G. Flohart).
Seine-Maritime - Baie de Seine/Le Havre, juv., du 14 au 19 novembre (P. Provost).
Somme - Saint-Quentin-en-Tourmont, 24 octobre (T. Rigaux).
Vendée - La Tranche-sur-Mer, 7 et 17 janvier (J. Gonin, A. Thomas), au moins 2 ind., le 24 janvier (J. Gonin) ; La Gachère/Brem-sur-Mer, ad., 23 décembre (S. Vrignaud).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). Le nombre de données a considérablement augmenté depuis 1994, et 1999 ne le dément pas avec une belle moisson d'observations : 25 mentions pour 31 oiseaux (moyenne nationale depuis 1981 : 8 données pour 10 individus par an), comme a augmenté le nombre des départements concernés (même s'ils restent essentiellement côtiers).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (29/30 - 2/2)

Individu présentant les caractéristiques de la race *feldegg* :

Haute-Corse - Barcaggio, fem., 7 mai (S. Provost), mâle, 9 mai (P. & S. Provost).

(Balkans, mer Noire). Données tardives ne cadrant pas avec la majorité des autres observations du secteur. En Corse, seules deux précédentes mentions sont tardives (entre le 15 et le 24 mai), les autres sont situées entre le 4 et le 30 avril, ces dernières étant en outre corroborées par quatre mentions des Alpes-Maritimes entre le 29 mars et le 21 avril, ce qui est conforme au passage précoce de cette sous-espèce orientale.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba* (1/1 - 0/0)

Individu présentant les caractéristiques de la race *subpersonata* :

1997 Haute-Corse - Barcaggio, mâle, capturé, phot., 15 mai (G. Faggio).

20. Bergeronnette grise *Motacilla alba*, mâle de la race *subpersonata*, Barcaggio, Haute-Corse, mai 1997 (G. Faggio). *Male Pied Wagtail of Morrocan race* subpersonata.



(Maroc). Première mention française pour cette sous espèce et la troisième européenne, les autres sont de Norvège (ancienne) et du Portugal (récente) (P.J. Dubois *in litt.*). On peut penser qu'il s'agit d'un oiseau qui a suivi des Bergeronnettes grises de la race type, lesquelles hivernent en nombre en Afrique du Nord. Tout cela n'est pas sans rappeler le Pinson des arbres nord-africain observé il y a quelques années en mars en Lozère avec des Pinsons des arbres (*Ornithos* 2-4 : 163).

TRAQUET ISABELLE *Oenanthe isabellina* (8/9 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Radeau/Port-Saint-Louis-du-Rhône, mâle, 19 et 20 avril (Y. Kayser, M. Thibault).
1998 Corse-du-Sud - Capitello, phot., vidéo, 2 ind., du 21 au 28 septembre (G. Bonaccorsi, B. Recorbet, J.-F. Seguin) et non un seul individu (*Ornithos* 6-4 : 164).

(De la Grèce et la Roumanie à la Sibérie et la Mongolie). Encore une donnée de Crau ; cet oiseau ne pourrait-il pas être celui vu tardivement à l'automne précédent (*Ornithos* 6-4 : 164) ?

TRAQUET PIE *Oenanthe pleschanka* (2/2 - 0/0)

1998 Somme - Hâble d'Ault, fem./mâle 1er hiver, 6 octobre (E. Dansette).

(De la Roumanie au Moyen-Orient jusqu'en Sibérie orientale). Deuxième mention française après celle du 25 octobre 1991 sur l'île de Sein, Finistère. Dommage qu'à chaque fois, ce soit un seul observateur qui ait profité du passage éclair de l'oiseau.

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (16/16 - 1/1)

Lot-et-Garonne - Étang de la Mazière, ad., capturé, phot., 24 octobre (D. Delsol, L. Joubert, A. Dal Molin).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Cette rousserolle fut capturée dans une phragmitaie abritant un important dortoir de Bruants des roseaux. Après n'avoir enregistré aucune donnée de 1981 à 1989, cette espèce est devenue quasiment annuelle, avec même deux voire trois mentions chaque année depuis 1994.

FAUVETTE EPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (15/15 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Roquemaure, 1er hiver, phot., du 14 au 20 novembre (J.-P. Paul *et al.*).
Haut-Rhin - Rouffach, fem., du 29 mai au 3 juin (R. Aye, T. Roth, E. Schmitt).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Deux mentions la même année, c'est un événement, et avec une donnée printanière de surcroît...

21 & 22. Fauvette épervière *Sylvia nisoria*, 1er hiver, Camargue, Bouches-du-Rhône, novembre 1999. (M. Duquet).
First-winter Barred Warbler.





POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (38/41 - 4/4)

Finistère - Île d'Ouessant : Keridreux, puis Cost Ar Reun, 19 et 20 octobre (J.-F. Arcanger, B. Lebrun) ; Poull Dragas, 25 octobre (F. Jiguet).
Manche - Île Chausey, phot., du 20 au 24 octobre (J. Jean Baptiste, F. Gallien, P. & S. Provost).
Pas-de-Calais - Audinghen, 16 octobre (G. Flohart).
1995 Doubs - Osselle, 20 septembre (J.-P. Paul), précédemment refusée, maintenant acceptée après réexamen.

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Encore une île avec laquelle il va falloir, en toute logique, compter : Chausey, qui accueille cette année deux pouillots à barres alaires, Pallas et à grands sourcils ! La donnée précoce de Franche-Comté a été révisée : elle est maintenant acceptée ; en dehors du contexte présidant aux apparitions de l'espèce sur le littoral Manche-Atlantique, elle est plutôt à mettre en relation avec l'oiseau camarguais des 17 et 18 septembre 1998 (*Ornithos* 6-4 : 165).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (540/583 - 46/41)

Charente-Maritime - Île d'Oléron : phare de Chassiron/Saint-Denis-d'Oléron, 2 ind. le 18 octobre, 1 seul le 19 octobre (A. Audevard).
Finistère - Île de Sein, 7 et 8 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, Y. Kayser, A. Larousse) ; île d'Ouessant : Kadoran, 12 octobre (F. Maillot *et al.*) ; Kerbrat, 13 octobre (E. Bubbe *et al.*) ; Prad Meur, 14 octobre, 2 ind. le 15 octobre, 1 seul du 16 au 25 octobre (S. Alavoine, P.-P. Evrard, P. Rouillier *et al.*) ; Porz Noan, du 14 au 16 octobre (P.-P. Evrard, C. Sinz *et al.*) ; Gerhuel, du 16 au 25 octobre (P.-P. Evrard, A. Larousse, P. Rouillier) ; Arland, du 16 au 22 octobre (P.-P. Evrard, P. Rouillier), 2 ind., 26 octobre (E. Gfeller, F. Jiguet), 1 seul le 27 octobre (Y. Guermeur), 31 octobre (G. Flohart), 2 novembre (Y. Guermeur) ; Mez ar Reun, 17 octobre (Y. Guermeur) ; Niou, 17 octobre (B. Helsens *et al.*) ; Poull Brac, 17 octobre (J.-F. Arcanger), 2 ind., les 19 et 20 octobre (E. Gfeller), 1 seul le 21 octobre, 2 ind. du 22 au 24 octobre (E. Gfeller), 1 ind., 30 octobre (P.J. Dubois), 2 novembre (Y. Guermeur), 11 novembre (Y. Guermeur, J. Jean Baptiste) ; Kernigou, 19 octobre (A. Larousse) ; Ti Crenn, 22 et 23 octobre (H. Dufourny), du 28 octobre au 6 novembre (C. Sinz) ; Parkoulern, 22 octobre (H. Dufourny), 9 et 10 novembre (J. Jean Baptiste) ; Park Raden, 26 et 27 octobre (E. Gfeller, F. Jiguet) ; Lampaul, 30 octobre (D. Michelat) ; Poull Bojer, du 31 octobre au 2 novembre (J. Birard, D. Michelat, M. Zucca) ; Lanvian, 4 novembre (A. André) ; Stang ar Stiff, du 8 au 10 novembre (Y. Guermeur, J. Jean Baptiste), 23 novembre (Y. Guermeur).
Manche - Île Chausey, du 20 au 24 octobre (J. Jean Baptiste, F. Gallien, P. & S. Provost).
Nord - Musée d'Art contemporain à Rosendaël/Dunkerque, 9 octobre (J.-A. Leclercq, C. Prangere *et al.*) ; parc Ziegler à Malo-les-Bains/Dunkerque, 9 octobre (J.-A. Leclercq, C. Prangere *et al.*).
Pas-de-Calais - Guînes, phot., du 6 au 9 octobre (H. Verne) ; Framezelle/Audinghen, 6 octobre (G. Flohart), 9 et 10 octobre (P.-A. Crochet, P.J. Dubois, G. Flohart), 12 octobre (G. Flohart), 22 octobre (G. Flohart) ; Haringzelle/Audinghen, 2 ind., phot., 12 octobre, 1 seul le 13 octobre (G. Flohart), ad. probable, 14 octobre (G. Flohart), 29 octobre (G. Flohart).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Année plutôt honorable avec 41 individus (pour une moyenne annuelle de 32 entre 1981 et 1998). Les sites restent classiques avec toutefois une mention particulière pour la pointe de Chassiron, sur l'île d'Oléron, qui, pour sa première mention, accueille d'un seul coup deux oiseaux. Comme quoi, il faut être au bon endroit à la bonne date...

POUILLOT DE SCHWARZ *Phylloscopus schwarzi* (6/6 - 2/2)

Charente-Maritime - Île d'Oléron : pointe de Chassiron/Saint-Denis-d'Oléron, 14 octobre (P. Trotignon).
Loire-Atlantique - La Turballe, 27 et 28 octobre (A. & C. Gentric, D. Raboin).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Deux oiseaux, c'est plutôt bien, d'autant que l'espèce n'est pas vue chaque année. Donnée assez précoce pour la pointe de Chassiron qui est à l'honneur en 1999 avec deux Pouillots à grands sourcils quatre jours plus tard. Le littoral de la Loire-Atlantique accueille son premier Schwarz !

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (16/17 - 7/8)

Finistère - Île de Sein, phot., du 17 au 19 octobre (J.-F. Darras, H. Davière, E. Lapous) ; île d'Ouessant : Ar Reun, 20 octobre (H. Dufourny) ; Pount Kam, 22 octobre (H. Dufourny) ; Arland, du 25 au 27 octobre (O. Bardet, L. Gavory, Y. Guermeur) ; Stang Porz Gwenn, 6 novembre (P.J. Dubois).
Nord - Mardyck/Dunkerque, 3 octobre (J.-A. Leclercq, C. Prangere).
Pas-de-Calais - Haringzelle/Audinghen, 2 ind., 17 octobre, 1 seul jusqu'au 19 octobre (G. Flohart *et al.*).
1998 Finistère - Île de Sein, phot., du 21 au 24 mai (Y. & J.-P. Trévoux).

(Asie centrale et septentrionale). Année record avec huit individus dont quatre à Ouessant ; jusqu'à présent les meilleures années étaient 1987 avec cinq oiseaux, 1994 et 1996 avec trois oiseaux. Une palme aussi pour l'île de Sein qui a accueilli l'espèce en mai 1998 (on peut d'ailleurs se demander à cet égard s'il ne s'agit pas d'un oiseau ayant hiverné sur place ou non loin de là).

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

Pouillots véloces de type sibérien (105/111 - 7/7) :
Finistère - Île d'Ouessant : Stang Porz Gwenn, au moins 1 ind., 31 octobre et 6 novembre (P.J. Dubois, D. Michelat) ; Parkou, 10 novembre (Y. Guermeur) ; Pount ar Rodez, 11 novembre ; Arland, 23 novembre (Y. Guermeur), 1er décembre (Y. Guermeur), 15 et 16 décembre (Y. Guermeur).





23 & 24. Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus*, île de Sein, Finistère, octobre 1999 (J.-F. Darras). *Dusky Warbler.*



25. Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* de type sibérien, Ouessant, décembre 1998 (D. Simpson). *Eastern Chiffchaff.*



26. Gobemouche nain *Ficedula parva*, île de Sein, Finistère, octobre 1999 (J.-F. Darras). *Red-breasted Flycatcher.*

Drôme - Montjoyer, 24 et 30 septembre (G. Olioso).
1998 Finistère - Île d'Ouessant : Porz Paol, 2 ind., phot., 30 décembre (D. Simpson) et non un seul (*Ornithos* 6-4 : 166).
1998 Vendée - Île d'Yeu : Port Joinville, 25 et 26 octobre (F. Noel).
1996 Ain - Divonne-les-Bains, phot., du 25 janvier au 6 février (L. Maumary, Y. Schmidt).

(Sibérie). L'oiseau de la Drôme est totalement hors époque normale (cf. les arrivées de novembre à Ouessant), mais rappelons-nous que le sud-est de la France réserve bien des surprises quant aux dates d'observation de certains pouillots sibériens... À noter cet oiseau hivernant de 1996 dans l'Ain, qui en outre était tantôt français, tantôt suisse...

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (197/205 - 8/9)

Bouches-du-Rhône - La Caume/Saint-Rémy-de-Provence, du 17 au 19 octobre (R. Crofton, A. Pataud).
Finistère - Île d'Ouessant : Stang Ar Ch'lann, du 8 au 11 octobre (F. Maillot) ; Poull Brac, 2 ind., 12 octobre (O. Chaline, G. Leotard) ; Cost ar Reun, 16 octobre (P.-P. Evrard, P. Rouillier) ; île de Sein, au moins 3 ind. de 1er hiver (peut-être 4), du 11 au 14 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, Y. Kayser, A. Larousse), 1 ind., phot., du 17 au 19 octobre (J.-F. Darras, E. Lapous).
1998 Seine-Saint-Denis - La Courneuve, 14 septembre (S. Malignat).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). On est loin des 33 individus de 1995 ! Pour mémoire, la moyenne annuelle 1981-1998 est d'un peu plus de 11 oiseaux. En ce qui concerne la donnée d'Île-de-France, on pourrait conclure : « À secteur inhabituel, date inhabituelle ».

PIE-GRIÈCHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (7/7 - 2/2)

Finistère - Île d'Ouessant : Locqueltas, 1er hiver, phot., 17 octobre (P.-P. Evrard, T. & M. Quelennec).
Haute-Saône - Vitrey-sur-Mance, 1er hiver, phot., du 23 au 27 octobre (B. Bourriot, J. Menetrey, D. Michelat).
1996 Finistère - Île d'Ouessant : Cost ar Reun, juv., phot., du 1er au 5 novembre (D. Laloi, E. Lapous, S. Pignocchi *et al.*) et non jusqu'au 3 novembre uniquement (*Ornithos* 4-4 : 159).

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). Belle année avec deux oiseaux à la même époque, celui d'Ouessant avait dû lire « *Les météores* »...

ETOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (49/127 - 3/5)

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuve de reproduction) :

Hérault - Vendémian, fem. ad., du 8 au 13 mai (M. Duquet, J.-Y. Frémont), mâle, phot., du 31 décembre au 13 janvier 2000 (M. Duquet).
Var - Hyères, couple ayant produit au moins 1 jeune, du 18 avril au 24 juin (J.-G. Robillard, P. Sertel).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). La colonisation du littoral a fait un saut remarquable en 1999 avec cette reproduction réussie en Provence.

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (41/49 - 5/5)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour du Valat, juv., 20 et 21 septembre (N. Vincent-Martin).
Finistère - Île de Sein, juv., 9 et 12 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, S. Guérin *et al.*) ; Île d'Ouessant : Porz Noan, 1er hiver, phot., du 18 octobre au 13 novembre (D. Desmots, P.-P. Evrard, G. Flohart *et al.*).
Ille-et-Vilaine - Saint-Malo, juv., 30 septembre (P. Le Mao).
Pas-de-Calais - Le Portel, juv., du 19 au 22 août (P. Bernard).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Avec cinq oiseaux différents, 1999 s'inscrit à la troisième place du classement des meilleures années après 1984 (9 individus) et 1997 (7 individus), la moyenne annuelle étant d'environ 3 oiseaux pour la période 1981-1998. À noter que la donnée du Portel est (enfin !) la première observation pour la région Nord/Pas-de-Calais.



27. Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*, mâle, Vendémian, Hérault, janvier 2000 (M. Duquet). Comparer la coloration des rémiges primaires et des tertiaires avec celle de l'Étourneau sansonnet (à droite). *Winter male Spotless Starling with Common Starling (right).*



28. Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus*, 1er hiver, Vitrey-sur-Mance, Haute-Saône, octobre 1999 (R. Dujardin).
First-winter Isabelline Shrike



29. Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala*, mâle, La Verdière, Var, juin 1998 (C. Bury).
Male Black-headed Bunting

ROSELIN GITHAGINE *Rhodopechys githaginea* (5/5 - 1/1)

Doubs - La Rivière-Drugeon, mâle ad., du 29 juin au 1er juillet (M. Dichamp, D. Michelat).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Il s'agit de la deuxième observation en Franche-Comté. La première avait été effectuée à Chaux (Territoire-de-Belfort) le 30 juin 1994. La concordance des dates est pour le moins remarquable...

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (104/136 - 4/3)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d'un astérisque (*).

Finistère - Île d'Ouessant : Ar Reun, juv., 20 octobre (J.-F. Arcanger).

Jura - Les Rousses, 4 mâles chant. (dont au moins 2 rouges), 10 juin, 2 mâles chant., 1er juillet (J.-L. Cathala, P. & J.-B. Crouzier) ; Bois-d'Amont, 5 ou 6 mâles chant. (dont au moins 2* gris), 10 juin (J.-L. Cathala, P. & J.-B. Crouzier).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Le bilan 1999 du suivi dans le Haut-Jura s'établit à 9 ou 10 mâles chanteurs (10 en 1998, 11 en 1997) ; il traduit une apparente stabilité de cette petite population, ce que confirme la découverte d'au moins 2 mâles gris. Ces résultats paraissent tout à fait remarquables dans le contexte d'effondrement des effectifs notés dans le Haut-Doubs voisin (résultats non encore parvenus au CHN) ou sur le littoral du Nord/Pas-de-Calais.

BRUANT A CALOTTE BLANCHE *Emberiza leucocephalos* (7/12 - 2/4)

Hautes-Alpes - Montgenèvre, mâle 1re année, capturé, phot., 11 novembre (S. Blache, R. Garcin, D. Rosselli).

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas de Pontevès, mâle ad., mâle imm. et fem., du 18 au 27 février (Y. Kayser *et al.*).

(Sibérie). En Camargue, tandis que deux oiseaux hivernaient au Mas l'Auricet (*Ornithos* 6 4 : 168), reliquat de l'hivernage précédent, trois autres individus étaient découverts par hasard dans un groupe de fringilles s'étant réfugiés dans une haie jouxtant la route d'Arles. Et combien passent inaperçus ? La capture de l'espèce dans les Hautes-Alpes confirme qu'il se passe bien quelque chose dans le sud-est de la France...

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* (17/17 - 1/1)

Nièvre - Marzy, mâle ad., 10 mars (S. Merle).

(Scandinavie, Sibérie). Observation assez extraordinaire d'un oiseau au nourrissage devant la maison de l'observateur et ayant sans doute hiverné dans la région.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (49/53 - 5/7)

Bouches-du-Rhône - Camargue, 31 janvier (L. Dietrich).

Corse-du-Sud - Capitello, 3 ind., 6 février, 1 seul le 7 février, 2 ind., le 13 février (G. Bonaccorsi).



30. Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*, mâle 1re année, Montgenèvre, Hautes-Alpes, novembre 1999 (S. Blache).
First-year male Pine Bunting.

Finistère - Île d'Ouessant : Poull Dragas, 29 octobre (J.-P. & M. Delapré) ; île de Sein, 4 et 5 novembre (Y. & J.-P. Trévoux).
Gironde - Étang de Cousseau/Lacanau, phot., 28 et 29 octobre (P. Grisser).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Sept oiseaux, c'est comme en 1998 (moyenne annuelle 1981-1998 : un peu moins de 3 individus). Par ailleurs, l'hivernage du Bruant nain se confirme, d'autant qu'il existe à la même époque une autre donnée du Finistère, non encore parvenue au CHN. La mention du Sud-Ouest en même temps que celles des îles bretonnes est intéressante.

BRUANT MELANOCEPHALE *Emberiza melanocephala* (38/42 - 4/4)

Alpes-Maritimes - Cipières, mâle, phot., du 11 au 17 juin (D. Dupuy).
Var - L'Espare/Hyères, mâle ad., 18 mai (J.-G. Robillard) ; La Verdière, mâle, phot., 27 mai (M. Duquet), 2 mâles, 30 mai (Y. Kayser).
1998 Var - La Verdière, de 1 à 3 mâle ad., phot., du 7 juin au 7 juillet (C. Bury, F. Dhermain, B. Lequart).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Après des observations sporadiques ces dernières années, le Bruant « mélano » serait-il en train de s'implanter en Provence ? À suivre avec intérêt en tout cas... [Voir article dans le présent numéro, *NDLR*.]

Annexe 1 - Espèces dont l'origine sauvage n'est pas établie (catégorie D)

PELICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (30/31 - 5/5)

Bouches-du-Rhône - Le Puy-Sainte-Réparade, ad., phot., du 1er au 30 avril (G. Durand, T. Perrier).
Marne - Taissy, 3 ad., 24 septembre (D. Lecompte) ; lac du Der/Arrigny et Giffaumont, 3 ad. probables, 2 novembre (C. Riols).
Meuse - Gimécourt, 3 ad., phot., 3 octobre (E. Vaillant).
Var - salins d'Hyères/Hyères, ad., 9 mars (A. Blasco).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Les trois individus vus dans la Marne et en Meuse sont sans doute les mêmes. Des informations faisant état de plusieurs spécimens échappés du zoo de Sigean (Aude) en 1998 conduisent à regarder ces observations d'un œil critique...

OIE DES NEIGES *Anser caerulescens* (18/41 - 0/0)

1998 Seine-Maritime - Port d'Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, 4 ad., 1er novembre (G. Béteille).

(Amérique du Nord, Groenland, Sibérie orientale). Ces oiseaux ont été vus en vol dans un groupe de 64 Oies cendrées en migration à l'extrémité de la digue du port d'Antifer.

CANARD A FAUCILLES *Anas falcata* (2/2 - 3/2)

Manche - Saint-Symphorien-des-Monts, mâle ad., 7 février (P. & S. Provost), mâle ad. (le même), phot., du 20 décembre au 16 janvier 2000 au moins (P. & S. Provost).

Meurthe-et-Moselle - Dommartin-les-Toul, mâle, du 23 au 26 novembre (E. Roualet).
(Sibérie orientale). L'oiseau normand aurait-il effectué un semblant de migration avec arrêt en Lorraine au retour ?

SARCELLE ELEGANTE *Anas formosa* (5/5 - 1/1)

Indre-et-Loire - Le Louroux, mâle ad., du 7 au 21 janvier (P. Cabard, G. Sabatier *et al.*).
(Sibérie, Asie). Évidemment, c'est une bonne date pour un canard égaré, mais avec cette espèce, il faut bien sûr être prudent quant à ses origines...

ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

Note importante : les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée sont fournies aux observateurs ayant joint une enveloppe timbrée à leur adresse en demandant à être informés de la décision du CHN.

1999

Puffin semblable *Puffinus assimilis* - Finistère - Île d'Ouessant : Créac'h - 17 septembre ; Vendée - Les Sables-d'Olonne - 1er octobre.
Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* - Hérault - Vendres - 7 ind., 25 juin.
Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Finistère - Île d'Ouessant : Porz Noan - 17 septembre.
Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* - Landes - Orx - 17 février.
Canard à front blanc *Anas americana* - Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Saint-Lumine-de-Coutais - mâle subad., du 13 au 24 mars.
Sarcelle d'hiver *Anas crecca* - Mâles présentant les caractéristiques de la race américaine *carolinensis*, appelée « Sarcelle à ailes vertes » : Ain - Birieux - 20 mars.
Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* - Oise - Verneuil-en-Halatte - mâle ad. (le même qu'en 1998, cf. ci-après), du 16 au 24 novembre.
Arlequin plongeur *Histrionicus histrionicus* - Haute-Loire - Chadrac - mâle, 15 février.
Élanion blanc *Elanus caeruleus* - Saône-et-Loire - Entre Tournus et Macon - 29 août.
Busard pâle *Circus macrourus* - Jura - Vincent - fem. 1er été, 5 mai ; Marne - Vanault-les-Dames - mâle 1er été, 11 juin.
Autour des palombes *Accipiter gentilis* - Individus présentant les caractéristiques de la race *buteoides* : Haute-Corse - Barcaggio - 10 mai.
Buse variable *Buteo buteo* - Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » : Jura - Champrougier - du 21 novembre au 12 mars 2000.
Buse féroce *Buteo rufinus* - Haute-Savoie - Reignier - 31 mars.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Cher - Allogny - 17 février. Moselle - Dieuze - 23 mai. Nièvre - étang de Vaux - 19 février.
Aigle pomarin *Aquila pomarina* - Marne - Brusson-les-Forges/Cheminon - imm./subad., 3 avril.
Aigle des steppes *Aquila nipalensis* - Haute-Savoie - Samoens - imm., 9 septembre.
Aigle impérial *Aquila heliaca* - Camargue : Mas-Neuf - imm., 14 février.
Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* - Pyrénées-Atlantiques - Saint-Jean-de-Luz - imm., 29 août.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Corse-du-Sud - Capitello - imm., 3 septembre.
Marouette poussin *Porzana parva* - Loir-et-Cher - Soings-en-Sologne - 7 avril.
Glaréole à ailes noires *Glareola nordmanni* - Isère - Reymure/Vif - 20 juin.
Gravelot à long bec *Charadrius placidus* - Indre - Pouligny-Saint-Pierre - 3 octobre.
Gravelot kildir *Charadrius vociferus* - Seine-et-Marne - Congis-sur-Therouanne - 28 et 29 mai.
Bécasseau minuscule *Calidris minutilla* - Vendée - Les Sables-d'Olonne - 23 octobre.
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* - Manche - Huisnes-sur-Mer - 19 septembre ; Pyrénées-Atlantiques - Biarritz - 3 ind., 4 décembre.
Bécassine double *Gallinago media* - Yvelines - Mantes-la-Jolie - 25 mai.
Chevalier criard *Tringa melanoleuca* - Camargue : Mas-Neuf - ad., 15 août.
Chevalier grivelé *Actitis macularia* - Jura - Desnes - ad., 9 août.
Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* - Pas-de-Calais - Oye-Plage - phot., 7 décembre.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Seine-Maritime - Vastérival/Sainte-Marguerite-sur-Mer - juv., 4 octobre.
Mouette atricille *Larus atricilla* - Landes - Courant d'Huchet/Moliets - ad., 11 décembre.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Landes - Ondres - 2 ad., 5 novembre ; Vendée - Les Sables-d'Olonne - 2e été, 20 août.
Tourterelle orientale *Streptopelia orientalis* - Loir-et-Cher - Ouzouer-le-Doyen - phot., 3 septembre.
Pic syriaque *Dendrocopos syriacus* - Somme - Quend - 31 août.
Sirli de Dupont *Chersophilus duponti* - Haut-Rhin - Reguisheim - 4 août.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Manche - Genêts - 7 novembre ; Marne - Giffaumont - 1er novembre.
Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* - Drôme - Gigors-et-Lozeron - 4 ind., 31 mars ; Pas-de-Calais - Oye-Plage - 10 avril.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg* : Bouches-du-Rhône - Camargue - mâle, 2 mai ; Haute-Corse - Macinaggio, mâle, 16 avril ; Meuse - Lachaussée - 2 ind., 22 avril.
Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* - Individus présentant les caractéristiques de la race *magna* : Somme - Quend - 11 avril.
Traquet rieur *Oenanthe leucura* - Pyrénées-Orientales - Banyuls - fem. ad., 29 septembre.
Grive de Naumann *Turdus naumanni* - Drôme - Bourg-de-Péage - 20 janvier.
Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* - Nord - Leffrinckoucke - 9 octobre.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* gr. *tristis/fulvescens* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Est Vaccarès - 17 novembre.
Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* - Alpes-Maritimes - Cipières - fem., 17 juin.

1998

Albatros indéterminé *Diomedea sp.* - Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen - 17 septembre.
Océanite frégate *Pelagodroma marina* - Finistère - Le Conquet - 25 octobre.
Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* - Oise - Verneuil-en-Halatte - mâle imm., 7 au 14 mars ; mâle (le même), du 19 décembre au 17 février 1999.
Aigle pomarin *Aquila pomarina* - Camargue : Piémanson, ad. probable, 20 septembre.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Corse-du-Sud - Capitello - juv., 2 octobre.
Pluvier bronzé/fauve *Pluvialis dominica/fulva* - Loire-Atlantique - Grande Brière - juv., phot., 12 août.
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* - Manche - Courtils - 3 octobre.
Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* - Landes - Orx - 22 et 23 septembre.
Bécassine double *Gallinago media* - Gironde - Lacanau - 14 août.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Calvados - Pennedepie - juv., 25 septembre ; Seine-Maritime, Cap d'Ailly/Varengeville-sur-Mer, 2 ad. et 1 juv., 13 septembre ; Sainte-Marguerite-sur-Mer - juv., 2 novembre.
Goéland railleur *Larus genei* - Pas-de-Calais - Ambleteuse - 7 septembre.
Goéland d'Audouin *Larus audouinii* - Charente-Maritime - Royan - 3e année, 10 juin.
Gobemouche nain *Ficedula parva* - Haut-Rhin - Saint-Louis - 18 septembre.

1997

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* - Yvelines - Triel-sur-Seine - fem., 5 novembre.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Seine-Saint-Denis - Parc du Sausset - juv., 20, 22 janvier et 2 février.
Goéland railleur *Larus genei* - Finistère - Penmarc'h - 30 novembre.
Goéland à ailes blanche *Larus glaucoides* - Individus présentant les caractéristiques de la race *kumlieni*, appelée « Goéland de Kumlien » : Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer - ad., phot., 29 décembre et 3 janvier 1998.

1996

Buse variable *Buteo buteo* - Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » : Ain - Foissiat - ad., phot., 4 mars.
Harfang des neiges *Nyctea scandiaca* - Ardennes - Entre Vouziers et Attigny - 8 novembre.

Annexe 3 - catégorie E

Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la Liste française ni dans la catégorie D, mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour. Ne figurent pas les espèces pour lesquelles une origine sauvage est totalement invraisemblable.

• **Courlan brun** *Aramus guarauna* - 1998 Pas-de-Calais, Oye-Plage, trouvé mort, phot., 31 décembre (J. Laesser, B. Posse, E. Revaz *et al.*).

• **Bernache du Canada** *Branta canadensis* - Individus présentant les caractéristiques des races *minima/hutchinsii/parvipes* : Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, 5 ind. (les 5 autres étant des hybrides), du 4 au 23 janvier (B. Lebrun, E. Le Roy, B. Theveny) et non uniquement le 4 janvier (*Ornithos* 6-4 : 171, mais ces oiseaux sont en fait présents toute l'année, P.J. Dubois, comm. pers.) ; 1997 Marne - lac du Der/Giffaumont-Champaubert, Arrigny, Sainte-Marie-du-lac-Nuisement, du 25 octobre au 22 février 1998 (E. Le Roy, C. & R. Riols, B. Theveny *et al.*) ; il y a lieu de préciser que cet oiseau était porteur d'une bague plastique de couleur (*Ornithos* 6-4 : 171).

Le CHN souhaite recueillir les données de « petites » Bernaches du Canada et invite les observateurs à envoyer toute description se rapportant à ce type d'oiseau (attention aux hybrides).

Remerciements

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 1999, ont contribué à son bon fonctionnement :
• la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière nécessaire au Comité et à son Secrétariat, ainsi que la revue *Ornithos* pour la prise en charge des photos couleur qui illustrent ce rapport,

• Christian Dronneau, Guy Flohart, Pascal Grisser, Yvon Guermeur, Yves Kayser, Robert Lécaille, Dominique Michelat, Georges Olioso, Sébastien Reeber, Christian Riols, Nicolas Selosse qui nous ont apporté des informations complémentaires ainsi que tous les responsables de Centrales Ornithologiques ou de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) qui nous ont transmis des données,
• enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

• BOUGEARD B. & SIBLET J.-P. (2000). Observation automnale d'un Pluvier fauve *Pluvialis fulva* dans l'Yonne. *Ornithos* 7-2 : 90-91.
• GUÉRIN S. (1998). Première mention française du Gravelot mongol *Charadrius mongolus*. *Ornithos* 5-1 : 42-45.
• LAROUSSE A. (1998). Afflux de Bécasseaux minutes *Calidris minuta* en France à l'automne 1996. *Ornithos* 5-2 : 49-53.
• SYROECHKOVSKI E.E., CZÖCKLER C. & LAPPO E. (1998). Status of Brent Goose in northwest Yakutia, East Siberia. *British Birds* 91 (12) : 565-572.

SUMMARY

Rare birds in France in 1999. *A new species was added to the French List in 1999, Forster's Tern* Sterna forsteri, *which also included the first record of Spanish Imperial Eagle* Aquila adalberti *this century. 1999 also included the second Sharp-tailed Sandpiper* Calidris acuminata, *and the second and third records of Lesser Sand Plover* Charadrius mongolus. *In 1997, a new subspecies was accepted for France, Moroccan White Wagtail* Motacilla alba subpersonata, *whilst in 1998 there were records of the second Pied Wheatear* Oenanthe pleschanka *and the fourth Bufflehead* Bucephala albeola.
In 1999, record numbers included a total of 6 Surf Scoters Melanitta perspicillata *(5 together !), 128 Ruddy Ducks* Oxyura jamaicensis, *4 Pallid Harriers* Circus macrourus, *24 Little Crakes* Porzana parva, *6 White-rumped Sandpipers* Calidris fuscicollis, *133 Long-tailed Skuas* Stercorarius longicaudus *and 8 Dusky Warblers* Phylloscopus fuscatus.
The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of records and individuals for the period 1981-98 ; the other pair relate to the current year (1999).

Comité d'Homologation National c/o LPO
La Corderie Royale, BP 263, 17305 Rochefort Cedex



31. Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala*, mâle, Cipières, Alpes-Maritimes, juin 1999 (D. Dupuy). *Male Black-headed Bunting.*