ZEISS

Les oiseaux rares en France en 2000



Rapport du Comité d'Homologation National

par Jean-Yves Frémont et le CHN

Introduction

Il s'agit du 19e rapport du Comité d'Homologation National (CHN), qui couvre l'année 2000. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 2000 est de **499**, en hausse sensible par rapport à l'année précédente. Le taux d'acceptation est de 83,5 %, chiffre supérieur à celui de 1999 mais néanmoins proche des valeurs habituelles (comprises entre 81 et 85 %). En 2000, c'était le poste de Pierre Crouzier (Président), dont le mandat arrivait à expiration, qui était vacant. Pour lui succéder, Jean-Yves Frémont, Secrétaire (non votant depuis la fin de son premier mandat de membre en 1995), a été élu comme membre votant. Pierre Crouzier conserve la présidence du CHN. En 2000, le CHN se composait donc des membres suivants : Yvon Créau, Marc Duquet, Guy Flohart, Jean-Yves Frémont (Secrétaire), Yves Kayser, Dominique Michelat, Serge Nicolle, Alain Rouge ainsi que Pierre Crouzier (Président). Un poste a été pourvu en 2001 et un autre doit l'être en 2002. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du Secrétaire du CHN avant le 1er avril 2002.

Travaux et décisions du CHN

Pour les oiseaux vus en mer au large des côtes françaises, c'est désormais la Zone Économique Exclusive (ZEE) de la France qui est prise en compte pour déterminer si ces données sont du ressort du CHN français, et non plus les eaux territoriales au sens strict (V. *Ornithos* 8-6 : 216-219). Ces données figurent désormais au rapport du CHN avec la mention « En mer », suivie du nom de la zone météorologique marine concernée (selon les nouvelles dénominations ; V. *Ornithos* 8-6 : 220-223) et des coordonnées géographiques précises du lieu d'observation ; une carte sera en outre insérée au rapport annuel pour localiser chacune des observations d'espèces pélagiques homologuées.
Dans la présentation des données, le nombre total de mentions françaises et d'individus correspondants a été ajouté cette année ; il figurera désormais systématiquement dans le rapport du CHN.
Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (modèle à demander éventuellement au secrétariat du CHN) dès que possible après l'observation (que vous soyez le découvreur ou simple observateur) et de préférence avant le 31 décembre de l'année en cours. Ceci évite la publication très tardive de données anciennes ou de compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s). Il est à cet égard important de rappeler que dans un souci de validation homogène des données, seules celles ayant été validées par un comité d'homologation national européen sont prises en compte pour la publication de synthèses nationales concernant une espèce.

Les faits marquants

En 2000, cinq espèces ont été ajoutées à la Liste française : le Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus*, le Gravelot pâtre *Charadrius pecuarius*, l'Hirondelle à front blanc *Hirundo pyrrhonota*, le Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis* et le Tangara écarlate *Piranga olivacea*. L'Eider de Steller *Polysticta stelleri* a fourni sa première mention pour le XXe siècle et le Cormoran pygmée *Phalacrocorax pygmeus* ses deuxième et troisième données. Quatre espèces sont observées pour la troisième fois en France : le Vanneau à queue blanche *Vanellus leucurus*, le Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata*, la Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* et la Paruline rayée *Dendroica striata*. Par ailleurs, des effectifs remarquables ont été notés pour quelques espèces : 15 Érismatures à tête blanche *Oxyura leucocephala* dont un groupe de douze individus, 4 Rousserolles des buissons *Acrocephalus dumetorum* alors qu'il n'existait que deux mentions jusqu'à présent. Enfin, le premier Corbeau familier *Corvus splendens* (cat. D) a été observé en France, ainsi que la première Mésange de Pleske *Parus caeruleus x P. cyanus* (Lascève *et al.* 2001).

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A ET C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.

2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants, à l'exclusion de l'année 2000, les deux suivants correspondent aux données homologuées depuis 1981 (2000 exclue) et à celui des individus correspondants, les deux derniers enfin représentent le nombre de données homologuées en 2000 et le nombre d'individus correspondants.

3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.

4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).

5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.

6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).

7. Date(s) d'observation.

8. Observateur(s), sauf exception, limité à 3 (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe ou dessinateur).

9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est indiquée entre parenthèses.

10. La séquence taxonomique est celle de Voous (1978, *The List of the Birds of the Western Palearctic*), modifiée par la Liste des oiseaux de France (CAF 1997).

11. Les données concernant les races sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la race concernée.

12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à l'année 2000. Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Mouette atricille - un adulte le 29 août 2000 à la pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, Vendée (A. Thomas & P. Trotignon, *in* Frémont et le CHN 2001).

GRÈBE À BEC BIGARRÉ *Podilymbus podiceps* (4/4) (4/4 - 1/1)

Sarthe - Saint-Denis-d'Orques, phot., du 24 juin 2000 au 27 octobre 2001 (C. Kerihuel, G. Paineau *et al.*).

(Amériques). Cette cinquième donnée française est remarquable à plus d'un titre : par la longueur du séjour de cet oiseau tout d'abord, par sa localisation (c'est la première à l'intérieur des terres), par le grand nombre d'observateurs qu'elle a drainés vers ce petit coin de campagne sarthoise jusque-là bien méconnu, et aussi par les manifestations vocales et les parades agressives de l'oiseau.

ALBATROS À SOURCILS NOIRS *Diomedea melanophrys* (5/5) (5/5 - 0/0)

1999 Finistère - Île d'Ouessant : pointe de Pern, imm., 1er et 2 avril (D. Cohez).

(Mers australes). Deuxième oiseau vu en Bretagne et en avril (le premier étant du 20 avril 1992 à Rothéneuf, Ille-et-Vilaine). Il existe deux données du Nord à l'automne et une de février au cap Corse.

ALBATROS INDÉTERMINÉ *Diomedea sp.* (6/6) (6/6 - 0/0)

1999 Manche - Au large de Cherbourg, 29 avril (Y. Février).

(Mers de l'hémisphère Sud). Pourrait-il s'agir de l'Albatros à sourcils noirs vu en début de mois à la pointe du Finistère ?



1. Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps*, Saint-Denis-d'Orques, Sarthe, mai 2001 (J.-P. Trévoux). *Adult Pied-billed Grebe.*

PUFFIN SEMBLABLE *Puffinus assimilis* (22/22) (15/15 - 4/5)

En mer - Rochebonne : 45°36' N/4°09' W, 14 août (R.P. Fray, D. Gray *et al.*) ; Rochebonne : 45°44' N/4°13' W, 14 août (R. P. Fray, D. Gray *et al.*) ; Rochebonne : 45°41' N/4°22' W et alentours, 4 ind. en tout, 22 août (J.-C. Beaudoin, D. Farges, A. Gentric *et al.*).

(La race *baroli* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries et aux Açores). À l'évidence, la multiplication des sorties en mer effectuées par les ornithologues français et étrangers, en particulier à bord des ferries Plymouth-Santander ou Porthmouth-Bilbao, va certainement changer le statut français de quelques oiseaux pélagiques, notamment celui du Puffin semblable.

OCÉANITE DE WILSON *Oceanites oceanicus* (11/11) (7/7 - 3/3)

En mer - Rochebonne : 46°10' N/4°30 W, 22 août (J. Millar) ; Rochebonne : 46°03' N/4°32' W, 22 août (J.-C. Beaudoin, D. Farges, A. Gentric *et al.*) ; Rochebonne : 46°19' N/2°01' W puis 46°21' N/2°00' W, 26 août (D. Desmots, B. Helsens *et al.*).

(Îles de l'Antarctique. En période internuptiale, tous les océans, y compris l'Atlantique). Comme pour l'espèce précédente, et pour les mêmes raisons, il faut s'attendre à un accroissement du nombre de données de cet océanite. Notons que l'observation du 26 août est la quatrième réalisée depuis le chalutier « *Kifanlo* » au large des Sables-d'Olonne (Vendée).



Distribution of pelagic records of Little Shearwater (✤) and Wilson's Petrel (◆) accepted by French RC in 2000.

CORMORAN À AIGRETTES *Phalacrocorax auritus* (0/0) (0/0 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : réservoir, 2e année, phot., du 5 au 8 octobre (A. de Broyer *et al.*).

(Amérique du Nord). Première donnée française pour cet oiseau mort d'épuisement après quelques jours, et sans doute arrivé avec pas moins de quatre espèces de passereaux néarctiques qui seront également trouvées sur l'île d'Ouessant. Une note relatant cette observation a été publiée dans *Ornithos* (De Broyer 2001). Cette espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la Commission de l'Avifaune Française (*Ornithos* à paraître).

CORMORAN PYGMÉE *Phalacrocorax pygmeus* (2/2) (1/1 - 2/2)

Nord - Deûlémont et Frelinghien, imm., phot., du 28 décembre au 20 janvier 2001 (C. & I. Capelle *et al.*).

Haut-Rhin - Kembs, phot., du 29 octobre au 1er novembre (F. Guth, A. Muller *et al.*).

(Europe de l'Est, Asie centrale). Deuxième et troisième données pour le XXe siècle, de surcroît la même année, la mention précédente étant de Camargue les 24 et 25 mars 1990. Il n'existe qu'une mention pour le XIXe siècle, le 5 novembre 1856, près de Dieppe, Seine-Maritime, et, curieusement, la seule mention du XIXe siècle pour la Suisse est du 25 octobre 1856 (Winkler 1999, B. Volet *in litt.*). L'espèce connaît une forte croissance en Europe de l'Est, notamment en Hongrie (A. Schmidt *in litt.*). Elle niche également dans le nord-est de l'Italie, pays où sont désormais vus de nombreux hivernants çà et là (A. Corso *in litt.*). En Suisse, l'année 2000 a connu la présence de 8 oiseaux, dont l'hivernage complet de 3 individus au lac de Zürich, toutes les données provenant du nord du pays (B. Volet *in litt.*) ; les Pays-Bas, l'Allemagne et la Pologne ont également été concernés par cet afflux dans la seconde moitié de l'année (Gantlett 2001). Les données françaises s'inscrivent donc parfaitement dans ce contexte. À noter que l'oiseau du Nord stationnait sur un complexe de bassins situés dans le Hainaut occidental belge, à 500 mètres de la frontière naturelle franco-belge, la Lys, rivière qu'il franchissait plusieurs fois par jour.

AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (31/22) (25/16 - 2/1)

Bouches-du-Rhône - Marais des Grands Paluds/Fos-sur-Mer, 26 mai (A. Blasco), puis Camargue, fem. ad., phot., du 5 juillet au 17 août (A. Chabrolle, Y. Kayser *et al.*).

(Afrique, Asie). La taille très inférieure à celles des mâles de Garzettes présents a permis de préciser le sexe de cet oiseau, non nicheur cette année. Aucune donnée enregistrée en 1999, cet oiseau a donc été compté comme un nouvel individu.

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (131/916) (34/77 - 1/1)

Mayenne - Desertines, ad., du 15 au 22 janvier (B. Duchenne, B. Helsens, D. Tavenon).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Une donnée et un individu, c'est peu ! Mais il est vrai que l'arrivée de l'espèce en France est conditionnée par les aléas météorologiques comme ceux des hivers 1987/1988 (20 oiseaux), 1993/1994 (19 oiseaux) ou 1996/1997 (13 oiseaux).

OIE RIEUSE DU GROENLAND *Anser albifrons flavirostris* (3/3) (0/0 - 1/1)

Finistère - Saint-Vio/Tréguennec, 1er hiver, phot., du 3 décembre au 11 mars 2001 (P.J. Dubois, J.-Y. Frémont, J.-Y. Péron, G. Rault *et al.*).

(Sud-Ouest du Groenland). Si l'on excepte les trois mentions de janvier 1963, liées aux rigueurs de l'hiver 1962/1963, où les départements d'Ille-et-Vilaine, de la Manche et du Pas-de-Calais furent concernés, cette donnée est une première depuis la prise en compte des données d'oiseaux rares par le CHN (1981). La présence d'un Faucon gerfaut *Falco rusticolus,* apparemment venu de la même région, et de deux Goélands argentés d'Amérique *Larus argentatus smithsonianus,* ainsi qu'un petit afflux de Goélands à bec cerclé *L. delawarensis* au cours de l'hiver 2000/2001, ont peut-être la même cause.

OIE NAINE *Anser erythropus* (14/15) (4/4 - 3/1)

Aube - Lac du Temple-Auzon/Radonvilliers, ad., du 5 novembre au 2 janvier 2001 (E. Le Roy, A. Mionnet, E. Parmentier *et al.*).
Marne - Lac du Der-Chantecoq, le même oiseau, du 19 octobre au 1er novembre (M. Guindollet, E. Le Roy *et al.*).
Haute-Marne - Lac du Der-Chantecoq : Éclaron/Braucourt/Sainte-Livière, le même oiseau, du 15 février 2001 au 3 mars 2001 (C. & R. Riols).

(Europe du Nord, Sibérie). La dernière mention de l'espèce remonte à 1988... déjà dans l'Aube ! L'individu qui a fréquenté, toujours en compagnie d'Oies cendrées *Anser anser*, le complexe des réservoirs Aube/Marne était porteur de bagues colorées très peu visibles, dont l'une émanait d'un programme franco-suédois qui s'intègre à diverses actions visant à sauver l'espèce d'une disparition « annoncée ». L'une de ces actions consiste à faire hiverner les oiseaux pour partie en Allemagne, et non en Europe centrale, où les oies sont décimées par une chasse insensée.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (31/20) (31/20 - 13/7)

Individus présentant les caractéristiques de la race *nigricans*, appelée « Bernache (cravant) du Pacifique » :
Charente-Maritime - Île de Ré : Ars-en-Ré, 1 ind., du 19 au 28 octobre (A. Marchand), 2 ind. du 18 novembre au 18 février 2001, mais 3 ind. le 17 février 2001 (LPO-Ré *fide* P. Trotignon) ; Saint-Clément-des-Baleines, 1 ind., 17 février 2001 (LPO-Ré *fide* P. Trotignon) ; Île d'Oléron : La Baudissière/Dolus d'Oléron et estuaire de la Seudre, ad., 10 novembre (P. Trotignon), 3 ind., du 11 au 29 décembre (A. Kim), 1 ind., du 19 février au 20 mars 2001, mais 2 ind. le 12 mars (A. Kim) ; Château-d'Oléron, ad., du 13 février au 15 mars 2001 (A. Kim).
Loire-Atlantique - Traicts du Croisic, ad., du 12 novembre au 23 mars 2001 (A. Gentric, Y. & J.-P. Trévoux).
Manche - Vains et Genêts, ad., du 9 janvier au 19 février (S. Provost *et al.*), ad., phot., du 23 novembre au 2 mars 2001 (S. Provost), 2 ad., 3 mars 2001 (S. Provost).
Nord - Le Clipon/Loon-Plage, ad. probable, 16 décembre (J.A. Leclercq *et al.*).
Vendée - Île de Noirmoutier : La Guérinière et Noirmoutier, ad., phot., du 29 novembre au 23 mars 2001 (M. Vaslin *et al.*).
1998 Charente-Maritime - Île d'Oléron : les 5 individus du 16 octobre au 8 mars 1999 (V. *Ornithos* 7-4 : 147) ont pu être différenciés par les motifs sur leurs flancs blancs, et se décomposent comme suit : La Baudissière/Dolus d'Oléron, 1 ind. du 16 octobre au 17 décembre (A. Kim) ; Le Château d'Oléron, 2 ind., 17 novembre, 3 ind., du 19 au 21 novembre, puis 2 ind. jusqu'au 2 mars 1999 (A. Kim) ; pointe de Chassiron, La Morelière et Les Huttes/Saint-Denis d'Oléron, 1 ind., du 19 janvier 1999 au 23 février 1999, un deuxième ind. le 8 mars 1999 (A. Kim) ; La Menounière et Les Placelles/Saint-Pierre d'Oléron, 1 ind., du 2 février 1999 au 1er mars 1999 (A. Kim).
1998 Loire-Atlantique - Traicts de Mesquer et de Pen Bé/Assérac, ad., phot., du 14 décembre au 13 janvier 1999 au moins (J.-L. Dourin, A. Gentric), il s'agit d'un deuxième individu et non de celui du Croisic (V. *Ornithos* 6-4 : 146) qui se serait déplacé sur ce site.

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Sur l'île de Ré, le maximum d'oiseaux présents en même temps au cours de l'hiver 2000/2001 a été de quatre, le 17 février 2001. Concernant le complexe estuaire Seudre-Île d'Oléron, plus difficile à appréhender, un minimum de trois individus est à envisager, mais rappelons que cinq oiseaux avaient pu être différenciés au cours de l'hiver 1998/1999. En outre, il a été démontré que des échanges peuvent exister entre ces deux îles (*fide* H. Robreau †). Pour le reste, la baie du mont Saint-Michel et la réserve naturelle des marais de Müllembourg à Noirmoutier accueillent probablement de nouveaux individus.

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis* (32/33) (16/15 - 2/2)

Loire-Atlantique - Grand traict du Croisic, ad., 17 octobre (A. Gentric).
Manche - Vains, ad., 8 octobre (S. Provost)

(Sibérie). Dates, brièveté du séjour (une seule journée par site) et concomitance avec les arrivées de Bernaches cravants *Branta bernicla* suggèrent une origine sauvage de ce qui pourrait d'ailleurs n'être qu'un seul et même individu en déplacement.

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (25/27) (22/24 - 4/4)

Finistère - lac du Drennec/Sizun, mâle imm., du 14 janvier au 26 mars, fem., du 23 janvier au 4 février (Y. Le Corre, A. Le Nevé, S. Mauvieux, G. Rault).
Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, fem. ad., 12 juin au moins (G. Flohart) ; Fond Pignon/Sangatte, mâle, 30 septembre et 1er octobre (P.J. Dubois).
1999 Vendée - Marais des Loirs/Olonne-sur-Mer, mâle ad., du 2 au 11 avril (D. Desmots).

(Amérique du Nord). L'année 2000 confirme l'accroissement régulier des apparitions de l'espèce en France.

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (30/26) (29/25 - 1/1)

Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., phot., 16 février (J. Gonin).
1999 Bouches-du-Rhône - Ginès, mâle ad., 9 janvier (P.-A. Crochet).
1999 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle imm., 22 janvier (D. Desmots, F. Portier).

(Amérique du Nord). Avec deux nouvelles données pour 1999, cette année détient le record de données depuis la création du CHN (6 mentions pour 5 individus). Voir le « En direct de la CAF » (*Ornithos* 8-6 : 216-219) au sujet de l'élévation de ce taxon au rang d'espèce.

SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors* (45/49) (35/39 - 3/4)

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle ad. et fem./imm., 10 octobre (S. Reeber).
Pas-de-Calais - Oye-Plage, fem./imm., 1er novembre (P.J. Dubois).
Seine-et-Marne - Trilbardou, mâle ad., 16 et 17 avril (P. Persuy).
1999 Charente-Maritime - Cabane de Moins/Breuil-Magné, mâle ad., du 7 au 28 mars (M. Dubillot, P. Trotignon).
1999 Vendée - Le Poiré-sur-Velluire, mâle ad., du 3 au 16 mars (M. Caupenne, P.-P. Evrard, C. & J. Gonin *et al.*) et non à partir du 4 mars (V. *Ornithos* 7-4 : 148).

(Amérique du Nord). Depuis 1995, les mentions se sont considérablement accrues (en moyenne 3,5 données par an pour 4 individus, contre respectivement 1,9 donnée et un peu plus de 2 individus depuis 1981). L'origine de certains oiseaux est bien sûr sujette à caution, mais les dates enregistrées en 1999 et 2000 correspondent bien aux pics des observations françaises (avril et septembre/octobre).

SARCELLE MARBRÉE *Marmaronetta angustirostris* (30/67) (11/11 - 0/0)

1999 Aveyron - Lac de Pareloup/Canet-de-Salars, 17 janvier (V. Lalanne-Bernard, Y. Bernard).
1999 Hérault - Étang du Méjean/Lattes, 5 ind., 27 août (M. Gunther).

(Méditerrannée, Moyen-Orient, Inde du Nord). Renseignements pris, les cinq oiseaux de l'Hérault pourraient correspondre à une nichée originaire du parc ornithologique de Pont-de-Gau en Camargue. Cette mention n'a donc pas été comptabilisée. Une donnée non soumise au CHN fait également état de deux individus à Sylvéréal, en Camargue, le 14 juillet 2000, qui pourraient avoir la même origine (G. Olioso *in litt.*). Quant à la donnée aveyronnaise, elle est pour le moins curieuse (date, région) mais a néanmoins été prise en compte dans les statistiques du CHN.



2. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, mâle, Fort-Vert, Pas-de-Calais, avril 2000 (G. Flohart). *Male Ring-necked Duck.*

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (85/72) (77/64 - 9/7)

Ain - Étang Pollet/Chalamont, mâle ad., 4 février (G. Bruneau).
Creuse - Étang des Landes/Lussat, mâle ad., 22 et 23 avril (A. Audevard).
Indre - Brenne (notamment étangs de la Gabrière, du Gabriau et de la Mer Rouge), mâle ad., phot., du 26 décembre au 11 mars 2001 (A. Audevard *et al.*).
Mayenne - Étang de Curessy/Saint-Loup-du-Dorat, mâle ad., du 14 mars au 16 avril (J.-F. Arcanger, B. Duchenne).
Moselle - Vallerange, mâle ad., 11 mars (G. Joannès, F. Kubina) ; localité tenue secrète, mâle ad., 13 mai (G. Schmitt *et al.*).
Pas-de-Calais - Fort-Vert, mâle ad., phot., du 30 avril au 5 mai (G. Flohart *et al.*).
Deux-Sèvres - Étang de la Grippière/Saint-Maurice-la-Fougereuse, mâle ad., 22 janvier (J.-F. Cornuaille).
Vendée - Parc Soubise/Mouchamps, mâle ad., phot., du 23 au 30 janvier au moins (T. Perrier).
1999 Charente-Maritime - Rochefort, mâle ad., du 10 novembre au 17 décembre (F. Sardain, P. Trotignon, S. Wagner).
1999 Finistère - Étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, mâle ad., du 14 novembre au 5 mars 2000 (A. Desnos, J.-Y. Péron, G. Rault), puis étang de Nérizélec/Plovan, le même ind., phot., du 11 au 18 mars 2000 (A. Desnos, J.-Y. Péron, G. Rault).
1998 Bouches-du-Rhône- Camargue : bassins de décantation des Saintes-Maries-de-la-Mer et étang du Vaccarès/Roquemaure, mâle ad., du 2 novembre au 6 mars 1999 (P. Crouzier, Y. Kayser, F. Legendre, M. Thibault *et al.*) et non jusqu'au 28 février uniquement (V. *Ornithos* 6-4 : 147).

(Amérique du Nord). Les oiseaux de l'Ain, de Vendée, de Charente-Maritime et du Finistère sont connus. Toutefois, le nombre d'oiseaux est en progression constante (7,8 données pour un peu moins de 6 oiseaux en moyenne annuelle depuis 1995, contre respectivement 4,3 et un peu moins de 4 individus depuis la prise en compte des données par le CHN en 1981) et des départements du centre de la France comme l'Indre ou la Creuse sont concernés par ce phénomène...

FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (6/3) (6/3 - 1/1)

Ain - Versailleux et Villars-les-Dombes, mâle ad., phot., 24 et 25 février (P. Crouzier, G. Bruneau).

(Amérique du Nord). Avec cette nouvelle donnée, la France totalise quatre oiseaux différents (deux mâles et deux femelles). Curieusement, bien qu'elle soit devenue régulière en Grande-Bretagne, l'espèce continue à bouder le nord-ouest du pays.

EIDER À TÊTE GRISE *Somateria spectabilis* (8/9) (6/7 - 1/1)

Finistère - Douarnenez, fem. 1er hiver, phot., du 30 décembre au 7 avril 2001 (G. Rault *et al.*).

(Océan glacial arctique). Toujours bien rare dans nos contrées, cette jeune femelle a fait les beaux jours du port de Douarnenez et a permis par la longueur de son séjour d'être observée par de nombreux ornithos.

EIDER DE STELLER *Polysticta stelleri* (1/1) (0/0 - 1/1)

Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 1er hiver, 17 novembre (K. Verbanck).

(Océan glacial arctique). Encore plus rare que l'espèce précédente (une seule donnée au XIXe siècle) mais provenant sensiblement de la même zone géographique, l'Eider de Steller est enfin l'objet de cette observation heureusement bien documentée, car néanmoins frustrante par sa brièveté, puisqu'elle concerne un individu de passage devant la digue du Clipon.

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (44/46) (24/26 - 0/0)

1999 Vendée - La Terrière/La Tranche-sur-Mer, 2 mâles ad., 5 décembre (A. Thomas, P. Trotignon).

(Amérique du Nord). Avec cette donnée parvenue tardivement, la Vendée comble l'année blanche de 1999, et l'espèce enregistre ainsi sa septième année de présence continue sur ce site. En revanche, il est étonnant qu'aucun des cinq oiseaux présents en baie de Douarnenez, Finistère, au cours de l'hiver 1999/2000 n'ait été revu l'hiver suivant.

GARROT ALBÉOLE *Bucephala albeola* (4/4) (3/3 - 0/0)

1998 Charente-Maritime - Lagunage de Rochefort-sur-Mer, mâle ad., du 10 au 17 novembre (M. Caupenne, J. Fillonneau, F. Sardain, P. Trotignon) et non jusqu'au 16 novembre (V. *Ornithos* 7-4 : 149).

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (233/586) (225/577 - 39/136)

Ain - Birieux, fem./juv., du 26 au 31 août (A. Bernard, P. Varagnat), mâle 1er hiver et fem./juv., du 18 au 20 novembre (P. & J.-B. Crouzier, A. Forest).
Charente-Maritime - Île d'Oléron : Saint-Denis d'Oléron, 2 mâle ad., du 3 au 22 septembre, puis 1 seul jusqu'au 19 octobre (P. Trotignon) ; lagunage de Rochefort-sur-Mer, mâle ad. et 2 fem. ad. (1 mâle et 1 fem. éradiqués), du 1er au 13 septembre (C. Bouchet, P. Malassagne), mâle ad. et 2 fem./juv., du 14 septembre au 29 octobre (C. Boucher, Y. Kayser, F. Sardain), 1 mâle ad., 1er novembre (P.-P. Evrard), 2 mâles ad., 12 novembre (S. Meret).
Eure - Pont-Audemer, mâle ad. (éradiqué), 10 juillet (T. Denis).
Ille-et-Vilaine - Paintourteau/Erbrée, 5 mâles et 10 fem./imm. (10 ind. éradiqués), du 7 au 24 octobre (J.-P. Lafond, M. Claisse, H. Suret *et al.*).
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : au moins 6 mâles et 1 fem. à la fin juin, 1 juv. à partir du 27 septembre, 2 juv. les 7 et 10 octobre, 8 mâles et 15 fem./imm. le 9 novembre, 16 mâles et 17 fem./imm. le 29 novembre, 16 mâles et 26 fem./imm. le 2 décembre, 19 mâles et 22 fem./imm. le 4 décembre, 18 mâles et 32 fem./imm. le 2 janvier 2001 (S. Reeber).

Les Moutiers-en-Retz, fem./imm., 3 septembre (J. Gonin), 2 fem./juv., 7 octobre (B. Lebascle), fem. ad. et 2 juv. (les 3 éradiqués), 11 octobre (D. Pilvin) ; étang de la Provostière/Riaillé, 2 mâles ad. et 1 fem., du 25 novembre au 9 décembre (S. Angebaud).
Maine-et-Loire - Île Saint-Aubin/Angers, mâle ad., 16 janvier (J.-C. Beaudoin, A. Bruggeman, B. Gaudemer).
Mayenne - Étang de la Grande Métairie/Jublains, 2 mâles et 3 fem./juv. le 3 août, 7 ind. le 16 septembre, puis 4 ind. du 4 au 14 octobre (J.-F. Arcanger, D. Tavenon *et al.*) ; étang des Landes/Sainte-Suzanne, mâle ad., 27 octobre (J.-F. Arcanger).
Moselle - Bouconville-sur-Madt, mâle ad., 19 mai (D. Combrisson).
Nord - Étangs du Hayon et de la Folie/Trélon, mâle ad., du 5 février au 2 avril et du 27 mai au 23 juillet au moins (J. Piette) ; lac des Moëres/Ghyvelde, fem./imm., 8 août (C. & I. Capelle) ; La Neuville-Thumeries/Thumeries, fem./imm., du 31 août au 9 septembre (C. & I. Capelle).
Pas-de-Calais - Marck, fem. ad., phot., (éradiquée), 8 juillet (P.J. Dubois, G. Flohart, S. Roy).
Seine-et-Marne - Jablines, fem., 3 décembre (F. Bouzendorf).
Vendée - Étang des Boucheries/Les Landes-Genusson, 2 mâles et de 2 à 3 fem., du 10 janvier au 18 février, 6 ind. le 24 février, 7 ind. le 2 mars, 9 ind. le 10 mars, 1 mâle et 4 fem. du 16 au 23 mars, 1 mâle et 1 à 2 fem. du 31 mars au 11 mai (1 fem. éradiquée le 5 avril), 1 couple et 7 pulli le 15 juin, 4 mâles et 2 fem. et une nichée de 4 jeunes de 8 jours environ le 11 août, 7 mâles et 11 fem. le 29 septembre (L. Grillet, S. Mcrand), 21 ind. le 19 octobre (L. Grillet, A. Rivallin), 2 mâles et 10 fem. (tous éradiqués) du 24 octobre au 15 novembre (L. Grillet), fem./imm. les 26 et 27 décembre (J. Gonin).
1999 Eure - Léry-Poses, mâle, 22 et 23 novembre (S. Kepka).
1999 Manche - Gorges, mâle 1er hiver, 21 décembre (B. Chevalier).
1995 Ain - Versailleux, mâle ad., 14 et 16 février (D. Genoud).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). Année sensiblement équivalente à la précédente en nombre de données et d'individus. Assisterions-nous aux premiers effets du contrôle des populations ? En tout cas, il est remarquable que d'une année sur l'autre l'espèce fréquente quasiment les mêmes départements : Ain, Charente-Maritime, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Mayenne, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Vendée, ce qui peut s'expliquer par une fidélité de celle-ci à ces « nouvelles » zones d'hivernage. En ce qui concerne le bastion de Grand-Lieu, la nidification, bien que probable, n'a pu être prouvée cette année malgré des recherches équivalentes aux années passées. Il est néanmoins possible que les campagnes de tir aient poussé les oiseaux vers des endroits situés en dehors de la réserve ou que ceux-ci aient quitté Grand-Lieu (S. Reeber *in litt.*). Le nombre global d'oiseaux enregistré pour ce site est de 87 en 2000 (identique à 1999), avec malgré tout une certaine approximation. Le deuxième bastion des Landes-Genusson en Vendée est en progression (25 oiseaux environ dont deux nichées totalisant 11 jeunes en 2000) et il ne serait pas étonnant qu'il y ait des échanges avec le site précédent, comme il serait également possible qu'il y ait reproduction du côté de l'Ille-et-Villaine et de la Mayenne.

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (23/21) (18/16 - 4/15)

Ain - Étang Verdat/Lapeyrouse, mâle ad., phot., du 27 septembre au 9 novembre (G. Bruneau, P. Crouzier, O. Debré, B. Gilard *et al.*) ; Birieux, fem. ad., du 2 au 17 octobre (P. Crouzier).
Charente-Maritime - Lagunage de Rochefort, fem. ad., du 28 septembre au 28 novembre (S. Delon, Y. Kayser, J.-P. Paul *et al.*).
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 6 mâles ad., 1 mâle imm. et 1 fem. le 25 septembre, 8 mâles ad. et 2 mâles imm. le 29 septembre, 8 mâles ad., 3 mâles imm. et 1 fem. du 4 au 10 octobre, encore 2 mâles ad., 2 mâles imm. et 1 fem. le 31 octobre, 3 mâles ad. et 3 mâles imm. les 8 et 9 novembre, 1 mâle imm. les 4 décembre et 2 janvier 2001 (P. Boret, S. Reeber).

(Circum-miditerranéen : Espagne, Tunisie, Turquie, dans les Balkans, également au nord de la Caspienne ; en cours de réintroduction en Corse). En avançant en 1999 que l'oiseau de l'Eure était peut-être un avant coureur d'autres mouvements en provenance d'Espagne, c'était peut-être faire montre de prémonition, car ce dont a été témoin l'automne 2000 est véritablement sans précédent pour cette espèce. Douze oiseaux ensemble sur le lac de Grand-Lieu, parfois à 50 mètres des Érismatures rousses (S. Reeber *in litt.*)... voilà qui ne laisse pas d'être inquiétant ! Une donnée de Gironde n'a pas encore été soumise au CHN. Fin 2000, la population espagnole était d'environ 4 500 individus et de nouveaux sites ont été colonisés vers le nord de l'Espagne dans les régions de Valence (Albufera), Tarragone (delta de l'Ebre), Salamanque, Palencia, Alava et Navarre (V. *Ornithos* 8-4 : 159). Cette explosion démographique, mais aussi un été très sec dans le sud de l'Espagne (V. *Ornithos* 7-4 : 186), est sans nul doute la cause des observations dans plusieurs sites français. À suivre donc...

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (54/90) (46/82 - 1/2)

Landes & Pyrénées-Atlantiques - Localités tenues secrètes, 5 sites dont 4 occupés par un couple, un seul produit 2 jeunes à l'envol (P. Grisser *et al.*).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). Aucune observation de l'espèce en 2000 en dehors du secteur traditionnel du Sud-Ouest.

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla* (512/515) (243/198 - -/-)

1997 Marne -Passavant-en-Argonne, ad., 19 octobre (D. Lecompte, E. Le Roy) et non C. Riols (V. *Ornithos* 7-4 : 151).

(Europe septentrionale et centrale, Islande, sud-ouest du Groenland). Donnée reçue tardivement. Rappelons que l'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 1998.

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (11/10) (9/8 - 1/1)

Tarn La Bastide Rouairoux, imm., 30 juin (S. Nicolle, P. Polette).

(De l'Espagne à la Chine). Juin est décidément le mois des rencontres avec ce vautour en dehors de son aire caussenarde de reproduction (dernières mentions : 3 en juin 1997 dans 3 départements différents, V. *Ornithos* 5-4 : 157).

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (16/16) (16/16 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la race *vulpinus*, appelée « Buse des steppes » ou « Buse de Russie » :

Ain - Péronnas, ad., 26 février (P. Crouzier).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). Cet individu était de forme rousse et donc beaucoup plus détectable.

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (11/10) (7/6 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Sambuc, ad., 21 avril (Y. Kayser).

1999 Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas Neuf, 2e hiver., vidéo, du 20 octobre au 2 mars 2000 (Y. Kayser, A. Le Nevé, J.-P. Paul, M. Zucca *et al.*) et non jusqu'au 19 février seulement (V. *Ornithos* 7-4 : 151).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Contrairement à l'immature de 2e hiver présent pendant tout l'hiver, celui-ci, un adulte, ne s'est pas attardé.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (325/349) (259/279 - 1/1)

Haute-Marne - Semilly, imm, 2 et 3 avril (B. Theveny).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Très « petite » année (la plus faible depuis la création du CHN) mais qui confirme la rareté de l'espèce chez nous en dehors de mouvements invasionnels.

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (34/33) (30/29 - 2/2)

Ain- Birieux, ad. possible, 30 avril (M. & F. Poumarat).

Pyrénées-Atlantiques - Tardets-Sorholus, juv., 6 septembre (S. Hommeau, R. Soret).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Après un « blanc » de 1981 à 1985, l'espèce est désormais observée quasiment tous les ans ; le millésime 2000 se situe dans la moyenne.

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (164/138) (115/85 - 10/7)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Basses-Méjanes, 1er hiver, 16 janvier (J.-P. Paul) ; Bardouine, ad., 3e année et juv. de forme « *fulvescens* » ensemble, 16 février (Y. Kayser) ; étang Redon et Amphise, ad., du 28 novembre au 11 mars 2001 (A. Flitti, Y. Kayser) ; Bardouine, imm., 4 décembre (Y. Kayser). Le Puy-Sainte-Réparade, 1er hiver, phot., du 12 au 28 décembre (F. Dhermain, A. Flitti, T. Perrier *et al.*).

Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, 1er hiver, vidéo, 15 février (M. Zucca), 2e hiver, 26 novembre (A. Guyot).

Meuse - Lisle-en-Barrois, juv., 15 et 16 novembre (D. Demange).

Haute-Saône - Francheville, 1er hiver, phot., 17 et 18 décembre (D. Michelat, F. Schmitt *et al.*).

3 & 4. Aigle criard *Aquila clanga*, 1er hiver, Le Puy-Ste-Réparade, Bouches-du-Rhône, décembre 2000 (A. Flitti-3, T. Perrier-4). *First-winter Spotted Eagle.*





Haute-Savoie - Le Hucel/Thollon-les-Mémises, imm., 13 mars (J.-P. Jordan *et al.*).
1999 Bouches-du-Rhône - Camargue : étang Redon, ad. du 14 novembre au 8 mars 2000 (C. Durand, Y. Kayser, N. Vincent-Martin *et al.*) et non jusqu'au 23 février seulement (V. *Ornithos* 7-4 : 152).
1998 Alpes-Maritimes - La Turbie, juv., 25 octobre (M. Belaud).
1997 Moselle - Étang de Lindre/Tarquimpol, ad., du 14 novembre au 12 février 1998 (R. Lécaille).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Remarquable est cette observation de trois oiseaux ensemble en Camargue le 16 février. Avec les deux hivernants de 1999/2000 déjà signalés (V. *Ornithos* 7-4 : 152), la réserve de Saint-Martin-de-Seignanx a accueilli en fait trois oiseaux différents en cette fin d'hiver 2000 (un 1er hiver, un 2e hiver et un adulte).

FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (70/97) (46/67 - 4/4)

Hors Crau :

Aude - Leucate, fem., 10 avril (P.J. Dubois), mâle, 11 avril (P.J. Dubois).
Corse-du-Sud - Cargèse, mâle imm., phot., 19 avril (Y. & D. Bas).
Gard - Pujaut, mâle ad., 9 et 10 mai (A. Pataud).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). En Crau, l'année 2000 enregistre une forte progression avec 60 couples (39 en 1999) qui ont permis l'envol de 98 jeunes (38 autres jeunes ont été tués par un prédateur). À noter que 33 % des oiseaux nicheurs étaient des immatures et qu'un couple a niché en bergerie pour la première fois depuis les années 1980 (L. Brun & P. Pilard *fide* Y. Tariel). Année parfaitement classique pour le reste des observations.

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonorae* (316/414) (277/368 - 5/8)

En dehors du littoral méditerranéen :

Ardèche - Saint-Vincent-de-Barrès, ad., forme sombre, 8 août (D. Genoud).
Haute-Loire - Desges, 1er été, forme sombre, 8 août (R. Riols).
Lozère - Saint-Roman-de-Tousque, 4 ad., 17 juin (F. Legendre).
Tarn - La Souque, imm., 16 juin (S. Nicolle) ; Gijounet, forme claire, 22 juin (A. Calvet).
1998 Pyrénées-Atlantiques - Ahusquy, forme claire, 9 mai (M. Duquet, J.-Y. Frémont, A. Larousse).
1994 Lozère - Florac, forme claire, 6 septembre (D. Genoud).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Hormis la Haute-Loire qui n'avait jamais été fréquentée par l'espèce, les autres départements sont plutôt classiques (sauf peut-être les Pyrénées-Atlantiques) et le millésime 2000 est une bonne année depuis que l'espèce n'est plus soumise à homologation sur le pourtour méditerranéen. Encore une donnée pour la Lozère, la septième, avec un groupe de quatre oiseaux.

FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (34/34) (27/27 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Amphise, juv., 11 décembre (Y. Kayser) ; Crau : Peau-de-Meau, ad., 15 décembre (Y. Kayser).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). L'adulte de Crau était de la race *feldeggi*, peut-être originaire de la proche Italie...

FAUCON GERFAUT *Falco rusticolus* (15/16) (0/0 - 2/1)

Finistère - Ouessant : Le Stiff, imm., forme claire, phot., du 27 décembre au 11 avril 2001 (A. Guyot, N. Issa, J.-P. Paul, M. Zucca *et al.*) ; Île de Béniguet/Le Conquet, le même oiseau, 30 janvier 2001 (M. Claise, J.-P. Lafond).

(Circumboréal). Affluence d'ornithologues sans précédent à cette période de l'année sur l'île d'Ouessant occasionnée par un événement exceptionnel : la présence d'un Faucon gerfaut de forme blanche qui a séjourné sur l'île pendant trois mois et demi. Rappelons que l'espèce n'avait pas été observée en France depuis 1979 ! Il existe au total onze mentions pour le XXe siècle dans notre pays et au moins trois pour le XIXe siècle. À noter que l'arrivée, également exceptionnelle, courant décembre d'une Oie rieuse du Groenland *Anser albifrons flavirostris* dans le département du Finistère, n'est peut-être pas sans rapport avec la présence de ce Gerfaut à Ouessant...



5. Faucon gerfaut *Falco rusticolus*, immature de forme claire, Ouessant, Finistère, février 2001 (J.-P. Paul).
Pale morph immature Gyrfalcon.





6 & 7. Marouette de Baillon *Porzana pusilla*, juvénile, Genêts, Manche, septembre 2000 (S. Provost). *Juvenile Baillon's Crake.*

MAROUETTE POUSSIN *Porzana parva* (210/249) (163/191 - 12/13)

Ain - Étangs de Crassy/Divonne-les-Bains, mâle, 24 avril (B. Piot) ; Birieux, mâle chanteur, du 27 mai au 1er juin (P. & J.-B. Crouzier), fem. ad., 8 juillet (G. Bruneau) ; Villars-les-Dombes, fem. ad., 13 août (P. Crouzier).
Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, mâle ad., 14 mars (M. Boët).
Bouches-du-Rhône - Polous/Saint-Chamas, fem. ad., du 11 au 17 mars (E. Franc, T. Ripoll) ; Saint-Chamas, fem. ad., du 18 au 24 mars (B. Kabouche, M. Lasceve, T. Louvel), mâle ad., du 20 au 24 mars (E. Franc) ; Le Puy-Sainte-Réparade, 2 mâles, 8 avril (G. & E. Durand).
Haute-Corse - Barcaggio, 2 fem., phot., 1er et 2 mai (Y. Kolbeinsson).
Oise - Vauciennes, juv., du 20 au 22 août (F. Bouchinet, M. & P. Sengez *et al.*).
Pas-de-Calais - Saint-Omer, fem. ad., 17 mars (P. Provost).
1999 Bouches-du-Rhône - Le Puy-Sainte-Réparade, fem., du 31 mars au 3 avril (G. & E. Durand).
1999 Isère - La Buisse, fem. ad., 1er avril (G. Bruneau).
1999 Pyrénées-Orientales - Canet-en-Roussillon, fem. ad., 15 avril (P. Cabard).
1996 Haute-Savoie - Publier, mâle, 14 avril (J.-P. & G. Jordan).

(Europe, Asie centrale). Année honorable, mais la plus faible depuis 1995, le cru 1999 ayant pour l'instant établi un record avec 23 mentions pour 28 individus. À noter que le mâle chanteur de Dombes a brusquement interrompu ses manifestations vocales après que des marques de passage conduisant à son territoire eurent été notées dans la végétation... Quant à la donnée du Pas-de-Calais, elle est particulièrement précoce pour la région.

MAROUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (84/115) (41/44 - 1/1)

Manche - Genêts, juv., phot., 1er septembre (S. Provost).
1997 Finistère - Trunvel/Tréogat, juv., capturé, phot., 5 août (B. Bargain, S. Provost).

(Europe, Asie centrale, Japon). Une seule donnée, dans un département inhabituel, et pas de mention de printemps... Tout cela n'est pas brillant pour l'espèce !

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (63/109) (33/77 - 2/1)

Bouches-du-Rhône - Étang du Landre/Fos-sur-Mer, ad., 6 décembre (Y. Kayser).
Pyrénées-Orientales - Canet, entre 10 et 15 couples, reproduction, plusieurs familles (*fide* Y. Aleman).

(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). Nouvelle donnée dans un autre secteur de Camargue. La population de l'étang de Canet est stable, et les prospections des grandes roselières de Salses-le-Château, Pyrénées-Orientales, plus au nord n'ont rien révélé à ce jour.



8. Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*, juvénile, Ouessant, Finistère, septembre 1999 (D. Laloi). *Juvenile American Golden Plover.*



9 & 10. Pluvier fauve *Pluvialis fulva*, adulte nuptial, Groffliers, Pas-de-Calais, mai 2000 (D. Cohez). *Adult Pacific Golden Plover.*

GLARÉOLE À AILES NOIRES *Glareola nordmanni* (16/15) (12/10 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue, ad., du 12 mai au 1er septembre (Y. Kayser, N. Vincent-Martin, J.G. Walmsley *et al.*).

(Asie occidentale). Cet oiseau fréquentait une petite colonie de Glaréoles à collier et son appariement avec un individu de cette espèce a même été supposé à un moment...

GRAVELOT PÂTRE *Charadrius pecuarius* (0/0) (0/0 - 1/1)

Loire-Atlantique - Marais de Grée/Ancenis, ad., phot. et vidéo, du 26 mars au 4 avril (R. Balej, Y. Trévoux *et al.*).

(Égypte). Première française pour ce gravelot qui a attiré bon nombre d'observateurs. L'oiseau accompagnait une belle troupe de Petits Gravelots *C. dubius* fraîchement débarqués sur cette prairie humide à quelques encâblures des bords de Loire... L'espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la Commission de l'Avifaune Française (V. *Ornithos* 8-6 : 216-219).

GRAVELOT MONGOL *Charadrius mongolus* (3/3) (3/3 - 0/0)

1999 Seine-Maritime - Le Havre, 1er été., phot., du 29 août au 2 septembre (D. Laloi, P. Sabine *et al.*) et non ad. (V. *Ornithos* 7-4 : 154).

GRAVELOT MONGOL/DE LESCHENAULT *Charadrius mongolus/leschenaultii*

1999 Vendée - Les Sables-d'Olonne, ad., 28 octobre (O. Girard).

(De la Turquie jusqu'en Extrême-Orient). Cette donnée a été présentée comme Gravelot mongol, mais l'éventualité d'un Gravelot de Leschenault de la sous-espèce *columbinus* (originaire de Turquie et de Jordanie) ne peut être écartée.

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (22/23) (20/21 - 1/1)

Finistère - Ouessant : Yusin, juv., phot., du 6 au 20 octobre (A. de Broyer, P.-P. Evrard, D. Laloi)
1999 Finistère - Ouessant : Porz-Doun, juv., phot., du 19 au 24 septembre (D. Laloi, E. Roy).

(Amérique du Nord). Ouessant constitue une terre d'accueil pour ce pluvier quasiment annuel sur l'île ; rappelons à cet égard qu'en 1999 un autre oiseau avait stationné sur l'aérodrome du 16 au 21 octobre.

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva* (5/5) (5/5 - 3/3)

Finistère - Ouessant : marais du Créac'h et Pern, 23 septembre (D. Laloi *et al.*).
Meurthe-et-Moselle - Varangéville, ad., phot. et vidéo, du 19 au 25 juillet (J. François, H. Michel *et al.*).
Pas-de-Calais - Baie d'Authie/Groffliers, ad., phot., 22 et 23 mai (D. Cohez, G. Flohart).

(Sibérie, Alaska). Trois données la même année (dont deux oiseaux adultes en plumage nuptial), c'est vraiment un record au regard des cinq mentions enregistrées jusqu'à présent en France !

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (55/55) (47/47 - 8/7)

Bouches-du-Rhône - Camargue : La Chassagne, ad., du 27 février au 12 mars au moins (Y. Kayser, H. Kowalski *et al.*).
Manche - Beauvoir, ad., phot., 4 novembre (Y. Février, R. Jamault).
Meuse - Samogneux et Rouvrois-sur-Othain, ad., 13 et 14 mars (D. Bizet, D. Combrisson).
Oise - Romescamps, 1er hiver, du 24 au 26 novembre (H. de Lestanville, M. & P. Sengez).
Hautes-Pyrénées - Puydarrieux, juv., du 15 au 17 septembre (C. Bergès).
Somme - Estrées-Mons, 1er hiver, vidéo, du 1er au 18 novembre (P. Decory, H. Dufourny, M. Zucca *et al.*).
Haute-Vienne - Boisseuil, 26 février (A. Audevard).
1999 Meuse - Sivry-sur-Meuse, ad., 14 mars (M. Gaillard).
1999 Seine-et-Marne - Aérodrôme de Melun-Villaroche/Melun, ad., du 28 octobre au 1er novembre (E. Roy, F. & L. Veyrunes *et al.*) ; Les Bordes/Montereau-sur-le-Jard, juv., 1er et 3 novembre (F. Legendre, J. Savry).
1998 Moselle - Tarquimpol, juv., du 3 au 11 octobre (J. François, G. Joannès, F. Kubina) et non jusqu'au 10 octobre seulement (V. *Ornithos* 6-4 : 152).
1997 Meuse - Mouzay, du 16 février au 1er avril (J. Cesarini, G. Fortier, D. & E. Landragin) et non jusqu'au 21 mars seulement (V. *Ornithos* 5-4 : 161).
1997 Seine-et-Marne - Marolles-sur-Seine, juv., vidéo, du 20 au 29 septembre (M. Zucca *et al.*).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Avec sept oiseaux différents, l'année 2000 se situe au même niveau que l'année précédente, c'est-à-dire le plus élevé depuis 1981. À noter trois données supplémentaires pour la Seine-et-Marne qui a accueilli deux oiseaux différents en 1999... La mention des Hautes-Pyrénées est intéressante par sa localisation et sa précocité. Quant à l'oiseau de Haute-Vienne, il se trouvait dans un groupe de Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* en migration active vers le nord-est.

VANNEAU À QUEUE BLANCHE *Vanellus leucurus* (2/2) (1/1 - 1/1)

Somme - Fond-de-Grébault/Martainneville, ad., phot. et vidéo, 13 et 14 mai (L. Gavory, J.-L. Hercent *et al.*).

(Asie centrale). Comme l'oiseau précédent de 1996 en Seine-et-Marne, celui-ci n'est malheureusement resté que deux jours... et à proximité d'une autoroute ! L'année 2000 a connu un afflux particulier de l'espèce en Europe et les premiers cas de reproduction pour le continent européen (Botond Kiss *et al.* 2001). Un adulte a d'ailleurs séjourné du 9 au 19 août aux Pays-Bas, où l'espèce est devenue annuelle depuis 1998 (Van der Vliet *et al.* 2001).

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (11/11) (10/10 - 2/2)

Pas-de-Calais - Ardres, juv., 20 et 21 octobre (G. Flohart, C. Prangère, D. Rosair).
Vendée - Marais Montporteau/Les Sables-d'Olonne, du 5 au 9 avril (J. Chevallier, D. Desmots).

(Amérique du Nord). Les données de printemps sont plutôt rares, mais il est vrai que l'afflux de l'automne 1999, notamment en Grande-Bretagne, a pu laisser des traces...



11. Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 2000 (D. Laloi). *Juvenile American Golden Plover.*

BÉCASSEAU MINUSCULE *Calidris minutilla* (10/10) (5/5 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Piémanson, du 12 au 15 mai (Y. Kayser, N. Riddiford, J.G. Walmsley).

(Amérique du Nord). Également une donnée de printemps pour ce bécasseau néarctique, sans doute lui aussi arrivé en Europe à l'automne précédent.

BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (21/22) (17/18 - 3/3)

Charente-Maritime - Île de Ré : pointe du Martray/Ars-en-Ré, phot., 30 juillet (A. Chabrolle, M. Thibault) ; Île d'Oléron : pointe de Chassiron/Saint-Denis-d'Oléron, ad. probable, 9 septembre (P. Trotignon).
Finistère - Île de Sein, juv., 31 octobre (Y. Trévoux, P. Yésou *et al.*).

(Amérique du Nord). Les données de juillet sont rares, mais la plus précoce est celle d'un oiseau vu du 24 au 26 juillet 1997 à Marans, également en Charente-Maritime...

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (23/23) (19/19 - 1/1)

Finistère - Trunvel/Tréogat, juv., phot., du 21 au 23 septembre (G. Rault).
1999 Côtes-d'Armor - Enrochement du Légué/Saint Brieuc, juv., phot., du 12 au 17 octobre (Y. Bourgault, M. Plestan).

(Amérique du Nord). Une nouvelle donnée pour la baie d'Audierne... et le Finistère, terre d'asile par excellence pour ce bécasseau occasionnel (11 observations). La mention de 1999 est la première dans le département des Côtes-d'Armor.

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (252/284) (191/208 - 21/26)

Ain - Étang Turlet/Villars-les-Dombes, juv., phot., du 18 au 28 septembre (G. Bruneau, P. Crouzier).
Finistère - Penmach, phot., du 19 au 23 août (G. Rault, B. Trébern *et al.*) ; Le Conquet, juv., du 10 au 13 septembre, 2 juv. le 13 septembre (R. Couix) ; Trégueiller/Plounéour-Trez, juv., du 16 au 19 septembre (R. Couix, S. Mauvieux) ; étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, du 19 au 29 septembre (G. Rault) ; étang du Curnic/Guissény, 3 juv., phot., du 23 septembre au 2 octobre, un seul juv. le 3 octobre (M. Champion, J. Gernigon, S. Mauvieux) ; Île d'Ouessant : Le Kun, juv., phot., du 15 au 23 septembre (R. Baeta, D. Laloi, S. Mauvieux).
Indre-et-Loire - Lac de Rillé/Rillé, juv., phot., du 11 au 18 septembre (R. Baeta, P. Cabard, A. Fossé *et al.*).
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 7 et 8 mai (S. Reeber), juv., 18 septembre (S. Reeber).
Manche - Huisnes-sur-Mer, 2 ind. dont 1 juv., 10 septembre, 1 seul juv., phot., 11 et 12 septembre (S. & P. Provost) ; Réthoville, 3 juv., 18 septembre (A. & V. Verneau).
Meurthe-et-Moselle - Varangéville, juv., du 11 au 17 septembre (J. François).
Oise - Vauciennes, ad., 21 mai (F. Bouchinet), ad., 2 août (M. & P. Sengez) ; Houdancourt, ad., du 24 au 28 juillet (F. Bouchinet, M. & P. Sengez *et al.*).
Pas-de-Calais - Platier d'Oye et Les Escardines/Oye-Plage, du 25 au 30 avril (P. Della Valle, B. Gauquie) ; Ardres, ad., 5 et 6 août (G. Flohart, S. Petten).
Seine-Maritime - Marais du Hode/Le Havre, 1er été., 28 juin (O. Benoist, A.-L. Pfister).
Vendée - Olonne-sur-Mer, juv., 31 octobre (J. Gernigon).
1999 Côtes-d'Armor - Port du Légué/Saint-Brieuc, juv., phot., du 19 au 30 septembre (D. Moulin, M. Plestan, P. Yésou).
1999 Finistère - Étang de Kervardès/Plovan, ad., 29 juillet (A. Desnos) ; étang de Kermor/Île-Tudy, juv., 14 août (A. Desnos) ; étang de Nérizelec/Plovan, juv., 10 septembre (A. Desnos).
1996 Moselle - Étang de Lindre/Tarquimpol, juv., du 20 au 28 octobre (H. Michel *et al.*) et non jusqu'au 27 octobre seulement (V. *Ornithos* 4-4 : 151).
1995 Indre-et-Loire - Saint-Pierre-des-Corps, juv., 22 octobre (L. Le Gal).

(Amérique du Nord, Sibérie). Année record détrônant 1984 qui avait jusqu'à présent la palme en la matière avec 20 données pour 22 individus. Soulignons également que deux sites (l'un dans le Finistère et l'autre à la pointe nord-est du Cotentin) ont accueilli chacun un groupe de trois oiseaux. L'intérieur du pays n'a pas été en reste avec par exemple deux adultes différents dans l'Oise à la fin juillet et au début d'août ! Une arrivée d'oiseaux (sibériens ?) s'est d'ailleurs produite à cette époque et une autre, plus classique mais très marquée, autour du 18 septembre.

BÉCASSEAU À QUEUE POINTUE *Calidris acuminata* (2/2) (1/1 - 1/1)

Jura - Desnes, ad., phot., du 11 au 14 juillet (M. Giroud, D. Michelat *et al.*).
1999 Bouches-du-Rhône - Camargue : Fangassier, phot. et vidéo, du 10 au 27 avril (P. Geniez, Y. Kayser, D. Laloi, N. Vincent-Martin, M. Zucca *et al.*) et non jusqu'au 24 avril seulement (V. *Ornithos* 7-4 : 158).

(Nord-est de la Sibérie). Qui aurait pensé qu'après la deuxième donnée de l'espèce, intervenue 27 ans après la première, la troisième serait enregistrée dès l'année suivante ! Cet été 2000 a également produit un adulte le 16 août aux Pays-Bas, quatrième mention pour ce pays (Van der Vliet *et al.* 2001).

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (139/187) (105/137 - 6/7)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Piémanson, ad., 15 mai (Y. Kayser) ; Quenin et They de Sainte-Ursule, juv., du 21 au 26 août (Y. Kayser, J.-P. Paul) ; Cinq-Cents-Francs, ad., 23 août (Y. Kayser).
Oise - Vauciennes, 2 ad., phot., du 18 au 20 mai (M. & P. Sengez *et al.*).



12. Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*, juvénile, Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, octobre 1999 (M. Plestan). *Juvenile Baird's Sandpiper.*



13. Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*, juvénile, Trunvel, Finistère, septembre 2000 (G. Rault). *Juvenile Baird's Sandpiper.*



14. Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, juvénile, Ouessant, Finistère, septembre 2000 (D. Laloi). *Juvenile Pectoral Sandpiper.*



15. Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, juvénile, Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, septembre 1999 (M. Plestan). *Juvenile Pectoral Sandpiper.*

Pas-de-Calais - Les Hemmes-de-Marck, phot., du 26 au 29 août (C. Capelle, D. Chesterman).
Vendée - Le Fenouiller, 14 mai (G. Besseau).
1999 Bouches-du-Rhône - Camargue : They de Sainte-Ursule et Quarantaine, ad., du 30 juillet au 19 août (A. Pataud, J.-P. Paul, N. Vincent-Martin, J. Wilson *et al.*) et non à partir du 4 août seulement (V. *Ornithos* 7-4 : 158).

(Europe septentrionale). Année qui se situe dans la moyenne (environ 6 données pour un peu plus de 7 individus depuis 1981), mais les deux oiseaux qui ont séjourné en Picardie constituent un événement plus exceptionnel, comme d'ailleurs, à moindre titre, celui de Vendée, l'ouest de la France étant rarement visité par l'espèce...

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (127/158) (82/91 - 11/14)

Finistère - Pointe de la Torche/Plomeur, 2 juv., phot., du 18 au 23 septembre (G. Rault, E. Roy) ; Crumini/Plovan, 23 septembre (G. Rault, E. Roy) ; Île de Sein, juv., 24 septembre (M. Champion, F. Le Guen) ; Île d'Ouessant : Yusin, juv., 17 octobre (J.-P. Delapré).
Jura - Desnes, juv., phot., du 8 au 12 septembre (M. Giroud, R. Jordan, D. Michelat).
Manche - Huisnes-sur-Mer, juv., phot., 4 septembre (S. Provost), 4 juv., phot., 10 septembre (P. & S. Provost), juv., 24 septembre, mais 2 juv. le 29 septembre (P. & S. Provost).
Somme - Hâble-d'Ault, juv., phot., 1er octobre (D. Laloi).
Tarn - Bellesserre, juv., phot., du 30 septembre au 2 octobre (C. Aussaguel, H. Darmandieu, M. Malaterre, T. Pons).
1999 Pas-de-Calais - Oye-Plage, juv., du 17 au 19 septembre, 2 juv., 22 septembre (A. de Broyer, P.J. Dubois, G. Flohart, A. Perthuis), et non 1 seul juv. le 18 septembre (V. *Ornithos* 7-4 : 158).

(Amérique du Nord). Magnifique année pour ce bécasseau (14 oiseaux), très proche de 1975, année record avec 15 oiseaux ; depuis la prise en compte des données par le CHN, la moyenne est d'un peu plus de 5 individus par an. Il faut dire que la Manche enregistre à elle seule au moins 6 oiseaux différents. Les données du Jura et du Tarn sont intéressantes par leur localisation. Quant à l'oiseau de la Somme, il avait déjà fait de mauvaises rencontres sur le sol français, puisqu'il était sérieusement blessé...

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (254/301) (27/28 - 2/2)

Haute-Corse - Macinaggio, du 30 avril au 3 mai (P. Crouzier) ; Barcaggio, 1er mai (Y. Kolbeinsson).
1999 Ain - Étang Pollet/Chalamont, 26 septembre (G. Bruneau).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Les données de Corse sont devenues « classiques » à cette époque, celle de 1999 provient d'une région où l'espèce est connue historiquement.



16. Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*, juvénile, Bellesserre, Tarn, septembre 2000 (C. Aussaguel). *Juvenile Buff-breasted Sandpiper.*

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (24/25) (15/15 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas-Thibert, juv., du 19 au 21 octobre (G. Massez, P. Pilard).
Manche - Saint-Côme-du-Mont, juv., 1er octobre (A. & V. Verneau).
(Amérique du Nord). Il faut remonter à 1991 pour trouver, la même année, deux mentions de cette espèce qui se montre peu chez nous (moyenne depuis 1981 : moins d'une donnée et moins d'un individu par an). À noter les localisations diamétralement opposées de ces deux oiseaux d'octobre.

BÉCASSIN À BEC COURT/À LONG BEC *Limnodromus griseus/scolopaceus* (19/21) (10/11 - 1/1)

Nord - Le Clipon/Loon-Plage, ad. nuptial, 17 août (C. Gruwier).
(Amérique du Nord). Encore un oiseau vu en vol (dans de bonnes conditions) depuis la digue du Clipon ; le précédent avait été observé le 22 août 1998.

CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (28/28) (13/13 - 1/1)

Vendée - L'Île-d'Olonne, 27 avril (M. Fouquet).
(Amérique du Nord). Rappelons qu'un oiseau avait séjourné pendant une dizaine de jours, en octobre 1999, au même endroit. De là à penser que celui-ci puisse être le même, il n'y a qu'un pas...

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* (90/79) (64/54 - 5/2)

Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, 1er juin (M. & M. Boët).
Bouches-du-Rhône - Camargue : étang de Beauduc, du 4 au 10 février (O. Scher, N. Vincent-Martin) ; Fangassier, du 25 juillet au 3 septembre (E. Franc, Y. Kayser).
Loir-et-Cher - Vineuil, phot., du 20 au 22 mai (A. Larousse, A. Perthuis).
Pas-de-Calais - Les Hemmes-de-Marck, phot., 7 mai (C. & I. Capelle).
(Nord-est de l'Europe, Sibérie). Les oiseaux de Camargue n'ont pas été comptabilisés (il s'agit sans doute de « revenants », et l'âge de celui de fin d'été est incertain), de même que celui du Pas-de-Calais (un le 2 mai 1999 au même endroit). L'oiseau de la région Centre est plus qu'inhabituel à l'intérieur des terres.

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor* (63/66) (44/47 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : baisse des Cinq-Cents-Francs, ad. en pumage d'hiver, du 6 au 26 août (L. Chevallier, E. Durand, X. Hindermeyer, Y. Kayser).
Somme - Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, juv., 1er septembre (L. Frutig, N. Moduli).
(Amérique du Nord). La moyenne annuelle depuis 1981 est de 2,3 données pour un peu plus de 2 individus. Si la Camargue a déjà accueilli un certain nombre de Phalaropes de Wilson sur son sol, le Marquenterre n'avait pas été visité par l'espèce depuis l'été 1995.

LIMICOLES NÉARCTIQUES

Dix espèces totalisant 46 données pour 54 individus, c'est le bilan de l'année 2000, qui se hisse à la première place. Seul le nombre d'espèces reste inférieur au record de 1998 (12). Rappelons que la moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981 est d'environ 8 espèces pour 25 données et 27 individus. Il faut dire que les mentions records enregistrées par les Bécasseaux tacheté et rousset ont largement contribué à ces excellents résultats en 2000. Avec l'arrivée tardive de quelques nouvelles mentions, 1999 compte désormais 10 espèces pour 41 données et 43 individus.

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (287/821) (231/737 - 16/29)

Bouches-du-Rhône - Camargue : baisse de Quenin, 2e été, 17 août (Y. Kayser).
Finistère - Île d'Ouessant : Créac'h, juv., 1er novembre (D. Laloi, J.-P. Siblet).
Haute-Loire - Lissac, juv., trouvé épuisé, mort par la suite, phot., 13 septembre (A. Giraud).
Nord - Digue du Clipon/Loon-Plage, juv., 16 août (C. Gruwier), 3 juv., 22 août (B. Portier), 3 juv., 23 août (B. Portier, N. Selosse), juv., 26 août (J.A. Leclercq), 2 juv., 2 septembre (C. Gruwier), 7 juv. et 1 ad., 3 septembre (C. Gruwier, N. Selosse), juv., 4 septembre (C. Gruwier), 2 juv., 26 octobre (C. Gruwier).
Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, juv., 16 septembre (G. Flohart) ; Fort Mahon/Blériot, juv., 29 octobre (P.J. Dubois), juv., 31 octobre (P.J. Dubois) ; Haringzelle, juv., 31 octobre (G. Flohart), juv., 4 novembre (G. Flohart).
1999 Manche - Phare de Gatteville/Gatteville-le-Phare, 2 juv., 4 octobre (A & V. Verneau).
1999 Pas-de-Calais - Biache-Saint-Vaast, juv., trouvé épuisé, mort par la suite, 30 septembre (S. Flechel).
1996 Meurthe-et-Moselle - Vigneulles, juv., recueilli, phot., 14 et 15 septembre, remis en forme et relâché à la digue du Clipon/Loon-Plage (Nord) le 3 octobre (J.-P. Harly, H. Michel), et non 21 et 22 septembre (V. *Ornithos* 4-4 : 153).
(Circumboréal). Année plutôt modeste mais le passage de cette espèce près de nos côtes est très lié aux conditions météorologiques régnant en mer du Nord.



17. Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, 3e hiver, Saint-Renan, Finistère, février 2000 (F. Barrault).
Third-winter Ring-billed Gull.

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (21/21) (16/16 - 1/1)

Vendée - Pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., 29 août (A. Thomas, P. Trotignon).

(Amérique du Nord). Nouvelle donnée pour la Vendée qui voit passer l'espèce chaque année depuis 1998. Il faut dire que les reposoirs de la pointe d'Arçay sont très attractifs.

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (13/13) (12/12 - 1/1)

Vendée - L'Île d'Olonne, 1er hiver, phot., du 30 mars au 22 avril (M. Fouquet, O. Penard).

(Amérique du Nord). Bien que le séjour de cette mouette fût assez long, il n'a cependant pas permis à tous les observateurs passés sur le site de voir l'oiseau, car celui-ci ne fréquentait ce marais que par intermittence.

MOUETTE DE BONAPARTE *Larus philadelphia* (4/4) (3/3 - 3/2)

Charente-Maritime - Île de Ré : Les Portes-en-Ré, 1er été, phot., vidéo, du 19 mai au 21 juin (M. Thibault *et al.*) ; Saint-Clément-des-Baleines, le même oiseau, du 21 juillet au 21 août (M. Thibault, M. Zucca *et al.*).
Loire-Atlantique - Saint-Brévin-les-Pins, ad., 21 et 22 juillet (F. Lepage, D. Tavenon).

(Amérique du Nord). Deux oiseaux la même année, alors qu'il n'existait que quatre mentions françaises, voilà qui est remarquable ! Grâce au séjour prolongé de l'oiseau rétais, de nombreux observateurs ont pu se familiariser avec cette espèce.

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (14/22) (11/19 - 3/11)

En dehors du littoral méditerranéen :
Creuse - Étang des Landes/Lussat, 2 ad., 27 avril (A. Audevard, C. Mercier).
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Lumine-de-Coutais, 1re année, 8 avril (S. Reeber).
Haute-Savoie - Embouchure de la Dranse/Publier, 8 ad., phot., 14 avril (R. Jordan).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). Même si un mouvement vers le nord, transitant occasionnellement par le Léman, est connu au printemps, huit adultes nuptiaux ensemble constituent tout de même une donnée remarquable. La donnée de Creuse montre que l'espèce passe aussi à cette époque non loin de la côte atlantique.

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (99/122) (99/122 - 4/4)

En dehors de la Corse :
Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin-de-Giraud, 2e été, 27 avril (A. Renaudier) ; baisse de Cinq-Cents-Francs, 1er été, 8 mai (G. Bruneau, F. Le Gouis, A. Renaudier) ; baisse de Quenin, ad., 12 août (F. & L. Veyrunes).
Gironde - Cap Ferret/Lège-Cap-Ferret, juv., 8 octobre (B. Delprat, J.-Y. Kernel, O. Le Gall).

(Circum-méditerranéen). Comme en 1999, quatre données pour 2000, c'est toujours aussi peu, même si l'observation d'un juvénile sur la côte atlantique donne un peu d'éclat à ce millésime.



18. Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, 1er hiver, Pont-l'Abbé, Finistère, avril 2001 (G. Rault). *First-winter Ring-billed Gull.*

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (214/139) (213/138 - 15/6)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).

Charente-Maritime - Cabane de Moins/Breuil-Magné, ad., du 3 février au 5 mars (P. Trotignon) ; Île d'Oléron : La Baudissière/Dolus-d'Oléron, ad., du 3 septembre au 17 mars 2001 (P. Trotignon).
Finistère - Trezmalaouen/Kerlaz, ad., phot., du 22 janvier au 17 février (G. Rault) ; Saint-Renan, 3e hiver, phot., du 15 février au 15 mars (F. Barrault, A. Le Nevé), ad. (le même), phot., du 30 novembre au 23 mars 2001 (F. Barrault, M. Champion), 1er hiver*, phot., du 10 décembre au 28 mars 2001 (F. Barrault, M. Champion) ; Pont-l'Abbé, 1er hiver*, phot., du 4 décembre au 13 avril 2001 (G. Rault *et al.*).
Gironde - Arcachon, 1er hiver*, 1er janvier (Y. Kayser), ad., 24 décembre (B. Lamothe).
Landes - Lac d'Hossegor, ad., 2 février (B. Lamothe).
Manche - Moidrey, 2e hiver*, phot., 14 et 20 mars (T. de Cornulier, S. Provost), 2 ind. de 2e hiver (1*), phot., 26 mars (S. Provost).
Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., du 1er au 25 septembre au moins (Y. Brouillard, A. Gentric).
Pas-de-Calais - Le Clipon/Loon-Plage, 1er hiver*, 26 octobre (C. Gruwier).
Vendée - Pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., du 29 août au 27 septembre au moins (A. Larousse, A. Thomas, P. Trotignon).
1999 Finistère - Telgruc-sur-Mer, ad.*, 24 février (S. Mauvieux) ; Roscoff, ad.*, 23 décembre (S. Mauvieux).
1999 Seine-et-Marne - Trilbardou, ad.*, 7 mars (P. Persuy).

(Amérique du Nord). Un certain nombre de données ne sont apparemment pas encore parvenues au CHN pour l'année 2000. Même si l'espèce est en expansion en Amérique du Nord, ce qui est corroboré par l'accroissement des données en Europe de l'Ouest, le Goéland à bec cerclé n'est pas toujours correctement identifié, notamment par des observateurs non rompus aux multiples problèmes de mue que posent les laridés. Il semblerait qu'une banalisation infondée des observations de ce goéland soit en train d'en résulter !

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (117/117) (109/108 - 9/9)

Côtes-d'Armor - Callac, 1er hiver, 14 février (S. Guérin) ; Plestin-les-Grèves, 1er hiver, 20 mars (S. Guérin).
Finistère - Plage du Ris/Douarnenez, 1er hiver, 15 mars (G. Rault) ; Trunvel/Tréogat, 1er hiver, phot., du 28 janvier au 12 mars (Y. Le Corre, G. Rault *et al.*).
Landes - Lac d'Hossegor, 1er hiver, du 22 janvier au 2 février (G. Blake, A. Guyot, B. Lamothe) ; Courant d'Huchet/Moliets, 1er hiver, du 6 au 20 février (G. Blake, A. Guyot).
Nord - La Neuville-Thumeries, 1er hiver/1er été, phot., du 24 au 29 avril (P. Camberlein, C. Capelle, C. Lebrun).
Seine-et-Marne - Trilbardou et Jablines, 2e hiver, vidéo, du 4 au 19 mars (A. Larousse, B. Lebrun, P. Persuy, M. Zucca).
Vendée - Plage du Tanchet/Les Sables d'Olonne, 1er été, 17 février (M. Fouquet).
1999 Finistère - Plougonvelin, 1er hiver, 20 février (A. Le Nevé).
1998 Côtes-d'Armor - Saint-Brieuc et Morieux, 1er hiver, 23 février et 9 mars (M. Plestan).

(Arctique canadien, Groenland). Avec neuf oiseaux différents (quasiment tous en février-mars), l'année 2000 est un bon






19-22. Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*, 1er hiver, Trunvel, Finistère, janvier 2000 (J.-F. Paziault-19, Y. Le Corre-20, R. Baeta-21 & 22). *First-winter Iceland Gull possibly of race* kumlieni.

cru, puisqu'il faut remonter à 1988 pour trouver 11 mentions ! En ce qui concerne l'individu de 1er hiver de la baie d'Audierne photographié moult fois (V. photos 19 à 22) entre le 28 janvier et le 12 mars, il présente apparemment tous les caractères de la race *kumlieni* et il semble bien qu'il s'agisse d'un « Goéland de Kumlien ». Toutefois, après révision de nombreuses données de Goélands à ailes blanches, et compte tenu de l'évolution récente des connaissances en la matière, la position actuelle du CHN est de considérer que l'identification des oiseaux de première et seconde années calendaires ne paraît, pour l'instant, pas suffisamment fiable pour autoriser une homologation.

MOUETTE DE ROSS *Rhodostethia rosea* (2/2) (1/1 - 1/1)

Nord - Le Clipon/Loon-Plage, ad. en plumage d'hiver, 26 octobre (C. Gruwier, K. Verbanck).

(Circum-arctique. Hiverne dans l'océan glacial Arctique). Troisième donnée française, et deuxième depuis la création du CHN en 1981 ! Huit observateurs chanceux étaient présents pour remarquer cette mouette en vol à l'arrière d'un groupe de Mouettes pygmées *Larus minutus*...



23. Sterne bridée *Sterna anaethetus*, adulte, Fouesnant, Finistère, juillet 2000 (C. Le Roux). *Adult Bridled Tern.*



24. Tourterelle orientale *Streptopelia orientalis*, Hoëdic, Morbihan, octobre 2000 (G. Rault). *Rufous Turtle Dove.*

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (22/30) (15/15 - 1/0)

Gironde - Banc d'Arguin/Arcachon, ad., phot., du 15 mai au 4 août (J.-J. Boubert, J. Gernigon, C. Lenoc).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Comme en 1999, cette sterne couvait dans la colonie de Sternes caugeks *Sterna sandvicensis* et a élevé un jeune hybride.

STERNE « À BEC ORANGE » *Sterna maxima/bengalensis/elegans*

Vendée - Pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., 13 août (A. Thomas).

Il s'agit probablement d'une Sterne élégante *Sterna elegans*, mais un léger doute subsiste.

STERNE BRIDÉE *Sterna anaethetus* (6/6) (6/6 - 1/1)

Finistère - Île aux Moutons/Fouesnant, ad., phot., du 27 au 31 juillet (C. & E. Le Roux).

(Des Caraïbes à l'Afrique de l'Ouest, Australie). Cette individu a fréquenté la colonie de Sternes pierregarins *Sterna hirundo* de l'île aux Moutons en fin de nidification. L'espèce demeure fort rare en France, puisque la moyenne depuis 1981 est d'un individu tous les trois ans.

GUILLEMOT À MIROIR *Cepphus grylle* (39/49) (18/22 - 2/2)

Finistère - Île d'Ouessant : Créac'h, 2 novembre (B. Bougeard, D. Laloi, J.-P. Siblet).
Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, ad., 16 septembre (G. Flohart, L. Gavory).

(Arctique, Atlantique Nord). Ces deux mentions sont plutôt classiques (secteurs, dates), mais curieusement aucune donnée n'a été enregistrée en 1999.

TOURTERELLE ORIENTALE *Streptopelia orientalis* (3/3) (3/3 - 1/1)

Morbihan - Île d'Hoëdic, 1er hiver probable, phot., 21 octobre (G. Rault).

(Asie centrale et Extrême-Orient). Quatrième donnée française, mais pour celle-ci, la sous-espèce a pu être déterminée. Il s'agit de *meena*, la race la plus occidentale de la Tourterelle orientale, qui niche notamment en Asie centrale et au sud-ouest de la Sibérie. À noter que deux des trois autres observations sont de la mi-octobre...

HIRONDELLE À FRONT BLANC *Hirundo pyrrhonota* (0/0) (0/0 - 1/1)

Morbihan - Île d'Hoëdic, juv., phot., du 30 septembre au 1er octobre (S. Guérin, G. Rault).

(Amérique du Nord). Première mention française pour cette espèce attendue depuis longtemps... au regard des mentions britanniques de martinets et d'hirondelles en provenance d'outre-Atlantique. L'espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la Commission de l'Avifaune Française (V. *Ornithos* 8-6 : 216-219). Une note sur cette observation a été publiée récemment dans *Ornithos* (Guérin & Rault 2001).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*
(209/278) (164/211 - 9/17)

Bouches-du-Rhône - Crau : Peyre l'Estève, Mas Chauvet, Grand Mas/Entressen, juv., 7 octobre (J.-P. Paul), 5 ind. (3 ad. et 2 ind. de 1er hiver), phot./vidéo, du 9 décembre au 27 janvier 2001 (J. Gonin, J.-P. Paul, N. Vincent-Martin, M. Zucca *et al.*).
Finistère - Île de Sein, du 12 au 15 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, E. Gfeller).
Gard - Pujaut, 1er hiver, 3 décembre (A. Pataud).
Manche - Genêts, 3 ind. (dont 2 ind. de 1er hiver), 19 février (P. & S. Provost) ; Beauvoir, 2 ind., 9 avril (S. Provost), 1 ind., 12 novembre (S. Provost).
Seine-Maritime -Saint-Vigor-d'Ymonville, 2 ind., 19 et 20 décembre (P. Poiré, P. Provost).
Var - Fréjus, phot., du 9 au 16 janvier (C. Bury).
1999 Finistère - Île d'Ouessant : Yusin, 1er mai (D. Cohez).
1992 Tarn-et-Garonne - Puygaillard-de-Quercy, du 5 décembre au 23 janvier 1993 (H. Redon).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). L'hivernage en Crau semble désormais régulier, et les polders de la baie du mont Saint-Michel voient à la fois des migrateurs et des hivernants réguliers. Un changement des mouvements de cette espèce sibérienne se dessine-t-il ? En fait, l'examen des données du début du XXe siècle (et même du XIXe siècle !) montre que le Pipit de Richard s'observait déjà en plein hiver à cette époque... L'oiseau de 1992 est celui qui a hiverné sur le site les deux hivers précédents (V. *Ornithos* 2-1 : 13) ; il n'a donc pas été comptabilisé.



25. Pipit de Richard *Anthus richardi*, Fréjus, Var, janvier 2000 (C. Bury). *Richard's Pipit.*

PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (6/6) (6/6 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Stang ar Stiff, 20 octobre (D. Desmots).

(Sibérie, Extrême-Orient). Septième donnée française et septième pour Ouessant, la dernière remontant à 1996, dans le même vallon et le... 21 octobre !

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (?/?) (277/473 - -/-)

1982 Ardennes - Challerance, 27 avril (J.-P. Briys).

(Eurasie arctique). L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 1991.

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (9/9) (9/9 - 1/1)

Var - Étang de Villepey/Fréjus, mâle ad., 23 avril (G. Pullino).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). Encore une donnée qui cadre bien avec les mentions printanières déjà enregistrées dans le Midi méditerranéen. Il existe, en outre, une observation problématique à Genêts (Manche) d'un oiseau de 1er hiver capturé le 10 septembre (P. & S. Provost). Cet individu, pour lequel nous disposons d'une quinzaine de photos (V. *Ornithos* 7-4 : 185), a fait l'objet d'une étude attentive et de discussions notamment par de nombreux spécialistes scandinaves et des pays de l'ex-URSS à l'occasion de la dernière conférence de l'AERC à Hel (Pologne) en septembre 2001. Il en ressort que si la Bergeronnette citrine ne peut être totalement exclue, certains caractères montrent qu'il pourrait s'agir plus probablement d'un oiseau hybride (P. Alström comm. pers.).

AGROBATE ROUX *Cercotrichas galactotes* (12/12) (7/7 - 0/0)

1988 Pyrénées-Orientales - Vinça, 23 et 24 juillet (J.-P. & G. Jordan).

(Eurasie méridionale, Afrique du Nord). Ce département a déjà enregistré deux données, un oiseau à Torreilles, le 25 mai 1977 et un autre à Port-Vendres, les 22 et 23 avril 1982... Quant à l'âge de celui de 1988 (jeune, adulte usé ?), il est plus sage de ne pas se prononcer (*contra* Jordan 2000).

ROSSIGNOL PROGNÉ *Luscinia luscinia* (3/3) (1/1 - 1/1)

Pas-de-Calais - Audinghen, du 27 août au 3 septembre (G. Flohart, T. Fournet).

(De la Scandinavie et l'Autriche jusqu'en Sibérie). La dernière mention française (la seule depuis la création du CHN) remonte à 1989, lorsqu'un oiseau fut trouvé blessé le 20 septembre à Joinville-le-Pont, Val-de-Marne.

TARIER PÂTRE *Saxicola torquata* (18/18) (14/14 - 1/1)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la race orientale *maura*, appelée couramment « Tarier (pâtre) oriental » :

Corrèze - Étang du Diable/Saint-Merd-les-Oussines, 1er hiver, 28 septembre (A. Audevard).

(Mer Blanche, Sibérie). La Corrèze n'est pas un département dont il est souvent fait mention dans les rapports du CHN, mais la pression ornithologique sur les passereaux à l'automne peut, la preuve, montrer qu'il s'y passe aussi des choses ! Le Tarier (pâtre) oriental reste un oiseau fort rare en France (en moyenne moins d'une donnée et d'un individu par an depuis 1981) et les identifications de cette sous-espèce (ou espèce ?) au printemps sont souvent éronnées, notamment à cause des variations de plumage présentées par les mâles à cette époque.

TRAQUET ISABELLE *Oenanthe isabellina* (10/11) (9/10 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Crau : Grand Mas, 27 décembre (D. Laloi *et al.*).

(De la Grèce et la Roumanie à la Sibérie et la Mongolie). La dernière mention de ce traquet a été enregistrée non loin de là, les 19 et 20 avril 1999 à Port-Saint-Louis-du-Rhône...

TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (20/21) (19/19 - 1/1)

Bouches-du-Rhône – Crau : Entressen, fem. probable, 20 avril (anonyme *fide* R. Crofton).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). La majorité des observations françaises sont de Camargue et de Crau, mais pas au printemps.

GRIVE À DOS OLIVE *Catharus ustulatus* (3/3) (1/1 - 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Arland/Park Raden, phot., du 12 au 14 octobre (A. de Broyer, A. Joris).

(Amérique du Nord). La précédente donnée provenait également d'Ouessant, du 16 au 18 octobre 1995.

GRIVE DE NAUMANN *Turdus naumanni* (15/15) (6/6 - 0/0)

1999 Morbihan - Crac'h, intermédiaire entre les sous-espèces *naumanni* et *eunomus*, 27 octobre (L. Le Gal).

(Sibérie). Les grives sibériennes sont toujours aussi rares et s'observent toujours très peu de temps...

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (17/17) (17/17 - 2/2)

Finistère - Île d'Ouessant : Ty Crenn, 1er hiver, 16 octobre (H. Dufourny) ; Île de Sein, ad., phot., du 19 au 22 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, Y. Kayser, A. Larousse *et al.*).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Deux oiseaux à la même date sur ces deux îles bretonnes... L'espèce est désormais régulière depuis 1993 avec souvent deux, voire trois individus par an.



26. Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola*, île de Sein, Finistère, octobre 2000 (M. Duquet). *Paddyfield Warbler.*

ROUSSEROLLE DES BUISSONS *Acrocephalus dumetorum* (2/2) (2/2 - 4/4)

Finistère - Île de Sein : 1er hiver, 15 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, E. Gfeller) ; Île d'Ouessant : Poull Brac, juv., phot., du 9 au 13 novembre (F. Duruz, D. Laloi).
Pas-de-Calais - Audinghen, juv., phot., du 22 au 27 octobre (G. Flohart, M. & P. Sengez).
Vendée - Phare de l'Armandèche/Les Sables d'Olonne, ad., 14 novembre (A. Barzic, D. Desmots).

(Nord-est de l'Europe, Sibérie, Asie centrale). Année exceptionnelle pour cette espèce qui multiplie par trois le nombre de données existant en France ! À noter que l'île de Sein enregistre sa deuxième observation, la précédente étant du 23 octobre 1994. Indépendamment des conditions météorologiques qui sont souvent évoquées dans ces cas-là, il faut savoir que la saison 2000 a été exceptionnelle en Finlande pour la reproduction de certaines espèces au rang desquelles figure la Rousserolle des buissons (R. Jordan *in litt.*).

HYPOLAÏS PÂLE *Hippolais pallida* (3/3) (1/1 - 1/1)

Aude - Leucate, 14 mai (F. Garcia).

(De l'Afrique du Nord à l'Afghanistan). La dernière donnée date du 13 avril 1990 dans l'Hérault, les deux plus anciennes sont du Gard (mai 1960) et de Camargue (septembre 1961). Ici, la sous-espèce n'a pas été identifiée avec certitude.

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (44/45) (17/17 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Le Kun, 1er hiver, du 18 au 26 octobre (P. Crouzier *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Cette fauvette qui peut se montrer très discrète est sans doute plus régulière que ne le laissent apparaître les quelques données automnales sporadiques...

POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (15/15) (13/13 - 3/3)

Finistère - Ouessant : Ty Crenn, 8 octobre (A. de Broyer, X. Vandevyvre) ; Stang ar C'hlann, du 15 au 17 octobre (D. Desmots).
Morbihan - Île d'Hoëdic, 16 octobre (G. Rault).

(De la Baltique à la Sibérie orientale). Bonne année pour ce pouillot d'observation irrégulière. Sur Ouessant, l'oiseau de Ty Crenn pourrait éventuellement être le même que celui trouvé non loin de là quelques jours plus tard (?).

POUILLOT BORÉAL *Phylloscopus borealis* (8/8) (8/8 - 1/1)

Finistère - Ouessant : réservoir aval, phot., 8 octobre (A. Joris).
1995 Charente-Maritime - Île d'Oléron : Saint-Denis d'Oléron, 25 novembre (P. Trotignon).

(De la Scandinavie au Japon et à l'Alaska). Ouessant a accueilli le même jour un Pouillot boréal et un Pouillot verdâtre *Phylloscopus trochiloides*... La donnée charentaise de 1995 est très tardive par rapport aux autres qui s'échelonnent du 30 août au 27 octobre, mais nous sommes là bien au sud des îles du Ponant.

27 & 28. Pouillot boréal *Phylloscopus borealis*, Ouessant, Finistère, octobre 2000 (A. Joris). *Arctic Warbler.*







29. Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis*, Arles, Bouches-du-Rhône, septembre 2000 (A. Flitti). *Eastern Bonelli's Warbler.*

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (45/48) (43/46 - 2/2)

Finistère - Ouessant : Le Kun, phot., du 23 au 25 octobre (P. Crouzier, J.-F. Darras) ; Stang ar Stiff, 25 octobre (M. Zucca). **1999 Pas-de-Calais** - Framzelle/Audinghen, 26 octobre (G.A. Nurse).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Après six années d'euphorie (de 4 à 9 oiseaux par an depuis 1994), retour en 2000 (avec deux données) à quelque chose de plus conforme à la moyenne annuelle.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (603/641) (586/624 - 34/36)

Bouches-du-Rhône - Étang du Réaltor/Calas, du 15 au 18 octobre (A. Flitti, T. Perrier).
Charente-Maritime - Île de Ré : Trousse-Chemise/Les Portes-en-Ré, 8 novembre (M. Thibault).
Finistère - Île d'Ouessant : Arland, 19 septembre (Y. Guermeur), 3 et 4 octobre (Y. Guermeur), 12 octobre (F. Vanhove), du 18 au 26 octobre (E. Didner, M. & P. Sengez), 2 ind., 13 novembre, 1 seul, 16 novembre (Y. Guermeur) ; Pount Salaün, phot., 20 et 21 septembre (N. Issa, D. Laloi), 12 octobre (Y. Guermeur) ; Ker al Loj, 22 septembre (D. Laloi) ; Poull Bojer, 4 et 5 octobre (Y. Guermeur) ; Rufilit, 4 et 5 octobre (Y. Guermeur), phot., du 23 au 25 octobre (J.-F. Darras) ; Stang Korz, 5 octobre (F. Duruz), 2 ind., 10 octobre (E. Didner), du 20 octobre au 7 novembre (J. Gernigon, J. Gonin, D. Laloi) ; Penn Arland, 5 octobre (Y. Guermeur) ; Kernigou, 5 octobre (Y. Guermeur), 15 octobre (C. Sinz) ; Ty Crenn, du 8 au 12 octobre (L. Spanneut) ; Poull Brac, 10 octobre (D. Cohez) ; Stang ar Stiff, 12 et 13 octobre (Y. Guermeur) ; Ker Yegu, 13 octobre (D. Desmots) ; Kerbrat, 13 octobre (Y. Guermeur) ; Lampaul, 15 et 16 octobre (J. Maout) ; Lann Vras, 17 et 18 octobre (C. Sinz) ; Rulan, 19 octobre (B. Helsens) ; Ar Reun, du 25 au 27 octobre (S. Reeber) ; Park Raden, 1er novembre (J.-F. Mandelbaum, M. Zucca) ; Stang Meur, phot., du 4 au 13 novembre (B. Angin, F. Duruz, D. Laloi).
Morbihan - Île d'Hoëdic, 21 et 22 octobre (G. Rault), autre ind., 22 octobre (G. Rault), du 23 au 25 octobre (Y. Kayser, A. Larousse *et al.*).
Vendée - Mare des Agaures/Les Sables d'Olonne, 24 octobre (M. Bibard).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Année classique (moyenne annuelle depuis 1981 : 31 données pour 33 individus), tant du point de vue du nombre d'oiseaux que de celui des secteurs fréquentés ; la donnée des Bouches-du-Rhône est toutefois moins habituelle.

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (23/24) 23/24 - 2/2)

Pas-de-Calais - Cran Poulet/Audinghen, du 14 au 19 octobre (G. Flohart, T. Fournet *et al.*).
Charente-Maritime - Île de Ré : Les Portes-en-Ré, 9 novembre (S. Maison-Haute, M. Thibault).

(Asie centrale et septentrionale). Après le record de 1999, retour à des chiffres plus « raisonnables »... Encore un Pouillot brun dans le Pas-de-Calais, aux mêmes dates que l'an passé. La donnée de la réserve de Lilleau-des-Niges sur Ré est plus tardive, comme le Pouillot boréal *Phylloscopus borealis* de 1995 sur une île voisine du même département.

POUILLOT ORIENTAL *Phylloscopus orientalis* (0/0) (0/0 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Mas de l'Ilon/Arles, juv., capturé, phot., 16 septembre (R. Crofton, S. Durand, A. Flitti, P. Harris *et al.*).

(De l'Albanie à l'est de la Turquie, surtout en Grèce). Première mention française de cette espèce autrefois sous-espèce du Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (Helbig *et al.* 1995). Il existe quelques mentions ailleurs en Europe de l'Ouest : Grande-Bretagne, Pays-Bas. La Commission de l'Avifaune Française a inscrit ce pouillot en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France (V. *Ornithos* 8-6 : 216-219).

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

Pouillots véloces de type sibérien (161/190) (120/127 - 3/3) :

Finistère - Île d'Ouessant : Ar Reun, 10 novembre (D. Laloi).
Hérault - Villeneuve-lès-Maguelone, phot., 18 et 19 novembre (P. Poiré, P. Provost).
Nord - Fourmies, 28 janvier (A. & J. Piette).

(Sibérie). Très petite année. Les deux données de novembre s'inscrivent parfaitement dans le pattern d'apparition de ce type d'oiseau en France ; l'oiseau du Nord est en revanche beaucoup plus inhabituel à cette époque.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (260/277) (206/215 - 17/17)

Charente-Maritime - Île de Ré : forêt du Lizay/Saint-Clément-des-Baleines, 11 novembre (S. Maison-Haute, S. Ridé, M. Thibault).
Finistère - Île d'Ouessant : Niou Uhella, 4 octobre (Y. Guermeur) ; Arland, du 7 au 9 octobre (D. Cohez) ; Poull Brac, du 9 au 13 octobre (D. Cohez) ; Ti Cren/Prad Meur, 1er hiver, phot., du 14 au 16 octobre (J.-P. Delapré, M. & P. Sengez) ; Stang ar Stiff, 14 et 15 octobre (A. de Broyer) , Pount ar Rodez, 1er hiver, 15 octobre (D. Desmots) ; Porz Noan, 16 octobre (P.-P. Évrard, P. Rouillier) ; Park Raden/Ar Reun, 1er hiver, du 19 au 25 octobre (P. Crouzier) ; Stang Korz, 1er hiver, 20 et 21 octobre (P. Crouzier, J. Gonin), 1er hiver, vidéo, du 26 au 31 octobre (P. Crouzier, M. Zucca). Île de Sein, 1er hiver, 16 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, Y. Kayser, A. Larousse).
Morbihan – Île d'Hoëdic, 1er hiver, phot., 22 octobre (G. Rault) , 1er hiver, phot., 24 octobre (Y. Kayser, G. Rault), mâle, phot., 25 et 26 octobre (S. Guérin, G. Sabatier).
Nord – Leffrinckoucke, 1er hiver, 1er octobre (C. Capelle).
Haute-Savoie – Delta de la Dranse/Publier, 1er hiver, 22 octobre (G. Bruneau, A. Renaudier).
1999 Finistère – Île de Sein, 24 octobre (H. Davière, E. Lapous).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Avec 17 oiseaux, 2000 est plutôt une bonne année (la moyenne annuelle depuis 1981 est de 11 données pour près de 12 individus). On notera deux arrivées, l'une aux environs du 15 octobre et l'autre vers le 22 octobre. L'oiseau plus tardif de l'île de Ré confirme le décalage des oiseaux vus à cette latitude (*cf.* Pouillots boréal *Phylloscopus borealis* et brun *P. fuscatus*) par rapport au Nord-Pas-de-Calais et aux îles bretonnes. La donnée de Sein pour 1999 porte à cinq (peut-être six) le nombre d'oiseaux ayant fréquenté l'île entre le 11 et le 24 octobre (V. *Ornithos* 7-4 : 168).

MÉSANGE DE PLESKE *Parus caeruleus x Parus cyanus* (0/0) (0/0 - 1/1)

Var - Étang de Macany/Hyères, capturé, phot., du 18 décembre au 10 janvier 2001 (P. Orsini, J.-G. Robillard, V. Rufray).

(Zone de contact entre la Mésange bleue et la Mésange azurée : aux alentours de l'Oural et de la Biélorussie). C'est une première en France pour cet hybride entre une Mésange azurée *P. cyanus* et une Mésange bleue *P. caeruleus*. Il existe une seule mention de Mésange azurée en France : un oiseau collecté dans l'Ain au cours de l'hiver 1907 ou 1908. Un article sur cette observation est parue dans *Ornithos* (Lascève *et al.* 2001).

ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (55/135) (52/132 - 1/0)

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuve de reproduction) :

Hérault - Vendémian, mâle, 18 avril et 5 mai (M. Duquet).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). Il s'agit sans doute de l'oiseau déjà signalé du 31 décembre 1999 au 13 janvier 2000 (V. *Ornithos* 7-4 : 168).

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (69/98) (47/55 - 8/8)

Charente-Maritime - Île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines, 1er hiver, 1er novembre (M. Thibault).
Finistère - Île d'Ouessant : Kéjou, juv., phot., du 18 au 23 septembre au moins (R. Baeta, D. Laloi) ; Yusin, juv., du 14 au 17 octobre (P.-P. Evrard, P. Rouillier) ; Île de Sein, juv., phot., du 8 au 13 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, S. Guérin *et al.*) ; Plougonvelin, juv., 8 octobre (R. Couix).
Gard - Montcalm/Aigues-Mortes, juv., 15 octobre (F. Veyrunes).
Hérault - Tartuguières/Montpellier, ad. nuptial, 28 mai (F. Prud'homme).
Somme - Hâble d'Ault, ad., 8 juin (D. Cohez).
1999 Finistère - Île d'Ouessant : Niou Izella et Porz Doun, imm., phot., du 2 au 4 mai (D. Cohez).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Très bonne année, puisque 2000 s'inscrit à la deuxième place après 1984 qui détient toujours le record (neuf oiseaux) depuis 1981. Mais 2000 est en revanche loin derrière 1960 qui a comptabilisé au moins 20 individus. Si les données printanières sont connues sur le littoral méditerranéen, l'adulte vu dans la Somme à cette époque est remarquable.

30 & 31. Gobemouche nain *Ficedula parva*, 1er hiver (30) et mâle (31), Hoëdic, Morbihan, octobre 2000 (G. Rault-30, S. Guérin-31). *First-winter (30) and male (31) Red-breasted Flycatcher.* ***32 à 35.*** Étourneau roselin *Sturnus roseus*, juvénile, Ouessant, Finistère, septembre 2000 (D. Laloi-32, R. Baeta-33), juvénile, Sein, Finistère, octobre 2000 (M. Duquet-34), 1er été, Ouessant, Finistère, mai 1999 (D. Cohez-35). *Juvenile (32, 33 & 34) and first-summer (35) Rosy Starling.*


30


31


32


33


34


35

MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (19/28) (14/22 - 2/3)

Corse-du-Sud - Bonifacio, mâle, 5 mai (P. Crouzier), 2 mâles, 3 août (A. Flitti).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Rien de nouveau sur cette espèce dont la recherche à Bonifacio parmi les hybrides avec le Moineau cisalpin *Passer domesticus italiae* reste le défi des observateurs fraîchement arrivés sur l'île de Beauté. Cela dit, l'observation de véritables Moineaux espagnols y est quand même toujours assez rare.

VIRÉO À ŒIL ROUGE *Vireo olivaceus* (6/6) (6/6 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Ty Crenn, du 8 au 10 octobre (A. de Broyer, L. Spanneut).
1998 Finistère - Île d'Ouessant : Prad Meur, 14 septembre (G. Bruneau).

(Amérique du Nord). Il n'y avait pas eu de mention depuis 1995, la donnée de 1998 parvenue tardivement au CHN comble en partie ce vide. En revanche, si elle concerne encore Ouessant comme toutes les précédentes, elle s'en distingue par sa date très précoce, les autres données s'échelonnant entre le 8 et le 21 octobre. La donnée de 2000 le confirme.

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (123/154) (108/139 - 6/8)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d'un astérisque (*).

Finistère - Île d'Ouessant : Porz Noan, imm., du 17 au 24 octobre (P.-P. Evrard, P. Rouillier) ; Stang ar Stiff/Keradennec, juv., 27 octobre (D. Laloi).
Jura -Les Rousses, 4 mâles chanteurs (2 rouges, 1 gris* et 1 non vu), 3 et 4 juin (P. Crouzier) ; Bois-d'Amont, 4 mâles chanteurs (3 gris* et 1 non vu) et 1 fem., 3 et 4 juin (P. Crouzier).
Morbihan - Île d'Hoëdic, juv., 23 et 24 octobre (G. Rault).
Haut-Rhin - Stosswihr, mâle gris, du 4 au 7 juin (T. Besançon, V. Palomares).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Les données des îles bretonnes sont classiques en octobre, mais celle en provenance d'une tourbière des Hautes-Vosges retient évidemment l'attention à cette époque... La petite population du Haut-Doubs semble malheureusement éteinte.

PARULINE RAYÉE *Dendroica striata* (2/2) (2/2 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Stang Meur, capturé, phot., vidéo, du 19 octobre au 5 novembre (J.-F. Mandelbaum, J.-P. Paul, M. Zucca *et al.*).

(Amérique du Nord). Troisième mention française, les deux précédentes également du Finistère et à la même époque : une du 9 au 15 octobre 1990 sur Ouessant et l'autre le 29 octobre 1995 sur Sein. L'oiseau trouvé le 19 octobre 2000, capturé et bagué le 26 octobre, présentait une forte adiposité, il avait par ailleurs dû subir les affres du voyage et son plumage en portait encore les traces...

36 & 37. Paruline rayée *Dendroica striata*, Ouessant, Finistère, octobre 2000 (J.-F. Mandelbaum). *Blackpoll Warbler.*





TANGARA ÉCARLATE *Piranga olivacea* (0/0) (0/0 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Stang Meur, mâle 1er hiver, phot., du 12 au 18 octobre (A. de Broyer, A. Guyot, A. Joris).

(Amérique du Nord). Première observation française de ce thraupidé plutôt discret, qui selon certains observateurs sortait peu de son buisson. Cette espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la Commission de l'Avifaune Française (*Ornithos* à paraître).

BRUANT À CALOTTE BLANCHE *Emberiza leucocephalos* (24/30) (10/16 - 2/1)

Bouches-du-Rhône - Fontvieille, mâle ad., 4 novembre (S. Brierre, L. Chevallier) ; Camargue : Mas de L'Auricet, 2 mâles et 1 fem., du 9 novembre au 10 février 2001 (Y. Kayser *et al.*).

1999 Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas de L'Auricet, 2 mâles et 1 fem., du 20 novembre au 9 janvier 2000 (Y. Kayser, A. Le Nevé *et al.*).

(Sibérie). L'hivernage des Bruants à calotte blanche continue en Camargue... et les trois oiseaux du Mas de L'Auricet, considérés comme des revenants, n'ont pas été comptabilisés en 1999 et 2000.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (68/76) (55/61 - 5/3)

Ain - Marais de Lavours/Pollieu, mâle ad., capturé, phot., 27 septembre (Y. Beauvallet, D. Goy).

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas de L'Auricet, du 7 au 27 février (J.-P. Delapré, Y. Kayser), le même, du 18 au 28 novembre (Y. Kayser).

Finistère - Île d'Ouessant : Cost ar Reun et Kun, 1er hiver, capturé, phot., 16 et 17 septembre (F. Veyrunes) ; Lann Vras, 26 octobre (R. Jordan).

1999 Charente-Maritime - Les Breuils, 22 décembre (J. Birard).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Ce n'est pas tous les ans qu'un Bruant nain est capturé dans l'Ain ! L'oiseau de Camargue n'a pas été comptabilisé, s'agissant manifestement du même oiseau trouvé le 31 janvier 1999 et hivernant donc pour la troisième fois consécutive exactement au même endroit. À noter aussi la mention intéressante de décembre 1999 au sud de Saintes... confirmant l'hivernage a priori disséminé de l'espèce dans notre pays.

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (58/65) (42/46 - 2/1)

Var - La Mourotte/La Verdière, mâle ad., phot., du 23 mai au 22 juillet (D. Laloi, M.-C. Martin, A. Pataud, F. & L. Veyrunes *et al.*).

Savoie - Bozel, mâle ad., phot., du 28 juin au 4 juillet (O. Bardet).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Le site du Var est à nouveau occupé cette année, mais par combien d'oiseaux ? Beaucoup d'imprécisions en la matière en tout cas, et un seul mâle adulte a été décrit et photographié. Bien évidemment, la donnée d'un oiseau séjournant en Savoie à cette époque est particulièrement intéressante. Que nous réserve cette espèce qui a niché pour la première fois en France en 1999 (Dupuy & Dupuy 2000) ?

ANNEXE 1 - ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (52/65) (35/36 - 1/1)

Somme - Cayeux-sur-Mer, ad., phot., 22 octobre (P. Della Valle, A. Desforges).

(Sud-est de l'Europe, Afrique, ouest et sud-ouest de l'Asie). La majorité des observations françaises sont de l'été et de l'automne, cette donnée s'inscrit donc dans ce contexte. En revanche, il s'agit de la première mention répertoriée dans ce département.

PÉLICAN GRIS *Pelecanus rufescens* (18/18) (18/18 - 0/0)

1998 Haute-Marne - Étang d'Aigremont/Droyes, ad., 20 et 21 octobre (C. Hervé, E. Le Roy).

(Afrique tropicale et présence quasi-continue dans le sud de l'Égypte). Rappelons qu'un adulte avait été noté le 31 août de la même année en Haute-Saône (V. *Ornithos* 6-4 : 169).

HARLE COURONNÉ *Lophodytes cucullatus* (7/7) (7/7 - 2/2)

Haut-Rhin - Huningue, fem. ad., 12 novembre (A. Muller).

Territoire-de-Belfort - Felon, fem./juv., 25 juin (J.-M. Gatefait).

1999 Maine-et-Loire - Le Lion-d'Angers, mâle ad., phot., de fin décembre au 21 mai 2000 (J. Ripaud, J. Ruault).

(Amérique du Nord). L'oiseau angevin a été trouvé le lendemain de la tempête ayant sévi à la fin de l'année 1999...

CORBEAU FAMILIER *Corvus splendens* (0/0) (0/0 - 1/1)

Nord - Roubaix, 10 janvier (C. Capelle).

(Du Moyen-Orient à l'Asie du Sud-Est). Première observation française de ce corvidé. Il existe une vingtaine de populations isolées issues d'introduction ou de colonisation en dehors de l'aire originelle de répartition. À cet égard, un premier couple est trouvé en avril 1994 à Hoek van Holland aux Pays-Bas, qui élève deux jeunes, un en 1997 et un autre en 1998, et toujours dans ce pays, un nouvel adulte est découvert en Frise et revu à Groningen en 1998 (Wiegant, 1999). Une nouvelle nidification a eu lieu en 2000, mais le nombre exact d'individus présents n'est pas clair (Van der Vliet *et al.*, 2001).

Annexe 2 - Liste des données non homologuées

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

Note importante : les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée sont fournies aux observateurs qui ont joint une enveloppe timbrée à leur adresse en demandant à être informés de la décision du CHN.

2000

Puffin semblable *Puffinus assimilis* - Finistère - Plougerneau - 11 octobre.
Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus* - En mer - Rochebonne : 45°04' N/4°11' W - 3 août.
Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* - Aude - Sigean - 4 ind., 5 mai.
Frégate superbe *Fregata magnificens* - Île d'Ouessant : Kadoran - 3 novembre.
Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Gard - Aigues-Mortes - phot., 27 et 28 août.
Grande Aigrette *Egretta alba* - Individu présentant les caractéristiques de la race américaine *egretta* : Camargue : Mas d'Agon - 27 mai.
Flamant nain *Phoenicopterus minor* - Pyrénées-Atlantiques - Biron - du 19 au 26 février.
Canard à front blanc *Anas americana* - Seine-Maritime - Le Havre - fem. ad., 29 octobre.
Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* - Ain - Villars-les-Dombes et Birieux - fem., phot., du 27 au 30 août.
Busard pâle *Circus macrourus* - Aube - Rouilly-Sacey - mâle ad., 22 septembre ; Haute-Savoie - Hucel/Thollon - juv., 23 septembre.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Ardèche - Lavilledieu - 29 mars ; Aube - Lac Amance - 19 novembre ; Loire - Bussy-Albieux - fem./imm., 4 mai ; Orne - Serans - juv., 9 janvier ; Pas-de-Calais - Pont-de-Briques - du 5 au 12 janvier.
Aigle pomarin/criard *Aquila pomarina/clanga* - Ardèche - Lavilledieu - 25 mars.
Faucon crécerellette *Falco naumanni* - Corse-du-Sud - Cargèse - fem., 19 avril.
Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* - Pyrénées-Atlantiques - Montory - ad., 7 mai ; Rhône - Marcy-l'Etoile - forme sombre, 17 août.
Faucon lanier *Falco biarmicus* - Marne - Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement - 10 mars.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Moselle - Moyenvic - 2 ind., 28 août.
Marouette poussin *Porzana parva* - Meuse - Lac de Madine/Heudicourt-sous-les-Côtes - fem. ad., 3 et 4 août.
Marouette de Baillon *Porzana pusilla* - Marne - Outines - 21 septembre.
Grue de Sibérie *Grus leucogeramus* - Meuse - Champneuville - ad., phot., 16 et 20 mars.
Grue demoiselle *Anthropoides virgo* - Charente - Roussines - 23 décembre.
Gravelot mongol *Charadrius mongolus* - Vendée - Bouin - juv., du 17 au 19 août.
Bécassin à bec court/à long bec *Limnodromus griseus/scolopaceus* - Nord - Leffrinckoucke - juv. probable, 26 août.
Courlis corlieu *Numenius phaeopus* - Individu présentant les caractéristiques de la race américaine *hudsonicus* : Charente-Maritime - Île de Ré : Le Martray - 14 août.
Chevalier grivelé *Actitis macularia* - Haut-Rhin - Wittelsheim - ad., 26 mai.
Mouette de Franklin *Larus pipixcan* - Landes - Courant d'Huchet/Moliets-Plage - 1er hiver, 5 février.
Mouette de Franklin/atricille *Larus pipixcan/atricilla* - Finistère - Île d'Ouessant : Porz Doun - ad., 3 novembre.
Sterne voyageuse *Sterna bengalensis* - Pyrénées-Orientales - Argelès-sur-Mer - 24 août.
Sterne bridée/fuligineuse *Sterna anaethetus/fuscata* - Finistère - Carantec - 2 ad., 14 août.
Martinet de Sibérie *Apus pacificus* - Vendée - Les Sables-d'Olonne - 11 juin.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Manche - Genêts - 2 ind., 23 août, 1 ind., 30 août, 2 ind., 23 septembre ; Somme - Cayeux-sur-Mer - 1er hiver, 5 février.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg* : Ain - Pérouges - 2 mâles ad., 30 avril et 1er mai ; Aude - Lapalme - fem. ad., 17 avril ; Bouches-du-Rhône - Salins de Berre, fem., 18 avril ; Var - Hyères - mâle ad., 23 mars ; Var - Salins des Pesquiers/Giens - 2 mâles ad., 25 mars
Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* - Manche - Courtils - fem., phot., 12 avril ; Genêts - 1er hiver, capturée, phot., 10 septembre (voir commentaire dans les données homologuées).
Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* - Bas-Rhin - Wissembourg - fem., 25 février.
Tarier pâtre *Saxicola torquata* - Individu présentant les caractéristiques de la race orientale *maura* : Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer - mâle ad., 13 mai.
Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* - Nord - Dunkerque - 2 ind., 1er octobre, 2 ind., 3 octobre.
Gobemouche nain *Ficedula parva* - Aveyron - Quins - 31 août et 2 septembre ; Charente-Maritime - Île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines - 19 août.
Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* - Vosges - La Haye - fem./juv., 26 août.
Moineau espagnol *Passer hispantolensis* - Corse-du-Sud - Piana - mâle, phot., 21 avril.
Pinson des arbres *Fringilla coelebs* - Individu présentant les caractéristiques des races *africana/spodiogenys* : Charente-Maritime - Île de Ré : Loix - fem., 30 janvier.
Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* - Haute-Loire - Chilhal - mâle ad., 18 avril.
Bruant à tête rousse *Emberiza bruniceps* - Nord - Fourmies - mâle ad., phot., du 1er au 11 février.



38. Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus*, adulte, Cayeux-sur-Mer, Somme, octobre 2000 (P. Della Valle).
Adult White Pelican.

1999

Faucon lanier *Falco biarmicus* - Haut-Rhin - Battenheim - fem., 7 mai.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Pas-de-Calais - Mont Bernanchon - ad., 1er octobre.
Sterne royale *Sterna maxima* - Morbihan - Ploemeur - 2 ind., 29 août.
Hirondelle paludicole *Riparia paludicola* - Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu - 6 avril.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Finistère - Poulizan/Plougonvelin - 3 ind., 5 décembre.
Hypolaïs bottée *Hippolais caligata* - Finistère - Île d'Ouessant : Stang ar Stiff/Ker Radennec - du 27 octobre au 12 novembre.
Paruline masquée *Geothlypis trichas* - Gironde - Lacanau - mâle 1er hiver, 19 octobre.
Paruline orangée *Protonotaria citrea* - Maine-et-Loire - Soulaines-sur-Aubance - mâle et fem., 7 mars.

1998

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* - Marne - Lac du Der-Chantecoq/Giffaumont-Champaubert - 5 ind., 8 novembre.
Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* - Maine-et-Loire - Saint-Georges-sur-Loire - fem. ad., 13 février.
Faucon lanier/sacre *Falco biarmicus/cherrug* - Marne - Vitry-le-François - 20 novembre.
Chevalier criard *Tringa melanoleuca* - Loire-Atlantique - Assérac - 24 juillet.
Gobemouche nain *Ficedula parva* - Haut-Rhin - Col du Hahnenbrunnen - mâle, 20 septembre.

1997

Aigle pomarin/criard *Aquila pomarina/clanga* - Ain - Saint-Maurice-de-Gourdans - 25 décembre.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Ind. présentant les caractéristiques de la race *feldegg* : Ardèche - Bessas - mâle, 24 avril.

1996

Busard pâle *Circus macrourus* - Hérault - Vic-la-Gardiole - juv., 5 septembre.
Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* - Ardèche - Saint-Étienne-de-Fontbellon - 14 janvier.

1994

Marouette poussin *Porzana parva* - Ain - Balan - chanteur, 2 et 4 mai.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg* : Ain - Meximieux - 2 mâles, 7 mai.
Gobemouche nain *Ficedula parva* - Ardennes - Apremont - juv., 9 août.

1992

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Ind. présentant les caractéristiques de la race *feldegg* : Ain - Pérouges - 2 mâles, 3 avril.

1982

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *seebohmi* : Alpes-Maritimes - Vallée des Merveilles - phot., 31 juillet.

Annexe 3 - catégorie E

Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la Liste française, ni dans la catégorie D mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour.

• **Marabout d'Afrique** *Leptoptilos crumeniferus* - 1997 Maine-et-Loire, Tiercé, phot., septembre (J. Ripaud).

• **Sarcelle cannelle** *Anas cyanoptera* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Saint-Seren/Tour-du-Valat, mâle ad., du 29 octobre au 27 novembre (C. Barbraud, Y. Kayser).

• **Urubu à tête rouge** *Cathartes aura* - Pas-de-Calais - Dannes, ad., du 23 au 26 août (M. Guerville, R. Maillard).

• **Pluvian fluviatile** *Pluvianus aegyptius* - 1999 Gironde - Blaye, ad., phot., du 12 septembre au 17 février 2000 au moins (B. Bayou, J.-Y. Boutet *et al.*).

• **Roselin à longue queue** *Uragus sibiricus* - Rhône - Saint-Georges-de-Reneins, fem., phot., 15 et 16 juillet (A. Renaudier).

Remerciements

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 2000, ont contribué à son bon fonctionnement :

• la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière nécessaire au Comité et à son Secrétariat, ainsi que la revue *Ornithos* pour la prise en charge des photos couleur qui illustrent ce rapport ;

• Carl Zeiss Division Jumelles pour le soutien apporté à la publication du rapport annuel ;

• Luc Barbier, Christian Dronneau, Philippe J. Dubois, Guy Flohart, David Gray, Pascal Grisser, Yvon Guermeur, Yves Kayser, Robert Lécaille, Emmanuel Le Roy, Dominique Michelat, Georges Olioso, Sébastien Reeber, Christian Riols, Maxime Zucca qui nous ont apporté des informations complémentaires ainsi que tous les responsables de Centrales Ornithologiques, de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) ou Départementaux (CHD) qui nous ont transmis des données ;

• enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

Bibliographie

• Botond Kiss J., Szabo L. & Duquet M. (2001). Le Vanneau à queue blanche *Vanellus leucurus*, une nouvelle espèce nicheuse pour l'Europe. *Ornithos* 8-3 : 100-107.

• Commission de l'Avifaune Française (1997). Liste des oiseaux de France métropolitaine. *Ornithos* 4-1 : I-VIII.

• De Broyer A. (2001). Première mention française du Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus*. *Ornithos* 8-5 : 192-195.

• Dupuy D. & Dupuy J.-L. (2000). Premier cas de nidification du Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* en France (Alpes-Maritimes). *Ornithos* 7-4 : 174-179.

• Gantlett S. (2001). Pygmy Cormorants in Europe : Britain next ? *Birding World* 14-11 : 465-474.

• Guérin S. & Rault G. (2001). L'Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota* : première mention française. *Ornithos* 8-4 : 155-157.

• Helbig A.J., Seibold I., Martens J. & Wink M. (1995). Genetic differentiation and phylogenetic relationship of Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli* and Green Warbler *Phylloscopus nitidus*. *J. Avian Biol.* 26(2) : 139-153.

• Jordan J.-P. (2000). Du nouveau sur l'Agrobate roux *Cercotrichas galactotes* en France. *Alauda* 68 (2) : 145-148.

• Lasceve M., Rufray V., Orsini P. & Bouillot M. (2001). Première mention de la Mésange de Pleske *Parus "pleskii"* en France. *Ornithos* 8-4 : 208-212.

• Van der Vliet R.E., Van der Laan J. & CDNA (2001). Rare birds in the Netherlands in 2000. *Dutch Birding* 23-6 : 315-347.

• Wiegant W.M., de Bruin A. (Bert) & CDNA (1999). Rare birds in the Netherlands in 1998. *Dutch Birding* 21-6 : 309-329.

Summary

Rare birds in France in 2000. *Five new species were added to the French List in 2000 : Double-crested Cormorant* Phalacrocorax auritus, *Kittlitz's Plover* Charadrius pecuarius, *Cliff Swallow* Hirundo pyrrhonota, *Eastern Warbler* Phylloscopus orientalis *and Scarlet Tanager* Piranga olivacea. *Also included in 2000 were the first record of Steller's Eider* Polysticta stelleri *for the 20th century, and the second and third records of Pygmy Cormorant* Phalacrocorax pygmeus. *A third record was accepted for four species : White-tailed Plover* Vanellus leucurus, *Sharp-tailed Sandpiper* Calidris acuminata, *Ross's Gull* Rhodostethia rosea *and Blackpoll Warbler* Dendroica striata.

Record numbers in 2000 included a total of 15 White-headed Ducks Oxyura leucocephala *(including 12 together !), 4 Blyth's Reed Warblers* Acrocephalus dumetorum *(2 records until now). Further, 2000 also included the first House Crow* Corvus splendens *(Category D) and the first Pleske's Tit (Blue Tit x Azure Tit* Parus caeruleus x P. cyanus*) for France.*

The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species presents the total numbers of French records and individuals (excluding 2000). The second pair relates the same information for the period 1981-1999 and the last pair relates to the current year (i.e. *2000).*

ZEISS *Le rapport du CHN est publié avec le soutien de Carl Zeiss Division Jumelles*

Comité d'Homologation National c/o LPO
La Corderie Royale, BP 263, 17305 Rochefort Cedex