

Les oiseaux rares en France en 2001

ZEISS

Rapport du Comité d'Homologation National

Jean-Yves Frémont & le CHN

Ce 20e rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 2001. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 2001 est de **507** (499 en 2000). Le taux d'acceptation est de 82,6 %, chiffre légèrement inférieur à celui de 2000, mais toujours dans la fourchette des valeurs habituelles (comprises entre 81 et 85 %).

En 2001, le poste d'Alain Rouge, dont le mandat arrivait à expiration, était vacant. Gaël Rault a été élu pour lui succéder. Pierre Crouzier conserve la présidence du CHN et acquiert le droit de vote pour que le président reste au cœur des débats du CHN, ce qui porte à neuf (au lieu de huit) le nombre de membres votants. En 2001, le CHN se composait donc des membres suivants : Yvon Créau, Pierre Crouzier (Président), Marc Duquet, Guy Flohart, Jean-Yves Frémont (Secrétaire), Yves Kayser, Dominique Michelat, Serge Nicolle et Gaël Rault. Un poste a été pourvu en 2002 et un autre doit l'être en 2003. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du Secrétaire du CHN avant le 15 mars 2003.

Travaux et décisions du CHN

Le passage à six numéros de la revue *Ornithos* permet de vous donner désormais plus régulièrement des informations ayant trait au fonctionnement du CHN (voir à ce sujet les rubriques « *En direct du CHN* » et « *En direct de la CAF* »). C'est ainsi que le compte rendu de la dernière réunion plénière annuelle du CHN des 27 et 28 avril 2002 a récemment été publié (*Ornithos* 9-4 : 158-160).

Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (modèle à demander éventuellement au secrétariat du CHN) dès que possible après l'observation (que vous soyez le découvreur ou simple observateur) et **avant le 31 décembre de l'année en cours**. Ceci évite la publication très tardive des observations ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des mentions déjà parues. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s). Il est à cet égard important de rappeler que dans un souci de validation homogène des données, seules les observations présentées à un comité d'homologation national sont prises en compte pour la publication de synthèses nationales ou européennes concernant une espèce.

Il est également important de souligner qu'en dépit du développement rapide du *digiscoping* et de la plus grande disponibilité d'images d'oiseaux occasionnels qui en résulte, rien ne peut remplacer une bonne description écrite. Les films et les photographies, numériques ou non, les enrichissent réellement et s'avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Le CHN souhaite donc ne plus recevoir de fiches sans description, fondées seulement sur une ou quelques images, aussi bonnes soient-elles.

Les faits marquants

En 2001, deux espèces ont été ajoutées à la Liste des oiseaux de France : le Pétrel gongon/de Madère *Pterodroma feae/madeira* et le Martinet des maisons *Apus affinis*, tandis qu'une autre – la Pie-grièche brune *Lanius cristatus* – l'a été en 2000. L'Alouette pispolette *Calandrella rufescens* a, quant à elle, enregistré

sa deuxième mention nationale. À signaler par ailleurs la présence exceptionnelle de deux Hypolaïs bottées *Hippolais caligata* sur les îles finistériennes, de deux Viréos à œil rouge *Vireo olivaceus* sur l'île d'Ouessant et l'afflux d'un nombre important d'Étourneaux roselins *Sturnus roseus* (46 individus au total).
Enfin, le premier Goéland dominicain *Larus dominicanus* (catégorie D) pour la France a été pris en compte en 1995.

Liste systématique des données acceptées (catégories A et C)

Les données sont présentées comme suit :
1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants à l'exclusion de l'année 2001, les deux suivants les données homologuées depuis 1981 (2001 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 2001.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo), enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Observateur(s), sauf exception, limité à trois (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe ou dessinateur).
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de Voous (1978, *The List of the Birds of the Western Palearctic*), modifiée par la Liste des Oiseaux de France (CAF 1997).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 2001. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature : p. ex., **Viréo à œil rouge** - un juvénile le 21 octobre 2001 sur l'île d'Ouessant, Finistère (N. Issa *et al.*, *in* Frémont & le CHN 2002).

PLONGEON À BEC BLANC *Gavia adamsii* (12/12) (8/8 - 1/1)

Marne - Ste-Marie-du-Lac-Nuisement, 1er hiver, phot., du 28 janvier au 7 mars (S. Paris, R. Riols *et al.*).

(Sibérie, Alaska). **Encore un long séjour (39 jours) pour ce plongeon du lac du Der (4e mention de l'espèce sur un site intérieur), après celui de l'hiver 1998-1999 observé dans le Bas-Rhin pendant 129 jours...**

GRÈBE À BEC BIGARRÉ *Podilymbus podiceps* (5/5) (5/5 - 2/1)

Indre - Lingé, phot., du 7 avril au 6 mai (C. Couartou, F. Desage, C. Mercier, J. Sudreau).
Mayenne - Ste-Suzanne, du 17 au 25 novembre (D. Tavenon).

(Amériques). **Nouvelle donnée d'un oiseau paradant, mais cette fois, en Brenne. L'année 2001 aura vu la présence simultanée de deux Grèbes à bec bigarré, puisque l'oiseau sarthois trouvé le 24 juin 2000 est resté jusqu'au 27 octobre 2001 (V. *Ornithos* 9-1 : 3). La donnée mayennaise se rapporte à l'oiseau de St-Denis-d'Orques, Sarthe, chassé par la vidange de l'étang où il avait élu domicile, les deux sites étant distants d'une quinzaine de kilomètres (Lapous 2002). Il n'a donc pas été comptabilisé pour 2001.**

PÉTREL GONGON/DE MADÈRE *Pterodroma feae/madeira* (-/-) (-/- - 1/1)

Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, 9 septembre (P.J. Dubois, G. Flohart, G. Olioso).

(Îles du Cap Vert, Madère). **Première mention française d'un *Pterodroma*. La distinction des deux espèces est délicate, et même si les critères rapportés évoquent bien le Pétrel gongon, il est plus raisonnable de ne pas trancher. Soulignons quand même que la rareté du Pétrel de Madère (30 couples environ) donne peu de poids à une apparition éventuelle de cette espèce sédentaire en Europe. La Commission de l'Avifaune Française a inscrit ce pétrel en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France (*Ornithos* à paraître).**

PUFFIN SEMBLABLE *Puffinus assimilis*
(27/28) (20/21 - 3/13)

Finistère - Île d'Ouessant : Créac'h et Kadoran, du 10 au 20 septembre (R. Baeta, M. Giroud, A. Hachenberg, M. Zucca).
En mer – Rochebonne : 46°20' N/4°57' W, 4 ind., 2 septembre (X. Hindermeyer, A. Perthuis), Rochebonne entre 45°00' N/6°00' W et 46°30' N/6°00' W, 8 ind., 11 septembre (Y. Kayser, A. Larousse *et al.*).
2000 Finistère - Île d'Ouessant : Créac'h, 19 octobre (M. Champion, F. Maillot, J.-P. Paul).

(La race *baroli* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries et aux Açores). **Le séjour prolongé d'un oiseau devant Ouessant est remarquable. Par ailleurs, le cru 2001 apparaît très bon si l'on en juge par le nombre d'individus contactés à partir des ferries Plymouth-Santander ou Portsmouth-Bilbao ; à cet égard, il est toutefois utile de souligner que si l'observation des espèces pélagiques est facilitée par ces traversées, celle du Puffin semblable n'est pas nécessairement comprise dans le prix du billet permettant l'accès aux ferries...**



fig. 1. Localisation des observations de Puffins semblables *Puffinus assimilis* (✣) effectuées en mer dans la zone économique exclusive (ZEE) française, et acceptées par le CHN en 2001. *Distribution of pelagic records of the Little Shearwater (✣) accepted by the French RC in 2001. Red line represents the boundary between Spanish and French Exclusive Economic Zones (EEZ).*

CORMORAN PYGMÉE *Phalacrocorax pygmeus* **(4/4) (3/3 - 1/1)**

Bouches-du-Rhône - Le Puy-Ste-Réparade, imm., 1er avril (S. Uriot, L. Mariani).

(Europe de l'Est, Asie centrale). **Cette nouvelle donnée, après celles de 2000, vient confirmer l'accroissement des apparitions de l'espèce en Europe de l'Ouest.**

AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* **(33/23) (27/17 - 0/0)**

Bouches-du-Rhône - Pont-de-Gau/Stes-Maries-de-la-Mer, fem. ad. *gularis* forme sombre, du 25 juin au 19 juillet au moins (Y. Kayser, F. & J. Lamouroux).
2000 Seine-Maritime - St-Vigor-d'Ymmonville, forme sombre, du 20 au 24 avril (L. Philippe *et al.*).

(Afrique, Asie). **La sous-espèce de l'oiseau normand n'a pas été déterminée.**

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* **(133/918) (36/79 - 0/0)**

1999 Bas-Rhin - Neuhaeusel, phot., du 21 novembre au 26 février 2000 (L. Dietrich, C. Dronneau, P. Mathon, G. Paulus).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). **Espèce toujours rare en France. Les arrivées hivernales sont en général liées aux vagues de froid, tandis que celles d'automne concernent plutôt des oiseaux islandais détournés des îles Britanniques à la suite de tempêtes.**

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* **(44/27) (44/27 - 12/3)**

Individus présentant les caractéristiques de la race *nigricans*, appelée « Bernache du Pacifique ».

Charente-Maritime - Bonne-Anse, ad., 12 et 16 novembre (J.-M. Thirion, P. Trotignon) ; île de Ré : Les Portes-en-Ré et Ars-en-Ré, jusqu'à 5 ind., du 2 décembre au 28 mars 2002 (équipe LPO-Ré *fide* P. Trotignon) ; île d'Oléron : Château-d'Oléron, 1 ind., 1er décembre (P. Trotignon), St-Georges-d'Oléron, 1 ind., 4 janvier 2002 (A. Kim) ; Bourcefranc-le-Chapus, 1 ind., 13 décembre (A. Kim) ; Marennes, 2 ind., le 7 janvier 2002 et encore

1 ind. le 4 février 2002 (A. Kim).
Loire-Atlantique - Traicts du Croisic, ad., du 16 décembre au 9 mars 2002 (R. Baëta, J.-Y. Frémont, D. Laloi, Y. Trévoux).
Manche - Genêts et Vains, ad., du 17 novembre au 15 janvier 2002 au moins (S. Provost *et al.*).
Vendée - St-Vincent-sur-Jard, ad., phot., du 5 décembre au 23 février 2002 (F. Portier, F. Salmon).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). **Il semblerait que neuf oiseaux environ aient fréquenté les deux grands complexes île de Ré et île d'Oléron cet hiver. Sept avaient été comptabilisés au cours de l'hiver précédent, mais il est difficile, d'une part de maîtriser les échanges entre ces deux secteurs, et d'autre part de connaître le nombre d'oiseaux revenants. Dans le doute, seuls deux nouveaux individus ont été comptabilisés pour la Charente-Maritime. L'oiseau de la baie du Mont-St-Michel passe son troisième hiver sur le site ; celui de Loire-Atlantique est également bien connu. L'oiseau du sud Vendée a été compté comme un nouvel individu.**

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis* (34/35) (18/17 - 3/3)
Charente-Maritime - Moëze, ad., 25 et 26 novembre (M. Caupenne, P. Trotignon *et al.*).
Loir-et-Cher - Soings-en-Sologne, ad., vidéo, 21 février (F. Pelsy, A. Perthuis).
Somme - Fort-Mahon, ad., 29 avril et 6 mai (P. Decory, T. Rigaux).

(Sibérie). **Toujours des séjours très brefs pour cette espèce. La donnée printanière tardive laisse perplexe quant à l'origine de l'oiseau.**

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (29/31) (26/28 - 5/5)
Finistère - Goulven, mâle 1er hiver, phot., du 26 octobre au 24 février 2002 (A. Audevard, S. Mauvieux, G. Rault, X. Rozec), mâle ad., phot., du 10 décembre au 27 février 2002 (A. Audevard, S. Mauvieux, G. Rault, X. Rozec) ; Tressény/Guissény, mâle ad., phot., du 28 décembre au 21 février 2002 (A. Audevard, S. Mauvieux, X. Rozec).
Loire-Atlantique - St-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle ad., 13 février (S. Reeber).
Vendée - Bouin, mâle ad., 12 décembre (O. Girard).
2000 Finistère - Goulven, mâle 1er hiver, du 14 novembre au 11 mars 2001 au moins (P.-A. Crochet, P.J. Dubois, J.-Y. Frémont, S. Mauvieux).
1999 Vendée - Marais des Loirs/Olonne-sur-Mer, mâle 1re année, du 2 au 11 avril (D. Desmots, P. Yésou) et non mâle 1re année, 6 avril seulement (*Ornithos* 7-4 : 148), ni mâle ad., du 2 au 11 avril (*Ornithos* 9-1 : 6).

(Amérique du Nord). **Beau millésime avec trois oiseaux ensemble dans le nord du Finistère dont peut-être un revenant (l'immature de l'hiver précédent) ; à noter qu'un certain flou existe sur l'âge du premier oiseau arrivé en baie de Goulven (mâle 1er hiver ou mâle adulte alors en plumage d'éclipse). Avec cinq oiseaux, les années 2000 et 2001 sont des années record. À noter que le marais des Loirs à Olonne-sur-Mer n'a abrité qu'un seul et même mâle immature en avril 1999, et que la qualification incorrecte d'adulte est probablement fréquente lorsque la différence adulte/immature se joue à quelques détails de plumes – en l'occurrence ici les lisérés beige ou noisette (et non blancs) des tertiaires – que les observateurs ne connaissent pas nécessairement et qui de surcroît ne sont pas faciles à détecter.**

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (30/26) (29/25 - 4/3)
Finistère - Goulven, mâle ad. probable, phot., du 9 novembre au 27 février 2002 (A. Audevard, S. Mauvieux, X. Rozec).
Loire-Atlantique - St-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle, 22 janvier (S. Reeber).
Haute-Savoie - Excenevex, mâle ad., 6 mars (G. & J.-P. Jordan *et al.*).
Vendée - St-Denis-du-Payré, mâle ad., 1er décembre (J. Gonin, A. Thomas).

(Amérique du Nord). **Trois individus, c'est quasiment la moyenne annuelle depuis 1997. L'oiseau vendéen, un probable revenant, n'a pas été comptabilisé.**

1 & 2. Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps*, adulte, Lingé, Indre, mai 2001 (C. Mercier). *Adult Pied-billed Grebe.*
3. Plongeon à bec blanc *Gavia adamsii*, 1er hiver, lac du Der, Marne, mars 2001 (S. Paris). *First-winter Yellow-billed Diver.*
4. Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis*, mâle, Goulven, Finistère, décembre 2001 (A. Audevard). *Male Green-winged Teal.*
5. Canard à front blanc *Anas americana*, mâle adulte, Guissény, Finistère, décembre 2001 (A. Audevard). *Adult male American Wigeon.*
6. Canard à front blanc *Anas americana*, 1er hiver, Goulven, Finistère, décembre 2001 (A. Audevard). *First-winter male American Wigeon.*



1



2



3



4



5



6

SARCELLE MARBRÉE *Marmaronetta angustirostris* **(30/67) (11/11 - 1/1)**
Hérault - Le Bagnas/Agde, 3 ad., 7 septembre (F. Valles).
(Méditerranée, Moyen-Orient, Inde du Nord). **L'apparition de plusieurs oiseaux en fin d'été depuis quelques années dans ce département rend leur origine plus que sujette à caution, d'autant que des échappés originaires du parc du Pont-de-Gau en Camargue ont déjà été signalés. D'un autre côté, l'espèce ne se porte pas trop mal en Espagne, on est ici en période de dispersion classique, et l'étang du Bagnas n'est pas tout près du Pont-de-Gau, donc au bénéfice du doute...**

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* **(96/79) (88/73 - 10/7)**
Ain - Étang Plat/Chalamont, mâle ad., du 15 au 21 février, puis St-Nizier-le-Désert, le même, du 1er au 4 mars (A. Bernard, P. & J.-B. & M. Crouzier, A. Forest).
Creuse - Étang des Landes/Lussat, puis Gouzon, mâle ad., phot., du 19 novembre au 18 décembre (A. Audevard, F. Desage).
Doubs - Vuillecin, mâle ad., 8 avril (Y. Magnin, D. Michelat).
Finistère - Étang de St-Vio puis étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, fem., phot., du 15 octobre au 31 décembre (A. Audevard, G. Rault) ; étangs de Poulinoc et de Lannéon/St-Renan, fem. ad., du 2 décembre au 23 février 2002 (M. Champion).
Loire-Atlantique - Herbignac, mâle ad., phot., du 15 janvier au 3 mars (J.-L. Dourin *et al.*).
Haut-Rhin - Wittelsheim, mâle ad., 7 avril (A. Mauss).
Savoie - Étang du Bourget/Conjux, mâle ad., 28 janvier (D. & M. Ducruet).
Vendée - La Belle-Henriette/La Faute-sur-Mer, fem., 1er avril (A. Thomas) ; La Tranche-sur-Mer, mâle ad. probable, 5 avril (P. Yésou).
2000 Finistère - Étangs de Poulinoc et de Lannéon/St-Renan, fem. ad., du 28 novembre au 29 avril 2001 (M. Champion, F. Le Guen, S. Mauvieux *et al.*).
2000 Maine-et-Loire - Lac de Maine/Bouchemaine, mâle ad. en éclipse probable, phot., du 3 au 8 novembre (J.-C. Beaudoin, A. Fossé, F. Noël).
(Amérique du Nord). **En 2001, les oiseaux de l'Ain et de la Creuse sont de probables revenants, ainsi que la femelle de St-Renan, Finistère. À noter la présence d'un mâle et d'une femelle distants de quatre kilomètres seulement en Vendée...**

FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* **(7/4) (7/4 - 1/1)**
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/St-Lumine-de-Coutais, fem. imm., du 9 au 16 avril (S. Reeber).
(Amérique du Nord). **Enfin une donnée dans l'ouest de la France !**

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* **(44/46) (24/26 - 3/3)**
Charente-Maritime - Île d'Oléron : anse de Maleconche/St-Georges-d'Oléron, fem. imm., phot., du 25 février au 9 mars (A. Audevard, P. Trotignon).
Finistère - Ste-Anne-La-Palue, fem. ad., 7 janvier et 8 février (A. Le Nevé, J.-Y. Péron, G. Rault).
Gironde - Lège-Cap-Ferret, fem. 1er hiver, trouvée morte, phot., 6 octobre (L. Couzi, P. Petit).
(Amérique du Nord). **Après un blanc en 2000, l'année 2001 nous apporte trois oiseaux, c'est pratiquement la moyenne annuelle depuis 1993 (2,67). À part une donnée du 11 septembre 1983 en Charente-Maritime et une autre du 1er octobre 1995 dans le Pas-de-Calais, la donnée girondine a quasiment un mois d'avance par rapport aux premières autres arrivées hivernales.**

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* **(272/722) (264/713 - 77/199)**
Charente-Maritime - Lagunage de Rochefort-sur-Mer, fem., 8 octobre, la même (?), 5 décembre (équipe LPO-Espace Nature *fide* P. Trotignon).
Creuse - Étang des Landes/Lussat, fem. ad., 5 novembre (A. Audevard).
Finistère - Étang de Nérizélec/Plovan, 2 fem., 29 août (S. Mauvieux).
Ille-et-Vilaine - Étang de Paintourteau/Erbrée, fem., 14 janvier (L. Morlier *fide* F. Contim), mâle, du 9 août au 17 septembre (J.-Y. Louis, F. Maréchal, L. Morlier *fide* F. Contim), mâle et fem., du 22 au 29 septembre (F. Contim), 9 ind., 15 octobre (R. Jamault, L. Morlier *fide* F. Contim), 12 ind. (5 mâles et 7 fem.), 22 octobre (L. Morlier *fide* F. Contim), entre 5 et 10 ind. (maximums de 3 mâles et de 8 fem.) du 28 octobre au 20 décembre (B. Angin, G. Juppet, L. Laîsné, L. Morlier *fide* F. Contim) ; étang de Careil/Iffendic, mâle 1er hiver, du 31 janvier au 16 avril (B. Angin, F. Contim, L. Gohier *et al.*) ; étang du Boulet/Feins, 1 ind., 6 janvier (P. Le Mao *fide*

F. Contim) ; étang de Bazouges sous Hédé/Hédé, 1 ind., 19 janvier (J. P. Gibon *fide* F. Contim) ; étang de Rolin/Québriac, juv., 31 octobre (P. Le Mao *fide* F. Contim) ; étang du Rouvre/St-Pierre-de-Plesguen, fem., 18 janvier (P. Pulce *fide* F. Contim).
Indre - Étang des Vignaux/Lingé, fem. ad. et 2 imm., 29 novembre (A. Audevard)
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : fin d'hivernage : 50 ind. (18 mâles et 32 fem.), 6 janvier, 60 ind. (18 mâles et 36 fem.), 17 janvier, 71 ind. (27 mâles et 44 fem.), 29 janvier, 62 ind. (24 mâles et 38 fem.), 22 février, 13 ind., 7 mars (S. Reeber) ; nidification : de 5 à 8 couples nicheurs (11 poussins vus), phot., 10 août (S. Reeber) ; début d'hivernage : 31 ind. (11 mâles et 20 fem.), 22 novembre, 43 ind. (15 mâles et 28 fem.), du 6 décembre au 15 janvier 2002 (S. Reeber) ; Les Moutiers-en-Retz : 2 juv., 8 et 9 septembre (J.-Y. Frémont), encore 1 juv., 22 septembre (Y. Trévoux), fem., 30 septembre (J.-Y. Frémont).
Mayenne - étang du Gué de Selle/Mésangers : fem. ad., 26 juillet, 1 couple, 30 juillet, 2 mâles, 6 août, fem. et 3 poussins d'une semaine, 29 août, 2 mâles, 2 fem. et 3 poussins d'environ 3 jours, 13 septembre, 2 mâles, 3 fem., 8 juv., 30 octobre, 4 fem./imm., 14 décembre, fem./imm., 18 décembre (J.-F. Arcanger, A. Desnos, B. Duchenne, D. Tavenon *et al.*) ; étang de la Morinière/St-Denis-d'Anjou, 4 fem./imm., 14 décembre (J.-F. Arcanger, N. Puech).
Seine-et-Marne - Jablines, mâle ad., 21 janvier (F. Bouzendorf).
Somme - Étang de Vermeulen/Rue, 3 ind. (1 éradiqué), 18 janvier (C. Bouteiller *fide* L. Barbier).
Vendée - Étang des Boucheries/Les Landes-Genusson : mâle et 3 fem., du 2 février au 14 avril, mâle, 28 avril, 2 mâles, 12 mai, mâle, fem. et 5 poussins d'une semaine, 18 mai, 4 mâles et 2 fem., 25 mai, 3 mâles, 3 fem. et 6 juv., 15 juin, 10 à 12 ind., du 6 au 28 juillet, , de 8 à 20 ind., du 3 au 30 août (L. Grillet), 25 ind. (24 éradiqués), 7 septembre (L. Grillet), de 1 à 2 ind., du 10 octobre au 9 novembre (L. Grillet).
Yonne - Étang des Sablons/Gron, mâle (éradiqué), du 16 janvier au 1er février (F. Chassier *fide* L. Barbier).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). **Outre Grand-Lieu, la nidification est prouvée cette année en Mayenne (deux nichées observées) qui a accueilli jusqu'à treize oiseaux sur un même étang ; trois nichées d'environ 5 à 6 jeunes chacune ont été observées sur le bastion vendéen des Boucheries ; la nidification en Ille-et-Vilaine n'a toujours pas été prouvée malgré 52 données cette année (au moins 13 oiseaux pour le seul étang de Paintourteau, limitrophe de la Mayenne). Après une apparente stabilisation, les effectifs (et les nidifications) ont encore progressé cette année, même si on peut imaginer qu'une partie des oiseaux comptabilisés revient à l'automne (combien ?). Il faut signaler que si en Grande-Bretagne, pas moins de 2 500 Érismatures rousses ont été éradiquées entre avril 1999 et l'automne 2002 sur une population estimée initialement à 6 000 individus (P.J. Dubois *in litt.*), un afflux d'oiseaux venus d'Amérique du Nord a été ressenti en fin d'été en Europe du Nord, notamment en Norvège et en Finlande, mais sans doute aussi plus à l'ouest (A. Tores Mjös *in litt.*).**

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus*
(55/92) (47/84 - 4/16)

Indre - Mézières-en-Brenne, ad., phot., du 19 décembre au 3 février 2002 (R. Baeta, J.-J. Courthial, N. Issa *et al.*).
Jura - Étrepigney, ad., 13 octobre (J. Michel).
Landes & Pyrénées-Atlantiques - Localités tenues secrètes : 6 sites occupés, 6 couples produisent 13 jeunes à l'envol (E. Bounine, S. Duchateau, P. Grisser).
Hautes-Pyrénées - Gensac, ad., du 21 mars au 15 avril (F. Ballereau, D. Portier).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). **Après une année sans observation en dehors des sites traditionnels du Sud-Ouest, l'espèce se montre à nouveau dans des départements très dispersés. En ce qui concerne la reproduction, fait rare depuis plusieurs années, tous les couples ont produit des jeunes à l'envol ; les conditions météorologiques de juin, excellentes cette année, semblent donc déterminantes.**



7. Élanion blanc *Elanus caeruleus*, Mézières-en-Brenne, Indre, décembre 2001 (R. Baeta). *Adult Black-winged Kite.*

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (13/12) (11/10 - 6/6)

Aude - Mazuby, imm. probable, 20 mai (C. Riols).
Hérault - Castanet-le-Haut, 27 mai (T. Biteau) ; Cambon et Salvergues, 12 juin (T. Biteau).
Puy-de-Dôme - La Godivelle, 2 ind. le 2 septembre, 1 seul le 3 septembre (T. Leroy).
Pyrénées-Atlantiques - Aste-Béon, imm. probable, 8 avril (anonyme, vidéo, *fide* A. Guyot).
1997 Aude - Aigues-Vives/Villardebelle, 7 septembre (J.-M. de Chabaneix, P. Polette).

(De l'Espagne à la Chine). **Les données de l'Aude et de l'Hérault peuvent concerner aussi bien un seul et même individu que deux ou trois (trois ont été pris en compte pour les statistiques) ; de même, l'oiseau du 3 septembre dans le Puy-de-Dôme est-il un des deux vus la veille ? Admettons-le...**

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (51/50) (36/35 - 3/3)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, mâle 1er été, phot., du 19 au 28 avril au moins (D. Cohez, E. Libercier *et al.*) ; Crau, mâle ad., 24 avril (A. Flitti).
Finistère - Île d'Ouessant : Kérandraon, juv., 21 septembre (A. Audevard) ; Le Stiff, juv., 4 octobre (N. Issa).
2000 Aude - Marcorignan, mâle ad., 19 avril (D. Clément).

(Asie centrale, à l'ouest jusqu'en Roumanie). **Difficile de savoir si Ouessant a été visitée par un ou deux oiseaux, d'autant que l'individu vu fin septembre peut très bien avoir passé plusieurs jours sur l'archipel de Molène. En tout cas, rappelons qu'un afflux de Busards pâles sans précédent a été constaté en Finlande avec un record de 76 oiseaux dont 65 juvéniles entre le 23 août et la fin septembre 2001 (*Birding World* 14-9 : 367)... En France, un peu moins de deux oiseaux en moyenne sont vus annuellement depuis 1981.**

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (17/17) (17/17 - 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie ».
Drôme - Rochefort-en-Valdaine, 27 mai (G. Olioso).
Finistère - Île d'Ouessant : Poull Brac, ad. probable, 20 octobre (A. Audevard).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). **L'oiseau de la Drôme était en migration active, celui d'Ouessant, à une très bonne date, n'a fait aussi que passer.**

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (12/11) (8/7 -2/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas Neuf, ad., du 3 novembre au 2 mars 2002 au moins (A. Bastien, C. Girond, Y. Kayser, B. Le Brun *et al.*) ; étang Redon, ad. de forme pâle, du 28 décembre au 10 janvier 2002, puis du 18 au 20 mars 2002 (Y. Kayser).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). **L'individu du Mas Neuf est bien connu, mais la Camargue a accueilli un nouvel oiseau cet hiver... et a même failli en accueillir d'autres en raison de la présence de plusieurs Buses variables un peu roussâtres.**

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (327/351) (261/281 - 4/4)

Doubs - Bannans, imm., 22 novembre (D. Michelat).
Haute-Loire - Montregard, fem. ad., 5 janvier (M. Zucca).
Marne - Entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, juv., 28 octobre (A. André).
Nord - Fletre, 25 décembre (P. Poiré).
1999 Finistère - Goulven, 13 novembre (P. Leon).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). **Une fois encore, 2001 montre bien la rareté de cette espèce en France en dehors des accidents climatiques, et les Buses variables « blanches » ont toujours autant de succès comme candidates potentielles...**

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (36/35) (32/31 - 4/4)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Amphise, ad., 23 mars (Y. Kayser) ; Bomborinette, ad., du 15 décembre au 9 janvier 2002 (P.-A. Crochet, E. Didner, Y. Kayser).
Meuse - Han-sur-Meuse, imm., 13 juin (M. Gaillard).
Pyrénées-Atlantiques - Angais/Bordes, juv., phot., 11 octobre (S. Duchateau, J.-L. Grangé).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). **Quatre mentions, c'est autant qu'en 1999, et la donnée des Pyrénées-Atlantiques n'est pas sans rappeler celle d'un juvénile le 6 septembre 2000 à Tardets-Sorholus. À noter aussi le caractère exceptionnel de la présence hivernale de l'espèce en Camargue, celle-ci hivernant normalement en Afrique tropicale !**





8 & 9. Aigle pomarin *Aquila pomarina*, Bordes, Pyrénées-Atlantiques, octobre 2001 (S. Duchateau). *Juvenile Lesser Spotted Eagle.*

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (176/146) (127/93 - 12/3)

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang Redon et Amphise, 1er hiver, du 17 janvier au 18 avril (Y. Kayser, H. Kowalski), imm., 11 mars (D. Cohez, E. Didner, N. Vincent-Martin) ; Bardouine, ad., les 27 janvier et 14 mars (N. Vincent-Martin) ; Bomborinette et étang Redon, imm. de forme « *fulvescens* », du 27 octobre au 21 mars 2002 (D. Cohez, A. Flitti, Y. Kayser, H. Kowalski), ad. pâle, du 12 novembre au 6 février 2002 (D. Combrisson, Y. Kayser, B. Le Brun, M. Zucca), ad. sombre, du 12 décembre au 8 février 2002 (M. Duquet, J.-Y. Frémont, Y. Kayser, B. Le Brun), 1er hiver, 30 décembre (D. Combrisson), subad., du 16 décembre au 25 février 2002 (M. Duquet, J.-Y. Frémont, Y. Kayser, B. Le Brun) ; Le Vigueirat, ad., du 17 novembre au 12 février 2002 (M. Chambouleyron, G. Massez, J.-B. Noguès *et al.*), subad., sans doute celui de l'étang Redon, 8 décembre (M. Chambouleyron).
Landes - St-Martin-de-Seignanx, 1er hiver, phot., du 4 janvier au 4 mars (A. Fossé, A. Guyot, M. Terrasse), 3e hiver probable, du 14 décembre au 27 janvier 2002 au moins (J. Gernigon, P. Grisser).
2000 Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Vigueirat, ad., du 1er novembre au 10 mars 2001 (J.-L. Lucchesi, G. Massez, J.-B. Noguès *et al.*) ; étang Redon et Amphise, ad., du 3 novembre au 11 mars 2001 (A. Bastien, E., G. & S. Durand, A. Flitti, Y. Kayser) et non à partir du 28 novembre (*Ornithos* 9-1 : 9).
2000 Landes - St-Martin-de-Seignanx, 2e hiver, du 26 novembre au 21 janvier 2001 (P. Grisser, A. Guyot), et non le 26 novembre uniquement (*Ornithos* 9-1 : 9).
2000 Marne - Belval-en-Argonne, 1er hiver, du 22 novembre au 25 décembre (C. & R. Riols, J. Varnier), Giffaumont et Outines, le même, du 22 au 25 février 2001 (P. Cabard, Q. Delorme, J. Piette).
1999 Landes - St-Martin-de-Seignanx, 1er hiver, vidéo, du 27 décembre au 17 février 2000 (S. Duchateau, P. Grisser, M. Zucca) et non le 15 février 2000 uniquement (*Ornithos* 9-1 : 9).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). **Difficile de savoir si la réserve de St-Martin-de-Seignanx a accueilli deux ou trois oiseaux immatures depuis 1999 (en dehors de l'adulte observé en 2000). Quoi qu'il en soit, pour les statistiques, seuls les jeunes ont été comptabilisés aussi bien en Camargue que dans les Landes, d'autant que la fidélité aux sites d'hivernage est connue chez cette espèce. À cet égard, une étude récente tendrait à montrer qu'un certain nombre d'hivernants camarguais pourraient provenir de Biélorussie (V. Dombrovski *fide* L. Demongin), principal bastion de la population européenne. Des recherches plus approfondies avec la participation du CHN vont être entreprises, d'autant que la mise en évidence de nombreux cas d'hybridation avec l'Aigle pomarin complique l'identification (L. Demongin *in litt.*).**

FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (71/98) (47/68 - 3/3)

En dehors de la Crau.
Aude - Espézel, imm., 26 août (D. Clément, H. Pic, C. Riols).
Bouches-du-Rhône - Camargue : Fiélouse, mâle ad., 2 mai (M. Narcy).
Hérault - Vendémian, juv., 20 août (M. Duquet).

1989 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, mâle, 7 avril, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 3-4 : 159), à présent refusée après réexamen.
1987 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, mâle, 8 mai, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 3-4 : 159), à présent refusée après réexamen.
1983 Corse-du-Sud - Molini/Porticcio, mâle, 29 mars, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 3-4 : 159), à présent refusée après réexamen.

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). **Le juvénile vu à Vendémian le 20 août ne devait pas venir de très loin...Voir à cet égard la note parue récemment sur la découverte d'une colonie de Faucons crécerellettes dans le département de l'Hérault (*Ornithos* 9-4 : 172). En Crau, la progression se poursuit avec 65 couples (39 en 1999 et 60 en 2000) ayant produit 113 jeunes en 2001 (P. Pilard/LPO Mission FIR).**

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonorae* (321/422) (282/376 - 4/3)

Aude - Brenac, imm., forme claire, 12 septembre (C. Riols) ; Puivert, même ind. probable, 25 septembre (C. Riols).
Hérault - Ceilhes et Rocozels, ad., forme claire, 21 août (F. Legendre).
Hautes-Pyrénées - Puydarrieux, imm., forme claire, 29 et 30 septembre (C. Bergès, V. Ducasse).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). **Dates et départements sans grandes surprises.**

FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (35/35) (28/28 - 0/0)

1995 Corse-du-Sud - Capitello, imm., 3 décembre, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 6-4 : 151), à présent refusée après réexamen.

FAUCON GERFAUT *Falco rusticolus* (17/17) (2/1 - /)

2000 Finistère - Île de Béniguet/Le Conquet , 28 décembre, le même oiseau que sur Ouessant (M. Claise, J.-P. Lafond) et non 30 janvier 2001 (*Ornithos* 9-1 : 10).



10. Marouette de Baillon *Porzana pusilla* juvénile, Vendée, septembre 2002 (B. Perrotin). *Juvenile Baillon's Crake.*

MAROUETTE POUSSIN *Porzana parva* **(223/263) (176/205 - 10/10)**
Bouches-du-Rhône - Le Puy-Ste-Réparade, mâle, 26 mars (M.-C. Martin), fem., 28 mars (M.-C. Martin).
Corse-du-Sud - Ajaccio, fem., 17 mars (B. Recorbet).
Hérault - Villeneuve-lès-Maguelone, mâle ad., 3 juillet (G. Balança, P. Mayet).
Meuse - Trois localités tenues secrètes, mâle ch., 5 mai (P. Millarakis *fide* J. François), mâle ch., 24 et 25 mai, fem. possible, 25 mai (J. François), mâle ch., 14 juin (T. Besançon, D. Combrisson, J. François).
Haute-Savoie - Taninges, mâle ad., phot., 7 avril (J.-F. Desmet).
Vendée - Île de Noirmoutier : Barbâtre, mâle ad., 2 décembre (A. Darras).
2000 Corse-du-Sud - Capitello, fem. du 1er au 9 avril (A. Ledru *et al.*).

(Europe, Asie centrale). **Année qui se situe parfaitement dans la moyenne annuelle (un peu plus de dix individus) depuis la création du CHN. Il faut en outre noter le bon cru lorrain après bien des années de silence (dernière mention en provenance de la Meuse en 1997), et bien sûr cette observation très tardive d'un oiseau début décembre sur l'île de Noirmoutier ; pour mémoire, il existe également une mention du 28 décembre 1964 dans l'Aube et une autre du 23 janvier 1964 en Ille-et-Vilaine (Dubois, Le Maréchal, Olioso & Yésou 2000).**

MAROUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* **(83/114) (40/43 - 1/5)**
Vendée - La Belle-Henriette/La Faute-sur-Mer, jusqu'à 5 juv., du 26 août au 9 septembre (A. Faure, A. Thomas, P. Trotignon *et al.*).
1999 Vendée - La Belle-Henriette/La Faute-sur-Mer, juv., du 15 au 20 août (Y. Barouin, A. Faure).
1998 Corse-du-Sud - Capitello, ad., 22 mars, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 6-4 : 151), à présent refusée après réexamen.
1996 Corse-du-Sud - Capitello, ad., du 27 mars au 8 avril, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 5-4 : 161), à présent refusée après réexamen.
1987 Corse-du-Sud - Capitello, ad., du 7 avril au 24 mai, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 5-4 : 161), à présent refusée après réexamen.

(Europe, Asie centrale, Japon). **La lagune de la Belle-Henriette a connu un franc succès en cette fin d'été, il faut dire que le rendez-vous avec cinq Marouettes de Baillon ne manquait pas d'attrait... même s'il n'y avait plus que deux oiseaux, sortant de plus en plus tardivement de la roselière, à compter du 2 septembre.**

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* **(63/108) (33/76 - 3/1)**
Hérault - Réserve naturelle du Bagnas/Agde, ad., 19 et 20 juillet (R. Dupuy de la Grandrive, F. Valles), le même probablement, 25 octobre (C. Gleize, F. Valles).
Pyrénées-Orientales - Étang de Canet, 2 ad., phot., 20 et 21 août (J. Birard, Y. Kolbeinsson), reproduction : une quinzaine de couples (*fide* Y. Aleman).
1988 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, ad., du 28 février au 7 mai, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 3-4 : 160), à présent refusée après réexamen.
1987 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, 1 ad. au moins, du 27 mars au 18 avril, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 3-4 : 160), à présent refusée après réexamen.

(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). **La population de l'étang de Canet semble stable, toujours pas d'extension prouvée sur l'étang de Salses (*fide* Y. Aleman).**

GLARÉOLE À AILES NOIRES *Glareola nordmanni* **(17/16) (13/11 - 2/2)**
Bouches-du-Rhône – Berre-l'Étang, 25 mai (T. Louvel).
Nord - Petit Denna/Loon-Plage, ad., phot., du 21 août au 16 septembre (P.J. Dubois *et al.*).

(Asie occidentale). **Deux mentions en 2001, c'est bien quand on considère qu'en moyenne moins d'un individu par an est vu depuis 1981. Le séjour prolongé de l'oiseau du Nord a permis à plus d'un observateur d'effectuer le déplacement...**

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* **(23/24) (21/22 - 2/2)**
Finistère - Pointe de la Torche/Plomeur, 4 octobre (G. Rault).
Loir-et-Cher - Étang de l'Arche/Chémery, phot., du 12 au 15 octobre (F. Pelsy, A. Perthuis, A. Pollet).

(Amérique du Nord). **À souligner cette donnée à l'intérieur des terres (Loir-et-Cher) d'un oiseau plus habituellement observé à proximité du littoral, mais il existe une mention antérieure en provenance du Loiret, mitoyen, et une autre de l'Ain, un département plus continental encore.**



11. Vanneau sociable *Vanellus gregarius*, Chabris, Indre, avril 2001 (A. Pertuis). *Adult Sociable Plover.*



12. Glaréole à ailes noires *Glareola nordmanni*, Loon-Plage, Nord, août 2001 (R. Tonnel). *Adult Black-winged Pratincole.*

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva* **(10/10) (10/10 - 3/3)**

Charente-Maritime - Île de Ré : réserve naturelle de Lilleau-des-Niges/Les Portes-en-Ré, ad., du 10 au 27 juillet (M. Thibault *et al.*).
Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, ad., 14 et 16 juin (G. Flohart *et al.*).
Pyrénées-Orientales - Salses, 1er mai (R. Baeta, C. & D. Laloi).
2000 Indre-et-Loire - Rillé, juv., 11 septembre (R. Baeta, N. Issa).
2000 Vendée - Pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., 18 septembre (M. Gaillard, N. Jeandeau).

(Sibérie, Alaska). Trois données en 2001, c'est déjà beaucoup pour cette espèce, mais les deux mentions de 2000 portent à cinq le nombre d'oiseaux vus cette année-là, soit le nombre total enregistré alors en France. Un article a été récemment publié sur cette apparente augmentation des observations de l'espèce dans notre pays (Baeta & Laloi 2002).

PLUVIER BRONZÉ/FAUVE *Pluvialis dominica/fulva* **(9/9) (9/9 - 0/0)**

1996 Corse-du-Sud - Capitello, 15 mars, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 7-4 : 154), à présent refusée après réexamen.

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* **(63/62) (55/54 - 3/3)**

Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas-Thibert, ad., 4 avril (G. Massez).
Indre - Chabris, ad., phot., vidéo, du 2 au 13 avril (F. Pelsy, A. Perthuis).
Saône-et-Loire - Verdun-sur-le-Doubs, ad., 17 mars (J.-M. Frolet).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Trois données traditionnelles de printemps, mais baisse sensible par rapport aux quatre dernières années, où au moins cinq oiseaux avaient été observés (7 en 1999 et 2000).

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* **(14/14) (13/13 - 0/0)**

1994 Vendée - Bouin, 1er été ou ad., phot., 20 août (J.-F. Bousquet).

(Amérique du Nord). Il n'est jamais trop tard pour faire du tri dans ses notes de terrain ou ses photos... la preuve !

BÉCASSEAU D'ALASKA *Calidris mauri* **(4/4) (3/3 - 1/1)**

Vendée - Île de Noirmoutier : Barbâtre, 1er été, phot., 19 avril (O. Penard).

(Amérique du Nord). Première donnée printanière pour ce bécasseau néarctique, et troisième pour la Vendée (sur un total de cinq mentions).

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* **(24/24) (20/20 - 1/1)**

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : St-Philbert-de-Grand-Lieu, juv., du 17 au 27 septembre (S. Reeber).

(Amérique du Nord). **Date classique, mais site plutôt intérieur, ce qui est rare pour ce bécasseau.**

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* **(275/312) (214/236 - 14/14)**

Ain - Pérouges, phot., 29 et 30 avril (G. Bruneau, A. Chabrolle) ; Vescours, juv., 7 et 10 novembre (P. & J.-B. Crouzier, A. Forest).
Charente-Maritime - Île d'Oléron : St-Denis-d'Oléron, juv., du 21 au 24 septembre (P. Trotignon).
Finistère - Goulven, juv., 29 septembre (S. Mauvieux, X. Rozec) ; étang du Pont/Kerlouan, juv., 30 septembre (F. Barrault, J. Maout, X. Rozec).
Loire - Boisset-les-Montrond, juv., 7 septembre (A. & Y. Barouin, A. Faure).
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : St-Philbert-de-Grand-Lieu, juv., du 25 au 29 septembre (S. Reeber).
Manche - Huisnes-sur-Mer, ad. probable, 19 septembre (S. Provost).
Meuse - Lac de Madine/Heudicourt, juv., du 20 au 28 août (D. Combrisson, E. Landragin, R. Lécaille).
Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, ad., 14 juin (G. Flohart *et al.*) ; Ardres, juv., phot., 11 et 12 août (G. Flohart, J.A. Leclercq).
Haut-Rhin - Michelbach, juv., phot., du 15 au 23 septembre (A. Mauss, B. Marconot).
Vendée - St-Denis-du-Payré, ad., du 29 au 31 août (A. Thomas, P. Trotignon) ; Beauvoir-sur-Mer, juv., du 6 au 12 septembre (J.-Y. Frémont, M. Vaslin).
2000 Finistère - Anse du Loc'h/Primelin, juv., 20 septembre (E. Roy).
1998 Vendée - La Guittière/Talmont-St-Hilaire, ad., 26 et 27 septembre (J. Gonin, X. Hindermeyer) et non 2 juv. uniquement, du 21 septembre au 3 octobre (*Ornithos* 6-4 : 153).

(Amérique du Nord, Sibérie). **Les effectifs sont en baisse par rapport aux trois dernières années, mais restent néanmoins supérieurs à la moyenne annuelle, qui affiche un peu moins de douze individus depuis 1981. L'année record 2000 vient encore s'enrichir d'une mention, ce qui porte à 27 le nombre d'oiseaux vus cette année-là.**

13. Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Michelbach, Haut-Rhin, septembre 2001 (B. Marconot). *Juvenile Pectoral Sandpiper.*







14 & 15. Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata*, Pyrénées-Atlantiques, septembre 2001 (J. Gernigon). *Sharp-tailed Sandpiper.*

BÉCASSEAU À QUEUE POINTUE *Calidris acuminata* **(3/3) (2/2 - 2/2)**

Ille-et-Vilaine - Hirel, juv., 21 octobre (R. Jamault).

Pyrénées-Atlantiques - Lac de l'Ayguelongue/Momas, ad., phot., du 16 au 25 septembre (S. Duchateau, A. Guyot *et al.*).

(Sibérie nord-orientale). Et encore deux données en 2001 ! Que se passe-t-il donc avec ce bécasseau asiatique qui ne nous a pas visités pendant 27 ans, après la première mention française de 1972, qui totalise soudain cinq mentions et se montre tous les ans depuis 1999 ? Un oiseau était également présent à cette époque en Espagne et une autre donnée française de mi-septembre est encore à l'étude au CHN... La date de l'oiseau d'Hirel est tardive pour l'Europe.

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* **(145/194) (111/144 - 3/3)**

Bouches-du-Rhône - Camargue : baisse des Cinq-Cents-Francs, 5 août (D. Cohez), phot., 18 et 19 août (J. Birard, Y. Kolbeinsson, M. Zucca).

Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer, 10 mai (O. Girard).

(Europe septentrionale). Petite année avec trois oiseaux seulement, si tant est que celui des 18 et 19 août en Camargue ne soit pas le même que celui du 5 août. Pour mémoire, la moyenne annuelle est d'environ six données pour sept individus depuis 1981. Une mention de ce limicole oriental dans l'Ouest est toujours intéressante.

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* **(139/173) (94/106 - 2/2)**

Finistère - Étang de Nérizélec/Plovan et pointe de la Torche/Plomeur, juv., du 2 au 6 octobre (S. Mauvieux, J.-Y. Péron, G. Rault).

Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, juv., 15 octobre (M. Narcy).

2000 Vendée - St-Denis-du-Payré, du 6 au 8 septembre (J. Gonin, A. Thomas, P. Trotignon, S. Vrignaud).

(Amérique du Nord). Comme 1997 (1 individu), 2001 ne restera pas dans les mémoires... surtout après le cru 2000 qui totalise maintenant quinze oiseaux avec cette nouvelle mention parvenue tardivement au CHN. L'année 2000 égale ainsi 1975 qui détenait jusqu'à présent le record.

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* **(256/303) (29/30 - 1/1)**

Bouches-du-Rhône - Camargue : Fangouse, 18 août (Y. Kayser).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Malheureusement, l'année 2001 ne fait que confirmer le déclin de l'espèce...

CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* **(29/29) (14/14 - 2/2)**
Aube - Assencières, du 4 au 6 juin (S. Paris *et al.*).
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : St-Lumine-de-Coutais, ad., du 4 au 7 juillet (S. Reeber).
(Amérique du Nord). Deux mentions pour cette année, alors que la moyenne depuis 1981 est de moins d'un oiseau par an, ce n'est donc pas si mal.

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* **(96/82) (70/57 - 5/4)**
Bouches-du-Rhône - Camargue : Stes-Maries-de-la-Mer, 30 avril (A. Schrumpf) ; Salin-de-Badon, juv., du 29 août au 4 septembre (D. Cato *et al.*).
Charente-Maritime - Île d'Oléron : Arceau/Dolus d'Oléron, 5 juillet (F. Corre, M.-C. Meesemaecker).
Hérault - Mauguio, 13 mai (Y. Dubois, J. Morinière).
Var - Villepey/Fréjus, phot., 5 août (C. Bury).
2000 Aude - Gruissan, 1 ad., 23 août, 2 ad. 24 et 25 août (D. Clément, B. Dury *et al.*).
2000 Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin-de-Badon, ad., 4 octobre (C. Girard).
1983 Haute-Corse - Tombolo Bianco/Biguglia, 4 septembre, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 6-4 : 156), à présent refusée après réexamen.
(Europe du Nord-Est, Sibérie). En Camargue, seul le juvénile a été comptabilisé. Les deux adultes audois de 2000 sont remarquables.

Limicoles néarctiques

Avec 6 espèces totalisant 22 données pour 22 individus, l'année 2001 se situe plutôt dans le bas du tableau. Il faut remonter à 1994 pour trouver un nombre d'espèces équivalent, et à 1997 pour égaler le nombre de données et d'individus. Pour information, 1993 avait un bilan encore plus médiocre (4 espèces pour 12 données totalisant 14 individus). À l'inverse, soulignons que 2000, année record, a fourni 10 espèces, 48 données et 56 individus (incluant quelques données reçues en 2001). La moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981 est de 7,8 espèces pour 25,2 données et 27,1 individus.

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* **(303/850) (247/766 - 25/84)**
En Mer – Ouessant : 48°52' N/5°07' W , ad., 19 août (D. Gray *et al.*).
Charente-Maritime - Île de Ré : Le Bois-Plage, 1er hiver, trouvé mort, phot., 29 octobre (O. & P. Le Gall).
Manche - Gatteville-le-Phare, 2 juv., 8 septembre (W.R. Turner, D.B. Wooldridge *et al.*) ; juv., 12 septembre (D.B. Wooldridge).
Nord - Digue du Clipon/Loon-Plage, juv., 26 août, 2 juv., 27 août, 4 juv., 1er septembre, 3 ad. et 7 juv., 4 septembre, juv., 5 septembre, 11 juv., 8 septembre, 16 ind., 9 septembre, 6 juv., 10 septembre, 3 juv., 16 septembre, 6 juv., 17 septembre, juv., 20 septembre, 2 juv., 22 septembre, juv., 23 septembre, 4 ind., 31 octobre (J. Boulanger, C. Gruwier, J.A. Leclercq, B. Paepegaey, N. Selosse *et al.*).
Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, 2 juv., 4 septembre (G. Flohart), juv., 9 septembre (P.J. Dubois, G. Flohart, G. Olioso), juv., 12 septembre (G. Flohart), 2 juv., 16 septembre (G. Flohart) ; Oye-Plage, 2 juv., 8 septembre (P.J. Dubois, G. Olioso) ; Blériot, 2 juv., 9 septembre (P.J. Dubois, G. Olioso).
Haute-Saône - Vaivre-et-Montoille, juv., 26 août (D. Lecornu).
2000 Haute-Savoie - Thonon-les-Bains, juv., phot., 27 août (L. Maumary).
(Circumboréal). La digue du Clipon totalise à elle seule 68 individus, mais avec un suivi sans pareil. Cela dit, il s'agit quand même d'une bonne année pour cette espèce.

GOÉLAND ICHTHYAÈTE *Larus ichtyaetus* **(0/0) (0/0 - 0/0)**
1997 Corse-du-Sud - Capitello, 2e hiver, 3 novembre, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 5-4 : 165 & *Ornithos* 6-2 : 95-96), à présent refusée après réexamen.

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* **(23/23) (18/18 - 2/2)**
Loire-Atlantique - Donges, 2e hiver, 22 mars, puis 8 et 9 avril (D. Harel, M. Maillard, D. Raboin).
Vendée - Île de Noirmoutier : Le Luzan/Noirmoutier, ad., phot., 28 août (D. Desmots, M. Vaslin).
1996 Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas-Thibert, 1er hiver, du 4 au 7 septembre (J.-L. Lucchesi, G. Massez, R. Mathevet).
(Amérique du Nord). Cette mouette est annuelle depuis 1998, comme en Vendée d'ailleurs. La donnée camarguaise de 1996 est la première pour le littoral méditerranéen.



16. Goéland railleur *Larus genei*, Borne, Haute-Loire, juin 2001 (A. Giraud). *Adult Slender-billed Gull.*



17. Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, Saint-Renan, Finistère, février 2001 (F. Barrault). *First-winter Ring-billed Gull.*

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (17/33) (14/30 - 2/18)

Jura - Desnes, 17 ad., 13 mai, 1 seul ad., 14 mai (M. Giroud, D. Michelat).
Haute-Loire - Lac de Freycenet/Borne, ad., phot., 13 et 14 juin (A. Giraud).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). **Huit adultes nuptiaux ensemble sur le Léman en 2000, 18 dans le Jura cette année... Ces derniers ont été découverts vers midi dans un groupe de 21 Mouettes rieuses qui arrivaient en vol sur la gravière de Desnes pour s'y reposer. Des groupes plus ou moins importants sont aussi notés régulièrement en Suisse à pareille époque (*Nos Oiseaux* 49/4 : 237).**

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (103/126) (103/126 - 4/4)

En dehors de la Corse.

Aude - Étang de Pissevache/Fleury-d'Aude, 2e été, 28 avril (R. Baeta, C. & D. Laloi).
Pas-de-Calais - Pointe du Riden/Audinghen, ad., 9 mai (B. Brunet).
Pyrénées-Orientales - Étang de Canet/St-Cyprien, ad., 28 septembre (F. Barth).
Haute-Savoie - Port de Séchex/Margencel, juv., 16 août (R. Jordan).

(Circum-méditerranéen). **Quatre données pour quatre oiseaux depuis trois ans. Il faut souligner que le juvénile du lac Léman est le deuxième pour ce site (le précédent, du 6 au 8 septembre 1998, avait déjà été vu par le même observateur !). Cet oiseau, porteur d'une bague colorée, avait été bagué poussin sur l'île de Pianosa en Toscane, Italie. En ce qui concerne l'oiseau du Pas-de-Calais, il n'est pas, bien sûr, sans rappeler celui qui avait séjourné à Boulogne-sur-Mer du 15 juin au 27 août 1995.**

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (230/145) (229/144 - 22/10)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).

Charente-Maritime - Île d'Oléron : La Baudissière/Dolus-d'Oléron, ad., du 3 septembre au 9 mars 2002 (P. Trotignon *et al.*).
Côtes-d'Armor – Langueux, ad., phot., 11 décembre (S. Dulau).
Finistère – Trezmalaouen/Kerlaz, ad., phot., du 13 janvier au 8 février (G. Rault *et al.*) ; St-Renan, 1er hiver*, du 8 janvier au 28 mars (M. Champion), ad., phot., du 30 novembre au 23 février 2002 (A. Audevard, M. Champion, F. & L. Desage, N. Issa, S. Permingeat) ; Ty an Quer/Ploéven, 2 ad.*, 27 février (F. Barrault) ; étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, 2e hiver*, 2 décembre (G. Rault).
Gironde - Arcachon, ad., phot., 27 janvier (A. Fossé), ad., phot., du 30 octobre au 27 mars 2002 (J. Gernigon, F. Jiguet), ad., phot., du 15 novembre au 14 mars 2002 (J. Gernigon, F. Jiguet, J.-C. Sautour), 2e hiver, phot., du 9 décembre au 14 mars 2002 (J. Gernigon, F. Jiguet) ; La Hume/Gujan-Mestras, ad., du 9 décembre au



18. Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, Saint-Renan, Finistère, février 2001 (F. Barrault). *Adult Ring-billed Gull.*



19. Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, Saint-Renan, Finistère, février 2002 (S. Permingeat). *Adult Ring-billed Gull.*



20. Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, Saint-Renan, Finistère, février 2002 (N. Issa). *Adult Ring-billed Gull.*

21 mars 2002 (J. Gernigon, J.-C. Sautour) ; Larros/Gujan-Mestras, ad., du 28 décembre au 24 janvier 2002 (J. Gernigon, F. Jiguet).
Landes - Le Courant-d'Huchet/Moliets, 1er hiver*, 14 décembre (J. Gernigon) ; Capbreton, 2e hiver*, 30 décembre (R. Jordan) ; Mimizan, 2e hiver*, phot., 31 décembre (G. Cadiou, R. Jordan).
Manche- Réville, 1er hiver*, du 3 au 7 mars (A. & V. Verneau *et al.*).
Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., 29 septembre au moins (J.-Y. Frémont, Y. & J.-P. Trévoux).
Pyrénées-Atlantiques - Hendaye, 1er été, phot., du 1er au 12 mai (S. Duchateau, J.-L. Grangé, A. Guyot, A. Nerrière).
Vendée - Île de Noirmoutier : Barbâtre, 2 ind. de 2e hiver*, phot., du 6 juillet au 31 août au moins (J.-Y. Frémont, Y. Trévoux, M. Vaslin *et al.*) ; Barbâtre et Noirmoutier, 1 seul 2e hiver, du 18 octobre au 21 juillet 2002 au moins (D. Desmots, M. Vaslin) ; pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., du 2 au 16 septembre (P.-A. Crochet, A. Thomas, P. Trotignon *et al.*).
2000 Pyrénées-Atlantiques - Hendaye, ad., phot., du 25 au 27 décembre (P.-A. Crochet, S. Duchateau).

(Amérique du Nord). **Avec dix nouveaux oiseaux, 2001 se situe au-delà de la moyenne annuelle depuis 1981 (un peu plus de sept oiseaux). La fidélité de l'espèce aux sites d'hivernage est bien connue, à l'instar des oiseaux du Sud-Ouest, de celui de Pénestin âgé d'au moins 19 ans, ou de ceux de Kerlaz ou de St-Renan.**

GOÉLAND D'AMÉRIQUE *Larus smithsonianus* (5/4) (5/4 - 4/4)

Finistère - Plage du Ris/Douarnenez, 1er hiver, phot., 9 mars (P.J. Dubois, J.-Y. Frémont), 2e hiver, 9 mars (P.J. Dubois, J.-Y. Frémont).
Nord - Loon-Plage, 2e hiver, 16 décembre (J.-Y. Frémont, J.-P. & R. Jordan).
Paris - Jardin des Plantes/Paris (5e), 2e hiver, 7 février (F. Jiguet).

(Amérique du Nord). **L'étude systématique des bandes de goélands associée à une meilleure connaissance des critères d'identification (notamment de la mue chez les grands goélands) permet quelques belles découvertes... À noter que ce goéland vient d'être élevé au rang d'espèce par la CAF (*Ornithos* à paraître).**

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (126/126) (118/117 - 8/8)

Finistère - Le Conquet, 1er hiver, phot., du 23 février au 20 avril au moins (M. Champion, M. Zucca *et al.*) ; île de Sein, 1er hiver, 27 octobre (J.-F. Darras, H. Davière, E. Lapous) ; plage du Ris/Douarnenez, 1er hiver, 3 décembre (G. Rault) ; port de Douarnenez, 1er hiver, phot., du 23 décembre au 1er janvier 2002 (A. Audevard, G. Rault).
Loire-Atlantique - La Turballe, 1er hiver, phot., du 10 février au 25 mars (J.-L. Dourin, Y. Trévoux).
Manche - St-Vaast-la-Hougue, 1er hiver, 4 février (J.-L. Dourin, A. Verneau).
Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 1er hiver, 22 novembre (J. Boulanger).
Vendée - Plage des Présidents/Les Sables d'Olonne, 1er hiver, 13 janvier (D. Desmots).



21. Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*, Douarnenez, Finistère, décembre 2001 (A. Audevard).
First-winter Iceland Gull.

2000 Nord - La Neuville-Thumeries, 1er hiver/1er été, phot., du 24 avril au 5 mai (P. Camberlein, C. Capelle, C. Lebrun), et non jusqu'au 29 avril uniquement (*Ornithos* 9-1 : 19).

(Arctique canadien, Groenland). Bonne année avec huit oiseaux comme en 1998 ; neuf avaient été vus en 2000 et la moyenne depuis 1981 est d'un peu moins de six par an. À noter que le port de La Turballe retrouve enfin l'espèce après une absence de plusieurs années, que la digue du Clipon voit passer son deuxième oiseau (le précédent était du 12 décembre 1999) et que celui de Sein fait partie des rares données d'automne.

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (22/29) (15/14 - 4/3)

Bouches-du-Rhône - Berre-l'Étang, ad., 2 juillet (T. Louvel).
Gironde - Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, fem. ad., baguée couleur, phot., du 15 mai au 8 août (J.-J. Boubert, J. Gernigon, P. Grisser), ad., phot., 2 août (J.-J. Boubert, J. Gernigon).
Manche - Genêts, ad., 31 juillet et 3 août (S. Provost).
1994 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, ad., 20 mai, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 3-4 : 165), à présent refusée après réexamen.

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Comme en 1999 et 2000, la femelle du Banc d'Arguin a couvé dans la colonie de Sternes caugeks *S. sandvicensis* et a donné un jeune hybride volant. Le couple et le poussin ont été capturés et bagués. À noter la présence d'un autre individu de passage sur cette colonie, décidément bien attractive.

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (11/3) (10/2 - 1/1)

Gironde - Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, imm. probable, phot., 20 et 21 juin (J.-J. Boubert, J. Gernigon).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). L'oiseau bagué couleur en 1987 a fréquenté la colonie d'Arguin jusqu'en 1996 inclus, année où un deuxième oiseau fréquentait l'île aux Moutons dans l'archipel des Glénans, Finistère (*Ornithos* 4-4 : 154). Il n'y avait pas eu de nouvelle donnée depuis.

STERNE « À BEC ORANGE » *Sterna bengalensis/elegans*

Bouches-du-Rhône - Berre-l'Étang, imm., 8 août (T. Louvel).
Charente-Maritime - Île de Ré : Les Portes-en-Ré, 15 juillet (A. & A. Chabrolle).

D'après les caractères relevés, l'oiseau des salins de Berre paraît plutôt être une Sterne voyageuse en plumage de transition 1er été/2e hiver, mais un hybride Sterne voyageuse/Sterne caugek ne peut raisonnablement pas être écarté.



22. Sterne voyageuse *Sterna bengalensis*, femelle, Banc d'Arguin, Gironde, juin 2001 (A. Guillemont). *Female Lesser Crested Tern.*



STERNE BRIDÉE *Sterna anaethetus* **(7/7) (7/7 - 1/1)**

Côtes-d'Armor - St-Jacut-de-la-Mer, ad., phot., du 8 août au 1er septembre (Y. Bourgault, J.-Y. Péron, G. Rault, L. Spanneut *et al.*).

(Des Caraïbes à l'Afrique de l'Ouest, Australie). Cette petite station balnéaire du nord de la Bretagne est devenue, le temps d'un été, la dernière destination à la mode... En effet, le séjour prolongé de cette sterne vue en moyenne une fois tous les trois ans en France, a provoqué une belle affluence d'observateurs, dont certains ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour enfin réussir à l'apercevoir...

23. Sterne bridée *Sterna anaethetus*, St-Jacut-de-la-Mer, Côtes-d'Armor, août 2001 (Y. Bourgaut). *Adult Bridled Tern.*

GUILLEMOT À MIROIR *Cepphus grylle* **(42/52) (21/25 - 2/2)**

Finistère - Île d'Ouessant : Créac'h, 31 octobre (P. Crouzier, J.-P. Siblet).
Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, ad., 7 mai (B. Brunet).
2000 Finistère - Île d'Ouessant : Créac'h, 18 septembre (B. Paepegaey).

(Arctique, Atlantique Nord). Les départements concernés sont les mêmes qu'en 2000, mais avec une mention printanière, ce qui est plus rare.

MARTINET DES MAISONS *Apus affinis* **(0/0) (0/0 - 1/1)**

Haute-Corse - Barcaggio, capt., phot., 13 mai (G. Faggio, P. Séliquer *et al.*, *Alauda* 69 : 355-357).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient). Première mention française de ce martinet que l'on attendait depuis quelques années déjà, au regard des observations qui se sont produites en Espagne notamment. Pour information, un Martinet des maisons a été observé quelques jours plus tard en Angleterre, à savoir du 26 au 29 mai dans le Nottinghamshire, donnée qui a été homologuée (Rogers & the Rarities Committee 2002). L'espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la Commission de l'Avifaune Française (*Ornithos* à paraître).

GUÊPIER DE PERSE *Merops persicus* **(6/7) (2/2 - 0/0)**

1998 Corse-du-Sud - Capitello, 17 et 18 septembre, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 6-4 : 161), à présent refusée après réexamen.

ALOUETTE PISPOLETTE *Calandrella rufescens* **(1/1) (0/0 - 1/1)**

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang du Vaisseau, 26 avril (Y. Kayser).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale). Il s'agit là de la deuxième mention française, la précédente concernait un oiseau tué à la chasse près de Bastia, Haute-Corse, en 1906.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* **(221/299) (176/232 - 19/34)**

Ain - Château-Gaillard, 21 avril (A. Bernard).
Bouches-du-Rhône - Tour-du-Valat, 6 ind. au moins, du 18 janvier au 3 mai (Y. Kayser, O. Pineau *et al.*) ; Le Vigueirat/Mas-Thibert, 26 octobre (G. Massez).
Charente-Maritime - Île de Ré : Les Portes-en-Ré, 2 ind., 30 septembre (S. Maison-Haute, M. Thibault) ; St-Clément-des-Baleines, 5 octobre (K.-H. Heyne) ; île d'Oléron : St-Denis-d'Oléron, juv., 19 octobre (M. Caupenne, P. Trotignon).
Finistère - Île d'Ouessant : Ar Reun, Parluc'hen et Le Kun, 3 ind., du 14 au 19 octobre (J.-F. Arcanger, A. Audevard, J. Gonin *et al.*) ; île de Sein, du 18 au 21 octobre (E. Lapous).
Manche - Genêts, 2 ind., 6 janvier (S. Provost), 2 ind. (dont un 1er hiver), du 18 janvier au 25 février (S. Provost), 2 ind., phot., 19 avril (S. Provost), 13 octobre (S. Provost), 5 ind., du 18 au 30 octobre (P. & S. Provost *et al.*) ; Beauvoir, 10 novembre (S. Provost).

Pas-de-Calais - Mont-aux-Loups/Tardinghen, 15 novembre (G. Flohart) ; cap Gris-Nez/Audinghen, juv., du 18 au 24 novembre (C. Capelle, P.J. Dubois, G. Flohart *et al.*).
Pyrénées-Orientales - St-Nazaire, 29 septembre (C. Peignot, J. Terraube).
Vendée - St-Denis-du-Payré, 4 janvier (J. Gonin) ; Bouin, 1er hiver, 24 janvier (J. Gernigon) ; île de Noirmoutier : pointe de Devin, 11 mai (S. Dulau).
2000 Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas-Thibert, 25 octobre et 19 novembre (G. Massez).
1999 Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas-Thibert, 13 octobre et 18 novembre (E. Didner, G. Massez, P. Pilard).
1998 Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas-Thibert, 2 ind., du 29 septembre au 22 novembre (J.-L. Lucchesi, G. Massez, L. Zimmermann).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). **L'année 2001 est un bon cru, même s'il existe quelques incertitudes sur le nombre exact d'oiseaux fréquentant des sites proches, et peut-être aussi sur des individus revenant hiverner. Quoi qu'il en soit, des sites d'hivernage semblent maintenant bien établis (Crau, Camargue, baie du Mont St-Michel) et de nouveaux apparaissent (littoral vendéen, par exemple). La meilleure connaissance de cette espèce par les observateurs et le développement de la recherche des passereaux depuis quelques années expliquent en partie cette dynamique (un peu plus de 4 oiseaux en moyenne entre 1981 et 1993, 26 entre 1994 et 2001 !). Mais le radical et brusque changement intervenu entre 1993 et 1994 est, pour l'instant, difficilement explicable.**

PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* **(7/7) (7/7 - 1/1)**
Pas-de-Calais - Blériot, 14 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, J.-Y. Frémont, S. Nicolle).

(Sibérie, Extrême-Orient). **Le mythe ouessantin (et insulaire !) est enfin tombé pour cette espèce dont les sept précédentes données françaises provenaient toutes de cette île. À noter qu'un oiseau avait séjourné du 2 au 5 octobre à La Haye, aux Pays-Bas (Van der Vliet *et al.* 2002).**

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* **(39/42) (28/29 - 1/1)**
Individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans » :
Doubs - Chaffois, mâle ad., 1er mai (D. Michelat).
1984 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, mâle, 22 avril, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 3-4 : 167), à présent refusée après réexamen.
1983 Corse-du-Sud - Capitello/Porticcio, mâle, 4 avril, mâle 30 avril, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 3-4 : 167), à présent refusée après réexamen.

(Balkans, mer Noire). **Enfin un oiseau qui ose crier sur le territoire français ! Cette sous-espèce, souvent mal identifiée, reste rare en France (un ou deux individus par an en moyenne depuis 1981).**

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* **(9/9) (9/9 - 1/1)**
Doubs - Chaffois, mâle ad., 12 mai (D. Michelat, L. Spanneut).
1996 Corse-du-Sud - Capitello, mâle 1er été, 11 mai, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 5-4 : 167), à présent refusée après réexamen.

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). **Première mention en Franche-Comté (et sur le même site qu'une Bergeronnette des Balkans !) pour cette espèce vue plutôt dans le Midi méditerranéen au printemps ; cet oiseau avait sans doute continué sa route par la vallée du Rhône.**



24. Martinet des maisons *Apus affinis*, Barcaggio, Haute-Corse, mai 2001 (G. Faggio). *Little Swift, the first for France.*





25 & 26. Tarier de Sibérie *Saxicola torquata maura*, Hoëdic, Morbihan, octobre 2001 (A. Mionnet). *Siberian Stonechat.*

TARIER PÂTRE *Saxicola torquata* **(19/19) (15/15 - 2/2)**

Oiseaux présentant les caractéristiques de la race orientale *maura*, appelée « Tarier de Sibérie ».

Morbihan - Île d'Hoëdic, 1er hiver, phot., vidéo, du 14 au 20 octobre (A. Mionnet, F. Noel, F. Pelsy, G. Rault *et al.*).

Pas-de-Calais - Sangatte, 1er hiver, phot., du 20 au 24 octobre (G. Flohart, J.A. Leclercq, S. Nicolle, F. Ruysschaert *et al.*).

(Mer Blanche, Sibérie). Deux oiseaux cette année, c'est plus que la moyenne, qui stagne à moins d'un oiseau par an depuis 1981...

GRIVE DORÉE *Zoothera dauma* **(12/13) (3/3 - 0/0)**

1998 Charente-Maritime - Île de Ré : St-Clément-des-Baleines, phot., 13 octobre (G. Nicot).

(Sibérie centrale et septentrionale). Cette grive, manifestement perdue, a été capturée (et relâchée) par le propriétaire de la maison (située en plein marais) dans laquelle elle venait de pénétrer ! Il s'agit de la troisième mention depuis la création du CHN en 1981, les deux précédentes ayant été enregistrées sur l'île d'Ouessant un 19 octobre (1987 et 1997).

GRIVE OBSCURE *Turdus obscurus* **(11/11) (3/3 - 1/1)**

Finistère - Île de Sein, mâle 1er hiver, phot., 27 octobre (Y. et J.-P. Trévoux *et al.*).

(Sibérie). Belles observations de cette grive qui n'est malheureusement restée qu'un jour sur l'île. La date rappelle celle ayant séjourné du 25 au 29 octobre 1986 sur l'Île d'Ouessant.

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* **(19/19) (19/19 - 1/1)**

Charente-Maritime - St-Seurin-d'Uzet, 2e année, capt., phot., 25 février (B. Bayou).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Date très étonnante, mais d'après l'état du plumage, il pourrait s'agir non pas d'un hivernant, mais d'un oiseau ayant « arrêté » sa mue sur ses quartiers d'hiver pour entreprendre une migration prénuptiale plutôt précoce, et qui se serait égaré à l'ouest (*fide* B. Bayou).

HYPOLAIS PÂLE *Hippolais pallida* **(?/?) (?/? - 1/1)**

Bouches-du-Rhône - Camargue : Piémanson, 22 mai (D. Cohez, Y. Kayser).

(Moyen-Orient). L'Hypolaïs pâle vient d'être subdivisée en deux espèces distinctes par la Commission de l'Avifaune Française, l'Hypolaïs pâle *H. pallida* (Moyen-Orient) et l'Hypolaïs obscure *H. opaca* (Afrique du Nord, Espagne). La révision de toutes les données (quatre données pour quatre individus jusqu'en 2000 inclus, dont deux données pour deux individus depuis la création du CHN en 1981) va être entreprise par

le CHN pour confirmation ou non des deux taxons en France. Cette question sera traitée dans un prochain « *En direct de la CAF* » (*Ornithos* à paraître). Quoi qu'il en soit, la présente mention camarguaise correspond à *pallida* (autrefois sous-espèce *elaeica*), celle de Charente-Maritime devra être reconsidérée en prenant en compte ces nouvelles dispositions taxonomiques.

HYPOLAIS PÂLE/HYPOLAIS OBSCURE *Hippolais pallida/Hippolais opaca* **(?/?) (?/? - 1/1)**

Charente-Maritime - St-Froult, capt., phot., 24 juillet (P. Delaporte).

(Afrique du Nord, Espagne). **Cette donnée sera reconsidérée suivant les nouvelles dispositions taxonomiques (V. ci-dessus).**

HYPOLAIS BOTTÉE *Hippolais caligata* **(4/4) (4/4 - 2/2)**

Finistère - Île d'Ouessant : Arland, du 23 au 25 septembre (R. Baeta, Y. Guermeur, A. Liger *et al.*) ; île de Sein, phot., du 14 au 20 octobre (J.-F. Darras, H. Davière, E. Lapous).

(Iran, Asie centrale, Mongolie). **Deux mentions la même année (sur les îles finistériennes), alors qu'il n'existe que quatre données en France !**

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* **(45/46) (18/18 - 1/1)**

Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, imm., 2 novembre (G. Bruneau, E. Dansette).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). **Donnée tardive mais pas exceptionnelle.**

POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* **(18/18) (16/16 - 2/2)**

Finistère - Ouessant : Ty Crenn, du 7 au 9 septembre (D. Matty, M. Zucca).
Rhône - Millery, 8 août (G. Bruneau).

(De la Baltique à la Sibérie orientale). **La donnée ouessantine est classique, on ne peut pas en dire autant de celle du Rhône (localisation bien sûr, mais aussi date la plus précoce à ce jour !).**

POUILLOT BORÉAL *Phylloscopus borealis* **(9/9) (9/9 - 2/2)**

Finistère – Ouessant : Pount Salaün, Kervasdoué, Parkous, phot., du 6 au 14 octobre (R. Armada, N. Issa, F. Vanhove *et al.*) ; Niou, 14 octobre (H. Dufourny *et al.*).

(De la Scandinavie au Japon et à l'Alaska). **Ouessant engrange deux nouvelles mentions de ce pouillot qui se montre aussi sur d'autres îles du Ponant.**

27. Grive dorée *Zoothera dauma*, St-Clément, Charente-Maritime, octobre 2001 (J.-P. Bonnet). *White's Thrush.*



28. Grive obscure *Turdus obscurus*, mâle 1er hiver, Sein, Finistère, octobre 2001 (J.-P. Trévoux). *Eye-browed Thrush*





29



30



31



32



33

29 à 33. Hypolaïs bottée *Hippolais caligata*, Sein, Finistère, octobre 2001 (J.-F. Darras). *Booted Warbler.*

34. Pouillot boréal *Phylloscopus borealis,* Ouessant, Finistère, octobre 2001 (R. Armada). *Arctic Warbler.*

35. Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus,* Sein, Finistère, octobre 2001 (J.-F. Darras). *Yellow-browed Warbler.*

36. Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita,* Brest, Finistère, décembre 2001 (N. Issa). *Eastern Chiffchaff.*

37. Gobemouche nain *Ficedula parva,* 1er hiver, Sein, Finistère, octobre 2001 (J.-P. Trévoux). *First-winter Red-breasted Flycatcher.*

38. Gobemouche nain *Ficedula parva,* mâle, Sein, Finistère, octobre 2001 (J.-F. Darras). *Adult male Red-breasted Flycatcher.*

39. Gobemouche nain *Ficedula parva,* 1er hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2001 (A. Joris). *First-winter Red-breasted Flycatcher.*



34



35



36



37



38



39



40. Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola*, St-Seurin-d'Uzet, Charente-Maritime, février 2001 (B. Bayou). *Paddyfield Warbler.*

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* **(48/51) (46/49 - 1/1)**

Pas-de-Calais - Blériot, 28 octobre (M. Narcy).
2000 Seine-Maritime - Sommesnil, 19 novembre (Y. Tremauville).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). **L'année 2001 n'est manifestement pas « une année à Pallas » ! Aucun oiseau sur les îles bretonnes, mais celui du Pas-de-Calais a été trouvé dans un lieu propice et à une bonne date. L'observation normande, parvenue tardivement, a été faite à une vingtaine de kilomètres de la côte, en bord de rivière et dans un département curieusement assez inhabituel pour ce genre de pouillot.**

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* **(637/677) (620/660 - 28/29)**

Finistère - Kerlouan, 7 février (N. Issa). Île d'Ouessant : Pount Salaün, 22 septembre (M. Zucca), du 13 au 17 octobre (A. Guyot) ; Toull al Lann, 9 octobre (Y. Guermeur) ; Ar Ger'huel, phot., 13 octobre (J.-P. Paul) ; Stang ar Stiff, du 14 au 19 octobre (Y. Guermeur, S. Mauvieux) ; Pount ar Rodez, 18 octobre (A. Audevard) ; Cost ar Reun, du 21 au 28 octobre (P.-P. Evrard) ; Stang Korz, 21 octobre (A. Audevard) ; Kerdraon, 21 octobre (X. Rozec) ; Arland, du 22 au 25 octobre (P.-P. Evrard) ; Stang Meur, 2 ind., du 17 au 19 octobre (F. Vanhove), 27 et 28 octobre (P.J. Dubois, N. Issa) ; Park Raden, 28 octobre (N. Issa, J.-P. Siblet) ; Stang Bihan, 28 au 31 octobre (P.J. Dubois) ; Stang Porz Gwenn, 30 et 31 octobre (A. Audevard, J.-C. Sautour) ; Poull Brac, du 2 au 4 novembre (P.J. Dubois, G. Flohart) ; Poul Bojer, phot., 4 novembre (M. & S. Zucca) ; Ar Reun, 4 novembre (M. & S. Zucca) ; Porz Arland, du 5 novembre au 31 décembre (Y. Guermeur) ; Ti Crenn, 14 novembre (Y. Guermeur). Île de Sein, phot., 14 octobre (J.-F. Darras, E. Lapous, G. Rault), phot., 18 octobre (J.-F. Darras, H. Davière, E. Lapous), du 22 au 25 octobre (E. Lapous) ; Goulven, du 17 au 20 novembre (N. Issa, S. Mauvieux, L. Spanneut, J.-P. Siblet).
Pas-de-Calais - Audinghen, 13 octobre (G. Flohart).
Rhône - Miribel/Jonage, 30 septembre (G. Bruneau, E. Dansette, A. Renaudier).
Vendée - Bourgenay/Talmont-St-Hilaire, 27 octobre (A. Barsyk, A. Lucas).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). **Au total, 22 oiseaux sur Ouessant, trois sur Sein, mais un seul dans le Pas-de-Calais (!). Quant au Rhône, il accueille son deuxième pouillot sibérien de l'année.**

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* **(25/26) (25/26 - 2/2)**

Finistère - Île de Sein, du 20 au 23 octobre (J.-F. Darras, H. Davière, E. Lapous).
Pas-de-Calais - Blériot, du 20 au 28 octobre (P.J. Dubois *et al.*).
1999 Finistère - Île d'Ouessant : Pount Kam, du 22 au 26 octobre (H. Dufourny, F. Jiguet) et non le 22 octobre uniquement (*Ornithos* 7-4 : 166).

(Asie centrale et septentrionale). **On remarquera bien sûr la concomitance des arrivées ; deux oiseaux, c'était aussi la « production » de 2000, la moyenne étant d'un peu plus d'un oiseau par an depuis 1981.**

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

1 - Individus présentant les caractéristiques du groupe *tristis/fulvescens* (8/10) (5/7 - 3/3)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin-de-Badon, chant, vidéo, 20 et 21 avril (J. Birard, M. Zucca).
Hérault - Capestang, chant, 23 mars (S. Nicolle).
Seine-St-Denis - La Courneuve, chant, 30 mars (G. Fayol, E. Piéchaud).

(Sibérie). **Trois chanteurs ce printemps, c'est bien, puisque le dernier remonte à 1998 (en Camargue). À noter qu'un des observateurs de l'oiseau d'Île-de-France avait déjà trouvé un chanteur le 22 avril 1996 au bois de Boulogne à Paris.**

2 - Pouillots véloces de type sibérien (165/196) (124/133 - 9/9)

Finistère - Île d'Ouessant : Poull Brac, du 29 octobre au 1er novembre (M. Zucca) ; Porz Arland, 5 novembre (Y. Guermeur) ; Stang ar Stiff, 20 novembre (Y. Guermeur). Goulven, 18 et 19 novembre (N. Issa, L. Spanneut *et al.*) ; Guisseny, 18 novembre (N. Issa, J.-P. Siblet, L. Spanneut *et al.*) ; Brest, phot., 3 décembre (N. Issa).
Jura - Desnes, du 20 janvier au 3 février (M. Giroud, D. Michelat), 2 au 11 décembre (M. Giroud).
Vendée - Olonne-sur-Mer, 28 décembre (P. Yésou).
2000 Loiret - Ouzouer-sur-Loire, 3 ind., phot., du 13 décembre au 11 mars 2001 (D. Chavigny).

(Sibérie). **Année qui se situe parfaitement dans la moyenne avec 9 individus. Une mention particulière pour la donnée 2000/2001 du Loiret où l'observateur a assisté à l'hivernage complet de trois oiseaux qui ont exploité, pendant trois mois, 80 m de berges le long d'un ruisseau se jetant dans la Loire.**

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* **(279/296) (225/234 - 13/14)**

Finistère - Île d'Ouessant : Niou Uhella, 1er hiver, phot., du 10 au 12 octobre (A. de Broyer, N. Issa, A. Joris) ; Cost ar Reun, 11 et 12 octobre (S. Mauvieux) ; Arland, 2 ind., 12 et 13 octobre (S. Mauvieux) ; Stang Porz Gwenn, 12 et 13 octobre (D. Combrisson) ; Pount Salaün, phot., 17 au 20 octobre (O. Penard) ; Kadoran, 1er hiver, 20 octobre (N. Issa) ; Poull Brac, phot., du 28 octobre au 1er novembre (N. Issa *et al.*). Île de Sein, 1er hiver, phot., du 13 au 17 octobre (J.-F. Darras, H. Davière, E. Lapous), mâle ad., phot., 21 octobre (J.-F. Darras, E. Lapous), 1er hiver, phot., du 28 au 30 octobre (Y. & J.-P. Trévoux, J.-L. Trimoreau, A. & V. Verneau).
Mayenne - Montigné-le-Brillant, 1er hiver, 15 novembre (J.-F. Arcanger *et al.*).
Morbihan - Île d'Hoëdic, 1er hiver, capt., phot., vidéo, 21 octobre (B. Iliou, F. Pelsy, G. Rault *et al.*).
Pas-de-Calais - Audinghen, 1er hiver, phot., 29 septembre (G. Flohart, J.-P. Siblet).
2000 Finistère – Île de Sein, 1er hiver, 14 octobre (M. Duquet, J.-Y. Frémont, G. Rault *et al.*) ; Île d'Ouessant : Porz Milin, 1er hiver, 26 octobre (M. Champion, F. Le Guen).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). **L'observation d'un mâle adulte cette année sur Sein (comme cela avait déjà été le cas à l'automne 2000 sur Hoëdic), est toujours un événement. Autre événement : cet oiseau tardif de Mayenne qui a été observé une grande partie de la journée dans le propre jardin d'un « ornitho » ! La donnée de l'île de Sein de 2000 semble se rapporter à un oiseau de la race *albicilla*, appelée « Gobemouche de la taïga », taxon qui pourrait prochainement être élevé au rang d'espèce. Toutefois, en l'état actuel des connaissances sur ce sujet, le CHN a préféré, pour l'instant, ne pas valider l'identification subspécifique, même s'il lui a accordé un certain crédit. Une note sur cette observation a récemment été publiée dans *Ornithos* (Duquet & Frémont 2002).**

PIE-GRIÈCHE BRUNE *Lanius cristatus* **(1/1) (1/1 - 0/0)**

2000 Morbihan - Île d'Hoëdic, ad., 24 octobre (E. Gfeller, Y. Kayser, A. Larousse, G. Rault).

(Asie centrale jusqu'à la Chine et au Japon). **Première française pour cette pie-grièche dont un individu avait été observé à Fair Isle (îles Shetland)... trois jours plus tôt (Rogers & the Rarities Committee 2001) ! Cette espèce (et la sous-espèce *cristatus* à laquelle appartenait l'oiseau d'Hoëdic) a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la Commission de l'Avifaune Française (*Ornithos* à paraître).**

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* **(82/126) (60/83 - 18/46)**

Hautes-Alpes - La Piarre/Serres, ad., phot., 31 mai (O. Tourillon).
Alpes-Maritimes - Fréjus, 6 ad., phot., 27 mai, 2 ad., phot., 4 juin (C. Bury) ; Cipières, ad., 29 mai (A. Larousse).
Bouches-du-Rhône - Cassis, 17 ad., 26 mai (A. Faralli, R. Turetta) ; Alleins, 4 ind. au moins, 30 mai (A. Flitti) ; Camargue : Grand-Badon, 1er été, 5 août (P.-A. Crochet, A. Johnson) ; Tour-du-Valat, imm., 25 octobre (M. Bossaert *et al.*).
Charente-Maritime - Île de Ré : St-Clément-des-Baleines, 1er été, 3 mai (D. Lecompte *et al.*), le même, du 20

au 29 juillet (M. Thibault *et al.*) ; île d'Oléron : pointe de Chassiron/St-Denis-d'Oléron, juv., du 26 octobre au 5 novembre (M. Caupenne, P. Trotignon).
Finistère - Île de Sein, juv., 29 août (S. Mauvieux) ; île d'Ouessant : Porz-Doun, ad., vidéo, du 4 au 8 septembre (M. Förschler, A. Hachenberg), 2 juv., du 12 au 19 septembre, puis 1 seul jusqu'au 24 septembre (M. Förschler, A. Hachenberg *et al.*), Kéridreux, juv., 19 et 20 septembre au moins (M. Zucca *et al.*).
Morbihan - Île d'Hoëdic, juv., du 16 septembre au 1er octobre (G. Rault *et al.*).
Var - Hyères, ad., 1er juin au moins (J.-G. Robillard).
Vaucluse - Monieux, 4 ad., 26 mai (D. Gobbo, O. Peyre *et al.*).
2000 Bouches-du-Rhône - Camargue : Fiélouse, 2 ind., 26 mai, 14 ind., phot., 30 mai (A. Criado, C. Girard *et al.*) ; Boisverdun, 2 juv., 27 septembre (Y. Kayser).
2000 Finistère - Île d'Ouessant : Pern, juv., 23 septembre (S. Mauvieux).
2000 Hauts-de-Seine - Colombes, ad., phot., du 31 décembre au 22 février 2001 (C. & P. Decaix, P.J. Dubois *et al.*).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). L'afflux d'Étourneaux roselins signalé au printemps 2001 en Bulgarie et en Roumanie (1 200 individus à Histria, delta du Danube à la fin mai ; Lajos Nèmeth *in litt.*) a largement débordé sur les pays d'Europe de l'Ouest comme l'Italie et la France, mais la Suède et l'Angleterre ont également été touchées. À noter la concomitance des pics observés dans les Balkans et des dates de l'afflux signalé dans le sud-est de la France, ce qui corrobore le caractère invasionnel du phénomène (par exemple, 3 500 individus filant plein ouest en quatre heures au cap Kaliakra, Bulgarie, le 28 mai 2001, obs. pers.). Par ailleurs, dans les données de 2000 parvenues tardivement, celle de Camargue avec un groupe de 14 oiseaux confirme le caractère invasionnel déjà noté ailleurs en Europe cette année-là. Sur l'île d'Ouessant, la donnée de Pern vient s'ajouter à celle d'un autre individu présent à Kéjou à la même époque (*Ornithos* 9-1 : 26). Enfin, l'hivernage complet d'un oiseau adulte dans un jardin privé de la proche banlieue parisienne, est remarquable.

VIRÉO À ŒIL ROUGE *Vireo olivaceus* (7/7) (7/7 - 2/2)

Finistère - Île d'Ouessant : Poull Brac, juv., du 9 au 13 octobre (D. Combrisson, G. Fresne *et al.*) ; Cost ar Reun, juv., phot., 21 octobre (N. Issa *et al.*).

(Amérique du Nord). C'est la deuxième fois (après 1988) que deux oiseaux sont vus la même année sur l'île d'Ouessant, qui fournit l'ensemble des données françaises de l'espèce. En outre, ce sont les premières photos qui en sont prises en France.

41 & 42. Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus*, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 2001 (A. Joris). *Juvenile Red-eyed Vireo.*







43. Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus*, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 2001 (N. Issa). *Juvenile Red-eyed Vireo.*



44. Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*, 1er hiver, Sein, Finistère, octobre 2001 (G. Rault). *First-winter Scarlet Rosefinch.*

ROSELIN GITHAGINE ***Rhodopechys githaginea*** **(7/7) (7/7 - 0/0)**

2000 Bouches-du-Rhône - Arles, mâle ad., 11 novembre (J.-P. Paul).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Cette mention d'un oiseau observé à l'embouchure du Rhône est intéressante, car elle est peut-être à rattacher au petit afflux qui s'est produit d'août à octobre en Sicile (A. Corso *in litt.*).

ROSELIN CRAMOISI ***Carpodacus erythrinus*** **(130/163) (115/148 - 11/12)**

NB : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d'un astérisque (*).

Finistère - Île d'Ouessant : Stang Meur, juv. probable, 12 octobre (B. Volet) ; Prad Meur, juv., 18 octobre (B. Helsens, F. Portier) ; île de Sein, juv., phot., 27 et 28 octobre (G. Rault, J.-L. Trimoreau, Y. & J.-P. Trévoux, A. & V. Verneau).

Jura - Les Rousses, mâle chant., 24 mai (P. Crouzier).

Morbihan - Île d'Hoëdic, juv., vidéo, du 18 au 23 octobre (F. Pelsy, G. Rault *et al.*).

Pas-de-Calais - Herlen/Wissant, 1 couple nicheur* (mâle rouge), 1 mâle gris chant.*, du 3 juin au 8 juillet, 1 juv. volant* (nourrissage), 4 juillet (C. Capelle, G. Flohart, A. Govaere *et al.*) ; Tardinghen : dunes du Châtelet, mâle gris*, de début juin à mi-juillet (G. Flohart, D. Tirmarche), marais de Tardinghen, 1 couple nicheur*, de mi-juin à mi-juillet, 1 jeune volant*, 16 juillet (G. Flohart).

2000 Doubs - Bonnétage, mâle chant*, 7 juin (N. Jeannot, J. Michel).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Les dernières observations en période de reproduction remontaient à 1998 pour le Haut-Doubs et le Pas-de-Calais. La donnée de 2000 parvenue tardivement ne doit pourtant pas nous rendre optimistes, puisque malheureusement, à nouveau, aucun chant de Roselin cramoisi n'est venu rompre le silence de ce département en 2001, et le département voisin du Jura n'est guère mieux loti. En revanche, un sursaut est à noter sur la côte d'Opale avec deux couples nicheurs ayant produit chacun au moins un jeune à l'envol.

BRUANT À CALOTTE BLANCHE ***Emberiza leucocephalos*** **(26/31) (12/17 - 1/1)**

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas de L'Auricet, mâle imm. probable, phot., 29 décembre (J.A. Leclercq, X. Vandevyvre).

(Sibérie). Un seul oiseau observé un seul jour cet hiver sur le site désormais devenu traditionnel de Camargue : que faut-il en penser ? S'agissant apparemment d'un immature, il a été comptabilisé.



45. Bruant nain *Emberiza pusilla*, Ouessant, Finistère, octobre 2001 (O. Penard). *Little Bunting.*

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* **(72/76) (59/61 - 1/1)**

Bouches-du-Rhône – Camargue : Mas de L'Auricet, du 22 décembre au 5 janvier 2002 (A. Flitti, Y. Kayser *et al.*).
Finistère - Île d'Ouessant : Arland, phot., du 14 au 20 octobre (J.-P. Paul, O. Penard, S. Reeber et al.).
1999 Corse-du-Sud - Capitello, 3 ind., 6 février, 1 seul le 7 février, 2 ind., le 13 février, donnée précédemment acceptée (*Ornithos* 7-4 : 169), à présent refusée après réexamen.

(Scandinavie, Asie septentrionale). **Petite année avec un oiseau sur Ouessant (bien qu'une autre observation soit encore à l'étude), et le même hivernant de Camargue (quatre hivers consécutifs !) qui n'a donc pas été comptabilisé.**

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* **(63/72) (47/53 - 5/8)**

Alpes-de-Hautes-Provence - Plateau de Valensole/Puimoisson, mâle ad., 3 juillet (M.-C. Martin).
Hautes-Alpes - Le Lauzet/Monestier-les-Bains, mâle ad., phot., du 9 au 28 juillet (J.-P. Delapré, F. Pouzergues).
Alpes-Maritimes - Cipières, 1 couple (produit 4 juv.) et 1 mâle, phot., du 6 juin au 14 juillet (A., C., F., Chapalain, D. & J.-L. Dupuy)
Var - La Mourotte/La Verdière, 2 mâles ad. et 1 fem., phot., du 14 mai au 15 juillet (J.-P. Paul, T. Perrier *et al.*).
2000 Alpes-Maritimes - Cipières, 1 couple (produit 3 juv.), phot., du 6 juin au 16 juillet (D. & J.-L. Dupuy), mâle 1er été, du 15 juin au 13 juillet (D. & J.-L. Dupuy).
2000 Aude - Rennes-le-Château, mâle, 4 juin (Y. Roullaud).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). **Le sud-est de la France continue à être colonisé ! Le couple de Cipières a de nouveau élevé des jeunes en 2001 (Dupuy *et al.* 2002), après la première nidification française réussie en 2000 (Dupuy & Dupuy 2000). En revanche, la tentative de nidification du Var, en bordure de route, a échoué par suite du fauchage de la zone (E. Durand *in litt.*). La donnée d'un mâle chanteur en 2000 dans l'Aude est-elle un signe supplémentaire ? Signalons que le deuxième mâle chanteur de Cipières en 2001 ne serait pas le même oiseau que celui de l'année précédente (chant différent) ; bien que le doute subsiste, il a donc été comptabilisé.**



46. Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala*, Le Lauzet, Hautes-Alpes, juillet 2001 (J.-P. Delapré). *Black-headed Bunting.*

ANNEXE 1 - ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* **(53/66) (36/37 - 5/17)**
Aude - Port-la-Nouvelle, ad., 27 avril (A. Mauss).
Hérault - Capestang, ad., 18 avril (S. Nicolle) ; Marseillan, 13 ad., phot., 26 décembre (J. & M.-P. Peleus).
Moselle - Lindre-Basse, imm., phot., 9 et 10 mai (G. Blaising, B. Chasse, M. Hirtz).
Seine-Maritime - Sandouville, ad., 16 septembre (P. Poiré).
1999 Marne - Lac du Der/Arrigny et Outines, 3 ad., du 26 septembre au 2 octobre (E. Le Roy, C. Riols *et al.*) et non le 2 novembre (*Ornithos* 7-4 : 170).
(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). **Bien sûr, ce vol de 13 oiseaux a de quoi surprendre, mais l'époque ne plaide pas en faveur d'oiseaux sauvages en déplacement.**

OIE DES NEIGES *Anser caerulescens* **(52/199) (19/42 - 0/0)**
2000 Marne - Lac du Der : Arrigny, Giffaumont-Champaubert, Outines, ad., phot., du 18 octobre au 3 mars 2001 (P. Bourguignon, P. Crouzier, M. Guindollet, E. Le Roy *et al.*).
(Amérique du Nord, Groenland, Sibérie orientale). **Cet oiseau a permis à un certain nombre d'observateurs de se consoler d'avoir « raté » l'Oie naine *Anser erythropus* hivernant sur le secteur (*Ornithos* 9-1 : 5).**

HARLE COURONNÉ *Lophodytes cucullatus* **(9/9) (9/9 - 4/5)**
Bouches-du-Rhône - Camargue : Roquemaure, fem./imm., 18 et 19 décembre (A. Blasco, Y. Kayser, J. Walmsley *et al.*).
Finistère - Étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, fem., 11 décembre (A. Desnos, G. Rault).
Loir-et-Cher - Naveil, mâle et fem., phot., du 22 mars au 2 avril (A.-M. & P. Gasselin, A. Perthuis).
Haut-Rhin - Mulhouse, juv., phot., du 15 au 26 septembre (A. Mauss).
2000 Territoire-de-Belfort - Felon, fem./juv., du 25 juin au 2 juillet (J.-M. Gatefait) et non le 25 juin uniquement (*Ornithos* 9-1 : 29).
(Amérique du Nord). **Si l'origine du couple observé dans le Loir-et-Cher est plus que douteuse, il est quand même permis de se demander si ceux de décembre et le juvénile de septembre ne sont pas arrivés par leurs propres moyens. À cet égard, rappelons qu'une femelle a été observée en février 2001 aux Açores en compagnie d'un Canard carolin *Aix sponsa* et d'un Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus* (*Birding World* 14-4 : 149).**



47. Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus*, Lindre-Basse, Moselle, mai 2001 (B. Chasse). *Immature White Pelican.*



48. Grue demoiselle *Anthropoides virgo*, adulte, Garancières-en-Beauce, Eure-et-Loir, septembre 2000 (D. Thierry). *Escaped Demoiselle Crane.*

GRUE DEMOISELLE *Anthropoides virgo* **(14/16) (7/7 - 0/0)**

2000 Eure-et-Loir - Garancières-en-Beauce, ad., phot., 23 septembre (D. Thierry).

(De la Turquie au nord de la Chine, Maroc). Peu de doute quant à l'origine de cet oiseau peu farouche, porteur d'une bague métallique à la patte gauche...

GOÉLAND DOMINICAIN *Larus dominicanus* **(1/1) (1/1 - 0/0)**

1995 Paris - Jardin des Plantes/Paris, ad., phot., janvier (F. Jiguet).

(Sur les côtes de tous les continents de l'hémisphère Sud). Il s'agit de la première observation française de ce goéland. Bien entendu sa présence en France est déjà étonnante, mais le lieu de sa découverte est déconcertant ! Si l'on excepte cette donnée, l'espèce a été observée pour la première fois dans le Paléarctique occidental le 23 avril 1997, dans le parc national du Banc d'Arguin en Mauritanie (Pineau *et al.* 2001), mais sa présence régulière dans l'Atlantique Nord est désormais prouvée (Jiguet *et al.* 2001). Cet oiseau appartenait à la sous-espèce *vetula* d'Afrique du Sud.



49. Goéland dominicain *Larus dominicanus*, adulte, Paris, janvier 1995 (F. Jiguet). *Adult Kelp Gull.*

2000

Puffin semblable *Puffinus assimilis* - En mer - Iroise - 47°34' N/5°10' W - 21 août ; Cantabrico ou Rochebonne - 1 ind., 30 août, 1 ind., 31 août.
Buse variable *Buteo buteo* - Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » : Manche - Doville - 26 novembre.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Pyrénées-Orientales - Tautavel - juv., 26 décembre.
Aigle criard *Aquila clanga* - Haute-Saône - Froideconche - 10 janvier.
Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* - Puy-de-Dôme - Plauzat - ad., forme claire, 12 septembre.
Faucon gerfaut *Falco rusticolus* - Territoire-de-Belfort - Auxelles-Bas - 27 janvier.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Finistère - Brignogan - ad., 9 septembre ; Ouessant : Créac'h, juv.?, 28 septembre.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Loiret - Orléans - ad., 31 décembre.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Manche - Marchesieux - 2 ind., 7 janvier.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg* appelée « Bergeronnette des Balkans » : Marne - Lac du Der/Giffaumont-Champaubert - mâle ad., 22 avril.
Pouillot de Schwarz *Phylloscopus schwarzi* - Manche - Doville - 26 novembre.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* - Ardennes - St-Germainmont - 17 décembre.
Gobemouche à demi-collier *Ficedula semitorquata* - Haute-Corse - Canna-Gradugine - mâle, 12 avril (*Alauda* 68 : 312).
Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* - Manche - Ducey - mâle, 20 février.

1999

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* - Finistère - Sizun - fem. ad., 1er octobre.
Bécasseau de l'Anadyr *Calidris tenuirostris* - Pyrénées-Orientales - Barcarès - ad., 15 août.
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* - Manche - Beuzeville-la-Bastille - juv., 18 septembre.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Manche - Brevands - 2 décembre.
Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* - La Belle-Henriette/La Faute-sur-Mer - juv., 18 août.
Tarier pâtre *Saxicola torquata* - Individu présentant les caractéristiques de la race orientale *maura*, appelée « Tarier de Sibérie » : Manche - Dragey - mâle, phot., 21 juin.

1998

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* - Finistère - Ouessant : Cost ar Reun - 2 novembre.
Goglu des prés *Dolichonyx oryzivorus* - Manche - Carolles - 30 août.

1997

Pipit de Richard *Anthus richardi* - Hérault - Vic-la-Gardiole - 8 mai.

1990

Oie des neiges *Anser caerulescens* - Aude - Rieux-Minervois - ad., 15 décembre.

1985

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* - Individu présentant les caractéristiques d'une race orientale du groupe Fauvette babillarde *Sylvia [curruca]* : Calvados - Caen - capt., phot., du 6 au 10 mars.

Annexe 3 - Catégorie E

Figurent ici des espèces qui n'entrent ni dans la Liste des Oiseaux de France ni dans la catégorie D, pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace pour le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour.

• **Flamant nain** *Phoenicopterus minor* - Loir-et-Cher, St-Claude-de-Dirax, phot., du 29 mai au 9 juin (J.-J. Courthial, A. Perthuis) ; 1997 Manche, Dragey, ad., phot., 12 juin (I. Bruneau, S. Provost).

• **Bernache du Canada** *Branta canadensis* - Individus présentant les caractéristiques des races *minima/hutchinsi* : Charente-Maritime - Moëze, 3 ind., du 20 janvier au 24 mars (P. Trotignon, équipe LPO-Moëze).

Le CHN demande aux observateurs de « petites » Bernaches du Canada d'être le plus précis possible dans leurs descriptions se rapportant à ce type d'oiseau (taille par comparaison aux autres bernaches, forme de la tête, taille du bec et du cou, présence d'un collier à la base du cou, couleur des parties inférieures, notamment).

ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui subsiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.
Note importante : les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée sont fournies aux observateurs ayant joint une enveloppe timbrée à leur adresse et demandant à être informés de la décision du CHN.

2001

Plongeon à bec blanc *Gavia adamsii* - Drôme - Loriol - 24 février.
Océanite de Swinhoe *Oceanodroma monorhis* - Nord - Loon-Plage- 31 août.
Canard à front blanc *Anas americana* - Moselle - Argancy - mâle ad., 14 janvier.
Élanion blanc *Elanus caeruleus* - Territoire-de-Belfort - Belfort - 21 octobre.
Busard pâle *Circus macrourus* - Haute-Corse - Biguglia - fem. ad., 25 avril.
Buse variable *Buteo buteo* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » : Hautes-Alpes - Upaix - 23 mars.
Buse féroce *Buteo rufinus* - Aube - Brienne-le-Château - 3 mars. Bouches-du-Rhône - Camargue : Amphise - ad.?, 12 novembre.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Loir-et-Cher - Lignières - mâle, 1er février. Val-d'Oise - juv. ou imm., du 30 mars au 1er avril.
Aigle criard *Aquila clanga* - Eure - marais Vernier - 30 juillet.
Faucon crécerellette *Falco naumanni* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Fiélouse - fem. probable, 2 mai.
Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* - Ariège - Ascou-Pailheres - 1er été., 15 août. Aude - Roquefeuil - 2 ind. de 1er été, forme claire, 25 août.
Faucon lanier *Falco biarmicus* - Pyrénées-Orientales - Salses - juv. ou imm., 10 février.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Villeneuve - 24 avril.
Glaréole à ailes noires *Pas-de-Calais* - Audinghen - ad., phot., 29 et 30 octobre.
Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* - Finistère - Ouessant : Stang Porz Gwen - juv., 11 octobre.
Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla* - Finistère - Ouessant : Porz Doun - 17 septembre.
Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* - Lot-et-Garonne - La Mazière/Villeton - 18 octobre.
Bécassine double *Gallinago media* - Marne - Lac du Der/Ste-Marie-du-Lac-Nuisement - 11 octobre.
Chevalier bargette *Tringa cinerea* - Bouches-du-Rhône - Camargue : étang du Grand Rascaillan - 2 ad., 18 juillet.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Finistère - Ouessant : Kadoran - juv., 13 septembre. Bas-Rhin - Rohrschollen/Strasbourg - imm., 27 août. Vendée - Les Sables-d'Olonne - ad.?, 26 septembre.
Mouette atricille *Larus atricilla* - Finistère - Goulven - juv./1er hiver, 28 septembre. Vendée - Beauvoir-sur-Mer - ad., 13 octobre.
Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia* - Seine-et-Marne - Annet-sur-Marne - 1er été, 1er mai.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Charente-Maritime - Île de Ré : phare des Baleines - ad., 4 mars. Gironde - Audenge - 2 ad., 18 décembre. Loire-Atlantique - Batz-sur-Mer - 1er hiver, 28 octobre.
Sterne élégante *Sterna elegans* - Vendée - Île de Noirmoutier : Noirmoutier-en-l'Île - ad., 3 août.
Sterne de Forster *Sterna forsteri* - Vendée - Les Sables-d'Olonne - imm., 13 août.
Coucou oriental *Cuculus saturatus* - Bouches-du-Rhône - Crau : Entressen - 26 avril.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans » : Aude - Narbonne - mâle ad., 7 mai. Bouches-du-Rhône - Le Puy-Ste-Réparade, mâle ad., 1er avril. Jura - Desnes - mâle ad., 8 et 9 mai.
Rossignol progné *Luscinia luscinia* - Jura - Desnes - ad.?, du 22 au 26 septembre. Lot-et-Garonne - La Mazière/Villeton - capt., phot., 1er septembre.
Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* - Individu présentant les caractéristiques de la race *magna* : Lot-et-Garonne - La Mazière/Villeton - capt., phot., 17 septembre.
Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* - Morbihan - Erdeven - fem./mâle imm., 25 juillet.
Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* - Individu présentant les caractéristiques de la race orientale *samamisicus* : Haute-Marne - Liffol-le-Petit - mâle, phot., du 25 au 29 octobre.
Grive dorée *Zoothera dauma* - Doubs - Noël-Cerneux - chant., 28 mai.
Locustelle fluviatile *Locustella fluviatilis* - Loire-Atlantique - Le Massereau/Frossay - juv., capt., phot., 20 août.
Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* - Landes - Tarnos - 2 novembre.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* - Finistère - Ouessant : Poull Brac - 1er novembre ; Cost ar Reun - 4 novembre.
Gobemouche nain *Ficedula parva* - Haut-Rhin - Hohrodberg - mâle, 2 septembre.
Mésange azurée *Parus cyanus* - Jura - Port-Lesney - 10 ad., 21 février.
Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus* - Drôme - Dieulefit - 6 juillet.

REMERCIEMENTS

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 2001, ont contribué à son bon fonctionnement :
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière nécessaire au Comité et à son Secrétariat, ainsi que la revue *Ornithos* pour la prise en charge des photos en couleurs qui illustrent ce rapport ;
- Carl Zeiss Division Jumelles pour le soutien apporté à la publication du rapport annuel ;
- Aurélien Audevard, Luc Barbier, Christian Dronneau, Philippe J. Dubois, Guy Flohart, Pascal Grisser, Yvon Guermeur, Yves Kayser, Robert Lécaille, Emmanuel Le Roy, Dominique Michelat, Georges Olioso, Sébastien Reeber, Christian Riols, Maxime Zucca qui nous ont apporté des informations complémentaires ainsi que tous les responsables de Centrales Ornithologiques, de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) ou Départementaux (CHD) qui nous ont transmis des données ;
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

• BAETA R. & LALOI D. (2002). Réflexions sur une augmentation récente des observations de Pluviers fauves *Pluvialis fulva*. *Ornithos* 9-3 : 109-111.
• DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P. (2000). *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan, Paris.
• DUPUY D. & DUPUY J.-L. (2000). Premier cas de nidification du Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* en France en 2001. *Ornithos* 9-2 : 85.
• DUPUY D., DUPUY J.-L. & CHAPALAIN C. (2000). Nouvelle nidification du Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* en France (Alpes-Maritimes). *Ornithos* 7-4 : 174-179.
• DUQUET M. & FRÉMONT J.-Y. (2002). Un Gobemouche de la taïga *Ficedula parva albicilla* sur l'île de Sein ? *Ornithos* 9-5 : 216-217.
• JIGUET F., JARAMILLO A. & SINCLAIR I. (2001). Identification of Kelp Gull. *Birding World* 14-3 : 112-125.
• LAPOUS E. (2002). Séjour prolongé d'un Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* en France (Sarthe). *Ornithos* 9-2 : 60-64.
• PINEAU O., KAYSER Y., SALL M., GUEYE A. & HAFNER H. (2001). The Kelp Gull at Banc d'Arguin - a new Western Palearctic bird. *Birding World* 14-3 : 110-111.
. ROGERS M.J. & THE RARITIES COMMITTEE (2001). Report on rare birds in Great Britain in 2000. *British Birds* 94-10 : 452-504.
. ROGERS M.J. & THE RARITIES COMMITTEE (2002). Report on rare birds in Great Britain in 2001. *British Birds* 95-10 : 476-528.
. VAN DER VLIET R.E., VAN DER LAAN J. & CDNA (2002). Rare birds in the Netherlands in 2001. *Dutch Birding* 24-6 : 325-349.

SUMMARY

Rare birds in France in 2001. *Two new species were added to the French List in 2001: Fea's Petrel/Zino's Petrel* Pterodroma feae/madeira *and Little Swift* Apus affinis. *In addition, the first Brown Shrike* Lanius cristatus *for France was accepted in 2000. Also included in 2001 was the second record of Lesser Short-toed Lark* Calandrella rufescens *for France while two Booted Warblers* Hyppolais caligata *were seen on the isles of Finistère and two Red-eyed Vireos* Vireo olivaceus *on the Isle of Ouessant. Record numbers noted in 2001 included a total of 46 Rosy Starlings* Sturnus roseus. *Belatedly, 1995 also included the first Kelp Gull* Larus dominicanus *(Category D) for France.*
The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of French records and individuals (excluding 2001) ; the second pair relate the same thing for the period 1981-2000 ; the last pair relate to the current year (i.e. 2001).

Jean-Yves Frémont, Secrétariat du CHN, 58 rue Laugier, 75017 Paris
Comité d'Homologation National c/o LPO, La Corderie Royale, BP 263, 17305 Rochefort Cedex

ZEISS

Le rapport annuel du Comité d'Homologation National (CHN) est publié avec le soutien de Carl Zeiss Division Jumelles