



Les oiseaux rares en France en 2002



Rapport du Comité d'Homologation National

Jean-Yves Frémont & le CHN

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous apprenons avec tristesse le décès de notre ami Gaël Rault, membre du CHN depuis deux ans et demi, à qui nous dédions ce rapport...

Ce 21^e rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 2002. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 2002 est de 459 (507 en 2001). Le taux d'acceptation atteint 83,2 %, chiffre sensiblement supérieur à celui de 2001 (82,6 %). En 2002, Serge Nicolle qui achevait son second mandat a été remplacé par Amine Flitti. Pierre Crouzier et Jean-Yves Frémont sont pour leur part reconduits respectivement dans leurs fonctions de Président et de Secrétaire du CHN. En 2002, le CHN était donc composé des membres suivants : Yvon Créau, Pierre Crouzier (président), Marc Duquet, Amine Flitti, Guy Flohart, Jean-Yves Frémont (secrétaire), Yves Kayser, Dominique Michelat et Gaël Rault. Un poste a été pourvu en 2003 et un autre doit l'être en 2004. Les candidats sont priés de se faire connaître auprès du Secrétaire du CHN avant le 1^{er} mai 2004.

TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CHN

Dans le cadre d'études de dossiers de plus en plus complexes en matière d'identification, les échanges avec des spécialistes internationaux s'intensifient. C'est ainsi que le CHN est régulièrement sollicité par certains représentants de comités étrangers, mais qu'il a également consulté certains experts au cours de l'année 2002 (V. remerciements en fin de rapport).

Dans le même ordre d'idée, mais aussi pour le suivi d'une bonne harmonisation des procédures de fonctionnement entre comités d'homologation (33 pays représentés), la réunion de l'AERC (*Association of European Records and Rarities Committees*) s'est tenue du 27 au 31 août 2003 en Roumanie (M. Duquet représentait le CHN et *Ornithos*, P.J. Dubois, la CAF).

En ce qui concerne l'homologation des Pouillots véloces « *tristis* » et de type sibérien, il est rappelé que la position du CHN est volontairement restrictive et prudente, celle-ci ayant pour objet de ne valider que les données d'oiseaux les plus typiques, seules attribuables dans les conditions actuelles de connaissances à l'une des deux catégories retenues (V. aussi à cet égard la note parue dans *Ornithos* sur le chant automnal d'un Pouillot véloce de la sous-espèce *tristis* ; Laloï & Sibley 2003).

Un débat constructif s'est également tenu autour de la présentation d'une observation de bécasseau à pattes jaunes, à l'origine considéré comme un Bécasseau minuscule *Calidris minutilla*. Les recherches et consultations engagées sur cette question ont permis de montrer qu'il s'agissait en réalité d'un Bécasseau minute *Calidris minuta* à pattes jaunes. Ce cas rarissime mais intéressant fera l'objet d'une publication dans *Ornithos*.

Signalons la création récente d'un organisme de recensement des migrateurs rares en France (Zucca & le CMR 2003) mis en place notamment pour suivre des espèces dont le statut ne relevait plus du champ de compétences du CHN ; il devrait permettre de combler utilement une place jusqu'alors vacante. Enfin, des décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (CAF) en matière notamment d'espèces homologuées par le CHN et ajoutées à la Liste des oiseaux de France, de nouveaux taxons

élevés au rang d'espèce comme le Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* ou l'Hypolaïs obscure *Hippolaïs opaca*, ou encore de changements de noms, ont été communiquées (Dubois *et al.* 2003).

Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (modèle à demander au secrétariat du CHN ou à charger sur le site du CHN (<http://www.lpo.fr/homologation/index.htm>) dès que possible après l'observation (que vous soyez le découvreur ou simple observateur) et de préférence avant le 31 décembre de l'année en cours. Ceci évite la publication très tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà publiées. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s). Il est à cet égard important de rappeler que dans un souci de validation homogène des données, seules celles présentées à un comité d'homologation national sont prises en compte pour la publication de synthèses nationales et européennes concernant une espèce.

Il est également important de souligner que malgré le développement rapide de la digiscopie rien ne peut remplacer une bonne description écrite. Les films et les photographies, numériques ou non, les enrichissent réellement et s'avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Le CHN souhaite donc ne plus recevoir de fiches sans description, fondées seulement sur une ou même plusieurs images, aussi bonnes soient-elles.

LES FAITS MARQUANTS

En 2002, une espèce a été replacée en catégorie A de la Liste des oiseaux de France : le Goéland ichthyaète *Larus ichthyaetus*. Le Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* a quant à lui enregistré sa deuxième mention nationale (tout comme l'Aigle des steppes *Aquila nipalensis* en 2001). Signalons aussi la présence prolongée (six mois !) d'un Gravelot de Leschenault *Charadrius leschenaultii* et, pour la deuxième année consécutive, un afflux important d'Étourneaux roselins *Sturnus roseus* (101 individus au total). Enfin, le premier Roselin de Lichtenstein *Rhodopechys obsoleta* (catégorie D) pour la France a été pris en compte en 2000.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A & C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants à l'exclusion de l'année 2002, les deux suivants les données homologuées depuis 1981 (2002 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 2002.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Observateur(s), sauf exception, limité à trois (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe ou dessinateur).
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de Voous (1978, *The List of the Birds of the Western Palearctic*), modifiée par la *Liste des oiseaux du Paléarctique occidental* (CAF/LPO 2003).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 2002. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grive à joues grises - un 1^{er} hiver du 12 au 14 octobre 2002 sur l'île d'Ouessant, Finistère (N. Issa *et al.*, in Frémont & le CHN 2003).





fig. 1 & 2. Localisation des observations d'Albatros à sourcils noirs *Thalassarche melanophrys*, de Puffin semblable *Puffinus assimilis* et d'Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus* effectuées en mer dans la zone économique exclusive (ZEE) française, et acceptées par le CHN en 2002 (fig. 1 : données 2002 ; fig. 2 : données 1999 & 2001). Distribution of pelagic records of Black-browed Albatross, Little Shearwater and Wilson's Petrel accepted by the French Rarities Committee (CHN) in 2002 (fig. 1 : records for 2002; fig. 2 : records for 1999 & 2001). Red line represents the boundary between Spanish and French Exclusive Economic Zones (EEZ).

ALBATROS À SOURCILS NOIRS *Thalassarche melanophrys* (6/6) (6/6 - 1/1)

En mer - Rochebonne, ad., 14 septembre (P.-P. Evrard).

1999 En mer - Yeu : 46°42' N/4°40' W, ad., 6 octobre (T. Brereton, A.C. Garvey, M.J. Hobbs).

(Mers australes). Deux observations de plus pour l'automne, ce qui laisse à penser au vu des données disponibles que cette époque est quand même la meilleure pour découvrir l'espèce au large de nos côtes.

PUFFIN SEMBLABLE *Puffinus assimilis* (45/59) (38/52 - 1/1)

Manche - Gatteville-le-Phare, 22 septembre (A. Verneau, D. Wooldridge).

2001 En mer - Cantabrico : 44°53' N/2°34' W, phot., 26 août (J. Birard, Y. Kolbeinsson, B. & R. Segerer, M. Zucca) ; Rochebonne : 45°35' N/3°43' W, 27 août (J. Birard, Y. Kolbeinsson, B. & R. Segerer, M. Zucca).

1999 En mer - Rochebonne, 16 ind., 24 août (D. Michelat, J.-M. Rémy[†], N. Selosse, F. Vanhove).

(La sous-espèce *baroli* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries et aux Açores). Avec cette nouvelle donnée, 1999 se situe comme la grande année pour l'espèce (15 mentions pour 18 individus). Signalons que les 16 oiseaux de 1999 ont été observés en trois heures à partir du ferry Plymouth-Santander. À noter que si 2001 a également été remarquable avec 15 individus, 2002, à l'inverse, fait vraiment figure de parent pauvre.

OcéANITE DE WILSON *Oceanites oceanicus* (20/20) (16/16 - 2/2)

En mer - Cantabrico : 44°36' N/2°29' W, 28 août (S. Chambris, J. Chevallier, B. Jolivet, M. & S. Zucca) ; Rochebonne : 45°05' N/2°37' W, 29 août (S. Chambris, J. Chevallier, B. Jolivet, M. & S. Zucca).

2001 En mer - Ouessant : 48°11 N/5°24 W, 15 août (F. Veyrunes) ; Rochebonne : 45°02 N/2°25 W et 45°00 N/2°26 W, 2 ind., 26 août (J. Birard, Y. Kolbeinsson, B. & R. Segerer, M. Zucca), 45°22 N/3°02 W, 28 août (J. Birard, Y. Kolbeinsson, B. & R. Segerer, M. Zucca) ; Cantabrico : 44°58 N/2°29 W et 44°53 N/2°36 W, 2 ind., 26 août (J. Birard, Y. Kolbeinsson, B. & R. Segerer, M. Zucca).

(Îles de l'Antarctique. En période internuptiale, tous les océans, y compris l'Atlantique). Six nouvelles données parvenues pour 2001 dont cinq réalisées grâce à l'initiative avisée d'une bonne équipe ayant organisé un périple d'une semaine à bord d'un voilier. Cette expérience réitérée en 2002 a été moins favorable, mais deux nouvelles mentions quand même pour une espèce réputée fort rare jusqu'à présent, et qui est régulière, semble-t-il, à cette époque dans les eaux du golfe de Gascogne.

AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (35/25) (29/19 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Pont-de-Gau/Saintes-Maries-de-la-Mer, ad. *gularis* forme sombre, phot., du 13 juin au 22 septembre (Y. Kayser, F. Lamouroux *et al.*).

(Afrique, Asie). La nidification de cet oiseau avec une Aigrette garzette *E. garzetta* dans une colonie d'une soixantaine de couples de cette dernière espèce, de Hérons garde-boeufs *Bulbucus ibis* et de Bihoreaux gris *Nycticorax nycticorax*, a produit quatre hybrides en juillet qui furent observés sur le site jusqu'à la mi-octobre.

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (136/923) (39/84 - 3/28)

Charente-Maritime - Breuil-Magné, 1^{er} hiver, du 13 au 17 décembre (P. Trotignon *et al.*).

Indre-et-Loire - Rillé, 1^{er} hiver, phot., du 13 décembre au 27 janvier 2003 (T. Girard, N. Issa, J.-M. Thibault *et al.*).

Nord - Le Clipon/Loon-Plage, 26 ind., 16 novembre (C. Gruwier, B. Paepegaey).

2001 Nord - Gravelines, 23 décembre (C. Capelle).

2001 Pas-de-Calais - Oye-Plage, la même que celle du Nord, phot., 23 décembre (C. Capelle).

2000 Marne - Lac du Der-Chantecoq, 3 ad., 28 janvier (F. Veyrunes).

1998 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, ad., du 19 novembre au 4 décembre (A. Thomas).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). À noter les arrivées concomitantes des oiseaux de Charente-Maritime et d'Indre-et-Loire. Quant aux oiseaux du Nord, il s'agit d'un vol longeant la digue du Clipon en direction

1. Aigrette des récifs *Egretta gularis*, adulte *gularis* de forme sombre, Pont-de-Gau, Bouches-du-Rhône, août 2002 (J. Delpéch). *Dark morph Western Reef Egret*.



2. Hybride Aigrette des récifs *Egretta gularis* x Aigrette garzette *E. garzetta*, Pont-de-Gau, Bouches-du-Rhône, septembre 2002 (A. Faure). *Young Western Reef x Little Egret hybrid*.





3. Oies rieuses du Groenland *Anser albifrons flavirostris*, Ouessant, octobre 2002 (N. Issa). *White-fronted Geese of Greenland race.*

de la Belgique, observation remarquable par le nombre d'individus concernés, puisqu'il s'agit du plus élevé depuis la prise en compte de l'espèce par le CHN en 1987. Signalons que l'oiseau vu en 2001 à Gravelines dans un vol de neuf Bernaches nonnettes *Branta leucopsis* à 11h30 se posait une trentaine de minutes plus tard au Platier d'Oye !

OIE RIEUSE DU GROENLAND *Anser albifrons flavirostris* (4/4) (1/1 - 2/9)

Finistère - Île d'Ouessant : Penn-Arland, Porz Doun, Pount Mikeal et Parluc'hen, jusqu'à 8 ind. au moins (2 ad. et 6 juv.), phot., du 22 octobre au 26 novembre (A. Audevard, D. Laloi, M. Zucca *et al.*).
Morbihan - Île d'Hoëdic, ad., 21 octobre (G. Rault *et al.*).

(Sud-Ouest du Groenland). Année exceptionnelle pour l'apparition de cette sous-espèce en France, puisqu'il s'agit seulement de la deuxième mention depuis sa prise en compte par le CHN en 1981 (après celle de l'hiver 2000-2001 en baie d'Audierne, Finistère), mais surtout le nombre d'individus concernés est sans précédent. La fête n'a malheureusement pas pu être totale, puisqu'il faut signaler qu'un des juvéniles fraîchement arrivés a malencontreusement rencontré des plombs de chasse à Pount Mikeal (N. Issa & D. Laloi, comm. pers.)... Ce phénomène est à mettre en relation avec une arrivée massive et exceptionnelle à la même époque de Cygnes chanteurs *Cygnus cygnus* sur tout le quart nord-ouest du pays (p. ex. 56 individus à Ouessant le 23 octobre).

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (56/30) (56/30 - 15/6)

Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *nigricans*, appelée « Bernache du Pacifique ».

Charente-Maritime - Île d'Oléron : Le Château-d'Oléron, ad., du 20 octobre au 3 mars 2003 (T. Biteau, A. Kim) ; Marennes, 1 ind. le 4 novembre, 2 ind., le 5 novembre (A. Kim) ; Bourcefranc-le-Chapus, 1 ind., 5 novembre (A. Kim) ; île de Ré : Loix et Ars-en-Ré, 2 ad., phot., du 10 novembre au 8 décembre, 1 seul ind. jusqu'au 19 mars 2003 (Y. Créau, équipe LPO-Ré *fade* P. Trotignon) ;

Finistère - Plouneour-Trez, phot., 10 et 11 mars (F. Barrault, J.-M. Loaec, X. Rozec) ; Locquéolé, ad., phot., du 10 novembre au 28 décembre au moins (A. Audevard, F. Barrault, Y. Créau, J. Maout).

Gironde - Gujan-Mestras, ad., 9 novembre (Y. Kayser, M. Thibault).

Manche - Genêts, ad., du 15 janvier au 3 mars (S. Provost) ; Vains, ad., du 12 novembre au 5 mars 2003 au moins



4. Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, Locquéholé, Finistère, novembre 2002 (A. Audevard). *Black Brant*.

étant des revenants. L'oiseau du Nord a été repéré en vol lors d'une journée de fort passage migratoire de Bernaches cravants le long de la jetée du Clipon, comme celui d'octobre au bout de la digue de Calais. Difficile d'établir une statistique sur d'éventuels nouveaux oiseaux, d'autant qu'il n'a jamais été fait expressément mention de juvéniles sur la période considérée, et qu'une redistribution peut s'effectuer entre départements voisins d'un hiver à l'autre. Le chiffre retenu est donc sans doute surestimé. À noter que l'oiseau de Locquéholé a été vu en présence d'un individu présentant des caractères intermédiaires entre *nigricans* et *bernicla*. Enfin, signalons que la donnée de Gironde est la première pour ce département qui accueille pourtant dès le milieu de l'hiver les plus gros effectifs de Bernaches cravants !

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (34/36) (31/33 - 3/2)

Finistère - Goulven, mâle ad., phot., du 7 octobre au 13 avril 2003 (Y. Le Corre, A. Le Nevé, X. Rozec) ; étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, fem. juv., phot., du 4 au 9 novembre (A. Audevard, G. Rault[†]).

Loire-Atlantique - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle ad., phot., du 16 au 21 janvier (S. Reeber). (Amérique du Nord). Retour à une année plus conforme à la moyenne après deux millésimes particulièrement riches qui avaient vu à chaque fois cinq oiseaux fréquenter notre pays. Celui de la baie de Goulven, revenant probable, n'a pas été comptabilisé. Il en est peut-être de même pour celui du lac de Grand-Lieu, mais dans le doute, il a été comptabilisé.

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (34/29) (33/28 - 2/2)

Finistère - Île d'Ouessant : marais du Créac'h et du Kun et réservoir aval, mâle ad., phot., du 20 janvier au 24 février (A. Audevard).

Morbihan - Le Duer/Sarzeau, mâle ad., 8 et 10 avril (G. Joannès).

(Amérique du Nord). L'oiseau d'Ouessant était apparié à une femelle dont les caractères relevés pouvaient laisser penser qu'il s'agissait d'un oiseau néarctique, mais une prudence légitime a eu, en la matière, le dernier mot.

5. Canard à front blanc *Anas americana*, mâle, Goulven, Finistère, novembre 2002 (A. Audevard). *Male American Wigeon*.

6. Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis*, mâle, Ouessant, Finistère, février 2002 (A. Audevard). *Male Green-winged Teal*.

7. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, femelle, Ploumoger, Finistère, décembre 2002 (A. Audevard). *Female Ring-necked Duck*.

8. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, femelle, Poses, Eure, mai 2002 (Y. Créau). *Female Ring-necked Duck*.

9. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, femelle, Bruyères-le-Châtel, Essonne, décembre 2002 (D. Laloi). *Female Ring-necked Duck*.

5 6

7 8

9



forme de la tête très caractéristique
en particulier pointue à l'arrière
et à front bien marqué

tête "baniolée", le cercle
oculaire étant le motif
le plus saillant



contractes nets sur le bec

très échancré

petite ligne blanche
à la base de la queue
correspondant aux sous-caudales
plus ou moins tachetées de blanc
(visibles sur l'oiseau s'ébrouant)

vagues lignes sur les flancs
mais peu marquées, les
flancs paraissent souvent unis

Fuligule à bec cerclé ♀
Bruyères-le-Châtel (91)

David Labi - 21.12.2002

SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors* (48/53) (38/43 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Saint-Seren, juv., 3 septembre (Y. Kayser).

Finistère - Saint-Vio, mâle, phot., du 21 au 23 avril (G. Rault[†] *et al.*).

(Amérique du Nord). Année qui s'inscrit parfaitement dans la moyenne annuelle. La date de l'oiseau finistérien est typique, quant à celui de Camargue, il n'est pas sans rappeler la dernière mention pour ce secteur d'un jeune tué le 19 septembre 1999 et bagué un mois plus tôt au Québec.

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (108/90) (100/82 - 15/17)

Ain - Birieux, Versailleux, Villars-les-Dombes, jusqu'à 3 mâles ad., phot., du 30 janvier au 24 mars (G. Bruneau, A. Chabrolle, P. & J.-B. Crouzier, P. Dubois, A. Faure *et al.*).

Eure - Poses, fem. ad., phot., du 1^{er} au 4 mai (Y. Créau, A. Marchand).

Finistère - Le Relecq-Kerhuon, fem. ad., phot., du 26 janvier au 16 avril (A. Audevard, F. Barrault) ; étang de Nérizélec/Plovan, fem. imm., phot., du 17 mars au 1^{er} avril (A. Desnos, G. Rault[†]) ; étang de Trunvel/Tréogat, fem., 1^{er} mai (G. Rault[†], P. Scordia) ; Le Curnic/Guissény, fem. 1^{er} hiver, phot., 24 novembre (A. Audevard) ; étangs de Poulinoc, Lannéon et Ty Colo/Saint-Renan et étang de Kerescar/Ploumoguier, fem. 1^{er} hiver, phot., du 8 décembre au 7 mars 2003 (A. Audevard, F. Barrault, M. Champion).

Indre - Brenne : Lingé, fem. ad., du 26 novembre au 15 décembre (C. & L. Desage, C. Mercier).

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : Saint-Lumine-de-Coutais, mâle et fem. ad., phot., du 11 au 19 mars (S. Reeber), Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle ad., 20 avril (S. Reeber).

Marne - Étang du Grand Coulon/Outines, mâle ad., phot., 13 et 14 avril (A. Balthazard, P. Haffner).

Yvelines - Étang des Grésillons/Triel-sur-Seine, fem. ad., 20 avril (A. & N. Mathurin).

Vendée - Jard-sur-Mer, fem. ad., du 22 décembre au 16 janvier 2003 (A. Thomas, P. Trotignon).

Vienne - Étang de Beaufour/Saulgé, fem., du 23 février au 14 avril (N. Moron).

Essonne - Bruyères-le-Châtel, fem., phot., du 27 octobre au 6 avril 2003 (M. Bitter, D. Laloi, B. Lebrun *et al.*).

2001 Ile-et-Vilaine - Étangs du Boulet/Feins et de Bazouges-sous-Hébé/Hédé, mâle et fem. ad., du 16 décembre au 27 janvier 2002 (F. Drapeau Contim, Y. Février, F. Maréchal[†] *et al.*).

(Amérique du Nord). En Dombes, un mâle adulte était déjà présent les années précédentes, seuls deux des trois oiseaux ont donc été comptabilisés. La femelle de Saint-Renan et de Ploumoguier n'est assurément pas l'adulte des hivers passés, et a donc été prise en compte dans les statistiques. En baie d'Audierne, il semble bien que le printemps ait vu le passage de deux femelles différentes. De même, sur le lac de Grand-Lieu, en Loire-Atlantique, le deuxième mâle n'effectuait qu'une courte halte migratoire. Avec 17 nouveaux oiseaux, 2002 double quasiment le chiffre jusqu'à présent record de 9 individus atteint en 2000 et 2001, et confirme, comme dans les îles Britanniques d'ailleurs (V. *British Birds* 96 : 630, 2003), l'augmentation d'effectifs de ce canard néarctique depuis 3-4 ans.



10. Fuligule à tête noire
Aythya affinis, mâle,
Huningue, Haut-Rhin,
février 2001 (R. Aye).
Male Lesser Scaup.

FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (9/6) (9/6 - 0/0)

2001 Haut-Rhin - Huningue, mâle ad., phot., du 14 janvier au 10 février (R. Aye).

(Amérique du Nord). Cet oiseau, en vrai transfrontalier, a fréquenté également la Suisse et l'Allemagne. Nos voisins ont eu à son sujet beaucoup de discussions sur son caractère sauvage et ne semblent finalement pas disposés, *a priori* au bénéfice du doute, à lui accorder la catégorie A. Cela dit, rien ne prouve vraiment qu'il s'agisse d'un échappé, rien ne prouve non plus que cela n'en soit pas un (à moins de le lui demander !).

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (352/924) (344/915 - 47/220)

Ain - Étang du Bataillard/Saint-Paul-de-Varax, mâle ad., éliminé, du 7 au 12 avril (P. Crouzier, A. Forest).

Aube - Lac de la forêt d'Orient/Piney, 2 mâles et 2 fem., 27 décembre (J.-B. M. & P. Crouzier, A. Forest, G. Murtin).

Bouches-du-Rhône - Réaltor/Cabriès, fem. ad., du 1^{er} au 11 novembre (A. Flitti) ; Camargue, fem./imm., du 1^{er} décembre au 3 janvier 2003 au moins (E. & S. Durand, A. Flitti, Y. Kayser, A. Pataud).

Calvados - Pont-l'Évêque, 2 fem., phot., 28 octobre (Y. Créau).

Charente-Maritime - Breuil-Magné, 4 fem./imm., 19 octobre (P. Trotignon) ; lagunage de Rochefort-sur-Mer, 1 ind., 13 mars (équipe LPO-Espace Nature *fade* P. Trotignon), mâle imm., du 22 au 26 décembre (N. Gendre, C. Pubert, P. Trotignon).

Eure - Poses, mâle ad., phot., 2 août (Y. Créau), 2 fem./imm., phot., du 3 novembre au 13 décembre (Y. Créau, P.J. Dubois *et al.*).

Finistère - Étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, fem., phot., 3 août (A. Audevard).

Ille-et-Vilaine - Étang de Paintourteau/Erbrée, 2 fem., du 13 au 17 septembre (P. Yésou), mâle éclipse, 19 octobre (J.-L. Bigorne) ; Châtillon-en-Vendelais, fem./imm., 19 octobre (J.-L. Bigorne).

Indre - Étang de la Gabrière/Lingé, mâle, éliminé, 7 mai (J. Deberge) ; étang de Lérignon/Lingé, fem., 23 décembre (LPO-Cher).

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : fin d'hivernage : 62 ind. (22 mâles et 40 fem.), 21 janvier, 61 ind. (28 mâles et 33 fem.), 11 février, 84 ind. (30 mâles et 54 fem.), 17 mai (S. Reeber) ; période de nidification : 14 mâles isolés et 2 fem. isolées, 8 couples cantonnés (sans poussin), 4 couples et 9 poussins, mi-juin (S. Reeber) ; hivernage : 31 mâles et 78 fem./imm., 25 novembre, 29 mâles et 92 fem./imm., 27 novembre, 43 mâles et 90 fem./imm., 27 décembre (S. Reeber).

Mayenne - Étang de la Morinière/Saint-Denis-d'Anjou, fem. ad., 15 janvier (J.-F. Arcanger) ; étang du Gué de Selle/Mézangers : 2 couples, du 15 avril au 25 juillet (J.-F. Arcanger, F. Neige), 4 mâles et 5 fem. au moins à partir du 25 juillet, plus 2 nichées de 4 jeunes en août (J.-F. Arcanger), 14 ind. (dont 4 mâles ad.), 8 octobre, 27 ind., 20 novembre (J.-F. Arcanger) ; étang de la Cosnière/Mézangers, 1 couple, du 25 juin au 25 juillet (J.-F. Arcanger) ; étang de Neuvellette/Jublains, mâle, 14 mai (J.-F. Arcanger) ; étang de la Grande Métairie/Jublains, mâle, du 25 juin au 8 août, 2 fem./imm., 13 décembre (J.-F. Arcanger) ; étang de Beaucoudray/Aron, 4 fem./imm., 13 décembre (J.-F. Arcanger) ; étang de la Chaîne/Bourgneuf-la-Forêt, mâle ad., du 9 juillet au 8 août (J.-F. Arcanger) ; étang communal d'Olivet, mâle ad., 8 août (J.-F. Arcanger).

Morbihan - Étang du Crannic/Brec'h, 4 ind. (1 mâle et 2 fem. éliminés), 27 et 28 août (anonyme).

Pas-de-Calais - Coquelles, juv., 28 août (P.J. Dubois, O. Pratte).

Haute-Savoie - Sous-Chens/Chens-sur-Léman, fem. ad., 3 février (R. Jordan *et al.*).

Seine-et-Marne - Étang de Favières, mâle et fem. (mâle éliminé), du 29 mars au 5 avril (P. Minil) ; Jablines, mâle 1^{er} hiver, phot., du 16 novembre au 25 janvier 2003 (R. Aubry, F. Barth, F. Bouzendorf, S. Chambris).

Deux-Sèvres - Étang de Fourreau, mâle et fem., 30 et 31 juillet (M. Fouquet).

Vendée - Étang des Boucheries/Les Landes-Genusson : 1 couple, 10 février (L. Grillet *et al.*), fem., du 26 juillet au 9 août (J. Gonin, L. Grillet), mâle et 3 fem. maxi, du 16 au 30 août (J. Gonin, L. Grillet), 5 imm. éliminés, 2 septembre (L. Grillet), fem., 3 octobre (L. Grillet), 2 imm., 8 octobre (L. Grillet).

2001 Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle ad., phot., éliminé, du 19 mars au 27 mars 2003 (S. Reeber).

2001 Seine-et-Marne - Jablines, fem. ad., du 17 novembre au 9 janvier 2002 (F. Bouzendorf, B. Lebrun *et al.*), mâle ad. internuptial, du 20 décembre au 6 janvier 2002 (F. Bouzendorf *et al.*).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). Même si la comptabilité de cette espèce est loin d'être aisée, il est indéniable que le nombre d'individus répertoriés ne cesse de croître depuis 1998 (107 en 1998, 131 en 1999, 136 en 2000, 202 en 2001, 220 en 2002). Le lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique et les étangs mayennais restent des sites réguliers de nidification, ce qui n'a en revanche pas été le cas cette année sur l'étang des Boucheries en Vendée. Pour Grand-Lieu, le nombre de nichées est estimé entre 5 et 10 (S. Reeber comm. pers.). Pour la Mayenne, précisons que la population

reproductrice a été d'au moins 6 mâles et 6 femelles ayant produit 8 jeunes à l'envol (J.-F. Arcanger *in litt.*). Il est certain que Grand-Lieu alimente les sites périphériques distants de 50 à 100 km tant pour la nidification que pour l'essaimage des jeunes, ce qui se passe sur l'étang des Boucheries en Vendée étant à cet égard symptomatique (implantation de la nidification en 2000 et 2001, éradication massive à l'automne 2001 empêchant sans doute une nouvelle nidification en 2002, mais arrivée de 5 immatures le 5 septembre 2002). Pour 2001, à noter que le mâle adulte qui a passé trois hivers sur le lac de Grand-Lieu et qui a été éliminé au printemps 2003, a un moment été soupçonné d'être une Érismature d'Argentine *Oxyura vittata* en raison notamment de sa tête noire, ce que peuvent effectivement présenter, essentiellement ou totalement, de rares mâles d'Érismature rousse. Rappelons que des campagnes massives de destruction ont eu lieu en Grande-Bretagne ces dernières années (Perennou 2003), et que même si des arrivées d'oiseaux anglais sont toujours soupçonnées, notamment en Loire-Atlantique, celles-ci n'ont à ce jour pas été prouvées. Il semble par ailleurs que la campagne d'éradication de cette espèce s'essouffle en France et que la coordination menée par l'ONCFS se soit relâchée... Enfin, l'annonce d'un afflux d'oiseaux venus d'Amérique du Nord qui se serait produit en fin d'été 2001 en Europe du Nord (V. *Ornithos* 10-2 : 55) est en fait erronée.

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (27/36) (22/31 - 2/2)

Doubs - Mancenant, mâle ad., phot., du 15 juillet au 20 août (G. Bouvard, R. Rufer *et al.*).

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle 1^{er} hiver, phot., du 25 novembre au 4 février 2003 (S. Reeber *et al.*).



(Circum-méditerranéenne : Espagne, Tunisie, Turquie, dans les Balkans, également au nord de la Caspienne ; en cours de réintroduction en Corse). Le mâle de Franche-Comté au comportement jugé un instant douteux était en fait en pleine mue des rémiges primaires, tout comme deux Harles bièvres *Mergus merganser* qui stationnaient sur le site à cette époque (D. Michelat *in litt.*). Rien de choquant, donc. Quant à l'oiseau du lac de Grand-Lieu, il s'agit d'un 1^{er} hiver, ce qui signe là une nouvelle arrivée et non une rémanence du phénomène de 2000 (V. *Ornithos* 9-1 : 8). À noter que cet oiseau se tient parfois (mais pas systématiquement) avec les Érismatures rousses présentes sur le site (S. Reeber *in litt.*)...

11. Érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala*, Mancenans, Doubs, juillet 2002 (R. Rufer). Male White-headed Duck.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (59/108) (51/100 - 2/13)

Bouches-du-Rhône - Marais du Vigueirat/Mas-Thibert, ad., phot., du 18 septembre au 18 février 2003 au moins (Y. Kayser, J.-B. Lasnier *et al.*).

Landes & Pyrénées-Atlantiques - Localités tenues secrètes : 7 sites occupés, 7 couples produisent 12 jeunes à l'envol (E. Bounine, S. Duchateau, P. Grisser).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). La reproduction a été mauvaise cette année dans le Sud-Ouest, puisque sur les 17 pontes déposées par les 7 couples, 10 ont échoué. En revanche, l'apparition d'un nouveau couple est encourageante. À noter la ponte très tardive de trois couples (début octobre et fin novembre), certainement à mettre en relation avec l'abondance des micromammifères.

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (19/18) (17/16 - 2/3)

Aude - Comus, 2 ind., 1^{er} juin (J.-P. Frances *fade* C. Riols).

Tarn - Barre, ad., 28 août (A. Calvet)

(De l'Espagne à la Chine). Les observations deviennent annuelles, en dehors des oiseaux issus des programmes de réintroduction. Cependant un certain nombre de données ne parviennent pas au CHN, ce qui est dommage : cela contribuerait à comprendre le phénomène de dispersion dont l'espèce est capable.



12. Busard pâle *Circus macrourus*, juvénile, île d'Ouessant, Finistère, octobre 2002 (N. Issa). *Juvenile Pallid Harrier*.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (54/53) (39/38 - 6/6)

Bouches-du-Rhône - Crau : Peau-de-Meau, mâle ad., phot., 30 mars (P. Dubois, C. Segonne).

Doubs - Sainte-Colombe, mâle 2^e été (3^e année calendaire), 4 septembre (D. Michelat, M. Sauret).

Finistère - Île d'Ouessant : Parluc'hen, juv., phot., du 9 au 17 octobre (N. Issa, M. Roemhild *et al.*).

Hérault - La Caunette, mâle ad., 14 septembre (S. Nicolle).

Jura - Desnes, mâle 2^e été (3^e année calendaire), phot., du 14 au 16 avril (M. Giroud *et al.*).

Puy-de-Dôme - Montagne de la Serre/Saint-Saturnin, mâle ad., 15 septembre (R. Riols).

(Asie centrale, à l'Ouest jusqu'en Roumanie). **Année record (la précédente datant de 1993 avec cinq oiseaux), et deux observations la même année en Franche-Comté ! Tout ceci est peut-être à mettre en relation avec l'afflux de l'espèce signalé un peu partout en Europe. Le séjour d'une semaine de l'oiseau ouessant in a permis la réalisation de quelques beaux clichés.**

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (23/23) (20/20 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie ».

Bouches-du-Rhône - Camargue : Bomborinette, 1^{er} hiver, du 18 au 26 novembre (Y. Kayser).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). **Un seul oiseau... mais ce n'est peut-être qu'une apparence, certains individus étant particulièrement délicats à déterminer...**

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (14/12) (10/8 -3/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas Neuf, ad., du 6 novembre au 19 avril 2003 au moins (G. Jacotot, Y. Kayser, L. Strenna *et al.*); Crau : Peyre-Estève, imm., du 19 septembre au 15 décembre (E., G., & S. Durand, A. Flitti, A. Hargreaves *et al.*).

Jura - Les Rousses, imm., du 15 au 20 juin (G. Bruneau, P.-A. Crochet, D. Michelat, J.-P. Paul).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). **L'individu du Mas Neuf semble particulièrement bien réglé dans ses dates d'arrivée en Camargue : 3 novembre 2001, 6 novembre 2002... Quant à l'oiseau du Jura, on ne peut pas dire qu'il se trouvait dans son paysage traditionnel !**

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (334/358) (265/285 - 11/11)


Doubs - La Rivière-Drueon, mâle ad., 12 janvier (D. Michelat); Bulle, puis Bannans, fem. imm., phot., du 27 novembre au 25 janvier 2003 (D. Michelat *et al.*); Bannans et La Rivière-Drueon, mâle ad., du 7 décembre au 22 janvier 2003 (D. Michelat *et al.*); Bouverans, mâle ad., du 7 au 21 décembre (D. Michelat); Sainte-Colombe, fem. ad., du 15 au 28 décembre (D. & J.-M. Michelat); Boujailles, mâle ad., phot., du 18 décembre au 8 janvier 2003 (F. Maillot, D. Michelat *et al.*); Bouverans et Frasne, imm., du 18 décembre au 8 janvier 2003 (C. Créatin, D. Michelat *et al.*).

Haute-Marne - Chalvrairie, 1^{er} hiver, 15 décembre (B. Theveny).

Pas-de-Calais - Sangatte, 1^{er} hiver, phot., du 2 au 5 janvier (C. Capelle, G. Flohart, G.A. Nurse), Escalles, 1^{er} hiver,



13. Buse pattue *Buteo lagopus*, 1^{er} hiver, Escalles, Pas-de-Calais, novembre 2002 (G. Flohart). *First-winter Rough-legged Buzzard*.



14. Buse pattue *Buteo lagopus*, 1^{er} hiver, Sangatte, Pas-de-Calais, janvier 2002 (C. Capelle). *First-winter Rough-legged Buzzard*.

phot., du 16 au 24 novembre au moins (P.J. Dubois, G. Flohart, L. Spanneut).

Haute-Saône - Vellefrie, 1^{er} hiver, du 14 au 19 janvier (D. Lecornu, F. Schmitt, F. Vigneron).

1996 Somme - Baie de Somme, fem. tuée et naturalisée, phot., 1^{er} décembre (collections MNHN *vide* F. Jiguet). (Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Huit oiseaux dont six pour la Franche-Comté. Belle arrivée par l'est en cette fin d'année 2002, mais comme souvent, les oiseaux sont restés cantonnés dans le nord-est de la France.

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (189/150) (140/97 - 3/2)

Ain - Birieux, ad., phot., du 7 au 18 février (M. Benmergui, J.-B. & P. Crouzier, A. Faure).

Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin-de-Badon, 1^{er} hiver, 24 février (A. Johnson) ; Amphise, imm. « *fulvescens* », du 27 novembre au 26 décembre (Y. Kayser, H. Kowalski, M. Thibault).

2001 Haute-Savoie - Le Hucel/Thollon-les-Mémises, 1^{er} hiver, 3 avril (J.-C. Baillet, L. Grillon, J.-P. Jordan).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). La comptabilité des Aigles criards est plus simple qu'à l'accoutumée, mais aucune donnée tangible n'est parvenue du site d'hivernage classique de la réserve de Saint-Martin-de-Seignanx dans les Landes. En Camargue, le « *fulvescens* », déjà présent l'hiver dernier, n'a pas été comptabilisé. Pour information, l'oiseau de 2001, manifestement en migration, a été signalé filant nord-est au-dessus de la Suisse quinze minutes après son observation française.

AIGLE DES STEPPES *Aquila nipalensis* (2/2) (1/1 - 0/0)

2001 Drôme - Rémuzat, imm., 23 mai (A. Hargreaves, C. Tessier).

(De l'Ukraine à l'Asie centrale). Seulement la deuxième donnée pour cette belle espèce, la première concerne un individu capturé à Plouaret, Côtes-d'Armor, début mai 1960.

AIGLE IBÉRIQUE *Aquila adalberti* (6/6) (2/2 - 2/1)

Pyrénées-Atlantiques - Col d'Organbidexka/Larrau, juv., 16 et 19 septembre (R. Bendelé, E. Cretin, J.-C. Ganzo, F. Ravenot).

2001 Hautes-Pyrénées - Col de Soulor/Arbéost, juv., phot., 12 septembre (S. Duchateau, S. Pérès).

(Péninsule Ibérique). La similitude des dates de 2001 et 2002 est frappante pour ces deux oiseaux juvéniles. La précédente mention (la première pour le XX^e siècle) concernait un oiseau de 1^{er} hiver vu le 14 janvier 1999 en Camargue. Que se passe-t-il donc de l'autre côté des Pyrénées ?

FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (74/101) (50/71 - 5/16)

En dehors de la Crau.

Bouches-du-Rhône - Camargue : Beauduc, mâle ad., 21 mars (S. Durand, A. Flitti) ; Cuges-les-Pins, 3 mâles, phot., du 6 au 9 mai (E. Barthélemy, R. Péliissier *et al.*).

Haute-Corse - Biguglia, 3 mâles imm., 9 mai, 1 mâle ad., 7 mâles imm. et une fem. ad., phot., 12 mai (D. Cohez, Y. Kayser, M. Villemagne *et al.*).

Hérault - Vendémian, mâle 1^{er} été et 2 fem., 26 avril (M. Duquet).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). L'année 2002 confirme le renouveau de l'espèce en France ! Pour les statistiques, seuls quatre mâles immatures ont été comptabilisés sur les sept oiseaux du 12 mai, les trois autres pouvant tout à fait être ceux du 9 mai. En Crau, légère diminution du nombre de couples en 2002 (61 contre 65 en 2001) mais production supérieure avec 115 jeunes à l'envol (P. Pilard/LPO-Mission FIR). La colonie de l'Hérault, découverte récemment (Ravayrol & Buhot 2002), comptait onze couples qui ont produit entre 30 et 40 jeunes (P. Pilard/LPO-Mission FIR).

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonora* (325/425) (286/379 - 3/4)

En dehors du littoral méditerranéen.

Ain - Lapeyrouse, 1^{er} été, 29 août (M. & P. Crouzier).

Aude - Roquefeuil, 2 fem. ad., 19 juin (C. Riols).

Hérault - Rosis, fem. (probable) ad., forme claire, 11 juin (J.-M. Cugnasse *et al.*).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Bien sûr la donnée de l'Ain est remarquable géographiquement, mais la date cadre parfaitement.

FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (36/36) (29/29 - 3/2)

Aude - Sainte-Lucie/Port-la-Nouvelle, fem. ad./subad., 13 octobre (D. Clément, F. Garcia).

Bouches-du-Rhône - Camargue : Grenouillet, juv., 4 et 6 septembre (Y. Kayser).

2001 Bouches-du-Rhône - Bois de Tagès/Saintes-Maries-de-la-Mer, juv., 28 décembre (Y. Kayser, G. Paulus). (Afrique du Nord, Asie occidentale). Ces nouvelles données sont tout à fait classiques : région, époque, et deux juvéniles sur les trois oiseaux concernés.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (237/277) (187/216 - 13/13)

Alpes-de-Haute-Provence - Lac de l'Escale/Chateau-Arnoux, juv., 22 septembre (D. Freychet *et al.*).

Alpes-Maritimes - Saint-Laurent-du-Var, mâle ad., 13 mars (J.-M. Tisserand).

Bouches-du-Rhône - Le Puy-Sainte-Réparate, fem., 6 avril (E. & G. Durand, A. Flitti) ; Mallemort, mâle ad., du 18 au 20 août (G. Jacotot).

Ardèche - Barrage de Donzère/Viviers, fem. ad., 17 août (G. Olios).

Corse-du-Sud - Campo dell'Oro/Ajaccio, mâle, 13 mars (A. Le Dru, B. Recorbet).

Hérault - Montpellier, fem., phot., 29 mars (*vide* X. Ruffray).

Loire - Valleille, juv., 16 et 17 août (A. Faure *et al.*).

Meuse - Mouzay, fem., phot., 5 avril (G. Pierrard).

Moselle - Kappelkingen, mâle ad., phot., du 13 au 15 avril (M. Brey, J. & N. Kirschving).

Rhône - Saint-Andéol-le-Château, mâle imm., 24 avril (G. Bruneau).

Savoie - Motz, fem. ad., du 19 au 27 avril (J.-P. Jordan *et al.*), mâle ad., 27 avril (D. Ducruet, K. Monod).

2001 Meuse - localité tenue secrète, mâle ch., du 14 au 19 juin (T. Besançon, D. Combrisson, J. François) et non le 14 juin uniquement (*Ornithos* 10-2 : 59).

1999 Meuse - Lachaussée, mâle ch., 20 juin (J.-P. Harly). (Europe, Asie centrale). Avec 13 oiseaux, cette année est très honorable, puisque la moyenne annuelle est d'un peu plus de 10 individus depuis 1981, date

15. Marouette poussin *Porzana parva*, femelle, Mouzay, Meuse, avril 2002 (G. Pierrard). *Female Little Crane.*



de la création du CHN. La répartition des observations est sans ambiguïté et montre bien la suprématie de la moitié est de la France en la matière. Mention spéciale pour la donnée de l'Hérault qui concerne une marouette récupérée indemne dans la gueule d'un chat qui l'avait capturée dans un jardin de la banlieue de Montpellier, et qui a été relâchée le lendemain sur un étang du secteur (V. *Ornithos* 9-3 : 120). En Corse, deux marais auparavant très attractifs pour les marouettes ont subi des dégradations importantes, ce qui n'est pas sans conséquence sur le nombre d'oiseaux répertoriés (B. Recorbet *in litt.*).

MAROQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (86/121) (41/48 - 3/6)

Haute-Corse - Maccinagio, 12 mai (D. Cohez, J.-P. Jordan, Y. Kayser *et al.*).

Pas-de-Calais - Beuvrequen, mâle ch., 2 juin (G. Flohart).

Somme - Saint-Quentin-en-Tourmont, 4 mâles ch., du 27 mai au 1^{er} juin au moins (F. Deroussen, P.J. Dubois, G. Flohart *et al.*).

(Europe, Asie centrale, Japon). Si l'oiseau de Corse est manifestement un migrateur, les autres données peuvent tout à fait concerner des nicheurs potentiels. La mention de la Somme (avec un chiffre record de chanteurs) nous rappelle que d'autres secteurs jusqu'alors inconnus peuvent encore par bonheur héberger cette espèce dont le chant reste difficile à repérer dans la cacophonie du chant des grenouilles d'un marais.

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (67/110) (36/77 - 4/20)

Aude - Narbonne, ad., 26 janvier, puis 3 ad. au moins en mars, 3 couples (4 nichées) et 14 juv., phot., de mars à octobre (D. Clément, J. Gonin *et al.*).

Pyrénées-Orientales - Étang de Canet, présence de la population (Y. Aleman, comm. pers.).

(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). Beau suivi de la petite population de ce marais narbonnais qui a produit 14 jeunes ; un article retraçant la saga des talèves de l'Aude a été publié récemment (Gonin & Clément 2003). La population pionnière de l'étang de Canet est toujours présente, mais n'a pas fait l'objet d'un recensement en 2002 (Y. Aleman, comm. pers.).

OUTARDE BARBUE *Otis tarda* (65/188) (6/11 - 1/1)

Gard - Saint-Laurent-d'Aigouze, mâle, 7 et 8 février (R. Dallard, M. Duquet, X. Rufay *et al.*).

(Europe centrale et méridionale, Turquie). Une donnée tous les quatre ans, c'est exactement la moyenne des trois dernières mentions de l'espèce en France : 5 novembre 1994 en Meurthe-et-Moselle, 6 avril 1998 en Crau, Bouches-du-Rhône, et puis ce mâle noté en 2002 dans le Gard (Dallard 2002) qui est peut-être à mettre en relation avec l'oiseau vu en vol au-dessus du lac de Neuchâtel se dirigeant vers la France le 12 décembre 2001, donnée homologuée par la Commission de l'avifaune Suisse (B. Volet *in litt.*). À noter qu'un mâle a également séjourné en Italie du 11 au 15 février 2002 (A. Corso *in litt.*).

16 ♂ 17. Glaréole à ailes noires *Glareola nordmanni*, Camargue, juin 2001 (E. Didner & N. Vincent-Martin). *Black-winged Pratincole*.



18. Gravelot de Leschenault *Charadrius leschenaultii*, adulte
Hirel, Ille-et-Vilaine,
septembre 2002 (P. Pulce).
Adult Greater Sand Plover.



GLARÉOLE À AILES NOIRES *Glareola nordmanni* (21/19) (17/14 - 1/0)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas de Sainte-Cécile, ad., 23 mai (D. Cohez, Y. Kayser).

2001 Bouches-du-Rhône - Camargue, ad., phot., du 13 juin au 16 juillet (D. Cohez, Y. Kayser, N. Vincent-Martin).

2001 Pas-de-Calais - Audinghen, ad., phot., 29 et 30 octobre (E. Dansette, T. Daumal, B. Paepegaey), donnée précédemment refusée (*Ornithos* 10-2 : 81), à présent acceptée après réexamen.

(Asie occidentale). Présence en Camargue d'un adulte depuis 2000 (il n'a donc pas été comptabilisé pour 2001 et 2002) et appariement avec une Glaréole à collier en 2001, ce qui a conduit à l'envol de deux jeunes hybrides mi-juillet... les choses se compliquent, d'autant qu'un autre individu de Glaréole à ailes noires avait été suspecté cette année-là sur la colonie (N. Vincent-Martin *in litt.*). Il est possible que l'oiseau d'octobre 2001 dans le Pas-de-Calais ait été le même que celui vu en août de la même année, à Loon-Plage, Nord, à 40 km à l'est.

GRAVELOT DE LESCHENAULT *Charadrius leschenaultii* (5/5) (2/2 - 1/1)

Ille-et-Vilaine - Hirel, ad., phot., du 7 septembre au 9 mars 2003 (F. Drapeau Contim *et al.*).

(De la Turquie à la Sibérie centrale). Sixième donnée française, la dernière remontant au mois de mai 1995, en Camargue, pour un oiseau n'étant resté que trois jours. On ne peut pas en dire autant de celui-ci qui a hiverné sur ce coin de la baie du Mont-Saint-Michel, ce qui a permis à beaucoup d'ornithologues de venir le voir... et d'en faire de nombreux et beaux clichés. La structure de l'oiseau et la taille du bec autorisent à dire qu'il s'agissait de la sous-espèce *crassirostris*.

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (25/26) (23/24 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Ru Niou puis Yusin, juv., phot., du 4 au 9 octobre (A. Audevard, J.-P. Jordan *et al.*).

(Amérique du Nord). Et une donnée de plus pour Ouessant, à une date classique !

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva* (13/13) (13/13 - 1/1)

Vosges - Aérodrome de Dogneville, ad., 17 juillet (T. Besançon).

(Sibérie, Alaska). Une donnée d'adulte au cœur de l'été, voilà qui ressemble bien à ce que l'on note souvent en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, et jusqu'ici, pas beaucoup en France ; espérons que cette donnée en appellera d'autres du même ordre... Pour information, deux adultes ont été homologués courant juillet et un autre fin août aux Pays-Bas (van der Vliet *et al.* 2003).



19. Pluvier bronzé
Pluvialis dominica, juvénile,
Ouessant, octobre 2002
(A. Ouwerkerk).
Comparer la silhouette
avec celle de la photo 20.
Juvenile American Golden Plover.



20. Pluvier bronzé
Pluvialis dominica, juvénile,
Ouessant, octobre 2002
(A. Audevard). *Juvenile
American Golden Plover.*

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (66/65) (58/57 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat puis Amphise, du 21 au 27 novembre (Y. Kayser, V. Lemoine, E. Libercier).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Il faut remonter à 1996 pour trouver une seule donnée de cette espèce qui depuis nous avait habitués à beaucoup mieux (7 individus en 1999 et 2000, mais déjà seulement 3 en 2001). On sait malheureusement que les effectifs mondiaux sont en déclin dramatique...

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (14/14) (13/13 - 1/1)

Gironde - Le Teich, juv., phot., du 3 au 10 septembre (J. Gernigon).

(Amérique du Nord). Une donnée du parc ornithologique du Teich, c'est si rare que ça fait vraiment plaisir ! À part ça, la date est classique et le lieu aussi...

BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (24/25) (20/21 - 4/4)

Bouches-du-Rhône - Camargue : nord Galabert, ad., du 17 au 20 août (P.-A. Crochet, Y. Kayser, S. Nicolle, E. Le Roy *et al.*) ; baisse des Cinq-Cents-Francis, 23 octobre (E. Franc), oiseau différent ?

Finistère - Île d'Ouessant : marais du Créac'h, juv., 6 novembre (A. Audevard).

Morbihan - Marais de Séné, ad., phot., 11 et 12 août (B. Guévorts, B. Lebrun).

(Amérique du Nord). Les observations du Bécasseau de Bonaparte sont toujours très bizarres : quatre données en 2002 après une année blanche, mais trois individus en 2000, six (!) en 1999 et un seule en 1998. En tous cas, la Camargue n'avait *a priori* pas accueilli l'espèce depuis 1954, alors deux la même année... on peut légitimement se demander si l'oiseau d'octobre n'était pas celui précédemment observé en août (au bénéfice du doute, deux oiseaux ont toutefois été comptabilisés).

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (25/25) (21/21 - 4/4)

Côtes-d'Armor - Le Legué/Saint-Brieuc, juv., phot., du 22 septembre au 11 octobre (J.-P. Delapré, F. Pouzergues *et al.*).

Finistère - Étang de Nérizélec/Plovan, juv., phot., 12 et 13 septembre (A. Audevard).

Gironde - Le Teich, juv., phot., 14 novembre (J. Gernigon).

Ille-et-Vilaine - Étang de la Cantache/Champeaux, juv., 22 septembre (M. Letue).

2000 Finistère - Trunvel/Tréogat, juv., phot., du 21 au 27 septembre (R. Baeta, N. Issa, D. Laloï, G. Rault[†]) et non jusqu'au 23 septembre seulement (*Ornithos* 9-1 : 14).

(Amérique du Nord). Nette arrivée mi-septembre, avec entre autres une deuxième mention pour les Côtes-d'Armor, trois ans après la première, et au même endroit. Deuxième bécasseau américain pour le parc ornithologique du Teich la même année, à une date plus tardive que dans les départements bretons, plaçant pour un oiseau en train de « glisser » vers le sud.



21. Bécasseau de Baird
Calidris bairdii, juvénile,
St-Brieuc, Côtes-d'Armor,
septembre 2002 (P. Pulce).
Juvenile Baird's Sandpiper.

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (290/327) (229/251 - 13/13)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Enfores de la Vignolle, juv., phot., du 31 août au 3 septembre (A. Faure, Y. Kayser, R. Sève *et al.*).

Charente-Maritime - Île de Ré : Les Portes-en-Ré, juv., phot., 12 et 13 septembre (H. Roques *et al.*) ; Saint-Jean-d'Angle, juv., 22 septembre (M. Caupenne, P. Trotignon).

Finistère - Le Curnic/Guissény, ad., 16 septembre (X. Rozec) ; embouchure du Quilimadec/Guissény, 1^{er} hiver, 25 octobre (A. Audevard, P.J. Dubois, J.-C. Sautour) ; étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, 1^{er} hiver, phot., du 13 au 27 octobre (A. Audevard, Y. Kayser, G. Rault[†] *et al.*).

Saône-et-Loire - Barrage de la Sorme/Blanzay, juv., 7 et 8 septembre (J.-M. Frolet, P. Gayet, C. Gentilin *et al.*).

Somme - Grand-Laviers, juv., du 8 au 10 septembre (P. Decory).

Vendée - La Chenollette/La Faute-sur-Mer, ad., du 20 juillet au 1^{er} août (A. Thomas, P. Trotignon *et al.*) ; Saint-Denis-du-Payré, ad., 19 août (L. Godet, P. Trotignon) ; île de Noirmoutier : Le Luzan/Noirmoutier-en-l'Île, juv., 4 et 5 septembre (M. Bourrieau, D. Desmots, N. de Pracontal) ; L'île d'Olonne, juv., 14 et 15 octobre (A. Barzic, J.-M. Lepage).

Yonne - Gron, juv., phot., du 12 octobre au 1^{er} novembre (J.-M. Guilpain).

2001 Deux-Sèvres - Massais et Ulcot, juv., 17 octobre (M. Fouquet).

(Amérique du Nord, Sibérie). Avec 13 individus, 2002 s'inscrit dans la moyenne annuelle (12 individus) depuis 1981, date de la création du CHN.

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (148/197) (114/147 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Baisse des Cinq-Cents-Francis, ad., 27 juillet (A. Flitti), juv., phot., du 26 août au 14 septembre (P.-A. Crochet, A. Faure, J. Gernigon).

(Europe septentrionale). Trois oiseaux en 2001 et seulement deux cette année, alors que la moyenne annuelle est d'environ cinq données pour un peu moins de sept individus depuis 1981...

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (141/175) (96/108 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Baisse salée/Tour-du-Valat, juv., 17 et 18 septembre (A. Johnson, Y. Kayser *et al.*).

Morbihan - Erdeven, 7 et 9 septembre (S. Guérin).

(Amérique du Nord). Encore une année qui ne restera pas dans les mémoires ! Deux oiseaux, comme en 2001, alors que la moyenne annuelle depuis 1981 est de cinq individus... mais relevons tout de même la présence de l'espèce en Camargue.

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (257/304) (30/31 - 1/1)

Doubs - Houtaud, du 27 au 29 mars (D. Michelat, M. Sauret *et al.*).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Une seule observation par an, c'est désormais le triste constat que l'on peut faire...

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (26/27) (17/17 - 2/2)

Finistère - Le Curnic/Guissény, juv., phot., du 4 octobre au 1^{er} décembre (A. Audevard, Y. Le Corre, S. Mauvieux *et al.*) ; étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern puis étang de Nérizélec/Plovan, 1^{er} hiver, phot., du 1^{er} au 25 octobre (A. Audevard, A. Desnos, G. Rault[†] *et al.*).



(Amérique du Nord). Deux oiseaux, c'est plutôt bien, dans la mesure où en dehors de l'année 2000, il faut remonter à 1991 pour trouver cet effectif... 2002 aura donc été une bonne année, d'autant que les oiseaux ont joué les prolongations, notamment celui du Finistère Nord, véritable star de l'automne, qui s'est laissé admirer par une pléthore d'ornithos...

22. Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus*, 1^{er} hiver, Plovan, Finistère, octobre 2002 (A. Audevard). *First-winter Long-billed Dowitcher.*

23. Bécassin à long bec
Limnodromus scolopaceus,
juvénile, Guissény, Finistère,
novembre 2002 (A. Audevard).
First-winter Long-billed Dowitcher.



CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (32/32) (17/17 - 0/0)

1995 Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas-Thibert, phot., 20 avril (J.-L. Lucchesi, G. Massez, D. Sève *et al.*). (Amérique du Nord). Une donnée parvenue tardivement au CHN pour combler le vide de cette année-là, mais rien en 2002...

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* (101/86) (75/61 - 3/3)

Bouches-du-Rhône - Camargue : marais du Grenouillet, phot., 8 mai (A. Audevard, J.-C. Sautour).

Somme - Le Crotoy : bassin de chasse, 7 mai (P. Decory).

Vendée - Île de Noirmoutier : Le Luzan/Noirmoutier-en-l'Île, ad., 1^{er} octobre (D. Desmots).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Toujours difficile de savoir si les oiseaux camarguais sont des revenants (celui-ci a été comptabilisé).

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor* (65/68) (46/49 - 1/1)

Charente-Maritime - Île de Ré : Lilleau des Niges/Les Portes-en-Ré, ad., phot., du 4 au 11 octobre (P.-P. Evrard, R. Périn, M. Thibault *et al.*).

2000 Bouches-du-Rhône - Camargue : baisse des Cinq-Cents-Francis, ad. en hiver, du 6 au 22 août (L. Chevallier, E. Durand, Y. Kayser), et Salin-de-Badon, le même, 26 août (M.-P. & X. Hindermeier) et non uniquement sur la baisse des Cinq-Cents-Francis (*Ornithos* 9-1 : 17).

(Amérique du Nord). Première observation rétaise de cette espèce, mais aussi la seule de l'année en France...

Limicoles néarctiques

Avec huit espèces totalisant 28 données pour 28 individus, l'année 2002 se situe plutôt dans la moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981. Celle-ci est d'environ huit espèces pour un peu plus de 25 données et 27 individus. Mis à part 2001, année plutôt médiocre, les millésimes 1998, 1999 et 2000 étaient nettement meilleurs. Avec une donnée parvenue tardivement et concernant 1995, cette année s'enrichit d'une nouvelle espèce et prend donc la première place à égalité avec 1998 pour le nombre d'espèces (mais reste inférieure à d'autres pour les nombres de données et d'individus).

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (332/938) (276/854 - 23/71)

Creuse - Mourioux, juv., forme sombre, phot., du 29 au 31 août (J.-M. Teulière).

Manche - Gatteville-le-Phare, juv., 14 septembre (A. Verneau, D.B. Wooldridge), juv., 23 septembre (D.B. Wooldridge).

Nord - Digue du Clipon/Loon-Plage, ad., 21 août, imm., 25 août, juv., 27 août, 4 juv., 31 août, juv., 11 septembre, 4 juv., et 1 imm., 14 septembre, 5 juv., et 1 ad., 15 septembre, juv., 19 septembre, 6 juv., 21 septembre, 25 juv., 22 septembre, juv., 25 septembre, juv., 5 octobre, juv., 17 octobre (J. Boulanger, C. Gruwier, J.A. Leclercq, B. Paepgaey, L. Scalabre, N. Selosse, K. Verbanck).

Pas-de-Calais - Fort-Mahon/Blériot, juv., 27 août (P.J. Dubois), 5 juv. et 1 imm., 22 septembre (P.J. Dubois) ; Cap Gris-Nez/Audinghen, 3 juv., 22 septembre (G. Flohart *et al.*), juv., 14 octobre (M. & P. Crouzier).

Hautes-Pyrénées - Campan, juv., phot., 9 septembre (C. Bergès *et al.*).

Haute-Savoie - Sciez-sur-Léman, juv., 10 septembre (R. Jordan, A. Renaudier).

Seine-Maritime - Sotteville-sur-Mer, juv., 22 septembre (Y. Créau).

2001 Nord - Digue du Clipon/Loon-Plage, juv., 16 août, juv., 2 septembre, 1 ad. et 10 juv., 8 septembre et non 11 juv., comme mentionné précédemment (*Ornithos* 10-2 : 63), 16 juv., 9 septembre et non 16 ind. sans précision, comme mentionné précédemment (*Ornithos* 10-2 : 63), juv., 21 septembre, 1 ind., 26 septembre, 4 juv., 31 octobre et non 4 ind. sans précision, comme mentionné précédemment (*Ornithos* 10-2 : 63).

(Circumboréal). La digue du Clipon totalise cette année 54 individus (quatre données manquantes ou quelques précisions ont été ajoutées aux mentions parues l'an dernier). Les autres départements ou régions concernés sont tout aussi classiques, mis à part les Hautes-Pyrénées (mais à une bonne date).

GOÉLAND ICHTHYAËTE *Larus ichthyaetus* (0/0) (0/0 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : plage d'Arles, 2^e été, 21 mai (B. Bougeard).

(De la mer Noire au Tibet, en passant par l'Asie centrale et la Chine). Première française que la Commission de l'Avifaune Française (CAF) a placé officiellement en catégorie A.

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (26/26) (21/21 - 1/1)

Charente-Maritime - Île de Ré : Lilleau des Niges/Les Portes-en-Ré, ad., phot., du 12 au 24 mai (S. Maisonhaute, Y. Perré, H. Roques, M. Thibault).

2001 Finistère - Goulven, 1^{er} hiver, 28 septembre (F. Barrault), donnée précédemment refusée (*Ornithos* 10-2 : 81), à présent acceptée après réexamen.

(Amérique du Nord). Donnée remarquable de cet adulte de l'île de Ré vu un temps paradant au sein d'une colonie de Goélands bruns *Larus fuscus* et argentés *L. argentatus*.



24. Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, juvénile, Campan, Hautes-Pyrénées, septembre 2002 (C. Bergès). Juvenile Long-tailed Skua.

25. Goéland à bec cerclé
Larus delawarensis, adulte,
 St-Renan, Finistère,
 décembre 2002
 (A. Audevard).
Adult Ring-billed Gull.



MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (15/15) (14/14 - 0/0)

2000 Landes - Moliets-Plage, 1^{er} hiver, 5 février (A. Guyot), donnée précédemment refusée (*Ornithos* 9-1 : 30), à présent acceptée après réexamen.

(Amérique du Nord). Deux données en 2000 (dont cet oiseau vu à l'embouchure du courant d'Huchet), mais rien en 2001 et 2002.

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (20/52) (17/49 - 0/0)

En dehors du littoral méditerranéen.

2001 Vendée - Île de Noirmoutier : Pont de l'Arceau/L'Epine, ad., 23 mars (M. Vaslin).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). Cette donnée de Vendée annonce celle à paraître dans le prochain rapport...

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (108/131) (108/131 - 6/6)

En dehors de la Corse.

Aude - Leucate, ad., 8 avril (A. Faure) ; salins de La Palme, 2^e été, 24 avril (S. Nicolle) ; étang de Pissevaches/Fleury-d'Aude, 3^e été, 2 mai (F. Garcia), 2^e été, 28 août (G. Olioso).

Bouches-du-Rhône - Camargue : plage de la Comtesse, 3^e été, 1^{er} juin (A. Flitti) ; baisse des Cinq-Cents-Francis, ad., phot., 2 septembre (A. Bechet, A. Faure, M. Gauthier-Clerc).

1991 Bouches-du-Rhône - Saintes-Maries-de-la-Mer, 2^e été, photo, 16 mai (M. Zekhuis *vide* P. Defos du Rau). (Circum-méditerranéen). Petite augmentation par rapport aux trois années précédentes qui avaient vu chacune quatre oiseaux. Les départements concernés sont on ne peut plus traditionnels.

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (253/156) (252/155 - 24/7)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).

Charente-Maritime - Île d'Oléron : La Baudissière/Dolus-d'Oléron, ad., du 10 sept. au 19 février 2003 (P. Trotignon *et al.*).

Côtes-d'Armor - Le Légué/Saint-Brieuc, ad., phot., du 26 décembre au 14 février 2003 (Y. Créau, D. Laloï *et al.*).

Finistère - Trezmalouen et Sainte-Anne-La-Palud, ad., phot., du 16 février au 10 mars (A. Audevard, G. Rault[†], L. Veyrunes), le même, phot., du 9 décembre au 25 février 2003 (A. Audevard, G. Rault[†]) ; plage du Ris et port Rhu/Douarnenez, 1^{er} hiver*, phot., du 21 février au 26 mars (A. Audevard, G. Rault[†], L. Veyrunes) ; Le Relecq-Kerhuon, 1^{er} hiver*, 14 mars (F. Barrault), ad.*, phot., 22 mars (A. Audevard, F. Barrault), le même,

phot., du 8 novembre au 12 janvier 2003 (A. Audevard, F. Barrault) ; étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, 2^e hiver, 15 octobre (A. Audevard) ; St-Renan, ad., phot., du 7 décembre au 26 février 2003 (A. Audevard, F. Barrault, M. Champion, D. Laloi).

Gironde - Arcachon, ad., du 15 janvier au 14 mars (J. Gernigon), 1^{er} hiver*, phot., du 15 février au 16 mars (J. Gernigon), 2^e hiver, 26 avril (G. Olios), jusqu'à 4 ad., phot., du 13 octobre au 27 mars 2003 au moins (J. Gernigon, Y. Kayser, B. Lamothe, J.-C. Sautour), 3^e hiver, phot., du 24 octobre au 27 mars 2003 au moins (J. Gernigon), jusqu'à 2 ind. de 1^{er} hiver*, phot., du 9 novembre au 18 mai 2003 (J. Gernigon, Y. Kayser, J.-C. Sautour) ; La Hume/Gujan-Mestras, ad., phot., du 21 août au 23 mars 2003 au moins (J. Gernigon, J.-C. Sautour) ; Larros/Gujan-Mestras, ad., phot., du 27 décembre au 19 mars 2003 (J. Gernigon, J.-C. Sautour).
Landes - Hossegor, 1^{er} hiver*, 5 janvier (A. Guyot).

Morbihan - Le Bronzais/Pénestin, ad., 14 septembre au moins (Y. & J.-P. Trévoux).

Vendée - Île de Noirmoutier : Noirmoutier-en-l'Île, ad., du 11 novembre au 6 février 2003 au moins (D. Desmots, M. Vaslin) ; pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., 28 août (A. Chabrolle).

2000 Pyrénées-Atlantiques - Hendaye, 1^{er} hiver*, 27 décembre (P.-A. Crochet).

(Amérique du Nord). En 2002, sept nouveaux oiseaux (en plumage de 1^{er} hiver) ont été retenus. Les revenants sont fidèles, et bien souvent leurs arrivées se situent quasiment aux mêmes dates d'une année à l'autre, à l'instar du vieil adulte de Pénestin, toujours en forme, malgré ses 20 ans au moins ! Sur l'île de Noirmoutier, l'adulte répertorié ici est l'oiseau de 2^e hiver signalé précédemment jusqu'au 21 juillet au moins (*Ornithos* 10-2 : 66).

GOÉLAND D'AMÉRIQUE *Larus smithsonianus* (9/8) (9/8 - 3/2)

Finistère - Île d'Ouessant : Penn ar Roc'h, port du Stiff et plage du Korz, 1^{er} hiver, phot., du 29 janvier au 7 avril (A. Audevard, R. Baeta) ; Molène, le même, 22 avril (A. Audevard) ; étang du Relecq-Kerhuon, 1^{er} hiver, 15 mars (A. Audevard).

(Amérique du Nord). Rien de surprenant qu'après les données de Douarnenez en 2001, Ouessant ou le vaste complexe portuaire de Brest reçoive la visite de ce goéland néarctique, mais encore faut-il qu'il y ait un observateur intéressé par les Laridés à la réception...

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (134/134) (126/125 - 7/12)

Finistère - Port de Douarnenez, 1^{er} hiver, phot., du 9 février au 19 mars (A. Audevard, G. Rault[†]), 1^{er} hiver, phot., du 9 mars au 6 avril (A. Audevard, G. Rault[†]) ; port de Saint-Guénolé, 1^{er} hiver, phot., 3 mars (G. Rault[†]) ; plage du Ris/Douarnenez, 1^{er} hiver (le même que celui de Saint-Guénolé), phot., 17 mars (A. Audevard) ; Le Relecq-Kerhuon, 1^{er} hiver, phot., du 22 au 24 mars (A. Audevard, F. Barrault).

Seine-et-Marne - Jablines, jusqu'à 7 ind. (six 1^{er} hiver et un 2^e hiver), du 5 janvier au 30 mars (F. Bouzendorf, S. Chambris *et al.*)

Vendée - Île d'Yeu : Port-Joinville, 1^{er} hiver, 28 mars (A. Thomas).

2001 Finistère - Le Conquet, 1^{er} hiver, phot., du 16 février au 20 avril au moins (J. Birard, M. Champion, M. Zucca *et al.*), et non à partir du 23 février comme précédemment indiqué (*Ornithos* 10-2 : 66).

(Arctique canadien, Groenland). Année remarquable par le nombre d'oiseaux concernés, 12, ce qui place 2002 au deuxième rang après l'afflux exceptionnel de 1984 (40 individus), même si les circonstances d'arrivée des oiseaux ne sont sans doute pas les mêmes ; ceci est d'ailleurs corroboré par ce qu'on pourrait appeler « le phénomène Jablines » avec cette concentration tout à fait exceptionnelle sur ce site intérieur ; à noter qu'un des oiseaux vus en début de période présentait *a priori* des caractères de la sous-espèce *kumlieni* et que pour brouiller les cartes, un Goéland leucophée *Larus michahellis* leucique de 1^{er} hiver faisait également partie du jeu ; une note complète sur le sujet est d'ailleurs en préparation (F. Bouzendorf, à paraître). À signaler aussi cette belle fréquentation de la pointe Bretagne par l'espèce courant mars.

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (26/32) (19/17 - 3/0)

Finistère - Baie de Morlaix, fem. ad., baguee couleur, 23 juin (E. de Kergariou).

Gironde - Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, fem. ad., baguee couleur, phot., du 16 au 21 mai puis du 4 au 8 août (J. Gernigon).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Pas de reproduction cette année pour cette femelle baguee couleur en 2001 sur la colonie du banc d'Arguin, puisqu'elle a préféré partir en villégiature sur les côtes bretonnes. Mais c'était sans compter sur la vigilance du conservateur de la réserve de la baie de Morlaix qui la repéra ce jour de juin sur le reposoir de la colonie de sternes du secteur...



26. Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus*, 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, mars 2002 (A. Audevard). *First-winter American Herring Gull*.

27. Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides*, 1^{er} hiver, Douarnenez, Finistère, février 2002 (A. Audevard). *First-winter Iceland Gull*.





28 & 29. Pipit de Richard *Anthus richardi*, Ouessant, Finistère, octobre 2002 (A. Audevard). *Richard's Pipit*.

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (12/4) (11/3 - 3/2)

Charente-Maritime - Île d'Aix : Le Jamblet, ad., 7 juillet (B. Mayot).

Finistère - Archipel de Glénan/Fouesnant, ad., phot., du 6 au 13 mai et du 13 au 27 juillet (A. & R. Le Nevé, G. Rault¹).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). L'oiseau de l'île d'Aix n'a été vu qu'une seule journée, malgré des recherches actives effectuées sur l'île jusqu'au 2 septembre. Quant à l'oiseau qui a fréquenté la colonie de Sternes caugeks *Sterna sandvicensis* de l'île aux Moutons dans l'archipel de Glénan, il n'est bien sûr pas sans rappeler celui qui a séjourné sur cet îlot au cours des étés 1995 et 1996 (*Ornithos* 4-4 : 154)... Pour les statistiques, ces oiseaux ont été comptabilisés, mais le doute est fort quant au fait qu'il s'agisse de deux nouveaux venus, d'autant qu'une sterne peut pendant plusieurs années changer de colonie...

STERNE « À BEC ORANGE » *Sterna bengalensis/elegans*

Bouches-du-Rhône - Camargue : baisse de Quenin, 31 août (P.-A. Crochet).

D'après les caractères notés, l'oiseau de Camargue serait plutôt une Sterne voyageuse mais le voile n'a pu être complètement levé. Par ailleurs, signalons la présence sur la colonie de Sternes caugeks du banc d'Arguin/La Teste-de-Buch en Gironde, d'un oiseau (photographié) qui a séjourné du 14 juillet au 3 août (J. Gernigon *in litt.*). Cette sterne qui a été vue parading autour des derniers couples nicheurs, protégeant ou essayant de nourrir des poussins, n'a pu être déterminée.

STERNE BRIDÉE *Sterna anaethetus* (8/8) (8/8 - 1/0)

Côtes-d'Armor - Saint-Jacut-de-la-Mer, ad., phot., du 23 juillet au 15 août (A. Chabrolle, G. Glémarec, A. Le Nevé).

(Des Caraïbes à l'Afrique de l'Ouest, Australie). Retour cet été de la Sterne bridée sur les lieux qui avaient fait sa gloire au cours de la saison précédente...

HARFANG DES NEIGES *Nyctea scandiaca* (16/16) (10/9 - 1/1)

Manche - La Hague, phot., 1^{er} avril (A. Livory *in litt.*).

(Circumboréal). Cette donnée est sans nul doute à mettre en relation avec les observations faites durant l'hiver en Belgique et aux Pays-Bas, concernant des oiseaux qui, courant octobre 2001, se sont réfugiés lors d'une tempête sur au moins trois navires marchands croisant au large des côtes canadiennes à cette époque et qui faisaient route vers des ports belges ou hollandais. Dommage que cette observation faite à la pointe du Cotentin soit restée si confidentielle...

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (245/364) (200/297 - 15/26)

Bouches-du-Rhône - Crau : Mas Chauvet/Entressen, 1 ind., du 29 septembre au 20 octobre (E. & S. Durand, A. Flitti), 7 ind. (dont un 1^{er} hiver), 21 décembre (Y. Kayser) ; Camargue : Cabano dis Ego/Le Sambuc, 2 ind., puis 1 seul, du 29 novembre au 7 décembre (A. Arnaud, R. Crofton, Y. Kayser).

Charente-Maritime - Moëze, 9 décembre (M. Zucca).

Finistère - Île d'Ouessant : Ru Niou, phot., 29 et 30 octobre (A. Audevard, P. Crouzier, P.J. Dubois.) ; réservoir aval, 4 novembre (A. Audevard, N. Issa), le même ?, 14 novembre (A. Audevard) ; Ty Corn, 5 novembre (A. Audevard).

Manche - Genêts, 2 ind. (1^{er} hiver), du 4 janvier au 13 février (S. Provost *et al.*), 1^{er} hiver, phot., 3 mars (F. Morazé, S. Provost), 2 ind., 19 et 23 octobre (S. Provost), 1 ind., 12 novembre (S. Provost), 2 juv. et 1 ad., 14 novembre (S. Provost *et al.*), 3 ind. (dont deux 1^{er} hiver), du 8 décembre au 21 février 2003 au moins (S. Provost) ; marais de Vrasville/Cosqueville, jusqu'à 2 ind. (1^{er} hiver), du 16 au 24 novembre (A. Bouchard, A. & V. Verneau).

2001 Bouches-du-Rhône - Crau : Mas Chauvet/Entressen, 19 ind., 7 octobre (D. Cohez *et al.*), jusqu'à 5 ind., phot., du 16 décembre au 9 février 2002 (E. & S. Durand, A. Flitti, B. Lebrun, T. Perrier) ; Peyre-Estève, 1 ind., 16 décembre (E. & S. Durand) ; Camargue : Tour-du-Valat, jusqu'à 5 ind., phot., du 8 octobre au 6 novembre (D. Cohez *et al.*), draille de la Commanderie/Le Sambuc, 1 ind., 9 octobre (D. Cohez, A. Olivier).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). Au fur et à mesure de l'agrégation des données, il semble bien se dessiner deux périodes pour cette espèce dans notre pays : passage automnal en octobre et arrivée d'hivernants entre la fin novembre et la mi-décembre. Bien sûr, il est très difficile de tenir la comptabilité du Pipit de Richard et de connaître la part des oiseaux revenant hiverner, d'autant que les conditions offertes pour déterminer l'âge des oiseaux sont souvent loin d'être bonnes. Des déplacements de faible envergure se produisent a priori aussi au cours de l'hiver, comme cela semble avoir été le cas fin 2001 entre la Crau et la Camargue. Pour l'instant, et à moins d'évidences prises en compte lors des calculs, les chiffres affichés accusent sans doute un certain optimisme. À cet égard, il serait judicieux, et en tous cas sûrement très instructif, de généraliser la capture et le baguage couleur des oiseaux sur les zones d'hivernage maintenant avérées comme la baie du Mont-Saint-Michel ou la zone Crau-Camargue. Certes, la rupture avec ce que l'on constatait autrefois s'est bien produite à partir de 1994 : entre 4 et 8 individus de 1981 à 1993, 43 individus en 1994, puis entre 15 et 65 individus par la suite (!), avec une moyenne de plus de 29 individus par an depuis 1994, mais il faut désormais tenter d'en savoir plus... À noter également l'évidence d'un hivernage « atlantique » discret, au vu des données hivernales sur la côte depuis plusieurs années (encore une cette année).

PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewskii* (2/2) (2/2 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Pern, 1^{er} hiver, phot., vidéo, du 22 au 26 octobre (Y. Créau, N. Issa, D. Laloi, M. Zucca *et al.*). (Sud de la Sibérie, Chine et nord-est de l'Inde). Les deux premières mentions de l'espèce en France avaient été établies la même année, 1998, pour un oiseau ayant effectué un séjour prolongé en Crau parmi des Pipits de Richard (Jiguet 1999), et un autre resté trois jours à l'automne sur l'île de Sein (Frémont 1999). Ouessant n'avait pas encore eu le sien, c'est maintenant chose faite.

ROBIN À FLANCS ROUX *Tarsiger cyanurus* (1/1) (1/1 - 1/1)

Pas-de-Calais - Blériot, mâle 1^{er} hiver, phot., du 20 au 23 octobre (L. & S. Veyrunes *et al.*).

(De la Finlande à la Sibérie orientale et au Japon). Deuxième mention française après celle du 27 octobre 1993 sur l'île d'Ouessant, Finistère, pour ce beau turdidé qui a vu subitement arriver une foule d'observateurs venus se régaler. À noter que trois oiseaux ont été notés entre le 7 octobre et le 16 novembre 2002 en Grande-Bretagne (Rogers & the Rarities Committee 2003).



30. Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus*, Blériot, Pas-de-Calais, octobre 2002 (R. Tonnel). Red-flanked Bluetail.

TARIER PÂTRE *Saxicola torquata* (21/21) (17/17 - 1/1)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *maura*, appelée « Tarier oriental ».

Meuse - Lac de Madine/Nonsard, mâle 1^{er} hiver possible, 8 décembre (T. Besançon).

(Mer Blanche, Sibérie). Date et région plutôt inhabituelles pour ce sibérien.

TRAQUET ISABELLE *Oenanthe isabellina* (12/13) (11/12 - 0/0)

1998 Finistère - Pointe de la Torche/Plomeur, 3 octobre (A. Le Nevé, G. Rault').

(De la Grèce et la Roumanie à la Sibérie et la Mongolie). Il n'est jamais trop tard pour exhumer des données de ses carnets d'observations ! Lieu et date sont évidemment typiques pour l'espèce.

TRAQUET PIE *Oenanthe pleschanka* (2-2) (2/2 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Bouge l'Fezen - Dizro, phot., du 14 au 27 octobre puis le 18 novembre (N. Issa, T. & M. Quelennec *et al.*).

(De la Roumanie au Moyen-Orient jusqu'en Sibérie orientale). Troisième mention française après celles du 25 octobre 1991 sur l'île de Sein, Finistère, et du 6 octobre 1998 au Hâble d'Ault dans la Somme. Cet oiseau qui est resté deux semaines sur place a bien sûr fait le bonheur de nombreux observateurs présents ou venus spécialement sur l'île à cette époque. Le sexe et l'âge de ce traquet ont donné lieu à débats, et il semble que les informations actuellement disponibles dans la littérature soient contradictoires ; peut-être une femelle de 1^{er} hiver (?).

TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (22/23) (21/21 - 0/0)

1997 Bouches-du-Rhône - Camargue : Beauduc, mâle 1^{er} hiver, 26 décembre (J.-P. Delapré, J.-P. & S. Sibley *et al.*).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). L'année 1997 a été exceptionnelle pour le Traquet du désert en France, avec désormais dix données ; deux mâles adultes avaient déjà été homologués en décembre en Camargue (*Ornithos* 5-4 :168), mais ce mâle de 1^{er} hiver, également de décembre, avait été oublié dans un carnet d'observations...

31. Traquet pie *Oenanthe pleschanka*, Ouessant, Finistère, octobre 2002 (A. Audevard). *Pied Wheatear*.



32. Traquet pie *Oenanthe pleschanka*, Ouessant, Finistère, octobre 2002 (N. Issa). *Pied Wheatear*.



GRIVE À JOUES GRISES *Catharus minimus* (2/2) (1/1 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Porz Coret, 1^{er} hiver, phot., du 12 au 14 octobre (N. Issa *et al.*).

(Amérique du Nord). Belle découverte de cette grive (troisième donnée française) qui n'avait pas été vue depuis 16 ans, mais déjà sur Ouessant (du 22 au 25 octobre 1986 dans le vallon d'Arland). La seule autre mention concerne un individu trouvé mort le 20 octobre 1974 en Vendée. À signaler qu'un oiseau, également de 1^{er} hiver, a été observé aux îles Scilly (Grande-Bretagne) du 26 au 30 octobre 2002 (Rogers & the Rarities Committee 2003).

GRIVE À GORGE NOIRE *Turdus ruficollis* (16-16) (10/10 - 0/0)

1999 Ardèche - Les Vans, fem., sous-espèce *atroregularis*, trouvée morte, phot., 20 février (*vide* F. Étienne, collections MNHN *vide* F. Jiguet).

(Sibérie). Cette grive sibérienne qui avait été baguée en Italie le 14 novembre 1998 comme Grive draine *Turdus viscivorus* (!) a fini sa vie dans un département d'où proviennent fort peu de données au CHN (mais qui a déjà accueilli l'Océanite de Castro *Oceanodroma castro* !).

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (20/20) (20/20 - 2/2)

Finistère - Ouessant : Punel, 1^{er} hiver, 30 octobre (A. Flitti).

Maine-et-Loire - Angers, 1^{er} hiver, trouvée morte, phot., 1^{er} novembre (M. Bonno, A. Fossé, F. Noël *et al.*).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). À remarquer la concomitance des dates de ces deux données. L'oiseau du Maine-et-Loire a inauguré tristement la nouvelle gare d'Angers et ses grandes baies vitrées... au pied desquelles elle gisait. Elle avait été baguée neuf jours plus tôt en Hongrie (ce qui constituait d'ailleurs la 8^e donnée pour ce pays) et avait parcouru 1 505 km (soit en moyenne un peu plus de 167 km par jour). Pour comparaison, un oiseau a été observé aux îles Scilly du 1^{er} au 6 novembre 2002 (Rogers & the Rarities Committee 2003).

ROUSSEROLLE DES BUISSONS *Acrocephalus dumetorum* (6/6) (6/6 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Pount ar Rodez, 1^{er} hiver, 29 et 30 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois).

(Europe du Nord-Est, Sibérie, Asie centrale). Septième mention française pour cette rousserolle autrefois si rare, mais pour laquelle les progrès en matière d'identification ont été très salutaires. Cela dit, l'exercice reste quand même délicat, et rien ne remplace une bonne pratique de terrain sur les lieux où elle passe en abondance... En Grande-Bretagne, cinq oiseaux furent notés cet automne, avec une arrivée de quatre individus à la mi-octobre et une mention du 30 octobre (Rogers & the Rarities Committee 2003).

HYPOLAÏS BOTTÉE *Hippolais caligata* (6/6) (6/6 - 1/1)

Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, phot., 13 septembre (C. Philpott, R. Turley, D. Walker).

(Iran, Asie centrale, Mongolie). En Grande-Bretagne, un oiseau avait fréquenté le Dorset du 15 au 19 août 2002 (Rogers & the Rarities Committee 2003) et un des découvreurs de l'oiseau français arrivait de Dungeness (juste en face du cap Gris-Nez) !

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoris* (47/48) (20/20 - 2/2)

Finistère - Île d'Ouessant : Arland, 1^{er} hiver, du 18 au 21 octobre (A. de Broyer, Y. Créau *et al.*) ; Poull Brac, 1^{er} hiver, 14 novembre (A. Audevard).

1998 Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, ad., 31 août (T. Daumal).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Ces trois données, dont une de 1998, s'inscrivent parfaitement dans le cadre de ce qui est connu du passage postnuptial : une première vague à la fin août, concernant plutôt des oiseaux scandinaves, et une seconde entre la mi-octobre et le début du mois de novembre, se rapportant davantage à des oiseaux plus orientaux.

POUILLOT BORÉAL *Phylloscopus borealis* (12/12) (12/12 - 0/0)

2000 Finistère - Île d'Ouessant : aérodrome, 14 octobre (F. Vanhove).

(De la Scandinavie au Japon et à l'Alaska). Un oiseau avait été vu au réservoir aval le 8 octobre 2000 (*Ornithos* 9-1 : 24), ce qui fait deux oiseaux la même année sur Ouessant. Avec seulement 12 individus répertoriés à ce jour (20 pour le Pouillot verdâtre et 56 pour le Pouillot de Pallas) cette espèce reste fort rare en France.



33. Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus,
Ouessant, Finistère,
octobre 2002 (N. Issa).
Pallas's Warbler.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (49/52) (47/50 - 4/4)

Finistère - Île de Sein, 18 octobre (J.-F. Darras, H. Davière, E. Lapous) ; Île d'Ouessant : Pount ar Rodez et Kerivarc'h, phot., 29 et 30 octobre (N. Issa, J.-P. & S. Sibley *et al.*).

Morbihan - Île d'Hoëdic, 19 octobre (Y. Kayser, A. Larousse, G. Rault *et al.*).

Vendée - Mare des Agaures/Les Sables-d'Olonne, du 10 au 12 novembre (D. Desmots, F. Portier *et al.*).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Année tout à fait honorable avec ces quatre données (une seule en 2001 et trois en 2000). Notons l'arrivée simultanée des oiseaux de Sein et d'Hoëdic, et le décalage de la mention vendéenne, département situé plus au sud, à l'instar de ce qui a déjà été observé pour d'autres passereaux sibériens dans ce département et en Charente-Maritime.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (667/708) (650/691 - 27/27)

Finistère - Île d'Ouessant : Ty Crenn, du 17 au 24 février (A. Audevard) ; Kun, 23 et 24 septembre (A. Audevard, J.-Y. Frémont, N. Issa) ; Kadoran, 26 septembre (A. Audevard, E. Roy), phot., du 11 au 17 octobre (A. Confais, E. Didner, N. Issa) ; Cost ar Reun, 11 octobre (N. Issa) ; Poull Brac, du 11 au 14 octobre (N. Issa, F. Veyrunes *et al.*), 31 octobre et 1^{er} novembre (A. Audevard, N. Issa *et al.*), 12 novembre (A. Audevard) ; Ker Yegu, phot., 12 et 13 octobre (E. Gfeller, N. Issa) ; Arland, du 13 au 16 octobre (A. Audevard, E. Gfeller, J. Gonin), 2 ind., 17 octobre (J. Gonin, S. Reeber) ; Parkou, 13 octobre (E. Gfeller), 29 et 30 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois *et al.*) ; Porz Paol, 14 octobre (J. Gonin) ; Stang Porz Gwenn, 14 octobre, 2 ind. le 16 octobre (E. Gfeller, F. Veyrunes) ; Stang ar Merdy, 14 octobre (E. Gfeller, F. Veyrunes) ; Kervasdoué, 16 octobre (J.-F. Arcanger) ; Ar Reun, 16 et 17 octobre (J. Gonin, S. Reeber) ; Stang Korz, 17 octobre (P.-A. Crochet *et al.*) ; Park Raden, du 19 au 22 octobre (P.-A. Crochet, M. Thibault, F. Veyrunes), 26 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois) ; Poull Bojer, vidéo, du 22 au 28 octobre (M. Zucca *et al.*). Île de Sein, 18 octobre (A. Audevard, Y. Kayser, J. Orrit *et al.*).

Pas-de-Calais - Blériot, 18 septembre (V. van Halst).

Vendée - Île de Noirmoutier : Barbâtre, du 19 au 23 octobre (A. Barzic, D. Desmots, M. Vaslin *et al.*) ; mare des Agaures/Les Sables-d'Olonne, 11 et 12 novembre (J.-M. Gillier, F. Portier).

2001 Nord - Dunkerque : nouvel avant-port, 17 octobre (B. Paepegaey).

1996 Vendée - Saint-Michel-en-l'Herm, 19 octobre (A. Thomas).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Année plus modeste que les précédentes, et inférieure à la moyenne annuelle (un peu plus de 32 oiseaux depuis 1981), mais avec 23 oiseaux sur Ouessant, le niveau est sensiblement le même sur cette île que l'an passé (22 individus). À remarquer la donnée de février près du camping d'Ouessant (individu resté hiverner ?) et aussi, une nouvelle fois, la date d'arrivée tardive de l'oiseau des Sables-d'Olonne accompagné d'un... Pouillot de Pallas !

POUILLOT DE SCHWARZ *Phylloscopus schwarzi* (10/10) (9/9 - 0/0)

1999 Finistère - Île d'Ouessant : Lann Vras, 24 et 25 octobre (P. Cruzier, F. Jiguet, L. Spanneut).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Avec cette donnée parvenue tardivement, 1999 totalise trois Pouillots de Schwarz, ce qui constitue un record (à égalité avec l'année 1996), mais aucun n'a été contacté depuis !

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (27/28) (27/28 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, 8 octobre (Y. Kayser).

(Asie centrale et septentrionale). Donnée parmi les plus précoces (une du 7 octobre 1986 à Ouessant et une autre du 3 octobre 1999 à Dunkerque), et la deuxième pour la Camargue (la précédente, du 21 novembre 1996 à Salin-de-Badon est, à l'opposé, la date la plus tardive en France et aussi la première mention pour le Midi méditerranéen).

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

1- Individus présentant les caractéristiques du groupe *tristis/fulvescens* (12/14) (9/11 - 1/2)

Loire-Atlantique - Montoir, 2 ind., capt., phot., 18 décembre (H. Dugué, D. Raboin).

2001 Finistère - Île d'Ouessant : Stang Korz, chant, phot., 3 novembre (N. Issa, D. Laloï, J.-P. Sibley).

(Sibérie). Les dates sont parfaitement conformes à ce que l'on connaît de la présence de *tristis* en France (migrateur tardif et hivernage de quelques individus).

2- Pouillots véloces de type sibérien (175/206) (134/143- 2/2)

Finistère - Île d'Ouessant : Park Raden, du 24 au 26 octobre (J.-F. Mandelbaum, M. Zucca) ; Pount Salaün, 26 octobre (Y. Créau, T. Fournet).

1992 Ain - Divonne-les-Bains, du 1^{er} au 29 février (B. Volet).

(Sibérie). Deux données seulement cette année, mais rappelons que le CHN n'homologue que les oiseaux vraiment typiques et en principe confirmés par leur cri caractéristique de *tristis*. Celui de 1992 jonglait avec la frontière franco-suisse.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (293/312) (239/250 - 8/8)

Bouches-du-Rhône - Bois de Tagès/Saintes-Maries-de-la-Mer, 1^{er} hiver, 19 septembre (Y. Kayser) ; Camargue : Tour-du-Valat, 1^{er} hiver, phot., 3 novembre (Y. Kayser, O. Pineau).

Finistère - Île de Sein : phare, 1^{er} hiver, 28 septembre (M. Champion, F. Le Guen), 1^{er} hiver, phot., 11 octobre (A. Audevard, A. Renaudier) ; Plas-ar-Skoul, 1^{er} hiver, phot., 28 septembre (M. Champion, F. Le Guen). Île



34. Gobemouche nain
Ficedula parva, Sein, Finistère,
octobre 2002 (A. Audevard).
Red-breasted Flycatcher.



35 & 36. Gobemouche nain *Ficedula parva* (*albicilla* ?), Sein, Finistère, septembre 2002 (M. Champion). *Red-breasted Flycatcher*.

d'Ouessant : Stang ar Stiff, 1^{er} hiver, 15 et 16 septembre (A. Chabrolle, R. Le Fur, A. Guyot) ; Kervasdoué, 1^{er} hiver, phot., 18 et 19 octobre (N. Issa, M. & T. Quelennec) ; Pount Salaün, 21 octobre (Y. Créau, T. Fournet).

2001 Finistère – Île de Molène, 2 ind. (1^{er} hiver), 12 octobre (J.-P. Jordan, F. Le Gouis).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Année moyenne mais quasi semblable à 1997 et 1998, où 9 oiseaux avaient été répertoriés. Toutefois, deux ont été vus dans les Bouches-du-Rhône (noter les dates extrêmes), région qui est loin d'accueillir l'espèce régulièrement. L'individu camarguais du 3 novembre présentait les caractéristiques de la sous-espèce *albicilla* (appelée « Gobemouche de la taïga »), comme l'un des deux oiseaux vus sur l'île de Sein le 28 septembre et abondamment photographié. Rappelons qu'un tel oiseau avait déjà été bien observé sur cette île en 2000 (Duquet & Frémont 2002). Le CHN va devoir prochainement réexaminer ces trois données dont les similitudes sont flagrantes.

PIE-GRIÈCHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (9/9) (9/9 - 1/1)

Seine-Maritime - Marais du Hode/Le Havre, 1^{er} hiver, 17 novembre (F. Malvaud).

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). Aucun oiseau n'avait été enregistré depuis 1999. Ici, il s'agirait plutôt de la sous-espèce *isabellinus*. La CAF a demandé au CHN de réexaminer l'ensemble des données françaises, afin de leur assigner un taxon dans la mesure du possible.

ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (56/135) (53/132 - 2/0)

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuves de reproduction).

Aude - Villesèques-des-Corbières, jusqu'à 2 ind., du 19 janvier au 22 mai (J. Gonin) ; Treille, 18 ind., 25 janvier (J. Gonin) ; Caves, 4 ind., 6 avril (J. Gonin), 1 ch., 12 décembre (J. Gonin) ; Leucate, 3 ind. et 1 ind. construit un nid, 16 avril (J. Gonin).

Pyrénées-Orientales - Rivesaltes, 16 mai (J. Gonin) ; Opoul-Perillos, 15 ind., 29 septembre (J. Gonin).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). Mis à part les communes de Villesèques-des-Corbières et Rivesaltes, qui n'avaient a priori jamais été mentionnées comme hébergeant l'espèce, les autres localités (connues) sont surtout données à titre d'information pour faire un peu le point sur l'état de la population désormais bien installée dans ces deux départements.

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (103/174) (81/131 - 25/101)

Ariège - Vernajoul, 12 ind., du 7 au 9 juin (D. & J.-J. Berné).

Aude - Luc-sur-Aude, jusqu'à 8 ind., phot., du 30 mai au 7 juin (M. Bisante, J. Gonin, Y. Roullaud) ; Treilles, imm., 12 juin (J. Gonin).

Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Sambuc, 2 ind., 28 mai (D. Cohez), juv., du 20 août au 19 septembre



37. Étourneau roselin *Sturnus roseus*, Ouessant, Finistère, août 2002 (A. Audevard). *Rosy Starling*.



38. Étourneau roselin *Sturnus roseus*, Penhors, Finistère, juin 2002 (G. Rault^t). *Rosy Starling*.

(Y. Kayser) ; étang de Bolmon/Chateauf-neuf-les-Martigues, 12 ind., du 29 au 31 mai (P. Lafont).

Charente-Maritime - Île de Ré : Les Portes-en-Ré, juv., 23 août (A. Chabrolle).

Finistère - Penhors, ad., phot., 6 juin (C. Jolin, G. Rault^t) ; Île d'Ouessant : Cost-al-Lann, ad., phot., du 6 au 13 août (A. Audevard) ; île de Molène, ad., du 29 août au 1^{er} septembre (J.-Y. Le Gall, C. Masson).

Gironde - Pointe de Grave/Le Verdon, 8 ind., 31 mai (R. Guelin *et al.*) ; Pessac-sur-Dordogne, ad., phot., 1^{er} juin (J. & P. Berné) ; Tabanac, 11 ind., phot., 1^{er} et 2 juin (J. Cazabeil, J. Dufour).

Hérault - Frontignan, 8 ind., 8 juin (X. Ruf-ray *et al.*) ; Lattes, 7 ind. (5 ad., deux 1^{er} été), 8 juin (X. Ruf-ray, H. Willem *et al.*) ; Lausargues, 8 ind., 9 juin (V. & X. Ruf-ray) ; Poussan, 5 ind., 12 juin (P. Isenmann).

Lozère - St-Laurent-de-Trèves, 5 ind., phot., 3 juin (J. Bouard, J. Fonderflick *et al.*) ; La Parade, ad., 4 juin (M. Champion).

Morbihan - Île d'Hoëdic, juv., du 28 au 30 septembre (J. Pourreau, G. Rault^t *et al.*).

Pas-de-Calais - Tardinghen, ad., 26 juillet (G. Flohart) ; Platier d'Oye/Oye-Plage, ad., 16 août (G. Flohart, T. Fournet).

Tarn - Nages, ad., 4 juin (F. Bonnet) ; Albi, jusqu'à 3 ind., phot., du 7 au 13 juin (M. Bujaud).

Tarn-et-Garonne - Nohic, ad., phot., 1^{er} juin (A. Calvet).

2001 Corse-du-Sud - Solenzara, ad., vidéo, 29 mars (E. G. & S. Durand *fade* A. Flitti).

2001 Finistère - Île d'Ouessant, Lampaul, Ar Reun, Keranchas, jusqu'à 2 juv., phot, du 11 au 17 septembre (T. Galewski, F. Veyrunes *et al.*) ; Le Stiff, juv., 6 octobre (A. de Broyer *et al.*).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). L'afflux de 2001 (48 individus) a donc été suivi d'une deuxième vague encore plus forte en 2002 (101 individus) ! Tout le sud de la France a été touché et des oiseaux ont suivi le cours de la Garonne, tandis que d'autres sont remontés par les Cévennes ; quelques-uns ont atteint la Bretagne et le Pas-de-Calais un peu plus tard en saison. En Roumanie, 32 000 oiseaux furent notés de mai à juillet en Dobroudja et dans le delta du Danube, et 15 000 couples ont niché dans ce pays en trois colonies (L. Szabo *in litt.*). L'Italie a connu l'afflux le plus important depuis 50 ans avec 253 individus de la dernière semaine de mai au 9 juin (A. Corso *in litt.*) ; 41 individus ont été homologués aux Pays-Bas (van der Vliet *et al.* 2003). En Norvège, un groupe de 17 oiseaux a été observé le 14 juin près du cercle polaire (L. Szabo *in litt.*), et l'Islande a accueilli 11 oiseaux (Y. Kolbeinsson *in litt.*). Dans le Finistère, l'oiseau de Molène est sans doute celui ayant séjourné à Ouessant précédemment, et n'a donc pas été comptabilisé. De même, les deux juvéniles signalés à Ouessant du 11 au 17 septembre 2001 pourraient être ceux notés à Porz-Doun (V. *Ornithos* 10-2 : 76), puisqu'ils étaient très mobiles aux dires des observateurs.

MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (21/31) (16/25 - 1/0)

Corse-du-Sud - Bonifacio, mâle, 9 mai (Y. Kayser *et al.*).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Bonifacio est l'un des rares sites corses où l'espèce soit visible, souvent à l'unité et parmi des hybrides Moineau cisalpin *P. d. italiae* x Moineau espagnol.

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (143/177) (128/162 - 4/5)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d'un astérisque (*).

Doubs - Oye-et-Pallet, 3 mâles ch.* (dont 1 mâle rouge et 1 mâle gris), 8 juin (D. Michelat) ; La Cluse-et-Mijoux, mâle gris ch., le même, du 17 au 21 juin (F. Maillot, D. Michelat, J.-P. Paul *et al.*).

Hérault - La Caunette, juv., 8 octobre (S. Nicolle).

Jura - Les Rousses, mâle gris ch.*, 22 juin (N. de Marre, D. & J.-M. Michelat).

2001 Pas-de-Calais - Wissant, mâle rouge ch.*, 28 juin (T. Daumal, B. Paepegaey).

1999 Finistère - Île d'Ouessant : Park Raden, juv., du 26 au 28 octobre (P. Crouzier, F. Jiguet).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). De nouveau plusieurs chanteurs dans le Doubs, mais la nidification n'a pu être prouvée en raison des difficultés d'accès aux sites concernés. Avec l'arrivée tardive d'une donnée supplémentaire dans le Pas-de-Calais en 2001, la commune de Wissant a donc accueilli un couple nicheur, ayant produit un jeune volant, et deux mâles chanteurs (un rouge et un gris) au total cette année-là (*Ornithos* 10-2 : 77), mais 2002 est restée bien silencieuse dans cette région...

BRUANT À CALOTTE BLANCHE *Emberiza leucocephalos* (27/32) (13/18 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Bomborinette, mâle ad., 13 novembre (Y. Kayser).

(Sibérie). Un seul oiseau cet hiver, mais sur un nouveau site.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (75/80) (62/65 - 0/0)

2001 Finistère - Île d'Ouessant : Kerdraon, 19 octobre (F. Vanhove).

1999 Corse-du-Sud - Capitello, 2 ind., 15 et 16 avril (D. & G. Tissier).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Aucun en 2002 ! Il faut remonter à 1982, pour retrouver une année vierge, mais 2001, il est vrai, n'avait déjà fourni que deux oiseaux. Rappelons que la moyenne depuis 1981 se situe à presque trois individus par an.

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (68/80) (52/61 - 5/5)

Alpes-de-Haute-Provence - Saint-Jeannet, 2 mâle ch., du 16 au 29 juin (G. Durand, D. Freychet, M. Roux *et al.*).

Alpes-Maritimes - Cipières, 1 couple et 1 mâle, phot., du 20 mai au 7 juillet (P.J. Dubois, J.-L. Dupuy, A. Larousse *et al.*).

Haute-Corse - Barcaggio, mâle ch., phot., 18 et 19 mai (F. Portier).

Lozère - Champerboux, fem., 10 mai (F. Legendre) ; Hures-la-Parade, mâle ch., phot., du 21 au 28 juin (M. Chauchepat, R. Destre, F. Fluyt).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Toujours des données du Sud-Est, et la Lozère n'est pas en reste. En revanche, la nidification semble avoir échoué cette année à Cipières (J.-L. Dupuy *in litt.*), et aucun oiseau n'a été contacté sur le site de la Verdière dans le Var, malgré des recherches intensives (A. Flitti *in litt.*).



39. Harle couronné
Lophodytes cucullatus, juvénile,
Le Havre, Seine-Maritime,
juillet 2002 (Y. Créau).
Hooded Merganser.

ANNEXE 1 - ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (58/83) (41/54 - 4/5)

Alpes-Maritimes - Estuaire du Var/Saint-Laurent-du-Var, ad., 24 août et 10 novembre (M. Boët, C. Cerruti, A. Vernier).

Bouches-du-Rhône - Cadarache, Le Puy-Sainte-Réparate, Saint-Estève-Janson, ad., phot., du 23 au 29 décembre (A. Flitti, L. Luzzy, B. Muller *et al.*).

Hérault - Étang de Vendres, 2 ad., 27 et 28 août (G. Olios).

Var - Salins des Pesquiers/Hyères, ad., phot., 14 et 16 septembre (G. Vitalis, A. Zammit).

2000 Somme - Hâble-d'Ault/Cayeux-sur-Mer, ad., phot., du 10 septembre au 22 octobre (P. Della Valle, A. Desforges, D. Laloi) et non le 22 octobre uniquement (*Ornithos* 9-1 : 29).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). On peut se demander où a bien pu aller l'oiseau de l'embouchure du Var entre août et novembre ? Peut-être dans les salins des Pesquiers à Hyères ? Les deux adultes de l'étang de Vendres étaient accompagnés d'un Pélican gris *Pelecanus rufescens*.

PÉLICAN GRIS *Pelecanus rufescens* (18/18) (18/18 - 1/1)

Gard - Saint-Laurent-d'Aigouze, ad., du 9 au 19 juillet (D. Cohez, Y. Kayser).

(Afrique tropicale et présence quasi continue dans le sud de l'Égypte). Pour information, la colonie du zoo de Sigean, Aude, produit environ 15 jeunes volants par an, qui sont tous bagués.

SARCELLE ÉLÉGANTE *Anas formosa* (15/26) (6/6 - 1/1)

Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle, phot., du 17 février au 18 mars au moins (F. Jiguet).

(Sibérie, Asie). La dernière mention remonte à janvier 1999 en Indre-et-Loire. Cette donnée de début 2002 rappelle celle d'un mâle tué parmi six individus le 12 janvier 1924, déjà en baie de l'Aiguillon, mais c'était une autre époque...

HARLE COURONNÉ *Lophodytes cucullatus* (13/14) (13/14 - 1/1)

Seine-et-Marne - Le Havre, juv., phot., 7 juillet (Y. Créau).

2001 Bouches-du-Rhône - Camargue : Roquemaure, fem./imm., phot., du 18 au 27 décembre au moins (A. Blasco, T. Daumal, Y. Kayser, J. Walmsley *et al.*) et non les 18 et 19 décembre uniquement (*Ornithos* 10-2 : 79).

(Amérique du Nord). Le comportement et le lieu de l'oiseau de la baie de Seine pourraient plaider pour une origine sauvage mais la date n'est pas très convaincante. En effet, les Harles couronnés s'attardent bien au nord de l'Amérique avant que la glace ne les oblige à migrer plus au sud.

ROSELIN DE LICHTENSTEIN *Rhodopechys obsoleta* (1/1) (1/1 - 0/0)

2000 Pas-de-Calais - Plage du casino/Oye-Plage, mâle 1^{er} hiver., du 12 au 19 novembre (R. Aubry, S. Chambris, G. Flohart, A. Lebossé).

(Du sud-est de la Turquie jusqu'au nord-ouest de la péninsule arabique au sud, à la Mongolie à l'est). Première observation française de ce roselin découvert dans une bande de Linottes mélodieuses *Carduelis cannabina*. Son origine étant sujette à caution, il a été placé en catégorie D par la Commission de l'Avifaune Française (CAF).

ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui subsiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

Note importante : les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée sont fournies aux observateurs ayant joint une enveloppe timbrée à leur adresse et demandant à être informés de la décision du CHN.

2002

Océanite de Swinhoe *Oceanodroma monorhis* - Pyrénées-Orientales - Canet-en-Roussillon - 2 ind., 9 mai.

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* - Aude - Bages - 2 ad., 10 août ; Gruissan - 3 ind., phot., 13 août.

Ibis chauve *Beronticus eremita* - Nord - Maubeuge - juv., 11 août.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* - Marne - Lac du Der - mâle ad., phot., du 25 janvier au 4 mars au moins ;

Vendée - Étang des Boucheries/Les Landes-Génusson - 2 fem., 27 janvier.
Vautour moine *Aegypius monachus* - Aude - Joucou puis Aunat - 27 août.
Buse variable *Buteo buteo* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » - Aude - Espézel - 29 septembre ; Ille-et-Vilaine - Bazouges-la-Pérouse - 15 février ; Marne - Giffaumont - 9 novembre.
Buse féroce *Buteo rufinus* - Lozère - Drigas - 10 juin.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Ain - Versailleux-en-Dombes - fem. ad., 4 février.
Aigle pomarin *Aquila pomarina* - Aude - Camurac - 14 septembre.
Aigle criard *Aquila clanga* - Aude - Espézel - 11 septembre.
Faucon crécerellette *Falco naumanni* - Bouches-du-Rhône - Cuges-les-Pins - 2 fem., du 6 au 9 mai. Jura - Desnes - fem., 11 juillet. Pyrénées-Orientales - Osséja - mâle et fem. ad., 15 septembre.
Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* - Aude - Rouvenac - 1^{er} été., 11 mai ; Niort-de-Sault - forme claire, 13 août ; Espézel et Roquefeuil - ad., 5 septembre ; Belvis - forme claire, 12 septembre.
Faucon lanier *Falco biarmicus* - Jura - Desnes - mâle ad., *erlangeri*, 16 février. Landes - Saint-Martin-de-Seignanx - imm., 27 janvier. Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer - mâle juv., 14 janvier.
Faucon sacre *Falco cherrug* - Gard - Rochefort-du-Gard - imm., 30 juin.
Gravelot semipalmé *Charadrius semipalmatus* - Morbihan - Quiberon - phot., 28 août.
Chevalier bargette *Tringa cinerea* - Vendée - La Faute-sur-Mer - 2 ind., 25 avril.
Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* - Corrèze - Chasteaux - juv., phot., du 3 au 5 septembre.
Mouette de Franklin *Larus pipixcan* - Côtes-d'Armor - Cap Fréhel/Fréhel - 2^e hiver, 11 novembre.
Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Finistère - Le Relecq-Kerhuon - 1^{er} hiver, 13 février. Indre-et-Loire - Rillé - ad., 9 janvier. Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu - 1^{er} hiver, phot., du 30 avril au 10 mai. Nord - Quesnoy-sur-Deûle - 2^e hiver, 23 septembre.
Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides* - Finistère - Le Relecq-Kerhuon - 1^{er} hiver, du 1^{er} au 3 février. Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer - ad., 27 septembre.
Sterne bridée ou fuligineuse *Sterna anaethetus* ou *fuscata* - Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer - ad., 18 et 30 septembre.
Pipit de Richard *Anthus richardi* - Charente-Maritime - Île de Ré : Ars-en-Ré - 12 mars. Vendée - Sainte-Flaive-des-Loups - 26 janvier.
Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans » : Hérault - Ceilhes et Rocozels - mâle ad., 5 mai.
Tarier pâtre *Saxicola torquata* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *maura*, appelée « Tarier oriental » : Var - Île de Port-Cros - mâle, 13 mars.
Rosignol progné *Luscinia luscinia* - Vaucluse - Buoux - ad., capt., phot., 14 août.
Hypolaïs rama *Hippolaïs rama* - Hérault - Montpellier - 22 juillet.
Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* - Finistère - Île d'Ouessant : Pount-ar-Rodez, Ar Zourn - 1^{er} novembre.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* gr. *tristis/fulvescens* - Alpes-Maritimes - Vaugrenier - phot., 14 février. Finistère - Île d'Ouessant : Kadoran - 14 octobre.
Pouillot de Lorenz *Phylloscopus (sindianus) lorenzii* - Gironde - Lacanau - 2 ind., 30 septembre.
Étourneau roselin *Sturnus roseus* - Ain - Pérouges - juv., 12 juin.
Moineau espagnol *Passer hispaniolensis* - Hautes-Alpes - Le Monétier-les-Bains - mâle, du 22 au 24 août.

2001

Puffin semblable *Puffinus assimilis* - Nord - Clipon/Loon-Plage - 25 décembre.
Aigle pomarin ou **Aigle criard** *Aquila pomarina* ou *Aquila clanga* - Saône-et-Loire - Bourbon-Lancy - 23 mai.
Bécasseau minuscule *Calidris minutilla* - Finistère - Trunvel/Tréogat - juv., phot., du 10 au 12 septembre.
Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* - Haut-Rhin - Michelbach - juv., 14 septembre.
Goéland railleur *Larus genei* - Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer - 24 octobre.
Goéland d'Audouin *Larus audouinii* - Aude - Leucate - 2 ind. de 2^e été, 22 avril.
Tarier pâtre *Saxicola torquata* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *maura*, appelée « Tarier oriental » : Seine-et-Marne - Plaine de Chanfroy/Fontainebleau - mâle, 1^{er} avril.
Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus* - Pas-de-Calais - Haringzelle - 29 octobre.
Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* gr. *tristis/fulvescens* - Finistère - Île d'Ouessant : Poull-Brac - 29 octobre ; Stang-Parz-Gwenn - du 31 octobre au 2 novembre ; Pount-ar-Rodez - 1^{er} novembre ; Goulven - 17 et 18 novembre ; Begmeil/Fouesnant - 28 décembre.

2000

Vautour moine *Aegypius monachus* - Côte-d'Or - Saint-Jean-de-Bœuf - 3 juin.
Buse féroce *Buteo rufinus* - Alpes-Maritimes - La Turbie - phot., 19 octobre.
Buse pattue *Buteo lagopus* - Haut-Rhin - Sewen - 1^{er} et 3 janvier.

Faucon sacre *Falco cherrug* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Le Sambuc - 30 décembre.

Marouette poussin *Porzana parva* - Var - Hyères - 3 mâles et 1 fem., du 21 mars au 6 avril..

Martin-chasseur de Smyrne *Halcyon smyrnensis* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas de Roure - 6 mai.

Pipit de la Petchora *Anthus gustavi* - Gironde - Lacanau - du 13 au 15 septembre.

1999

Buse variable *Buteo buteo* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » - Ain - Gex - tuée par voiture, phot., novembre.

Aigle pomarin *Aquila pomarina* - Marne - Outines - 12 octobre.

1998

Syrnhapte paradoxal *Syrnhaptus paradoxus* - Seine-et-Marne - Ury - 2 ind., automne.

1996

Grive à gorge noire *Turdus ruficollis* - Val-d'Oise - Ermont - baguée en Russie le 17 avril comme fem. 2^e année, *atroglaris*, morte (collision contre la vitre d'une véranda) le 14 novembre. Il s'agissait en fait d'un Merle noir *Turdus merula* femelle...

1992

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Calvados - Port-en-Bessin - imm., phot., 1^{er} novembre.

1990

Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus* - Finistère - Étang de Nérizélec/Plovan - phot., mi-août.

ANNEXE 3 - CATÉGORIE E


Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la liste française ni dans la catégorie D, mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour.

- **Marabout d'Afrique** *Leptoptilos crumeniferus* - Ille-et-Vilaine - La Chapelle-de-Brain, ad., 4 septembre (Y. Février) ; Lot - Saint-Denis-Catus, électrocuté, phot., 4 novembre (J.-C. Boisguérin).
- **Flamant nain** *Phoenicopterus minor* - Bouches-du-Rhône - Camargue, 1 couple, du 1^{er} mai au 9 août (A. Arnaud) ; Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, phot., du 4 au 24 février (G. Flohart) ; 2001 Bouches-du-Rhône - Camargue, 1 couple, phot., du 9 avril au 21 août, 1 poussin, du 26 mai au 21 août (A. Arnaud, M. Magnier, B. Perez) ; 2000 Bouches-du-Rhône - Camargue, 2 ad., du 7 mai au 23 juin (A. Arnaud, C. Key) ; 1999 Bouches-du-Rhône - Camargue, 2 ad., du 19 mai au 12 juillet (C. Durand, V. Lemoine).
- **Sarcelle cannelle** *Anas cyanoptera* - Loiret - Guilly, mâle, du 17 octobre au 4 novembre (D. Chavigny).
- **Grue demoiselle** *Anthropoides virgo* - Hautes-Pyrénées - Puydarrieux, ad., baguée, phot., du 16 au 28 octobre (J.-P. Abadie, V. Ducasse, S. Lemur) ; 2000 Eure-et-Loir - Garancières-en-Beauce, ad., baguée, phot., 23 septembre (D. Thierry), précédemment en catégorie D (*Ornithos* 10-2 :80), mise en catégorie E à la demande de la CAF, compte tenu du port d'une bague, signant là une origine *a priori* captive (donnée déduite des statistiques).

REMERCIEMENTS

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 2002, ont contribué à son bon fonctionnement :

- la **Ligue pour la Protection des Oiseaux** (LPO) pour l'aide matérielle et financière attribuée au secrétariat du Comité, et nécessaire à son fonctionnement,
- la **revue *Ornithos*** pour la prise en charge du coût des photos en couleurs qui illustrent ce rapport,
- **Carl Zeiss Division Jumelles** pour le soutien apporté à la publication du rapport annuel,
- **Aurélien Audevard**, **Philippe J. Dubois**, **Guy Flohart**, **Julien Gonin**, **Nidal Issa**, **Yves Kayser**, **Robert Lécaille**, **Dominique Michelat**, **Georges Oliosio**, **Sébastien Reeber**, **Maxime Zucca** qui nous ont apporté des informations complémentaires,
- tous les responsables de Centrales Ornithologiques, de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) ou Départementaux (CHD) qui nous ont transmis des données,
- **Killian Mullarney**, **Colin Bradshaw**, **Lars Svensson**, **Bruce Mac Tavish**, **Jon King**, **Martin Reid** et **Geoff Carey**, experts sollicités en 2002,
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.



Retrouvez toutes les informations relatives au CHN sur le site Internet de la LPO (www.lpo.fr/homologation/index.htm). Téléchargez la liste des espèces soumises à homologation en France et un modèle informatique de fiche. Vous trouverez également la liste des comités d'homologation régionaux et départementaux français, ainsi qu'un lien vers le site de l'AERC (www.aerc.be), pour tout savoir sur les comités d'homologation européens.

SUMMARY

Rare birds in France in 2002. A new species was added to Category A of the French List in 2002: Great Black-headed Gull *Larus ichthyæetus*. A Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus* was the second French record (as was the case of a Steppe Eagle *Aquila nipalensis* in 2001). Of particular interest was the long stay (6 months) of a Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii* and, for the second consecutive year, a large number of Rosy Starlings *Sturnus roseus* (101 individuals). Further, 2000 included the first Desert Finch *Rhodopechys obsolata* (Category D) for France. The first pair of numbers in parenthesis following the scientific name of each species present the total numbers of French records and individuals (excluding 2002); the second pair relate to the same for the period 1981-2001; the last pair relate to the current year (2002).

Jean-Yves Frémont, Secrétariat du CHN, 58 rue Laugier, 75017 Paris
Comité d'Homologation National c/o LPO, La Corderie Royale, BP 90263, 17305 Rochefort Cedex

BIBLIOGRAPHIE

- DALLARD R. (2002). Présence hivernale d'une Outarde barbue *Otis tarda* dans le Gard. *Ornithos* 9-6 : 264-266.
- DUBOIS P.J., JIGUET F., LE MARÉCHAL P. & LA CAF (2003). En direct de la CAF. Décision récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française. *Ornithos* 10-5 : 230-237.
- DUQUET M. & FRÉMONT J.-Y. (2002). Un Gobemouche de la taïga *Ficedula parva albicilla* sur l'île de Sein ? *Ornithos* 9-5 : 216-217.
- FRÉMONT J.-Y. (1999). Première donnée automnale du Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii* en France. *Ornithos* 6-3 : 137-138.
- GONIN J. & CLÉMENT D. (2003). Statut de la Talève sultane *Porphyrio porphyrio* dans l'Aude et en France en 2002. *Ornithos* 10-6 : 252-257.
- JIGUET F. (1999). Première mention du Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii* en France. *Ornithos* 6-3 : 135-137.
- LALOI D. & SIBLET J.-P. (2003). Chant automnal d'un Pouillot de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis*. *Ornithos* 10-3 : 130-132.
- PERENNOU C. (2003). La protection de l'Érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala* en France. *Ornithos* 10-6 : 281-283.
- RAVAYROL A. & BUHOT D. (2002). Découverte d'une colonie de Faucons crécerelletes *Falco naumanni* dans l'Hérault. *Ornithos* 9-4 : 172.
- ROGERS M.J. & THE RARITIES COMMITTEE (2003). Report on rare birds in Great Britain in 2002. *British Birds* 96-11 : 542-609.
- VAN DER VLIET R.E., VAN DER LAAN J. & CDNA (2003). Rare birds in the Netherlands in 2002. *Dutch Birding* 25-6 : 361-384.
- ZUCCA M. & LE CMR (2003). Le Comité de suivi des Migrateurs Rares : objectifs, fonctionnement, mise en œuvre. *Ornithos* 10-4 : 182-183.



Le rapport annuel du Comité d'Homologation National (CHN) est publié avec le soutien de Carl Zeiss Division Jümelles



Adeptes de la photographie puis de la digiscopie, Gaël contribuait régulièrement à l'illustration d'*Ornithos*. Voici, ci-dessus, quelques-unes des belles images qu'il nous a confiées, d'autres continueront à agrémenter notre revue.



Gaël Rault (1970-2003)

Ceux qui ont eu la chance de rencontrer Gaël garderont certainement de lui l'image d'une personne aimable, aux sens nobles de ce terme. Car au-delà de ses compétences reconnues en ornitho, Gaël était avant tout un garçon sensible, agréable, discret mais pourtant attentif aux autres, pour qui le mot amitié avait une vraie signification. Espérons que nous avons su lui montrer que l'amitié, l'affection même que nous lui portions, étaient tout aussi sincères.

Gaël nous a quittés avant la nouvelle année, que nous aurions aimé lui souhaiter excellente, mais le destin en a décidé autrement... Tout autant qu'il nous manque déjà, les mots nous font défaut pour décrire ce que sa disparition représente.

Les croyants n'auront aucun mal à imaginer qu'il a déjà rejoint le Paradis des ornithos, les autres auront une pensée pour lui quand ils observeront, dans sa Bretagne natale ou ailleurs, ces oiseaux qui l'ont tant passionné.

À Naëlle et Clémence, à ses parents, et en particulier à son cousin Arnaud Le Nevé, également ornithologue, à ses amis et à tous ceux que sa disparition affecte, nous adressons notre soutien et nos plus amicales pensées. Kenavo Gaël !

Marc Duquet & Jean-Yves Frémont, pour le CHN et le Comité de rédaction d'Ornithos