



Les oiseaux rares en France en 2003



22^e Rapport du Comité d'Homologation National

Jean-Yves Frémont *✉* le CHN

Ce 22^e rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 2003. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 2003 est de 533 (459 en 2002, 507 en 2001). Le taux d'acceptation atteint 87,1%, un chiffre nettement supérieur à ceux des deux années précédentes (82,6% en 2001 et 83,2% en 2002). En 2003, Yvon Créau achevait son mandat et a été remplacé par Alain Rouge, déjà membre du CHN de 1993 à 2001. Pierre Crouzier et Jean-Yves Frémont ont été, pour leur part, reconduits dans leur fonction de Président et de Secrétaire du CHN. En 2003 le CHN se composait donc des membres suivants : Pierre Crouzier (Président), Marc Duquet, Amine Flitti, Guy Flohart, Jean-Yves Frémont (Secrétaire), Yves Kayser, Dominique Michelat, Gaël Rault[†] et Alain Rouge. Un poste a été pourvu en 2004 et un autre doit l'être en 2005. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du Secrétaire du CHN avant le 1^{er} mai 2005.

TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CHN

Ordre systématique

Compte tenu de la décision de la Commission de l'Avifaune Française (CAF) suivant en cela celle du Comité Taxonomique Européen (AERC TAC) de modifier l'ordre systématique des taxons dans la liste des oiseaux du Paléarctique occidental, les Ansériformes et les Galliformes se trouvent désormais en tête des listes des oiseaux de France et du Paléarctique occidental (Jiguet & la CAF 2004).

Révisions de fiches

Comme annoncé dans le précédent rapport, des révisions ont été engagées à la demande de la Commission de l'Avifaune Française (CAF) notamment concernant les taxons nouvellement élevés au rang d'espèce (Jiguet & la CAF *op. cit.*). C'est ainsi que toutes les données d'Hypolaïs pâle *Hippolais pallida* et bottée *Hippolais caligata* ont été revues, celles de Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* le sont actuellement.

Espèces soumises à homologation

À compter du 1^{er} janvier 2005, deux espèces – l'Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* et le Vautour moine *Aegypius monachus* – ne sont plus soumises à homologation nationale et la zone géographique au sein de laquelle le Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* l'est se trouve modifiée.

- **Vautour moine** – L'expansion des populations françaises de ce rapace, l'annonce de nouveaux programmes de réintroduction et les considérables capacités de dispersion de ce vautour ne permettent plus de recueillir de manière satisfaisante les données le concernant, d'où son retrait de la liste des espèces soumises à homologation nationale en France.
- **Érismature rousse** – Le nombre de mentions annuelles d'Érismatures rousses dépasse depuis plusieurs années celui habituellement retenu pour son maintien sur la liste des espèces soumises à homologation au plan national. Toutefois, l'espèce ne pouvait être retirée de cette liste, compte tenu des enjeux de protection relatifs aux risques générés par son expansion, à la nécessité d'en connaître les effectifs afin de pouvoir les limiter pour préserver les populations d'Érismatures à tête blanche *Oxyura leucocephala*, et ceci à la demande du Ministère en charge de l'environnement. La création récente d'un organisme de

recensement des migrateurs rares (Zucca & le CMR 2003) mis en place notamment pour assurer le suivi des espèces dont le statut ne relevait plus du champ de compétences du CHN, va permettre dorénavant de prendre en compte cette espèce.

- **Faucon d'Éléonore** – Au vu de l'imprécision du critère d'exclusion géographique adopté depuis plusieurs années, mais aussi de la puissance de vol de cette espèce devenue régulière sur le littoral méditerranéen, celle-ci ne sera plus soumise à homologation nationale qu'en dehors des départements présentant une façade sur la Méditerranée – Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. Le Faucon d'Éléonore reste donc soumis à homologation nationale sur tout le reste du territoire.

- **Espèces exotiques** – Le CHN ne souhaite pas examiner les mentions d'espèces ou d'individus manifestement échappés de captivité. Celles-ci ne lui parviennent d'ailleurs que de manière très aléatoire, la plupart des observateurs censurant d'eux-mêmes bon nombre de données de canards ou autres espèces exotiques. De même, il nous semble sans intérêt d'examiner les mentions d'oiseaux appartenant à des populations férales d'ores et déjà bien connues, tels que les Pélicans gris *Pelecanus rufescens* de l'Aude et de l'Hérault (en raison des échappés du zoo de Sigean) ou les Pélicans frisés *Pelecanus crispus* de Dombes. Le CHN n'examinera donc que les fiches relatives à des oiseaux présentant une potentialité, même très faible, d'être d'origine sauvage, tels que le Marabout d'Afrique *Leptoptilos crumeniferus*, la Grue demoiselle *Grus virgo* ou encore la Sarcelle cannelle *Anas cyanoptera*... Il sera tenu compte, à cet égard, des lieux et dates d'observation, de l'éventuelle présence de bagues de zoo ou des implantations des populations férales connues.

- **Bernache du Pacifique** – En raison du risque croissant, et déjà avéré, de découverte en France de Bernaches cravants *Branta bernicla* présentant des caractères intermédiaires entre les sous-espèces *bernicla* et *nigricans*, le CHN souligne la nécessité de produire des descriptions particulièrement détaillées. Il n'acceptera donc que celles totalement conformes aux critères attendus.



1. Paruline rayée
Dendroica striata,
Ouessant, Finistère,
octobre 2003
(M. Vergès).
Blackpoll Warbler

Fiches d'homologation

Délai d'envoi – Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (modèle à demander au secrétariat du CHN ou à télécharger sur le site du CHN (<http://www.lpo.fr/homologation>)) dès que possible après l'observation – que vous soyez le découvreur ou simple observateur – et cela avant le 31 décembre de l'année en cours. Cela évite la publication très tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s). **Fiche et photos** – Il est également important de souligner qu'en dépit du développement rapide de la digiscopie et des nombreuses images d'oiseaux occasionnels qu'elle génère, rien ne peut remplacer une bonne description écrite. Les films et les photographies, numériques ou non, les enrichissent réellement et s'avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever des questions auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Le CHN souhaite donc ne plus recevoir de fiches sans description, fondées seulement sur une ou même plusieurs images, aussi bonnes soient-elles. **Prise en compte des données** – Rappelons enfin que dans un souci de validation homogène des données, seules celles présentées à un comité d'homologation national sont prises en compte pour la publication de synthèses nationales et européennes concernant une espèce.

LES FAITS MARQUANTS

En 2003, une espèce a été ajoutée à la Liste des oiseaux de France – le Fou masqué *Sula dactylatra* – ainsi que deux sous-espèces – la Fauvette babillarde « orientale » *Sylvia curruca minula/halimodendri* (l'une ou l'autre de ces deux formes orientales) et le Pouillot du Caucase *Phylloscopus trochiloides nitidus*. La Sterne de Forster *Sterna forsteri* fournit sa deuxième mention et le Guillemot de Brünnich *Uria lomvia*, sa troisième (la première d'un oiseau vivant), tout comme le Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* et la Locustelle de Pallas *Acrocephalus certhiola*. Avec 85 oiseaux, l'Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* a établi un record, meilleur chiffre depuis la prise en compte de l'espèce par le CHN en 1987. Pas moins de six Pluviers bronzés *Pluvialis dominica* se sont retrouvés sur le sol français ainsi que sept Pouillots de Hume *Phylloscopus humei* (cette dernière espèce ne comptait que cinq oiseaux jusqu'à présent). Le Chevalier solitaire *Tringa solitaria*, dont on enregistre la cinquième donnée, n'avait pas été vu en France depuis 17 ans ! L'année 2003, enfin, aura vu la première Buse de Swainson *Buteo swainsoni* (catégorie D) pour la France.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A & C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants à l'exclusion de l'année 2003, les deux suivants les données homologuées depuis 1981 (2003 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 2003.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Observateur(s), sauf exception, limité à trois (ordre alphabétique et/ou découvreur, identificateur, photographe ou dessinateur).
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de Voous (1978, *The List of the Birds of the Western Palearctic*), modifiée par la *Liste des oiseaux du Paléarctique occidental* (CAF/LPO 2003).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 2003. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Plongeon à bec blanc – un 1^{er} hiver le 31 janvier 2003, île de Molène, Finistère (A. Audevard, in Frémont & le CHN 2005).

2. Oie rieuse du Groenland
Anser albifrons flavirostris,
 Ouessant, Finistère,
 octobre 2003
 (A. Audevard).
White-fronted Goose
 of *Greenland* race.



OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (139/951) (42/112 - 4/85)

Charente-Maritime - Moëze, H1, phot., du 25 novembre au 14 février 2004 (P. Jourde *et al.*).

Marne - Scurpt, ad., phot., du 24 au 30 décembre au moins (A. Flitti *et al.*).

Nord - Loon-Plage, 66 ind., phot., 19 février (G. Flohart).

Pas-de-Calais - Audinghen, 17 ind., 16 février (G. Flohart, M. Narcy).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Nombre d'oiseaux record depuis la prise en compte de l'espèce par le CHN en 1987. Il faut dire que la pose, remarquable, de 66 individus dans les friches industrielles de la zone portuaire de Dunkerque n'y est pas étrangère. Il s'agit sans doute d'oiseaux hivernant au Bénélux et qui se déplacent un peu trop à l'ouest, en général à la suite d'un coup de froid ; malheureusement, souvent accueillis par une gerbe de plombs, ceux-ci repartent bien vite vers des cieux plus hospitaliers...

OIE RIEUSE DU GROENLAND *Anser albifrons flavirostris* (6/13) (3/10 - 1/0)

Finistère - Île d'Ouessant : Poull Gwegen, 2 ad., phot., du 11 au 21 octobre (A. Audevard, L. Spanneut *et al.*).

(Sud-Ouest du Groenland). Comme en 2002, il y a eu à la mi-octobre de fortes tempêtes au large de l'Islande, ce qui pourrait expliquer cette arrivée. Cela dit, après l'année exceptionnelle de 2002 qui avait vu l'apparition de neuf individus sur les îles bretonnes, on peut aussi penser que ces deux oiseaux (adultes) ont eu la « nostalgie du pays » ; c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été comptabilisés.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (71/36) (71/36 - 5/4)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *nigricans*, appelée « Bernache du Pacifique »

Charente-Maritime - Île d'Oléron : Le Château-d'Oléron (et côte entre Saint-Trojan et Saint-Denis-d'Oléron), jusqu'à 4 ind., du 28 octobre au 1^{er} mars 2004 (A. Kim) ; Les Boucholeurs/Chatelailon-Plage, Bourcefranc-le-Chapus, une partie de ces ind., jusqu'au 15 mars 2004 (A. Kim).

Vendée - Lagune du Dain/Bouin, ad., 15 février (M. Vaslin) ; Saint-Vincent-sur-Jard, ad., phot., 16 février (F. Jiguet) ; Île de Noirmoutier : Le Luzan/Noirmoutier-en-l'Île (et alentours : L'Épine, Barbâtre), jusqu'à 5 ind., phot., du 4 novembre au 15 janvier 2004 (D. Desmots, M. Vaslin, W. Raitière).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Sur le littoral charentais, les deux premiers oiseaux sont notés le 28 octobre sur l'île d'Oléron rejoints par deux autres le 11 novembre, lesquels sont accouplés à des *bernicla* et accompagnés respectivement de 4 et 5 jeunes « hybrides » ! Un cinquième oiseau est suspecté, mais il est difficile de suivre les mouvements qui s'effectuent dans ce vaste complexe des pertuis charentais, d'autant que les échanges s'intensifient en début de printemps. Pour les statistiques, tous ces oiseaux sont considérés

comme des revenants et donc non comptabilisés. Dans le sud de la Vendée, un oiseau avait déjà séjourné à Saint-Vincent-sur-Jard au cours de l'hiver 2001-2002, bien qu'il n'ait pas été signalé en début d'hiver 2003, on peut raisonnablement penser que celui observé à la mi-février soit le même. Dans le nord du département, bien que les bernaches noirmoutrines puissent parfois fréquenter la baie de Bourgneuf située en face de l'île, l'oiseau de Bouin, également de février, a pu être clairement différencié et donc compté comme un nouvel oiseau. Sur l'île de Noirmoutier, l'hiver 2003-2004 a vu, outre les 5 *nigricans* « pures », 4 individus (une famille de 2 adultes et 2 jeunes) présentant des caractères intermédiaires entre *bernicla* et *nigricans*. Bien entendu, seuls les oiseaux ne montrant pas de traces d'une « hybridation » sont ici pris en compte. Pour cet hiver 2003-2004, trois nouveaux individus ont été pris en compte pour Noirmoutier (deux adultes au cours de l'hiver 2002-2003, *Ornithos* 11-2 : 54).

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis* (37/38) (21/20 - 1/1)

Finistère - Plounéour-Trez, ad., phot., du 3 au 17 mai (A. Audevard, F. Barrault, S. Mauvieux *et al.*). (Sibérie). Les dates de séjour de cet oiseau incitent grandement à la prudence quant à son origine...

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (38/39) (35/36 - 3/2)

Finistère - Goulven, mâle ad., du 14 octobre au 13 mars 2004 (F. Barrault, A. Le Nevé, X. Rozec).
Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : Saint-Lumine-de-Coutais, fem., phot., du 4 février au 1^{er} mars (S. Reeber), mâle ad., phot., du 22 décembre au 15 janvier 2004 (S. Reeber).
2001 Moselle - Zommange, mâle ad., 11 décembre (M. Hirtz).

(Amérique du Nord). L'oiseau de la baie de Goulven est désormais bien connu. Quant au mâle adulte vu en décembre sur le lac de Grand-Lieu, il fréquentait la même remise que celui présent en janvier 2002, mais aucun mâle n'ayant été vu au cours de l'hiver 2002-2003 sur ce site particulièrement bien suivi, il a été considéré comme un nouvel oiseau. Avec l'ajout d'une donnée parvenue tardivement, l'année 2001 détient désormais le record pour l'espèce avec six individus.

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (39/31) (38/30 - 3/3)

Charente-Maritime - Breuil-Magné, mâle ad., phot., du 3 au 25 avril (Y. Créau).
Loire-Atlantique - Le Massereau/Frossay, mâle ad., phot., 31 décembre (M. Vaslin).
Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., du 11 au 25 avril (P.-P. Evrard, A. Thomas, P. Trotignon).
2001 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., du 10 novembre au 15 janvier 2002 (J. Gonin, A. Thomas) et non le 1^{er} décembre uniquement (*Ornithos* 10-2 : 52).
2000 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., du 23 décembre au 15 janvier 2001 (A. Thomas).

3. Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, Noirmoutier, Vendée, décembre 2003 (M. Vaslin). *Black Brant*.



4. Bernache à cou roux *Branta ruficollis*, Goulven, Finistère, mai 2003 (A. Audevard). *Red-breasted Goose*.



1999 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., phot., du 19 décembre au 16 février 2000 (J. Gonin, A. Thomas) et non le 16 février 2000 uniquement (*Ornithos* 9-1 : 6).

1998 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., du 11 décembre au 31 janvier 1999 (A. Thomas).

1998 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, 2 mâles ad., du 1^{er} au 25 janvier (J.-Y. Frémont, A. Larousse, A. Thomas *et al.*), 1 seul mâle ad., jusqu'au 12 avril (A. Thomas) et non 2 ad., jusqu'au 25 janvier uniquement (*Ornithos* 7-4 : 148).

1998 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle imm., du 3 au 17 janvier (A. Thomas).

(Amérique du Nord). À noter les dates concomitantes des données de Charente-Maritime et de Vendée, qui font manifestement penser à des oiseaux en halte migratoire printanière (c'est la raison pour laquelle celui de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré a été comptabilisé, bien que ce site accueille au moins un hivernant quasiment chaque année). À ce propos, l'arrivée de données tardives et de compléments pour cette réserve naturelle a permis des réajustements.

SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors* (51/56) (41/46 - 2/1)

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : Saint-Lumine-de-Coutais, fem., 19 mars (S. Reeber).

Vendée - La Barre-de-Monts, fem. ad., phot., du 14 avril au 3 juin (M. Vaslin *et al.*).

2002 Vendée - La Barre-de-Monts, fem. ad., phot., du 4 mai au 29 juin (F. Signoret, M. Vaslin).

(Amérique du Nord). Une fois de plus, l'oiseau de Grand-Lieu est trouvé sur les prairies inondées du lac parmi les Canards souchets fraîchement arrivés, 26000 ce jour-là !). En 2002 et 2003, la femelle des marais de Monts s'est appariée à un mâle de Canard souchet et a élevé à chaque fois six canetons ; une note relative à ces observations est en préparation pour *Ornithos* (M. Vaslin, comm. pers.).

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (126/110) (118/102 - 11/5)

Finistère - étangs de Poulinoc et de Lannéon à Saint-Renan, fem. ad., phot., du 10 octobre au 29 avril 2004 (A. Audevard, F. Barrault, M. Champion, A. Le Nevé *et al.*) ; étang de Kerescar/Ploumoguier, fem. ad., phot., du 17 novembre au 6 décembre (A. Audevard, M. Champion).

Indre - Brenne : Lingé, fem. ad., 31 décembre au moins (F. Desage).

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, fem., du 31 janvier au 10 février (S. Reeber), fem. ad., phot., 25 mars (S. Reeber).

Rhône - Miribel-Jonage, mâle ad., phot., 21 et 22 février (A. Faure, V. Rolland-Commarmot *et al.*).

Saône-et-Loire - Saint-Marcel, mâle ad., du 18 au 21 janvier (J.-M. Frolet *et al.*).

Yvelines - Louveciennes, fem., phot., 11 janvier (P.J. Dubois).

Vendée - Jard-sur-Mer, fem. ad., du 28 octobre au 10 décembre (O. Girard, F. Portier, L. Sallé, P. Trotignon).

Yonne - Bas-Rebourseaux/Vergigny, mâle ad., 15 novembre au moins (P. Durlet).

Essonne - Bruyères-le-Châtel, fem., phot., du 8 au 22 novembre au moins (M. Bitter).

5. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, femelle, Ploumoguier, Finistère, décembre 2003 (A. Audevard). *Female Ring-necked Duck*.



6. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, Miribel-Jonage, Rhône, février 2003 (V. Rolland-Commarmot). *Male Ring-necked Duck*.



2002 Finistère - étangs de Poulinoc, Lannéon et Ty Colo à Saint-Renan et étang de Kerescar/Ploumoguier, fem. H1, phot., du 1^{er} décembre au 10 avril 2003 (A. Audevard, F. Barrault, M. Champion) et non du 8 décembre au 7 mars 2003 uniquement (*Ornithos* 11-2 : 56).

2002 Sarthe - Saint-Denis-d'Orques, fem. ad., phot., du 7 au 24 novembre (C. Kérihuel, D. Tavenon *et al.*), mâle H1, phot., du 29 novembre au 3 janvier 2003 (C. Kérihuel, D. Tavenon *et al.*).

2002 Yonne - Bas-Rebourseaux/Vergigny, mâle ad., phot., du 27 octobre au 15 décembre (A. Martaud).

(Amérique du Nord). Plusieurs oiseaux sont des revenants (Finistère, Indre, Vendée, Yonne, Essonne) et n'ont donc pas été comptabilisés. On peut se poser des questions sur le nombre croissant des apparitions de ce fuligule (l'arrivée de données tardives place désormais l'année 2002 en tête avec 20 individus !) et notamment sur l'origine d'une partie au moins de ces oiseaux. Cela étant dit, le Fuligule à bec cerclé est en augmentation en Amérique du Nord, et en Grande-Bretagne, il a littéralement explosé. Rien n'indique donc qu'il soit davantage échappé de zoos qu'un autre canard néarctique... Quoi qu'il en soit il faut souligner que sur le lac de Grand-Lieu, on a pu noter l'arrivée quasi simultanée d'un Fuligule à tête noire (29 janvier), d'un Fuligule à bec cerclé (31 janvier) et d'un Canard à front blanc (4 février) !

FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (9/6) (9/6 - 3/1)

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, fem. H1 probable, du 29 janvier au 14 mars (S. Reeber), fem. ad., phot., du 9 décembre au 15 janvier 2004 (S. Reeber).

Haut-Rhin - Huningue, mâle ad., phot., du 6 novembre au 9 février 2004 au moins (V. Palomares, A. Torkler). (Amérique du Nord). Sur le lac de Grand-Lieu, selon l'observateur, il est tout à fait possible que l'oiseau de fin 2003 soit le même que celui vu en début d'année, il n'a donc pas été comptabilisé, tout comme le revenant transfrontalier d'Alsace. Rappelons qu'une femelle immature avait déjà séjourné sur le lac de Grand-Lieu du 9 au 16 avril 2001.

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (6/6) (6/6 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *americana*, appelée « Macreuse à bec jaune »

Vendée - La Coupelasse/Bouin, mâle imm., du 15 au 25 avril (O. Girard, J.-Y. Frémont, Y. Trévoux, M. Vaslin). (Amérique du Nord, Sibérie). La dernière donnée remonte au 15 mars 1998 au même endroit.

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (47/49) (27/29 - 1/1)

Vendée - La Gachère/Brétignolles-sur-Mer, mâle imm., phot., 8 mai (D. Desmots, W. Raitière *et al.*).

(Amérique du Nord). Après des observations annuelles de 1993 à 1999, aucune donnée n'a été répertoriée en 2000 et 2002. Les observateurs seraient-ils moins assidus à détailler les bandes de macreuses, ou l'irrégularité des données depuis trois ans est-elle bien réelle ? En tout cas, celle-ci était dans un groupe d'à peine cent Macreuses noires et brunes, et pouvait concerner un oiseau ayant hiverné plus au sud.

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (400/1147) (392/1138 - 34/169)

Aube - Lac de la forêt d'Orient/Mesnil-Saint-Père, mâle ad. et 2 fem./juv., 28 décembre (J.-B., M. & P. Cruzier, A. Forest, G. Murtin).

Bouches-du-Rhône - Camargue : Roquemaure et Tour-du-Valat, fem./imm., du 29 décembre au 25 janvier 2004 (M. Gauthier-Clerc, Y. Kayser, M. Vaslin *et al.*)

Charente-Maritime - Lagunage de Rochefort-sur-Mer, mâle et 2 fem., 21 octobre (O. Laluque, P. Trotignon), mâle H1 probable, 24 novembre (P. Trotignon).

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : fin d'hivernage, 44 mâles et 91 fem./imm., 5 janvier, 48 mâles et 91 fem./imm., 22 janvier, 36 mâles et 76 fem./imm., 20 février, 56 mâles et 92 fem./imm., 6 mars, 34 mâles et 28 fem./imm., 3 avril (S. Reeber) ; nidification et estivage, 17 ad. seuls et 50 ad. appariés dont 12 avec poussins, 2^e quinzaine de juin (S. Reeber) ; hivernage, 32 mâles et 24 fem./imm., 21 novembre, 44 mâles et 80 fem./imm., 1^{er} décembre, 76 mâles et 120 fem./imm., 30 décembre (S. Reeber) ; Les Moutiers-en-Retz, mâle ad., du 18 au 27 juillet (J.-Y. Frémont), 2 mâles ad. et 1 fem., 2 août (J.-Y. Frémont), 3 mâles ad., 9 août, 2 mâles ad., 16 août (J.-Y. Frémont).

Maine-et-Loire - étang de Cheigné/Saint-Georges-sur-Loire, 3 mâles et 5 fem./imm., 21 octobre (J.-C. Beaudoin, C. Bretaudeau).

Marne - Lac du Der/Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, mâle ad. et mâle H1, 25 janvier (T. Besançon).

Mayenne - Secteur des « Coëvrons » (nord-est Mayenne) : étangs de Beaucoudray/Aron, de la Grande-Métairie/Jublain, de la Cosnière, du Gué de Selle et Chevalière/Mézangers, des Landes/Sainte-Suzanne, 10 mâles et 8 fem., 8 nichées, du 14 janvier au 14 août (J.-F. Arcanger) ; étangs du Gué de Selle et des Landes/Sainte-Suzanne,

60 ind., du 7 au 30 octobre (J.-F. Arcanger) ; étang de Curessy/Grez-en-Bouère, imm., 7 et 13 août (J.-F. Arcanger) ; étang d'Olivet, jusqu'à 4 fem./imm., du 22 au 31 octobre (J.-F. Arcanger) ; étang des Rochettes/Loiron, mâle ad., 24 octobre (J.-F. Arcanger) ; étang du bas/Launay-Villiers, fem. ad., 31 octobre (J.-F. Arcanger).

Haute-Saône - Vaivre-et-Montoille, fem. ad., phot., 10 janvier (D. Etienney, D. Lecornu).

Seine-et-Marne - Jablines, fem. ad., du 12 janvier au 10 février (F. Bouzendorf, B. Lebrun *et al.*).

Yvelines - Louveciennes, fem. ad. probable, phot., 11 janvier (P.J. Dubois).

Vendée - Étang des Boucheries/Les Landes-Génusson : fem., 12 juillet, 2 mâles et 2 fem., 7 août, mâle, 20 août, 2 fem., du 4 septembre au 16 octobre (L. Grillet) ; 3 mâles et 7 imm., phot., Jard-sur-Mer, du 19 au 26 octobre (F. Portier).

2002 Aube - Lac de la forêt d'Orient/Piney, 2 mâles et jusqu'à 3 fem., du 27 décembre au 18 février 2003 (J.-B., M. & P. Crouzier, A. Forest, G. Murtin, O. & S. Paris *et al.*), et non 2 mâles et 2 fem. uniquement le 27 décembre (*Ornithos* 11-2 : 57).

2001 Mayenne - étang de la Rincerie/Ballots, 2 fem., 23 décembre (J.-L. Reuzé *cf.* D. Tavenon).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne où elle se reproduit librement). Au lac de Grand-Lieu, la phénologie de l'espèce est maintenant bien établie, ce que montrent encore les chiffres de l'année 2003 : stabilité constatée des effectifs lors des comptages de janvier 2003 par rapport à celui du 27 novembre 2002 (seulement 6 oiseaux supplémentaires), un départ s'amorce à la mi-février (112 oiseaux présents), suivi au début de mars par un passage d'oiseaux alors en migration et qui effectuent une brève halte sur le lac (148 individus alors présents), puis chute des effectifs en avril (62 oiseaux). En 2003, le nombre de nichées sur le lac peut être estimée à 10-15 avec une production moyenne de deux oiseaux à l'envol, mais il est probable qu'une quinzaine de nichées supplémentaires sont réparties sur des micro-sites non décelables (S. Reeber, comm. pers.) ; à noter que le nombre d'adultes présents en période de nidification (67 oiseaux en juin) correspond bien aux recensements d'avril et de novembre (62 et 56 individus). En fin d'été, une partie des érismaures quitte le lac pour se disperser sur des sites périphériques comme le montre l'apparition systématique d'oiseaux en marais Breton par exemple (station d'épuration des Moutiers-en-Retz). En fin d'année, 196 Érismaures rousses sont alors présentes sur Grand-Lieu, contre 133 à la même époque en 2002 (soit un surplus de 63 oiseaux, chiffre qui a été retenu pour les statistiques 2003). Il y a lieu d'ailleurs de noter que ce nombre correspond à la production de la trentaine de couples supposée dans le département (60 jeunes), quand on sait que les adultes, fidèles à leur site d'hivernage, regagnent Grand-Lieu avec leurs jeunes à l'automne (S. Reeber, comm. pers.). En Mayenne, la population semble désormais bien installée, en dépit du tir de dix individus au cours de l'été. En Vendée, les tirs effectués ces dernières années sur l'étang des Boucheries semblent avoir porté un coup d'arrêt à l'augmentation précédemment constatée ; signalons toutefois que les deux femelles d'octobre étaient en compagnie d'un mâle d'Érismaure à tête blanche ! Au global, l'année 2003 totalise 34 données pour 169 individus, léger recul par rapport aux années précédentes, mais qui ne traduit sans doute pas la réalité des choses, seulement un essoufflement du signalement de cette espèce par les observateurs. En effet, sur les secteurs particulièrement bien suivis comme la Loire-Atlantique et la Mayenne, le dynamisme de cette érismaure est bien loin de marquer le pas...

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (29/38) (24/33 - 2/3)

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle ad. et 2 fem., du 1^{er} décembre au 3 février 2004 (S. Reeber), encore 1 fem., 28 février (A. Le Nevé).

Vendée - Étang des Boucheries/Les Landes-Génusson, mâle ad., 16 et 17 octobre (L. Grillet *et al.*).

2002 Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle H1, phot., du 25 novembre au 24 juin 2003 (S. Reeber *et al.*) et non jusqu'au 4 février 2003 uniquement (*Ornithos* 11-2 : 58).

(Circum-méditerranéen : Espagne, Tunisie, Turquie, dans les Balkans, également au nord de la Caspienne ; en cours de réintroduction en Corse). Le mâle adulte du lac de Grand-Lieu est sans doute l'oiseau de 1^{er} hiver qui a séjourné sur ce site du 25 novembre 2002 au 24 juin 2003 ; il n'a donc pas été comptabilisé comme un nouvel oiseau.

PLONGEON À BEC BLANC *Gavia adamsii* (13/13) (9/9 - 2/2)

Finistère - Île de Molène, H1, 31 janvier (A. Audevard).

Seine-Maritime - Saint-Jouin-Bruneval, ad., 12 novembre (O. Benoist).

(Sibérie, Alaska). Deux oiseaux la même année, après une année blanche, pour ce plongeon qui reste d'une grande rareté dans notre pays. La sortie du port de Molène en plein hiver à bord de l'*Enez Eussa III* peut réserver de bonnes surprises...

ALBATROS À SOURCILS NOIRS *Thalassarche melanophrys* (8/8) (8/8 - 0/0)

2001 Nord - Le Clipon/Loon-Plage, ad., 6 novembre (C. Gruwier).

(Mers australes). Il s'agit de la troisième mention de cette espèce depuis ce haut lieu de seawatching ; les précédentes concernent un adulte le 4 septembre 1991 et un immature également un 6 novembre... 1994.

PUFFIN SEMBLABLE *Puffinus assimilis* (46/60) (39/53 - 1/1)

Manche - Gatteville-le-Phare, 23 septembre (V. Verneau).

(La sous-espèce *baroli* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries et aux Açores). Les années se suivent et se ressemblent à la pointe nord-est du Cotentin, avec cette nouvelle donnée à un jour d'intervalle par rapport à celle de 2002. Pas de données en provenance des ferries reliant la Grande-Bretagne à l'Espagne cette année...

OCÉANITE DE WILSON *Oceanites oceanicus* (22/22) (18/18 - 1/1)


En mer - Rochebonne : 45°58' N/1°58' W, 23 août (A. Faure, F. Malvaud, A. Virondeau).

(Îles de l'Antarctique. En période internuptiale, tous les océans, y compris l'Atlantique). L'organisation de cette sortie en mer par la LPO au départ de Fouras aura donc fait quelques heures.

FOU MASQUÉ *Sula dactylatra* (0/0) (0/0 - 1/1)

En mer - Rochebonne : 46°26' N/4°04' W, ad., phot., 3 septembre (H. Harrop et al.).

(La sous-espèce *dactylatra* niche sur les îles caraïbes et atlantiques tropicales, Antilles ; *granti* niche aux Galapagos et sur des îles proches dans le Pacifique). Ce fou, arrivé en soirée (donc on ne sait d'où...), a passé la nuit sur le bastingage du ferry Porthsmouth-Bilbao, avant de s'envoler au petit matin devant les côtes espagnoles (Harrop 2003). Cet oiseau, dont c'est la première mention en France, appartient au groupe *dactylatra* et a été admis par la CAF en catégorie A de la liste des Oiseaux de France (Jiguet & la CAF 2004).



7. Fou masqué *Sula dactylatra*, Rochebonne, golfe de Gascogne, septembre 2003 (H. Harrop). Masked Booby.

fig. 1. Localisation des observations d'Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus* et de Fou masqué *Sula dactylatra* effectuées en mer dans la zone économique exclusive (ZEE) française en 2003 (et 2000-2002 pour le premier). Distribution of pelagic records of Wilson's Petrel (blue : 2003, grey : 2000-2002) and Masked Booby (orange) in France in 2003. Red line represents the boundary between Spanish and French Exclusive Economic Zone (EEZ).

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (61/121) (53/113 - 6/19)

Ain - Lapeyrouse, ad., 11 août (R. Roy).

Aude - Fitou, ad., 1^{er} avril (C. Riols).

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, ad., 10 février (E. Duborper).

Côte-d'Or - Laperrrière-sur-Saône et Samerey, ad., phot., du 21 au 23 novembre (L. & S. Joly, J.-P. Paul *et al.*).

Hautes-Pyrénées - Azereix, juv., 3 septembre (J.-M. Fourcade, C. & D. Raguét).

Landes & Pyrénées-Atlantiques - Localités tenues secrètes : 13 sites occupés, 6 couples produisent 14 jeunes à l'envol (F. Delage, S. Duchateau *in litt.*).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). L'oiseau camarguais est peut-être celui présent à l'époque au marais du Viguirat, mais dans le doute il a néanmoins été comptabilisé. La population du Sud-Ouest montre une évolution positive avec la découverte de trois nouveaux couples cette année. Cette dynamique explique peut-être les observations dans des départements situés bien loin de ce noyau aquitain.



8. Élanion blanc *Elanus caeruleus*, Camargue, Bouches-du-Rhône, février 2003 (F. Dhermain). *Black-shouldered Kite*.

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (21/21) (19/19 - 1/1)

Aude - Lafajole, 9 juillet (P. Fioraso *vide* C. Riols).

(De l'Espagne à la Chine). L'expansion des populations françaises issues des programmes de réintroduction rend caduc le maintien de cette espèce sur la liste des espèces soumises à homologation nationale. Aussi le Vautour moine ne sera-t-il plus à homologuer à compter du 1^{er} janvier 2005.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (60/59) (45/44 - 2/2)

Aude - Espezel, mâle ad., 13 septembre (C. Riols).

Haute-Corse - Macinaggio, mâle ad., 16 avril (P.J. Dubois).

(Asie centrale, à l'ouest jusqu'en Roumanie). Retour à une année conforme à la moyenne (deux données pour deux individus depuis 1981, date de la création du CHN après le record de 2002 (six oiseaux !).

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (24/24) (21/21 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie »

Doubs - Bulle, ad., 19 et 20 janvier (D. Michelat *et al.*).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). Comme en 2002, un seul oiseau de cette sous-espèce délicate à identifier.

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (18/15) (14/11 - 3/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas Neuf et environs, ad., phot., du 20 octobre au 25 février 2004 au moins (A. Flitti, F. Garcia, V. Palomares, M. Zucca *et al.*).

Côte-d'Or - Rouvres-en-Plaine, H1, 10 septembre (P. Durlet, H. Gauche).

Haut-Rhin - Saint-Louis, 27 mai (N. Minéry, G. Muller).

2001 Bouches-du-Rhône - Camargue : Bomborinette, imm., du 17 novembre au 16 avril 2002 (S. Durand, A. Flitti, Y. Kayser).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Un nouvel hivernage pour l'oiseau camarguais et deux données, une nouvelle fois, dans des départements inattendus. À ce sujet, il faut signaler que dès l'année 2000, le CHN avait été informé que des oiseaux étaient importés illégalement en France, notamment des jeunes (sans doute pris au nid) en provenance du Maghreb (Algérie principalement semble-t-il) et remis par la police aux services vétérinaires du Jardin des Plantes et du zoo de Vincennes (J.-L. Berthier *in litt.*). Ce phénomène est toujours d'actualité et a été corroboré par des saisies régulières chez des particuliers dans le quart sud-est de la France (G. Oliosio *in litt.*). L'augmentation constante du nombre de Buses féroces



9. Buse pattue *Buteo lagopus*, Gravon, Seine-et-Marne, décembre 2003 (F. Bouzendorf). *Rough-legged Buzzard*.



10. Aigle pomarin *Aquila pomarina*, La Rivière-Drugeon, Doubs, septembre 2003 (J. Bruezière). *Lesser Spotted Eagle*.

en France et ses apparitions dans des régions pour le moins étonnantes pourraient donc avoir une explication. Toutefois, dans la majorité des cas, il est difficile voire hasardeux de statuer sur l'appartenance à une quelconque sous-espèce à partir des descriptions fournies, ce qui empêche de confirmer cette hypothèse.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (346/370) (277/297 - 8/8)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Villeneuve, fem. ad., 10 février (Y. Kayser).

Doubs - La Rivière-Drugeon, fem. ad., phot., du 5 novembre au 14 mars 2004 (D. Michelat, M. Sauret *et al.*) ; Boujailles, mâle ad., phot., du 25 novembre au 14 décembre (D. Michelat).

Haute-Marne - Chalvrairie, fem. ad., phot., du 12 au 22 février (B. Théveny).

Moselle - Hagen et Evrange, mâle ad., du 8 au 18 février (J.-L. Cathala).

Pas-de-Calais - Audinghen, H1, 8 décembre (G. Flohart).

Haut-Rhin - Aspach-le-Haut, fem. ad. probable, 11 janvier (T. Bitsch).

Seine-et-Marne - Gravon, fem. H2 probable, phot., vidéo, du 29 nov. au 14 décembre (L. Spanneut, M. Zucca *et al.*). (Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Année plutôt moyenne et localisations classiques, hormis la donnée tout à fait exceptionnelle de Camargue, une région qui n'avait jamais accueilli l'espèce (mentions les plus méridionales : une de Drôme en janvier 1985 et une des Pyrénées-Atlantiques en janvier 1990).

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (40/39) (36/35 - 2/3)

Doubs - Entre La Rivière-Drugeon, Bannans, Sainte-Colombe, Bonnevaux et Bulle, ad. et subad., phot., du 10 au 22 septembre (D. Michelat *et al.*) ; Bonnevaux, juv., 13 septembre (D. Michelat, C. Mauvais).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Belle série d'observations dans ce coin de Franche-Comté qui a déjà accueilli l'espèce pendant 11 jours (!) en fin de printemps 1989.

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (193/152) (144/99 - 10/3)

Bouches-du-Rhône - Camargue : bois de Tourtoulon et étang Redon, ad., du 10 janvier au 11 mars (D. Cohez, M. Gauthier-Clerc, J.-Y. Mondain-Monval *et al.*) ; Tour-du-Valat, H1, du 19 janvier au 20 avril (E. Duborper, Y. Kayser, A. Larousse), ad., du 27 octobre au 30 janvier 2004 (M. Gauthier-Clerc, C. Pin *et al.*) ; Consécannière et Tagès, ad., du 13 février au 13 mars (E. Duborper, Y. Kayser, N. Vincent-Martin) ; Bomborinette, imm., 9 mars (G. Bruneau, P.-A. Crochet, E. Didner), H1, phot., du 10 décembre au 15 mars 2004 (D. Cohez, Y. Kayser, F. Le Gouis) ; Amphise, imm. *fulvescens*, du 22 au 27 octobre (M. Gauthier-Clerc, M. Thibault) ; Le Vigueirat/Mas-Thibert, ad., du 19 janvier au 24 mars (G. Massez *et al.*), ad., du 11 novembre au 11 mars 2004 (G. Massez, J.-B. Nogès).

Landes - Saint-Martin-de-Seignaux, ad., 30 décembre (K.J. Hall).

2002 Bouches-du-Rhône - Camargue : Amphise et Redon/Bomborinette, imm. *fulvescens*, du 27 nov. au 19 mars

2003 (D. Cohez, Y. Kayser, H. Kowalski, M. Thibault *et al.*) et non jusqu'au 26 décembre uniquement (*Ornithos* 11-2 : 60).

2002 Landes - Saint-Martin-de-Seignanx, ad., 27 décembre (B. Paepegaey).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Pour la Camargue, seuls trois oiseaux sont des nouveaux venus, les autres sont à considérer comme des revenants (Y. Kayser, comm. pers.), ce qui est également le cas de celui des Landes.

FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (79/117) (55/87 - 7/114)

En dehors de la Crau et de la colonie héraultaise

Aude - Fleury-d'Aude, 1 couple avec 4 juv., 1 mâle ad., 1 mâle imm., phot., du 4 mai au 19 juillet (D. Clément, J. Gonin, E. Rousseau) ; Espezel, mâle ad., 17 mai (C. Riols), jusqu'à 93 ind., du 12 août au 19 septembre (D. Clément, C. & R. Riols, C. Loyrette, Y. Roullaud).

Bouches-du-Rhône - Cuges-les-Pins, 1 mâle ad., 3 mâles imm., 2 fem., phot., du 13 avril au 8 mai (R. Pélissier, G. Viricel *et al.*).

Haute-Corse - Poretta/Borgo, mâle ad., mâle E1 et 2 fem., phot., 17 avril (P.J. Dubois), mâle ad. et fem., 29 avril (J.-P. Cantera).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, en petit nombre en France). L'année 2003 a été plutôt favorable à l'espèce avec la découverte d'un nouveau couple dans l'Aude, qui s'est reproduit avec succès (4 jeunes, Rousseau *et al.* 2003), le renforcement de la colonie villageoise de l'Hérault (12 couples et 26 jeunes à l'envol) et le maintien à un bon niveau des colonies de Crau (63 couples produisent 197 jeunes volants, P. Pilard/LPO-Mission FIR). À signaler aussi la découverte d'un dortoir postnuptial dans les Pyrénées audoises qui a rassemblé jusqu'à 93 oiseaux le 17 août, principalement des jeunes, certains originaires de Crau, d'autres probablement d'Espagne. Enfin, cette plaine agricole du secteur de Cuges-les-Pins double ses effectifs par rapport à 2002 et pourrait bien, elle aussi, réserver des surprises dans un proche avenir...

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonora* (328/429) (289/383 - 8/11)

En dehors du littoral méditerranéen

Aude - Espezel, E1, 12 juillet (C. & R. Riols) ; Lespinassière, 2 ad. (forme claire) et 1 E1, 5 août (F. Garcia).

Gironde - Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, ad. (forme sombre), 28 août (J. Gernigon).

Lozère - La Fage-Montivernoux, 12 juin (H. Picq).

Hautes-Pyrénées - Saint-Pastous, forme sombre, 21 juin (P. Llanès, P. Navarre).

Tarn - Les Yès/Mazamet, 2 E2 (formes claire & sombre), 17 juillet (A. Calvet, C. Maurel) ; Les Montagnès/Mazamet, E2 (forme claire), 29 août (A. Calvet, G. Petitjean).

Vendée - L'Île-d'Olonne, forme sombre, 10 novembre (O. Girard).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Ce n'est pas la première fois que la Lozère est visitée par cette espèce à cette époque (quatre adultes le 17 juin 2000 par exemple), l'observation de cette année



11. Faucons crécerellettes
Falco naumanni, Espezel,
Aude, septembre 2003
(R. Riols). Lesser Kestrels.

se situait sur les bas plateaux de l'Aubrac. La donnée du banc d'Arguin est en revanche plus inhabituelle, quant à celle des marais d'Olonne-sur-Mer, un 10 novembre, elle constitue la première mention pour la Vendée et dans les dates les plus tardives répertoriées en France. À ce jour, le Faucon d'Éléonore n'est plus soumis à homologation sur la côte méditerranéenne ; cette restriction est étendue aux départements entiers présentant une façade sur la Méditerranée, à compter du 1^{er} janvier 2005 (voir « Travaux et décisions du CHN » en introduction du présent rapport).

FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (40/39) (33/32 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : La Bélugue, fem. imm. *feldeggi* probable, 23 mars (A. Flitti).

Doubs - Chaffois, juv., 20 septembre (D. Lecornu, D. Michelat).

2000 Aude - Armissan, ad., 23 avril (A. Liger).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). Deux données, comme en 2002 ; celle d'un juvénile en Franche-Comté est tout de même à souligner.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (250/290) (200/229 - 8/13)

Aude - Les Coussoules/La Franqui, mâle ad., phot., du 23 au 29 mars (F. Garcia, J. Gonin).

Bouches-du-Rhône - Le Puy-Ste-Réparate, 2 mâles et 2 fem., du 11 au 29 mars (E., G. & S. Durand, A. Flitti, G. Olioso).

Gard - Le Planas/Pujaut, 2 mâles et 1 fem., du 11 au 15 avril (M. Geng, A. Pataud, R. & E. Vedere).

Ille-et-Vilaine - étang de Careil/Iffendic, fem., du 12 au 15 avril (G. Hervé, J. Maout).

Savoie - Motz, fem., du 5 au 14 avril (J.-P. Jordan), mâle, phot., du 19 au 26 avril (J.-P. Jordan, F. Le Gouis *et al.*),

fem., du 22 au 24 avril (G. Corsand, J.-P. Jordan).

Vaucluse - Courthézon, mâle, 22 avril (A. Pataud).

(Europe, Asie centrale). Treize oiseaux observés, comme en 2002, dans les départements habituels, sauf pour la mention bretonne (mais à une date classique). À noter la belle série d'observations du département de la Savoie dont le secteur bénéficiait de conditions de niveaux d'eau favorables (J.-P. Jordan, comm. pers.).

MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (89/127) (44/54 - 1/3)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, 1 ad., 1 nid avec 8 œufs, 2 poussins, phot., du 31 mai au 4 juin (D. Cohez, Y. Kayser *et al.*).

(Europe, Asie centrale, Japon). Même si 2003 n'affiche qu'une seule donnée à son palmarès, celle-ci est bien évidemment remarquable, puisqu'il s'agit de la découverte d'un nid contenant 8 œufs dans une scirpaie de la Baisse des Sarcelles sur le domaine de la Tour-du-Valat. Deux poussins étaient visibles le 1^{er} juin, alors qu'au moins deux œufs s'apprêtaient à éclore ; sans surprise, le nid était vide le 4 juin en soirée (Y. Kayser, comm. pers.), les poussins étant nidifuges. Il s'agit du deuxième cas de nidification en Camargue, le précédent datant de 1970 près d'Arles (Y. Kayser, *in litt.*). En ce qui concerne le reste de la France, dommage que la mention prometteuse de la Somme de 2002 soit *a priori* restée sans lendemain.

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (71/130) (40/97 - 5/11)

Aude - marais de Saint-Louis/Narbonne, 3 ind., 5 janvier (D. Clément), 5 ind., 9 janvier (J. Gonin), 9 ind. (5 ad., 2 juv., 2 ent. cris), 4 mai (D. Clément, Y. Kayser, E. Rousseau),

Gard - étang du Charnier/Vauvert, 13 janvier (L. Demongin) ; Gallician/Vauvert, ad., 4 mars (E. Duborper).

(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). La détection de cette espèce est toujours difficile et les effectifs sont assurément sous-estimés, notamment en Camargue. Dans les marais du Narbonnais, la présence d'au moins 3 à 5 couples est avancée (*vide* J. Gonin). En ce qui concerne le département des Pyrénées-Orientales, la population de l'étang de Canet est stable tant du point de vue du nombre d'individus (entre 15 et 20) que des secteurs fréquentés. Des familles avec 2-3 jeunes sont pourtant vues, et il est permis de penser que ces derniers doivent alimenter entre autres la petite population du Narbonnais, voire plus à l'est, puisque malgré des prospections répétées, la roselière de Salses n'a toujours pas révélé la présence de l'espèce (Y. Aleman, comm. pers.).

GRAVELOT MONGOL/DE LESCHENAULT *Charadrius mongolus/lechenaultii*

Somme - Baie d'Authie : Fort-Mahon, 25 juillet (H. Levêque, T. Rigaux).

2002 Somme - Baie de Somme : Saint-Quentin-en-Tourmont, 28 juillet (T. Daumal).

(De la Turquie jusqu'en Extrême-Orient). On ne peut manquer de souligner l'étonnante proximité des lieux

et des dates à un an d'intervalle. L'oiseau de 2003 est plutôt un Gravelot mongol, compte tenu du plumage quasi nuptial encore à cette époque (la couleur des pattes, la taille de l'oiseau et le front noir vont dans le même sens), mais des imprécisions ne permettent pas de conclure.

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (26/27) (24/25 - 5/6)

Mayenne - étang de la Rincerie/Ballots, ad., 20 septembre (J.-L. Reuzé).

Vendée - Saint-Denis-du-Payré, ad., 15 juillet (L. Godet, P. Trotignon, S. Verneau *et al.*) ; Bouin, 2 ad., phot., 12 septembre (M. Vaslin), ad., du 26 au 28 septembre (J.-L. Trimoreau, S. Reeber, M. Vaslin) ; île de Noirmoutier : Barbâtre, H1, phot., du 21 au 26 novembre (D. Desmots, M. Vaslin).

(Amérique du Nord). Année remarquable à plus d'un titre pour cette espèce, avec pas moins de cinq oiseaux pour le seul département de la Vendée, dont deux ensemble sur la lagune du Dain en baie de Bourgneuf (certains observateurs auraient préféré qu'ils jouent un peu les prolongations... ce qui a heureusement été le cas de ce troisième individu, dix jours plus tard au même endroit et différent des deux précédents). À noter aussi, pour une fois, la prédominance des adultes. Quant à la Mayenne, elle ne s'offre pas le luxe de cette espèce tous les ans...

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (67/66) (59/58 - 3/3)

Loire-Atlantique - Guérande, E1, phot., du 17 août au 14 septembre (A. Gentric, P. de Grissac, O. Poisson, G. Rault *et al.*).

Hautes-Pyrénées - Puydarieux, juv., du 20 au 24 septembre (V. Ducasse).

Somme - Boismont, ad., 9 et 10 mars (T. Rigaux *et al.*).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Beaucoup d'observateurs se sont retrouvés autour des salines du marais guérandais en cette fin d'été, et les recherches étaient parfois longues... Cela dit, cette donnée est intéressante, par la date et parce qu'elle provient du littoral (les deux autres mentions de ce département sont nettement intérieures). Rappelons qu'il ne resterait qu'environ 120 adultes de cette espèce dans les steppes centrales du Kazakhstan, et un programme de marquage coloré vient d'être initié en 2004 (voir *Ornithos* 11-6 : 325). Ouvrons l'œil !

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (15/15) (14/14 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : pisciculture du Verdier, juv., 25 septembre (C. Bouffet, Y. Kayser).

(Amérique du Nord). La Camargue n'est pas connue pour être un lieu stratégique en matière de bécasseaux néarctiques, et encore moins pour cette espèce dont il s'agit a priori de la première mention en ces lieux.

12. Vanneau sociable *Vanellus gregarius*, Guérande, Loire-Atlantique, août 2003 (G. Rault). *Sociable Plover*.



13. Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*, Sein, Finistère, septembre 2003 (F. Desage). *Baird's Sandpiper*.



BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (28/29) (24/25 - 2/2)

Loire-Atlantique - Corsept, E1, 1^{er} juin (D. Tavenon).

Pas-de-Calais - Platier d'Oye/Oye-Plage, phot., du 31 août au 3 septembre (G. Flohart, J. Leclercq *et al.*).

(Amérique du Nord). Régions plutôt classiques pour l'accueil de ce bécasseau, l'époque ne l'est pas moins pour les oiseaux adultes ou de 1^{er} été.

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (29/29) (25/25 - 2/2)

Finistère - Île de Sein, juv., phot., du 25 septembre au 4 octobre (F. & L. Desage, C. Mercier, G. Rault[†], P. Yésou) ; Le Curnic/Guissény, juv., phot., du 6 au 10 octobre (Y. Le Corre, X. Rozec).

2002 Côtes-d'Armor - Le Légué/Saint-Brieuc, juv., phot., du 22 septembre au 13 octobre (J.-P. Delapré, M. Plestan, F. Pouzergues *et al.*) et non jusqu'au 11 octobre seulement (*Ornithos* 11-2 : 65).

(Amérique du Nord). Le Finistère recèle les meilleurs secteurs pour cette espèce difficile à trouver...

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (305/342) (244/266 - 19/26)

Aube - Lac de la forêt d'Orient : Mesnil-Saint-Père, ad. et juv., phot., 14 septembre, seul le juv. les 17 et 20 septembre (F. Croset, O. & S. Paris *et al.*).

Bouches-du-Rhône - Camargue : Salin-de-Badon, ad., phot., vidéo, du 6 au 25 août (F. Bouzendorf, S. Chambris, Y. Kayser, M. Zucca *et al.*) ; Piémanson, 1 ind., phot., 14 septembre (D. Cohez) ; Carrelet, 2 juv., 14 et 15 septembre (D. Cohez, Y. Kayser).

Eure - Poses, 1 ind., 26 septembre (J.-M. Fénérole).

Finistère - Étang de Kerescar/Ploumoguer, juv., 15 septembre (M. Champion) ; île d'Ouessant : Porz Doun, juv., 22 septembre (A. Audevard) ; étang de Nérizélec/Plovan, juv., 4 octobre (P. Legay).

Gironde - Le Teich, juv., phot., du 29 août au 5 septembre (A. Audevard, J.-C. Sautour).

Loire-Atlantique - Le Migron/Frossay, jusqu'à 2 ad., phot., du 2 au 14 août (F. Bouzendorf, F. Gabillard *et al.*).

Manche - Goury/Auderville, ad., 26 et 27 août (A. Mellies, A. Verneau) ; Les Ponts-d'Ouve/Saint-Come-de-Monts, 2 juv., 20 et 21 septembre (S. Reeber, A. Verneau).

Moselle - Gélucourt, juv., du 26 au 29 septembre (T. Besançon, G. Joannès).

Pyrénées-Atlantiques - Momas, juv., du 25 septembre au 1^{er} octobre (A. Guyot *et al.*).

Somme - Grand-Laviers, juv., du 13 septembre au 31 octobre (W. Boudas, P. Decory *et al.*).

Vendée - Saint-Denis-du-Payré, ad., 19 avril (P. Trotignon), juv., 24 et 25 août (P. Trotignon) ; Maché, au moins 4 ind. (2 ad. et 2 juv.), phot., du 6 au 23 septembre (B. Isaac, F. Maillot, F. Portier *et al.*) ; île de Noirmoutier : Le Luzan/Noirmoutier-en-l'île, ad., phot., 1^{er} octobre (D. Desmots, M. Vaslin).

2002 Charente-Maritime - Hiers-Brouage, ad., du 19 au 24 avril (O. Lалуque, P. Trotignon).

2001 Meuse - Lac de Madine/Heudicourt, juv., du 20 au 31 août (D. Combrisson, E. Landragin, R. Lécaille) et non jusqu'au 28 août uniquement (*Ornithos* 10-2 : 61).

1999 Seine-et-Marne - Marolles-sur-Seine, 13 et 14 septembre (J.-P. Siblet *et al.*).

(Amérique du Nord, Sibérie). Avec 26 individus, 2003 occupe la deuxième place après 2000, année record qui avait totalisé 27 individus. Cela dit, le score de 2003 pourrait bien évoluer, car toutes les données concernant cette année ne sont pas encore parvenues au CHN. Rappelons que la moyenne annuelle depuis 1981, date de la création du CHN, est d'un peu plus de douze oiseaux ! Un afflux sans précédent a eu lieu en Grande-Bretagne et en Irlande (au moins 261 individus), mais aussi ailleurs en Europe, puisque même la Pologne et la Hongrie ont été touchées avec respectivement 6 et 11 oiseaux (Gilroy & Lees 2003). En France, on note d'abord une arrivée en août (avec une prédominance d'adultes), puis une nouvelle vague à la mi-septembre. À cet égard, il faut remarquer que l'arrivée d'un certain nombre d'espèces d'origine néarctique s'est produite autour du 10 septembre, suite à une perturbation importante ayant sévi sur nos côtes du 6 au 9 septembre, restes du cyclone Florian... Pour le département de l'Eure, signalons qu'une donnée concernant un deuxième « Bécasseau tacheté » présent du 23 au 26 septembre au moins est toujours à l'étude ; des documents complémentaires (descriptions, photos) au sujet de cet individu seraient les bienvenus. Enfin, l'accroissement général d'observations de limicoles néarctiques semble bien se confirmer en France (Dubois & Luczak 2004).

BÉCASSEAU ÉCHASSE *Calidris himantopus* (7/7) (7/7 - 0/0)

2002 Finistère - Léchiat/Tréfiat, ad., 10 et 12 août (J.-N. Ballot).

(Amérique du Nord). Espèce très rare en France ; sa dernière apparition remonte à 1997, où deux oiseaux avaient été notés la même année. Celle de 2003 n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'une des deux de 1997



14. Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Frossay, Loire-Atlantique, août 2003 (F. Bouzendorf).
Pectoral Sandpiper.

15. Bécasseau rouset *Tryngites subruficollis*, Guérande, Loire-Atlantique, septembre 2003 (A. Audevard).
Buff-breasted Sandpiper.

16. Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus*, Camargue, Bouches-du-Rhône, août 2003 (F. Bouzendorf).
Broad-billed Sandpiper.

17. Chevalier solitaire *Tringa solitaria*, Ouessant, Finistère, septembre 2003 (R. Baeta). *Solitary Sandpiper.*

18. Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*, St-Renan, Finistère, septembre 2003 (A. Audevard). *Lesser Yellowlegs.*



(un adulte à Pénestin, Morbihan, le 26 juillet). À noter le changement récent de nom scientifique de cet ancien *Micropalama* et en conséquence sa nouvelle position dans la liste systématique (Jiguet & la CAF 2004).

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (151/200) (117/150 - 7/16)

Aude - Lapalme, 26 avril (F. Legendre).

Bouches-du-Rhône - Camargue : nord Fangassier, phot., 14 mai (D. Cohez) ; Fangassier, Galabert, Tampan et Cinq-Cents-Francis, ad., 27 juillet (P.-A. Crochet), jusqu'à 10 ind., (dont 8 juv.), phot., vidéo, du 16 août au 1^{er} septembre (J. Birard, F. Bouzendorf, A. Flitti, G. Olioso, M. Zucca *et al.*)

Pyrénées-Atlantiques - Momas, ad., phot., du 16 au 22 août (A. Guyot *et al.*).

Var - Salins des Pesquiers/Hyères, du 16 au 18 août (A. Pérennou).

Vendée - île de Noirmoutier : marais de Müllembourg/Noirmoutier-en-l'île, 21 avril (W. Raitière, T. Herault).

2002 Bouches-du-Rhône - Camargue : étang du Pèbre, 3 mai (D. Cohez)

(Europe septentrionale). Seize oiseaux (!) : il faut remonter à 1991 pour trouver un tel effectif (mais 1989, année record, affichait 23 oiseaux !). Il est vrai qu'à chaque fois, un groupe camarguais a contribué à ces chiffres (12 individus le 10 mai 1989 à Piémanson, 8 individus sur le même secteur le 30 mai 1991 et jusqu'à 10 individus en août 2003). La moyenne annuelle est d'un peu plus de sept individus depuis 1981... À noter encore les arrivées simultanées du 16 août dans d'autres départements ainsi que la donnée prénuptiale précoce pour la côte atlantique.

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (143/177) (98/110 - 5/5)

Bouches-du-Rhône - Camargue : pisciculture du Verdier/Le Sambuc, juv., phot., du 14 au 27 septembre (A. Bechet, D. Cohez, Y. Kayser, A. Olivier *et al.*) ; étang Redon, ad. probable, 23 septembre (Y. Kayser).

Finistère - La Torche/Plomeur, juv., phot., 2 octobre (T. Biteau, R. Jamault, G. Rault¹).

Loire-Atlantique - Guérande, juv., phot., du 10 au 13 septembre (A. Gentric, T. Printemps, P. Pulse *et al.*).

Vendée - Maché, juv., phot., du 18 septembre au 4 octobre (P.-P. Evrard, F. Portier).

(Amérique du Nord). Cinq oiseaux, c'est exactement la moyenne depuis 1981. À noter que le lac de Maché en Vendée accueillait à la même époque quatre Bécasseaux tachetés, mais le Bécasseau rousset n'a pas connu, lui, le même afflux... même si la Camargue a reçu la visite de deux oiseaux !

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (258/305) (31/32 - 1/1)

Haute-Corse - Biguglia, 11 mai (M. Thibault, M. Vaslin).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Une seule observation par an depuis trois ans...



19. Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*, St-Renan, Finistère, septembre 2003 (A. Audevard). Lesser Yellowlegs

20. Chevalier solitaire
Tringa solitaria,
 Ouessant, Finistère,
 septembre 2003
 (A. Audevard).
Solitary Sandpiper.



CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (33/33) (18/18 - 1/1)

Finistère - Étang de Mézanostis/Saint-Renan, juv., phot., vidéo, du 12 septembre au 3 octobre (A. Audevard, M. Champion, A. Le Nevé *et al.*).

2002 Finistère - étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, 1^{er} octobre (A. Desnos).

(Amérique du Nord). La moyenne depuis 1981 pour ce chevalier est de moins d'un oiseau par an ! Celui de 2003, arrivé avec d'autres limicoles néarctiques, s'est attardé, ce qui a permis à un grand nombre d'observateurs en route pour Ouessant, où un autre chevalier encore plus rare stationnait au même moment, de « faire d'une pierre deux coups ».

CHEVALIER SOLITAIRE *Tringa solitaria* (4/4) (1/1 - 1/1)

Finistère - île d'Ouessant : réservoirs, juv., phot., du 10 au 19 septembre (A. Audevard *et al.*).

(Amérique du Nord). Il fallait bien un cyclone de la puissance de Florian pour ramener du continent américain un chevalier qui n'avait pas été vu en France depuis 17 ans ! Toutes les mentions françaises sont du Finistère, dont quatre d'Ouessant, celle de 1986 (qui était jusqu'à présent la seule enregistrée depuis la création du CHN), à la même époque et au même endroit que celle de cette année.

CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* (104/89) (78/64 - 1/1)

Finistère - Pointe de Trévignon, 9 août (S. Chanel, V. Rolland-Commarmot).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Une seule donnée et encore dans un département plutôt inhabituel. Où sont passés les oiseaux camarguais ?

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor* (66/69) (47/50 - 1/1)

Côtes-d'Armor - Langueux, 10 et 11 septembre (M. Plestan *et al.*).

(Amérique du Nord). La baie de Saint-Brieuc a elle aussi reçu un hôte américain de marque, trouvé dès l'accalmie, après quatre jours de « furie ».

Limicoles néarctiques

Avec neuf espèces totalisant 37 données pour 45 individus, l'année 2003 se situe au-dessus de la moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981. Celle-ci est d'environ huit espèces pour un peu plus de 26 données et 28 individus. Dans les années récentes, seules 1999 et 2000 sont nettement supérieures. Des mentions parvenues tardivement au CHN sont ajoutées au millésime 2002 qui affiche désormais 10 espèces pour 31 données et 31 individus.



21. Labbe à longue queue
Stercorarius longicaudus,
Léman, Haute-Savoie,
octobre 2002
(L. Maumary).
Long-tailed Skua.

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (355/1023) (299/939 - 12/31)

Finistère - île d'Ouessant : Porz Doun, ad., 7 octobre (N. Issa).

Nord - Digue du Clipon/Loon-Plage, 2 juv., 24 août, 1 ad., 25 août, 1 juv., 26 août (N. Selosse *et al.*), 2 juv., 30 août (C. Gruwier), 6 ind. (3 juv., 2 E2, 1 ad.), 12 septembre (J. Boulanger, N. Selosse *et al.*), 13 juv., phot., 23 septembre (C. Gruwier *et al.*), 1 juv., 24 septembre, 1 juv., 28 septembre, 1 juv., 4 octobre, 1 juv., phot., 5 octobre (C. Gruwier *et al.*).

Haute-Saône - Vaivre-et-Montoille, juv., phot., 1^{er} septembre (D. Lecornu).

2002 Haute-Savoie - Sciez-sur-Léman et Thonon-les-Bains, 15 juv. au moins, phot., du 25 août au 3 octobre (J. Duplain, J.-M. Fivat, L. Maumary *et al.*) et non pas 1 juv., 10 septembre (R. Jordan, A. Renaudier) uniquement (*Ornithos* 11-2 : 68).

2001 Haute-Saône - Vaivre-et-Montoille, juv., 27 août (D. Lecornu) et non pas 26 août (*Ornithos* 10-2 : 63). (Circumboréal). Le site du Clipon totalise à lui seul 29 des 31 individus répertoriés pour 2003, fruits d'un suivi sans faille. La totalité des données transfrontalières du lac Léman parvenues tardivement sont également remarquables (à signaler que deux de ces oiseaux sont morts pendant leur séjour sur ce site).

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (27/27) (22/22 - 2/2)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Vaccarès, E2, phot., vidéo, du 17 juillet au 26 août (J.-M. Fénérole, A. Flitti, D. Tissier, F. Veyrunes *et al.*).

Côtes-d'Armor - Languieux, ad., 25 juillet (M. Plestan).

(Amérique du Nord). L'oiseau camarguais a fait les beaux jours de nombreux observateurs et photographes, ce qui est loin d'être le cas de celui (en plumage nuptial) de la baie de Saint-Brieuc. L'espèce est désormais vue tous les ans depuis 1998.

MOUETTE DE BONAPARTE *Larus philadelphia* (7/6) (6/5 - 3/3)

Bouches-du-Rhône - Entressen, H1, phot., du 25 février au 10 mars (P.-A. Crochet, F. Dhermain, G. Paulus *et al.*) ; Camargue : Piémanson, E1, phot., 5 et 7 avril (D. Cohez, P.-A. Crochet, Y. Kayser *et al.*).

Pas-de-Calais - Calais, H1, phot., du 29 avril au 2 mai (E. Dansette *et al.*).

(Amérique du Nord). Trois oiseaux la même année pour une mouette aussi rare, c'est déjà remarquable, mais deux individus dans le delta du Rhône, c'est encore plus extraordinaire !

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (20/52) (17/49 - 2/3)

En dehors du littoral méditerranéen

Nièvre - Pouilly-sur-Loire, 2 ad., 24 mai (N. Pointecouteau, O. Wiler *et al.*).

Vendée - Île de Noirmoutier : Müllembourg/Noirmoutier-en-l'île, E1, phot., du 14 avril au 2 décembre (D. Desmots, M. Vaslin *et al.*).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). La donnée de la Nièvre (à la limite du Cher) concerne manifestement des oiseaux en migration prénuptiale remontant le cours de la Loire. Quant à l'oiseau de Vendée, il est revenu d'hivernage en 2004, un article sur ce séjour hors du commun sur la côte atlantique a récemment été publié dans *Ornithos* (Desmots *et al.* 2004).

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (114/137) (114/137 - 14/19)

En dehors de la Corse

Aude - Lapalme, ad., 14 avril (M.-P. & X. Hindermeier), E2, phot., du 27 au 29 avril (J. Gonin, F. Garcia), 4 E2, 3 mai (C. Bouffet, Y. Kayser), 5 ind. (2 E2 et 3 E3), phot., 29 mai (J. Gonin), 1 E3, 31 mai (F. Garcia) ; Pissevache/Fleury-d'Aude, E2, 15 avril (M.-P. & X. Hindermeier), 2 E2, phot., 25 mai (J. Gonin), E1, phot., 11 juin (J. Gonin) ; La Franqui, E3, 3 mai (Y. Kayser), E2, phot., 4 mai (J. Gonin), 4 ind. (2 E2 et 2 E3), phot., 24 mai (J. Gonin) ; Sainte-Lucie/Port-la-Nouvelle, E2, phot., 4 mai (J. Gonin) ; Port-la-Nouvelle, jusqu'à 3 ind. (2 E2 et 1 ad.), du 26 au 30 avril (F. Garcia, J. Gonin).

Bouches-du-Rhône - Camargue : embouchure du grand Rhône, E3, 27 et 28 avril (Y. Kayser) ; salins du Caban/Port-Saint-Louis-du-Rhône, ad., phot., 5 juin (A. Flitti).

Rhône - Lyon, E3, phot., vidéo, du 2 juillet au 26 août (S. Chanel, E. Dansette, V. Rolland-Commarmot).

(Circum-méditerranéen). Difficile de faire le tri dans les oiseaux qui ont fréquenté le secteur de Leucate. Pour les statistiques, l'hypothèse la moins optimiste a été privilégiée en considérant que bon nombre d'oiseaux vus sur la plage de La Franqui se retrouvent dans les salins de Lapalme distants de deux kilomètres. C'est ainsi qu'un minimum de 16 oiseaux différents a été pris en compte pour le département de l'Aude, ce qui néanmoins révèle un afflux tout à fait inhabituel, que le très bon suivi réalisé cette année sur le secteur a aussi permis de bien mettre en évidence. À noter également le séjour prolongé de l'oiseau lyonnais qui venait passer toutes ses soirées au confluent du Rhône et de la Saône. L'année 2003 devient l'année record pour cette espèce. Cependant, on peut resté déçu en regard des potentialités qu'offre la grande colonie du delta de l'Ebre en Espagne, qui n'est pourtant pas très éloignée des côtes méditerranéennes françaises.

22. Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia*, Entressen, Bouches-du-Rhône, mars 2003 (F. Dhermain). *Bonaparte's Gull*.



23. Mouette atricille *Larus atricilla*, Camargue, Bouches-du-Rhône, août 2003 (F. Bouzendorf). *Laughing Gull*.



GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (277/163) (276/162 - 31/17)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*)

Bouches-du-Rhône - Entressen, H1*, phot., du 10 au 15 mars (J. Gonin, F. Maillot, J.-P. Paul *et al.*).

Finistère - Le Relecq-Kerhuon, H1*, phot., du 2 janvier au 29 mars (A. Audevard, F. Barrault, A. Le Nevé *et al.*), ad., du 28 novembre au 9 février 2004 (A. Audevard, F. Barrault) ; Kernic/Plounevez-Lochrist, H1*, phot., 17 janvier, 2 H1 (1*), phot., 7 février (F. Barrault), ad.*, phot., 2 et 7 février (F. Barrault) ; Guissény, ad.*, phot., 21 février (F. Barrault) ; Douarnenez, H1*, phot., du 24 février au 1^{er} mars (A. Audevard, T. Galewski, F., L. & S. Veyrunes) ; étang de Nérizélec/Plovan, E1*, phot., 10 mars (G. Rault) ; étang du Moulin-Neuf/Plonéour-Lanvern, H1*, phot., 30 novembre (A. Audevard) ; Saint-Renan, ad., phot., du 13 novembre au 19 mars 2004 (A. Audevard, M. Champion, A. Le Nevé *et al.*), H1*, phot., du 4 décembre au 19 mars 2004 (A. Audevard, N. Issa, A. Le Nevé *et al.*).

Charente-Maritime - Île d'Oléron : La Baudissière/Dolus-d'Oléron, ad., phot., capt., du 3 octobre au 16 mars 2004 (M. Caupenne, P. Jourde, P. Trotignon *et al.*).

Gironde - La Hume/Gujan-Mestras, ad.*, du 27 janvier au 10 février (J. Gernigon), ad., phot., du 30 novembre au 10 avril 2004 (J. Gernigon) ; Arcachon, H3*, 10 et 14 mars (J. Gernigon), 2 ad., phot., 29 août (A. Audevard, J.-C. Sautour), H2, phot., du 24 octobre au 23 avril 2004 (J. Gernigon), 5 ind. (3 ad. et 2 H2), phot., du 27 octobre au 1^{er} novembre (J.-C. Sautour), H3, du 5 décembre au 24 mars 2004 (J. Gernigon) ; Larros/Gujan-Mestras, ad., phot., 28 août (A. Audevard, J.-C. Sautour), ad. (le même), phot., du 24 octobre au 27 avril 2004 (J. Gernigon, J.-C. Sautour) ; Arcachon et La Teste, H2, phot., du 24 octobre au 24 mars 2004 (J. Gernigon).

Loire-Atlantique - Lac de Grand-Lieu : Saint-Lumine-de-Coutais, H1*, phot., du 23 au 25 février (S. Reeber) ; Rezé, H2*, phot., du 21 décembre au 16 janvier 2004 (S. Dulau, A. Le Nevé).

Manche - Les Ponts-d'Ouve/Saint-Come-de-Monts, H2*, phot., 20 septembre (S. Reeber, A. Verneau).

Morbihan - Pénestin, ad., 1^{er} novembre (J.-L. Dourin, A. Troffigüe).

Pas-de-Calais - Calais, E1, phot., vidéo, du 4 juillet au 21 avril 2004 au moins (P. Camberlein, P.J. Dubois, F. Gabillard *et al.*).

Vendée - Île de Noirmoutier : Barbâtre et Noirmoutier-en-l'Île, E1*, phot., du 3 juillet au 4 décembre (D. Desmots, J.-Y. Frémont, M. Vaslin), ad., du 20 août au 9 mars 2004 (D. Desmots, M. Vaslin) ; pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., 9 septembre (P. Bacquet, G. Barguil, M. Gabriel).

2002 Finistère - Saint-Renan, ad., du 2 décembre au 5 mars 2003 (A. Audevard, M. Champion, D. Laloi) et non du 7 décembre au 26 février uniquement (*Ornithos* 11-2 : 70).

2002 Vendée - Île de Noirmoutier : Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., du 11 novembre au 11 avril 2003 (D. Desmots, M. Vaslin) et non jusqu'au 6 février uniquement (*Ornithos* 11-2 : 70).

(Amérique du Nord). Au cours de l'hiver 2003-2004, les oiseaux du bassin d'Arcachon furent très mobiles et n'ont pu être suivis individuellement de façon satisfaisante (J. Gernigon, comm. pers.). En tout cas, en dépit du



24. Goéland à bec cerclé
Larus delawarensis,
Arcachon, Gironde,
août 2003 (A. Audevard).
Ring-billed Gull.

nombre d'individus revenant sur les sites habituels toujours aux mêmes dates, des arrivées se produisent toujours, notamment des oiseaux de 1^{er} hiver (huit cette année dont six pour le seul département du Finistère). À noter bien sûr celui qui a traversé la France pour se retrouver en Crau en compagnie d'une Mouette de Bonaparte !

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (142/147) (134/138 - 3/3)

Finistère - Roscoff, ad., phot., 14 novembre (E. de Kergariou, L. Thébault).

Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer, E1, phot., du 2 au 12 mai (G. Flohart, B. Paepegaey et al.).

Vendée - près de l'île-d'Yeu, ad., 27 février (J. Pourreau).

2001 Yvelines - port de l'Ilon/Saint-Martin-la-Garenne, H1, 31 décembre (G. Baudoin).

(Arctique canadien, Groenland). Petite année, puisqu'il faut revenir à 1997 pour trouver cet effectif de trois oiseaux, les années suivantes affichant entre six (moyenne annuelle depuis 1981) et 12 individus. Cependant, cet hiver nous gratifie de deux adultes (classe d'âge toujours très rare même lors d'invasions comme en 1984, où 40 oiseaux au moins avaient pourtant été répertoriés).

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (29/32) (22/17 - 1/0)

Gironde - Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, fem. ad., baguée couleur, phot., du 9 mai au 28 juillet (J. Gernigon).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Cette femelle baguée couleur en 2001 était appariée une nouvelle fois à une Sterne caugek. Le couple a couvé deux œufs probablement clairs, puisqu'il n'y a pas eu de poussins (J. Gernigon comm. pers.).

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (15/6) (14/5 - 3/1)

Gironde - Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, ad., phot., 19 juillet (J. Gernigon).

Loire-Atlantique - Corsept, H2 ou ad., phot., du 25 au 31 août (J. Gonin, S. Reeber, D. Tavenon *et al.*).

Vendée - Bouin, ad., phot., 29 juin (M. Vaslin *et al.*).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). Il est bien évident que l'origine géographique de cette espèce nous interdit d'imaginer que ces trois données de l'été 2003 concernent des nouveaux venus. Depuis des années, des oiseaux sont vus ici ou là sur nos côtes (deux en 2002, un en 2001, deux en 1996, par exemple). Que deviennent ces sternes lors des « années blanches » ? En tout cas, la dernière mention sur Arguin est celle d'un immature probable les 20 et 21 juin 2001 (*Ornithos* 10-2 : 67). L'oiseau vu uniquement le 29 juin sur la lagune du Dain à Bouin peut-il être celui de l'estuaire de la Loire qui a attiré de nombreux observateurs en cette fin août ? C'est très possible quand on connaît les mouvements de laro-licoles



25. Sterne élégante
Sterna elegans, Corsept,
Loire-Atlantique,
août 2003 (J. Gonin).
Elegant Tern.

qui s'opèrent dans cette baie de Bourgneuf, mais rien n'exclut non plus l'oiseau vu le 19 juillet sur Arguin qui aurait accompagné les Sternes caugeks dans ces mouvements bien connus vers le nord, le long du littoral atlantique, après leur nidification. En outre, l'usure du plumage à cette époque empêche d'être formel sur l'âge exact de l'oiseau vu près du pont de Saint-Nazaire. Pour les statistiques, l'option a donc été d'ajouter un seul individu aux deux présents en 2002 sur la côte atlantique.

STERNE « À BEC ORANGE » *Sterna sp.*

La présence du 14 juillet au 3 août 2002 sur la colonie de Sternes caugeks du banc d'Arguin/La Teste-de-Buch en Gironde, d'un oiseau (photographié) avait déjà été relatée dans le dernier rapport. Cette sterne qui n'a pu être déterminée est revenue en 2003. Celle-ci, appariée à une Sterne caugek, a élevé un poussin. Les trois oiseaux ont été photographiés, capturés et bagués, tandis que des prélèvements de plumes ont été effectués en vue d'analyses génétiques (J. Gernigon comm. pers.).

STERNE DE FORSTER *Sterna forsteri* (1/1) (1/1 - 1/1)

Finistère - Saint-Pol-de-Léon et Carantec, ad., phot., du 10 janvier au 10 mars (F. Barrault, J. Maout *et al.*).

(Amérique du Nord). Deuxième mention française après l'adulte vu sur l'île de Ré, Charente-Maritime, du 11 au 26 décembre 1999. Ses deux mois de présence sur ce vaste secteur ont permis à beaucoup de venir lui rendre visite... même si son observation n'était pas gagnée d'avance.

26 & 27. Sterne de Forster *Sterna forsteri*, St-Pol-de-Léon, Finistère, mars 2003 (A. Guillemont). *Forster's Tern*.



GUILLEMOT DE BRÜNNICH *Uria lomvia* (2/2) (0/0 - 1/1)

Pas-de-Calais - Audinghen, 3 février (G. Flohart).

(Arctique, Atlantique Nord). Première mention française d'un oiseau vivant. Les deux autres données proviennent du Finistère et concernent des individus trouvés morts sur les laisses de mer lors des marées noires : un près de Plouguerneau le 21 avril 1978 et un près de Santec le 21 janvier 1981. Cette observation du cap Gris-Nez fait suite à des périodes de vent fort de nord et à des arrivées d'oiseaux mazoutés ; un nombre important d'alcidés a alors été noté à cette époque, dont des espèces rares comme des Mergules nains et des Macareux moines...

GUILLEMOT À MIROIR *Cephus grylle* (45/55) (23/27 - 2/3)

Finistère - île d'Ouessant : Créac'h, 3 ind. (1 + 2), 29 octobre (P. Crouzier, J.-P. Siblet).

(Arctique, Atlantique Nord). Aucune donnée en 2002. Les deux dernières mentions sont de 2001 dont un oiseau du 31 octobre, déjà au Créac'h (et des mêmes observateurs).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (260/390) (215/323 - 22/38)

Bouches-du-Rhône - Crau : Mas Chauvet/Entressen, de 2 à 4 ind. (dont 1 H1), phot., du 10 octobre au 10 mars 2004 (A. Flitti, M. Thibault *et al.*), mais 11 ind., le 15 novembre, 7 ind., 9 décembre, 10 ind. le 14 décembre (D. Cohez, Y. Kayser, A. Larousse, G. Rault').

Finistère - île d'Ouessant : Porz-Coret, H1, 16 octobre (J. Gonin) ; Yusin, 20 octobre (P.-P. Evrard) ; Parluc'hen, 21 octobre (A. Audevard *et al.*) ; Porz-Doun, H1, du 27 au 29 octobre (P., J.-B. & M. Crouzier, J.-P. Siblet *et al.*) ; Kadoran, H1, 28 octobre (A. Audevard).

Manche - Saint-Léonard/Vains, 29 janvier (S. Provost) ; Genêts, 2 ind., 12 avril (S. Provost), 2 ind., 15 octobre, 1 seul le 16 octobre (S. Provost), 3 ind., 25 et 26 octobre (S. Provost) ; Carolles, 24 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 29 octobre, 17 novembre (S. Provost *et al.*).

Pyrénées-Orientales - Saint-Nazaire, 1 ind., phot., 2 novembre au moins (C. Peignot), jusqu'à 4 ind., phot., du 21 décembre au 7 mars 2004 (J. Gonin, C. Peignot).

Seine-Maritime - Cap de la Hève/Sainte-Adresse, 2 ind., 1^{er} octobre, 2 octobre, 15 octobre (P. Provost *et al.*) ; digue d'Antifer/Saint-Jouin-Bruneval, 3 décembre (O. Benoist).

2002 Bouches-du-Rhône - Crau : Mas Chauvet/Entressen, 3 ind., 29 décembre (V. Palomares), sans doute une

partie des 7 ind. (dont 1 H1) du 21 décembre (*Ornithos* 11-2 : 73).

2002 Finistère - Île d'Ouessant : Ru Niou, phot., 30 octobre (A. Audevard, P. Crouzier, P.J. Dubois) et non 29 et 30 octobre, la date du 29 octobre correspond à l'observation sur ce même site d'un Pipit de Godlewski (*Ornithos* 11-2 : 73) ; à cet égard signalons une erreur concernant la photo 28 qui représente ce Pipit de Godlewski et non un Pipit de Richard, la photo 29 est en revanche bien celle du Pipit de Richard du 30 octobre (*Ornithos* 11-2 : 72).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). Encore une année qui s'inscrit dans la continuité tant du point de vue du nombre d'oiseaux que des sites concernés (en migration et en hivernage) et du pattern d'apparition de l'espèce. On note comme en 2002 un passage automnal attesté par les données de Carolles dans la Manche, du cap de la Hève en Seine-Maritime et d'Ouessant, Finistère, notamment, puis l'arrivée en hivernage fin novembre et mi-décembre dans les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. Les hivernants bien suivis sur les « prades » de l'embouchure du Réart près de l'étang de Canet à Saint-Nazaire rappellent des observations précédemment effectuées sur ce site, mais dont les dates (7 mai 1995 et 29 septembre 2001) semblaient alors plutôt indiquer des migrateurs. Les oiseaux d'avril en baie du Mont Saint-Michel peuvent concerner des hivernants en déplacements locaux et jusqu'alors passés inaperçus sur ces vastes zones.

PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewskii* (3/3) (3/3 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Kadoran, H1, 28 octobre (F. Jiguet).

2002 Finistère - Île d'Ouessant : Pern, H1, phot., vidéo, du 22 au 26 octobre (Y. Créau, N. Issa, D. Laloï, M. Zucca *et al.*), puis Ru Niou, phot., 29 octobre (A. Audevard, P. Crouzier, P.J. Dubois) et non pas les observations de Pern uniquement (*Ornithos* 11-2 : 73).

(Sud de la Sibérie, Chine et nord-est de l'Inde). En ce qui concerne l'oiseau de 2002, l'apparition d'une couverture muée sur l'aile droite (voir photo 28 dans *Ornithos* 11-2 : 72) alors que celle-ci était absente lors des observations de l'oiseau de Pern (une seule couverture était muée du côté gauche) pourrait correspondre à la poursuite de la mue de cet oiseau et ne concerne donc pas forcément un deuxième individu. En tout cas, cet épisode illustre une fois de plus l'adage du « syndrome du deuxième oiseau » qui perturbe souvent les rapports entre observateurs ne voyant pas, avec juste raison, la même espèce précédemment signalée au même endroit, le jour même ou le lendemain. Le même phénomène a failli se reproduire avec la donnée de 2003 à Kadoran, car un Pipit de Richard a fréquenté à un autre moment de la journée, les landes du secteur.

28. Pipit de Richard *Anthus richardi*, St-Nazaire, Pyrénées-Orientales, janvier 2003 (J. Gonin). *Richard's Pipit*.



29. Pipit de Richard *Anthus richardi*, Entressen, Bouches-du-Rhône, janvier 2003 (A. Flitti). *Richard's Pipit*.



PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (9/9) (9/9 - 1/1)

Morbihan - Île d'Hoëdic, 20 octobre (Y. Kayser, A. Larousse, G. Rault *et al.*).

1997 Finistère - Île d'Ouessant : Stang ar Stiff, 28 et 29 octobre (Y. Guermeur, D. Laloï *et al.*).

(Sibérie, Extrême-Orient). C'est la première mention pour Hoëdic, puisque toutes les autres sont d'Ouessant, excepté la dernière (en 2001) en provenance du Pas-de-Calais. La donnée de 1997 avait été « oubliée » dans un carnet, et c'est quand même la quatrième fois que ce vallon accueille l'espèce !

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (41/44) (30/31 - 2/3)

Individus présentant les caractéristiques de la race *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans »

Hautes-Alpes - Lac de Curbans/La Saulce, mâle, phot., 13 avril (O. Tourillon).

Haute-Corse - Macinaggio, 2 mâles et 1 fem., phot., 8 avril (P.J. Dubois).

2002 Aude - Lapalme, mâle, phot., 21 avril (E. Gfeller, J. Gernigon, J. Gonin).

(Sibérie, Extrême-Orient). Enfin des *feldegg* photographiées, ça fait plaisir ! L'observation de trois oiseaux ensemble en Corse n'a rien de commun, d'autant qu'y figure une femelle (la première à être photographiée en France). L'histoire montre que bien des *feldegg* annoncées n'en sont probablement pas, en l'absence du cri si caractéristique, et les confusions avec *thunbergi* ne sont pas rares. Soulignons aussi que la rencontre avec certains intermédiaires *feldegg x flava* (ou *beema* ou *lutea*) dont il existe plusieurs mentions en France, ne simplifie pas les choses... À cet égard, ajoutons qu'un tel « hybride » accompagnait d'ailleurs les oiseaux vus en Corse.

AGROBATE ROUX *Cercotrichas galactotes* (12/12) (7/7 - 1/1)

Ariège - Aulus, 25 juillet (N. Cao, J. Pichenot).

(Eurasie méridionale, Afrique du Nord). Observation en vallée d'Ars à 1710 m d'altitude... L'Espagne n'est pas loin... et le département voisin des Pyrénées-Orientales a déjà enregistré trois données. La dernière mention de l'espèce en France remontait au 22 mai 1991, à Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône.

ROBIN À FLANCS ROUX *Tarsiger cyanurus* (2/2) (2/2 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Stang ar Stiff, fem./H1, phot., du 24 octobre au 2 novembre (A. Audevard, P. Cruzier, D. Laloï *et al.*).

(De la Finlande à la Sibérie orientale et au Japon). Une nouvelle donnée en 2003 après celle de 2002 ! Il est vrai que l'espèce est en augmentation dans l'ouest de son aire de répartition. En tout cas, c'est la deuxième mention pour Ouessant et contrairement au précédent, cet oiseau a joué les stars devant un beau parterre d'observateurs venus l'admirer.

30. Bergeronnette des Balkans *Motacilla flava feldegg*,
La Saulce, Hautes-Alpes, avril 2003 (O. Tourillon).
Male Black-headed Yellow Wagtail.



31. Bergeronnette des Balkans *Motacilla flava feldegg*,
Macinaggio, Haute-Corse, avril 2003 (P.J. Dubois).
Female Black-headed Yellow Wagtail.



32. Robin à flancs roux
Tarsiger cyanurus,
Ouessant, Finistère,
octobre 2003
(A. Audevard).
Red-flanked Bluetail.



33. Robin à flancs roux
Tarsiger cyanurus,
Ouessant, Finistère,
octobre 2003
(M. Vergès).
Red-flanked Bluetail.



34



35



36



37



38

34. Tarier oriental *Saxicola torquatus maurus*, Sainte-Adresse, Seine-Maritime, octobre 2003 (P. Provost). *Eastern Stonechat*.

35. Traquet pie *Oenanthe pleschanka*, Auderville, Manche, novembre 2003 (A. Verneau). *Pied Wheatear*.

36. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique, octobre 2003 (J.-P. Trévoux). *Desert Wheatear*.

37. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, Hardelot, Pas-de-Calais, décembre 2003 (F. Bouzendorf). *Desert Wheatear*.

38. Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola*, Grues, Vendée, août 2003 (J. Gonin). *Paddyfield Warbler*.

TARIER PÂTRE *Saxicola torquatus* (22/22) (18/18 - 1/1)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *maurus*, appelée « Tarier oriental »

Seine-Maritime - Cap de la Hève/Sainte-Adresse, fem. ad., phot., du 26 au 28 octobre (P. Provost *et al.*). (Mer Blanche, Sibérie). Preuve que les pointes du littoral n'ont rien à envier aux îles... s'il y a un observateur « à la réception » !

TRAQUET PIE *Oenanthe pleschanka* (3/3) (3/3 - 1/1)

Manche - Cap de la Hague/Auderville, fem. ad./fem. H1, phot., 1^{er} novembre (F. Malvaud, A. Verneau *et al.*). (De la Roumanie au Moyen-Orient jusqu'en Sibérie orientale). Encore une rareté observée sur un cap en Normandie ! Après la donnée de 2002 à Ouessant, on ne s'attendait pas à revoir ce traquet l'année suivante, alors qu'il ne s'agit que de la quatrième mention française ! Notons que trois observations ont eu lieu à la même époque dans le sud de l'Angleterre (Rogers & the Rarities Committee 2004).

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica* (??) (0/0 - 2/2)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *melanoleuca*

Haute-Corse - La Marane/Borgo, mâle ad. au moins, phot., 17 avril (P.J. Dubois).

Vendée - Île de Noirmoutier : Noirmoutier-en-l'Île, mâle E1, capt., phot., 15 mai (W. Raitière, M. Vaslin *et al.*). (Des Balkans aux bords de la Caspienne). Ce sont les premières données dûment circonstanciées pour cette sous-espèce de l'Est et de bons documents photographiques permettent notamment de juger de l'étendue du noir sur le front et la gorge (voir Ullman 2003). À noter qu'un mâle de 1^{er} été était observé le 4 mai aux Pays-Bas (van der Vliet *et al.* 2004).

TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (22/23) (21/21 - 2/2)

Loire-Atlantique - Le Collet/Les Moutiers-en-Retz, fem. H1, phot., du 18 au 20 octobre (Y. & J.-P. Trévoux *et al.*).

Pas-de-Calais - Hardelot, mâle, phot., du 6 au 17 décembre (S. Peten *et al.*).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). Deux données en 2003 après deux années blanches, c'est plutôt bien, d'autant que la moyenne depuis 1981 est d'un individu par an.

GRIVE OBSCURE *Turdus obscurus* (12/12) (4/4 - 1/1)

Nord - Villeneuve-d'Ascq, mâle ad., 5 octobre (A. Leprêtre).

(Sibérie). Cet oiseau a été observé 10 minutes dans un jardin privé en compagnie de Grives mauvis.

LOCUSTELLE DE PALLAS *Acrocephalus certhiola* (2/2) (2/2 - 1/1)

Pas-de-Calais - Tardinghen, H1, 2 octobre (G. Flohart, D. Tirmarche).

(Sibérie orientale). Troisième donnée française, les deux précédentes étaient en provenance d'Ouessant (31 août 1987 et du 10 au 13 octobre 1998). À noter qu'une Locustelle de Pallas de 1^{er} hiver avait été observée le 12 septembre en Hollande (van der Vliet *et al.* 2004).

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (22/22) (22/22 - 3/3)

Lot-et-Garonne - Villeton : étang de La Mazière, capt., phot., 19 septembre (A. Dal Molin), ad., capt., phot., 3 et 4 octobre (A. Dal Molin).

Vendée - Grue, ad., capt., phot., 19 août (J. Gonin, F. Salmon).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). L'année 2003 est un bon cru, puisqu'il faut remonter à 1997 pour trouver trois mentions de Rousserolles isabelles la même année. Remarquable, bien sûr, le fait que les roselières de La Mazière aient accueilli deux des trois oiseaux !

ROUSSEROLLE DES BUISSONS *Acrocephalus dumetorum* (7/7) (7/7 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, juv., capt., 3 septembre (Y. Kayser, O. Pineau *et al.*).

(Europe du Nord-Est, Sibérie, Asie centrale). Première mention camarguaise de l'espèce !

HYPOLAÏS PÂLE *Hippolais pallida* (3/3) (2/2 - 0/0)

2001 Bouches-du-Rhône - Camargue : Piémanson, 22 mai (D. Cohez, Y. Kayser).

2001 Charente-Maritime - Saint-Froult, capt., phot., 24 juillet (P. Delaporte).

1961 Bouches-du-Rhône - Camargue : Tour-du-Valat, juv., capt., conservé, phot., 16 septembre (*vide* Y. Kayser). (Moyen-Orient).

HYPOLAÏS OBSCURE *Hippolais opaca* (1/1) (0/0 - 0/0)

1960 Gard - Pointe de l'Espiguette/Grau-du-Roi, capt., conservé, phot., 21 mai (*vide* Y. Kayser). (Afrique du Nord, Espagne).

HYPOLAÏS PÂLE/OBSCURE *Hippolais pallida/opaca* (2/2) (2/2 - 0/0)

2000 Aude - Leucate, 14 mai (F. Garcia).

1990 Hérault - Montpellier, 13 avril (G. Balança).

Comme annoncé précédemment (*Ornithos* 10-2 : 70-71), la révision des six données françaises d'Hypolaïs pâles a été faite par le CHN à la demande de la Commission de l'Avifaune Française, suite à la subdivision en deux espèces distinctes, l'Hypolaïs pâle et l'Hypolaïs obscure. L'objectif était de voir si une attribution à l'une ou l'autre des deux espèces était possible (Jiguet & la CAF *op. cit.*). C'est dans un souci d'exhaustivité que les données antérieures à la création du CHN ont été reprises ici. Afin de ne pas perdre d'information, les mentions pour lesquelles la distinction entre les deux taxons n'a pu être faite sont néanmoins prises en compte.

HYPOLAÏS BOTTÉE *Hippolais caligata* (5/5) (5/5 - 0/0)

2002 Pas-de-Calais - Cap Gris-Nez/Audinghen, phot., 13 septembre (C. Philpott, R. Turley, D. Walker).

2001 Finistère - Île d'Ouessant : Arland, du 23 au 25 septembre (R. Baeta, Y. Guermeur, A. Liger *et al.*) ; île de Sein, phot., du 14 au 20 octobre (J.-F. Darras, H. Davière, E. Lapous).

1985 Finistère - Île d'Ouessant : Arland, 11 octobre (Y. Guermeur).

1984 Finistère - Île d'Ouessant : réservoir amont, 19 septembre (Y. Guermeur).

1984 Vendée - Île d'Olonne, 28 septembre, donnée précédemment acceptée (*Alauda* 54 [4] : 301), à présent refusée après réexamen.

(Iran, Asie centrale, Mongolie).

HYPOLAÏS BOTTÉE/RAMA *Hippolais caligata/rama* (1/1) (1/1 - 0/0)

1988 Nord - Leffrinckoucke, 17 septembre (C. Gruwier, J. Leclercq, N. Selosse *et al.*).

Comme pour l'Hypolaïs pâle, la Commission de l'Avifaune Française a demandé au CHN de revoir les sept données existantes depuis que l'Hypolaïs rama a été considérée comme une espèce à part entière, afin de déterminer le taxon effectivement concerné par chaque observation (Jiguet & la CAF *op. cit.*). Là encore, pour ne pas perdre d'information eu égard à des espèces rarement observées, les mentions pour lesquelles la distinction ne peut être certaine sont toutefois prises en compte sous le double vocable. Une donnée d'Ouessant relative à ce qui pourrait bien être la première mention française d'Hypolaïs rama est toujours en cours d'examen.

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (49/50) (22/22 - 1/1)

Morbihan - Île d'Hoëdic, H1, capt., phot., du 22 au 27 octobre (Y. Kayser, E. Lapousse, G. Rault *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Cet individu particulièrement peu farouche et qui passait son temps à se gaver de poires a fait les beaux jours des nombreux observateurs présents sur cette île morbihanaise.

FAUVETTE BABILLARDE « ORIENTALE » *Sylvia curruca minula/halimodendri* (1/1) (1/1 - 0/0)

2002 Jura - Desnes, phot., du 30 novembre au 5 janvier 2003 (M. Giroud *et al.*).

(Moyen-Orient, Asie centrale). Ces deux sous-espèces (*minula* est parfois considérée comme une espèce à part entière) sont phénotypiquement très proches et originaires d'une région du monde où plusieurs formes cohabitent avec certaines populations présentant des caractères intermédiaires. Dans les pays où ces deux formes se retrouvent en hivernage, comme au Sultanat d'Oman, les différencier est un casse-tête permanent dont le résultat n'est pas toujours satisfaisant (obs. pers.). C'est pourquoi en l'absence de capture de l'oiseau, il n'a pas été possible au CHN de trancher entre ces deux taxons. Quoi qu'il en soit, cette donnée constitue bien une première française, et la CAF a admis l'une ou l'autre de ces deux formes orientales en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France (Jiguet & la CAF *op. cit.*).



39. Fauvette épervière *Sylvia nisoria*, Hoëdic, Morbihan, octobre 2003 (G. Rault¹). Barred Warbler.



40. Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus*, Porquerolles, Var, avril 2003 (M. Goliard). Pallas's Warbler.

POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (20/20) (18/18 - 1/1)

Morbihan - Île d'Hoëdic, 20 octobre (Y. Kayser).

(De la Baltique à la Sibérie orientale). Cette espèce n'est pas d'observation annuelle en France (rien en 1997, 1999 ou 2002 par exemple).

Oiseau présentant les caractéristiques de la sous-espèce *nitidus* appelé « Pouillot du Caucase » (0/0) (0/0 - 1/1)

Pas-de-Calais - Audinghen, H1, 20 et 21 septembre (G. Flohart, J.-A. Leclercq *et al.*).

(Caucase, nord de la Turquie). Cette donnée constitue la première mention pour la France et a été inscrite par la CAF en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France (Jiguet & la CAF *op. cit.*). Actuellement, on recense seulement trois données de cette sous-espèce très en dehors de son aire de répartition, dont par exemple un oiseau aux îles Scilly, au sud de l'Angleterre, du 26 septembre au 4 octobre 1983.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (54/57) (52/55 - 8/8)

Finistère - Île d'Ouessant : Kervasdoué, phot., 18 octobre (N. Issa, F. L. & S. Veyrunes) ; Stang ar Stiff, 24 octobre (N. Issa, F. Veyrunes) ; Kadoran, du 24 au 26 octobre (P., M. & J.-B. Crouzier, F. Jiguet) ; Arland et Park Raden, 25 octobre (J. Piette) ; Île de Sein, phot., 25 octobre (Y. & J.-P. Trévoux).

Manche - Île de Tatihou/Saint-Vaast-la-Hougue, 27 octobre (A. & V. Verneau).

Var - Île de Porquerolles/Hyères, capt., phot., 22 avril (M. Goliard, C. Moyon *et al.*).

Vendée - Île d'Yeu, 29 octobre (S. Chambris, B. Garry).

2002 Nord - Malo-les-Bains, phot., 11 novembre (B. Paepegaey, L. Spanneut, K. Verbanck *et al.*).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). À l'instar des Pouillot à grands sourcils et des Gobemouches nains, le nombre de Pouillots de Pallas répertoriés sur Ouessant est, une année comme celle-ci, probablement surévalué dans la mesure où certains individus se déplacent sur l'île et sont alors considérés comme de nouveaux venus. C'est par exemple tout à fait possible pour l'oiseau vu à Arland le 25 octobre et qui peut, d'après certains observateurs, être celui observé la veille à Stang ar Stiff, sur ce même côté de l'île. Cela dit, 2003 est néanmoins une année exceptionnelle à plus d'un titre, d'abord par le nombre de données pour cette espèce (8 individus) mais aussi par cette surprenante capture d'un oiseau sur une île méditerranéenne au printemps ! En ce qui concerne l'effectif, l'année 1997 avec neuf individus tient la première place, mais trois mentions de cet automne à Ouessant n'ont pas encore fait l'objet de fiche, ce qui, si ces données sont homologuées, consacrerait 2003 comme la nouvelle année record !

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (695/736) (678/719 - 80/93)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Beauduc, 16 octobre (E. Franc).

Finistère - Île d'Ouessant : Kadoran, vidéo, du 27 septembre au 3 octobre (S. Chambris, L. Godet, J. Norwood *et al.*), 2 ind., 15 octobre (P.-A. Crochet), capt., phot., du 28 octobre au 3 novembre (A. Audevard, F. Jiguet, J. Piette), jusqu'à 2 ind., du 18 au 20 novembre (A. Audevard), 24 et 25 novembre (A. Audevard) ; Arland, 27 septembre (J. Birard, M. Zucca), 1^{er} octobre (Y. Guermeur), 2 ind., 14 octobre (P.-A. Crochet, J. Gernigon, J. Gonin), 2 ind., du 17 au 24 octobre (J.-F. Arcanger, A. Audevard, N. Issa), jusqu'à 3 ind., du 15 au 21 novembre (A. Audevard, R. Baeta, N. Issa) ; Kun, du 28 septembre au 3 octobre (S. Chambris, L. Godet *et al.*), du 11 au 14 octobre (G. Bruneau, P.-A. Crochet) ; Kerlann, 28 et 29 septembre (J. Birard, M. & S. Zucca) ; Stang ar Stiff, 28 et 29 septembre (J. Birard, M. & S. Zucca), 2 ind., du 21 au 23 octobre (P.-A. Crochet) ; Toull al Lann, 2 octobre (M. Zucca), 16 octobre (J. Gonin) ; Kreniou, 2 octobre (H. Gauche, M. Giroud, S. Maas) ; Cost ar Reun, 2 octobre (A. Audevard), 21 octobre (N. Issa *et al.*) ; Dizro, du 12 au 15 octobre (N. Issa, A. Mera, B. Paepegaey) ; Pount ar Rodez, 13 octobre (G. Bruneau) ; Parkou, jusqu'à 2 ind., du 13 au 15 octobre (A. Audevard, P.-A. Crochet, N. Issa), 16 novembre (A. Audevard) ; Pount Salaün, 2 ind., 13 octobre (A. Audevard, N. Issa), 22 octobre (P.-A. Crochet) ; Poull Dragas, du 13 au 15 octobre (P.-A. Crochet, F. Veyrunes), 21 octobre (P.-A. Crochet), du 11 au 16 novembre (A. Audevard, A. Mera, L. Spanneut) ; Porz Koret, phot., 13 et 14 octobre (J. Gernigon, C & J. Gonin, S. Reeber) ; Porz Gwenn, du 13 au 15 octobre (G. Bruneau, J. Gernigon, J. Gonin, S. Reeber) ; Stang Porz Gwenn, 2 ind., 13 et 14 octobre (J. Gernigon, J. Gonin, S. Reeber), 19 octobre (P.-A. Crochet), 14 et 15 novembre (A. Audevard, N. Issa, L. Spanneut *et al.*) ; Ar Reun, 14 octobre (J. Gernigon, J. Gonin, S. Reeber) ; Stang ar Merdy, 14 et 15 octobre (N. Issa, B. Segerer) ; Poull Gweguen, 14 et 15 octobre (J.-F. Arcanger) ; Porz Noan, 15 octobre (P.-A. Crochet), 2 novembre (A. Audevard, R. Morin) ; Stang Meur, jusqu'à 3 ind., du 17 au 23 octobre (P.-A. Crochet, E. Didner, F. Veyrunes) ; Ar C'Hernigou, du 17 au 20 octobre (P.-A. Crochet, N. Issa, F. Veyrunes) ; Stang Korz, 17 octobre (F. Veyrunes) ; Porz Paol, du 17 au 22 octobre (P.-A. Crochet) ; Ty Crenn, du 17 au 22 octobre (P.-A. Crochet, F. Veyrunes), du 11 au 15 novembre (A. Audevard, R. Baeta, N. Issa), 24 et 25 novembre (A. Audevard) ; Kervasdoué, du 18 au 24 octobre (N. Issa *et al.*) ; Poul Féaz, du 18 au 20 octobre (P.-A. Crochet, F. Veyrunes) ; Ker Ere, 18 octobre (F. Veyrunes) ; Prad Meur, du 20 au 22 octobre (P.-A. Crochet), 11 et 12 novembre (A. Audevard) ; réservoir aval, 21 octobre (P.P. Evrard, P. Rouillier) ; Ru Lan, 23 octobre (P.-A. Crochet) ; Kerhuel, 27 octobre (A. Audevard *et al.*) ; Ker Yegu, 30 octobre (A. Audevard), 11 novembre (A. Audevard) ; Poull Brac, du 11 au 16 novembre (A. Audevard, R. Baeta, N. Issa), du 21 au 28 novembre (A. Audevard) ; Park Raden, 15 novembre (A. Audevard, R. Baeta, N. Issa) ; Penmarch, 8 octobre (T. Guillosson) ; étang de Ty-Colo/Saint-Renan, 15 octobre (M. Champion, T. Quelenec) ; île de Sein, phot., 20 octobre (J.-F. Darras) ; île de Molène, 3 novembre (A. Audevard) ; lac du Drennec/Sizun, 10 et 11 novembre (Y. Le Corre).



41. Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus, île
d'Hoëdic, Morbihan,
octobre 2003 (J. Gonin).
Yellow-browed Warbler.

Lot-et-Garonne - La Mazière/Villeton, capt., phot., 3 novembre (A. Dal Molin).

Morbihan - Île d'Hoëdic, du 18 au 20 octobre (Y. Kayser, E. Lapousse, A. Le Nevé *et al.*), capt., phot., 27 et 28 octobre (J. Gonin, Y. Kayser *et al.*).

Nord - Zuydcoote, 13 octobre (J. Piette, T. Tancrez).

Pas-de-Calais - Audinghen : Haringzelle, 2 ind., 10 octobre (G. Flohart *et al.*), 17 octobre (P.J. Dubois, J.-Y. Frémont, M. Zucca), Cran Poulet, 12 octobre (G. Flohart); Blériot, 18 octobre (P.J. Dubois, J.-Y. Frémont, H. Verne, M. Zucca).

Vendée - Île de Noirmoutier : Fort Larron/Noirmoutier-en-l'Île, 22 octobre (M. Vaslin); Les Sables-d'Olonne : mare des Agaures, 26 octobre (P. Jésus *et al.*); La Paracou, 15 et 16 novembre (A. Barzic, D. Desmots, J.-M. Lepage), du 23 au 25 novembre (A. Barzic, D. Desmots, T. You); île d'Yeu, 27 octobre (S. Chambris, B. Garry), 10 et 11 novembre (W. Raitière); pointe de l'Aiguillon-sur-Mer, 15 novembre (M. de Gabriel).

2001 Finistère - Île d'Ouessant : Kadoran, 9 octobre (B. Volet); Toull Rouez, 15 octobre (M. Champion).

1982 Charente-Maritime - Rochefort, 1^{er} décembre, donnée précédemment acceptée (*Alauda* 52 : 121, 1984), à présent refusée après réexamen.

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale).

Année exceptionnelle avec 93 individus, mais qui se situe toutefois juste derrière 1988, une année record qui totalisait... 94 oiseaux. L'île d'Ouessant à elle seule fournit 59 données pour 71 individus, la Vendée atteint le chiffre – remarquable pour ce département – de sept individus et des départements comme le Lot-et-Garonne enregistrent leur première mention. La première vague arrive pendant le week-end des 27 et 28 septembre à Ouessant avec cinq individus, alors qu'aucun oiseau n'était présent les jours précédents. À noter d'ailleurs que cette arrivée coïncide avec l'observation de plusieurs dizaines d'oiseaux aux Pays-Bas (*vide* M. Zucca). La plus grosse arrivée se matérialise par deux vagues successives le 13 puis le 17 octobre, et novembre n'est pas en reste avec une nouvelle arrivée aux alentours du 11 et dans une moindre mesure vers le 21, ce qui témoigne du glissement des oiseaux ayant également « envahi » les autres pays européens dans des proportions tout à fait inhabituelles. Notons enfin que le réexamen de la donnée ancienne de 1982 n'a pas permis de trancher entre Pouillot à grand sourcil et Pouillot de Hume.

POUILLOT DE HUME *Phylloscopus humei* (4/5) (4/5 - 7/7)

Finistère - Île d'Ouessant : Kerhuel, 27 et 28 octobre (F. Jiguet *et al.*); Stang Korz, du 3 au 12 novembre (A. Audevard); Stang Porz Gwenn, du 10 au 12 novembre (A. Audevard); Stang Meur, 11 novembre (A. Audevard); Porz Noan, phot., 15 et 16 novembre (N. Issa, L. Spanneut *et al.*); Niou, phot., 15 et 16 novembre (R. Baeta, N. Issa, L. Spanneut *et al.*).

Pas-de-Calais - Tardinghen, 10 novembre (S. Chambris, G. Flohart, M. Zucca).

(Nord-est de l'Afghanistan à la Chine centrale). Si la France, comme d'autres pays d'Europe, a connu en 2003 des arrivées remarquables de Pouillots de Pallas et de Pouillots à grands sourcils, elle a également, comme ces mêmes pays, été le théâtre d'un événement exceptionnel en ce qui concerne le Pouillot de Hume : sept individus (dont six pour Ouessant), alors que le nombre répertorié jusqu'à présent était de cinq oiseaux ! La Grande-Bretagne a elle aussi établi un record avec 22 individus (Rogers & the Rarities Committee 2004) et cinq oiseaux ont été observés aux Pays-Bas (van der Vliet *et al.* 2004). En ce qui concerne Ouessant, l'individu trouvé le 3 novembre à Stang Korz pourrait éventuellement être celui contacté les 31 octobre et 1^{er} novembre à Toull al Lann (et non encore soumis au CHN). Quoi qu'il en soit, on note comme en Grande-Bretagne une arrivée en deux vagues, la première dans la dernière décade d'octobre, la seconde, très nette, à la mi-novembre. Pour information, la dernière mention de l'espèce en France remontait à janvier 1996 en Crau, obtenue après celle de fin octobre 1995 à Hoëdic, Morbihan.



42. Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, Ouessant, Finistère, octobre 2003 (F. Veyrunes). Yellow-browed Warbler



43. Gobemouche nain
Ficedula parva, Ouessant,
Finistère, octobre
2003 (A. Audevard).
Red-breasted Flycatcher.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

1 - Individus présentant les caractéristiques du groupe *tristis/fulvescens* (13/16) (10/13 - 1/3)

Loire-Atlantique - Montoir, 3 ind., capt., phot., 15 janvier (H. Dugué, D. Raboin).

(Sibérie). Pour mémoire, deux autres individus avaient été capturés et bagués courant décembre 2002 sur ce même site (*Ornithos* 11-2 : 77), soit cinq hivernants dans ce secteur de l'estuaire de la Loire, ce qui est remarquable.

2 - Pouillots véloces de type sibérien (177/208) (136/145- 3/3)

Charente-Maritime - Rochefort-sur-Mer, phot., 16 et 17 décembre (P. Jourde).

Vendée - Notre-Dame-de-Monts, 6 novembre (M. Vaslin) ; Olonne-sur-Mer, 15 novembre (P. Yésou).

(Sibérie). Les dates d'observation de l'oiseau vu le long de la Charente à Rochefort rappellent bien celles des mentions de *tristis* hivernant en Loire-Atlantique, quant à celles de Vendée, elles sont typiques pour ce migrateur plutôt tardif.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (302/321) (248/259 - 25/28)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Boisverduin, H1, 25 septembre (Y. Kayser).

Charente-Maritime - Moëze, H1, 6 septembre (M. Narcy).

Finistère - Île d'Ouessant : Saint-Michel, H1, vidéo, 30 septembre (L. Godet, J. Norwood, M. Zucca) ; Pount-Salaün, vidéo, 2 octobre (S. Chambris, M. Zucca) ; Parkous, H1, vidéo, 2 octobre (J. Birard, M. Zucca), 12 octobre (P.-A. Crochet) ; Stang Meur, H1, 2 octobre (L. Godet, J. Norwood) ; Cost ar Reun, 2 H1, phot., vidéo, 2 octobre (A. Audevard, P. Grisser, M. Zucca), 21 octobre (J.A. Leclercq) ; Ty Crenn, Pradmeur et Poull Brac, 3 ind., du 11 au 15 octobre (G. Bruneau, P.-A. Crochet) ; Arland, 12 octobre (B. Helsens) ; Porz Doun, 12 octobre (G. Bruneau, P.-A. Crochet) ; Pount ar Rodez, 12 octobre (G. Bruneau) ; Kervasdoué, H1, 13 octobre (A. Audevard, N. Issa) ; Rulan, 13 octobre (B. Paepgaey) ; Ty Korn, 13 octobre (A. Ouwerkerk) ; Kerc'here, H1, 14 octobre (A. Audevard) ; Stang ar Stiff, 14 octobre (G. Bruneau) ; Kerhuel, H1, phot., 15 octobre (A. Audevard, N. Issa) ; Toull al Lann, phot., 15 et 16 octobre (A. Gernigon, C. Gonin, C. Kerihuel) ; Poull Bojer, 15 octobre (A. Gernigon, C. Gonin). Île de Sein : phare, mâle ad., phot., 10 et 11 octobre (A. Audevard), H1, 10 et 11 octobre (A. Audevard) ; Kourrijou, phot., 18 octobre (J.-F. Darras).

Hérault - Ceilhes-et-Rocozeles, 11 novembre (F. Legendre).

2001 Finistère - Île d'Ouessant : Kerbrat, H1, 14 octobre (M. Champion).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Comme le montre le nombre de Gobemouches nains cet automne (avec 28 oiseaux, 2003 se place en deuxième position juste derrière 1995, année record avec 33 individus), cette espèce, à l'instar des pouillots d'origine asiatique, a également fait l'objet

d'un afflux tout à fait inhabituel. Les arrivées coïncident d'ailleurs assez bien avec celles du Pouillot à grands sourcils et l'on note par exemple une arrivée de six oiseaux à Ouessant entre le 30 septembre et le 2 octobre, le flux majeur se situant du 12 au 15 octobre. À noter cet avant-coureur du 6 septembre en Charente-Maritime, date très précoce, notamment pour ce département qui voit en général l'apparition des passereaux d'origine orientale plus tardivement en saison que dans le nord et le nord-ouest de la France.

ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (58/135) (55/132 - 3/4)

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuves de reproduction)

Aude - Fleury-d'Aude, 2 mâles, 4 mai (Y. Kayser).

Gard - Scamandre/Vauvert, mâle, 20 mai (D. Cohez, Y. Kayser *et al.*) ; Saint-Gilles, mâle, 22 mai (Y. Kayser). (Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). Même si la colonisation de l'Aude qui s'est effectuée au début des années 1990 est connue, cette localité n'avait pas encore fait l'objet d'observations circonstanciées.

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (129/293) (107/250 - 4/4)

Aude - Peyriac-de-Mer, fem., phot., du 25 novembre au 24 décembre (F. Gilot, J. Gonin *et al.*).

Finistère - Île de Molène, phot., du 10 au 12 juin (Y. Pailler, Y. Sparfel) ; île d'Ouessant : Kerlann, Porz Gwenn et Toull al Lann, juv., du 28 septembre au 1^{er} octobre (M. Zucca *et al.*).

Pyrénées-Orientales - Pollestres, H1/E1, 11 mars (F. Garcia).

2002 Bouches-du-Rhône - Châteauneuf-les-Martigues, 18 ind. au moins, du 29 au 31 mai (P. Lafont).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Retour à la normale après trois années successives d'afflux printaniers, notamment 2002, année record avec 119 oiseaux. À noter qu'en 2003, un nouvel afflux semblait se dessiner en Europe orientale, puisque 1200 individus étaient observés le 1^{er} juin en Roumanie (L. Szabó *in litt.*), mais la vague s'est finalement arrêtée sur place avec environ 16000 couples nicheurs en trois colonies, ce qui représente la plus grosse invasion – en terme de couples nicheurs – en Europe (L. Szabó *in litt.*).


MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (22/31) (17/25 - 1/0)

Corse-du-Sud - Bonifacio, mâle, 8 mai (F. Portier).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Même donnée à un jour près qu'en 2002. Rien de nouveau donc sous le soleil (et le vent...) de Bonifacio.



44. Gobemouche nain *Ficedula parva*, Sein, Finistère, octobre 2003 (A. Audevard). Red-breasted Flycatcher.



45. Étourneau roselin *Sturnus roseus*, Peyriac-de-Mer, Aude, novembre 2003 (J. Gonin). Rose-coloured Starling.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs* (4/4) (1/1 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques des sous-espèces *africana/spodiogenys*

Ain - Col de la Faucille/Mijoux, mâle, 19 avril (J.-P. Paul).

(Afrique du Nord). Une seule donnée au XX^e siècle, avec un individu le 27 mars 1994 à Barre-des-Cévennes en Lozère. Il est cependant difficile d'être catégorique avec les oiseaux présentant les caractéristiques du groupe de races nord-africaines, d'autant que le risque d'oiseaux d'élevage n'est pas nul. Cet oiseau présentait le croupion vert d'*africana*, mais le tour de l'œil et la barre alaire large de *spodiogenys*. Enfin l'absence de blanc sous l'œil peut aussi poser question. Bien sûr, il est communément admis pour ces sous-espèces sédentaires que les diverses apparitions nord-européennes correspondent à des oiseaux ayant suivi des Pinsons des arbres hivernant quelque part en Afrique du Nord, puisque celles-ci se produisent toujours à la même époque (mars-avril). Pourtant, et contre toute attente, ces formes n'ont jamais été officiellement répertoriées en Espagne, et, par ailleurs, sur des illustrations photographiques montrant quatre ou cinq oiseaux, tous sont légèrement différents, ce qui ne plaide pas en faveur de « véritables » égarés, mais ce qui ne serait alors pas surprenant pour des oiseaux au plumage aberrant (A. Tore Mjös *in litt.*). En Grande-Bretagne, six mentions de 1994 à 1998 n'ont toujours pas été homologuées et un article sur le sujet est en préparation (C. Bradshaw *in litt.*). Pour 2003, trois données aux Pays-Bas sont toujours actuellement en circulation au sein du comité d'homologation néerlandais (van der Vliet *et al.* 2004). Il n'est pas impossible que le CHN soit amené à revenir sur cette question ultérieurement.

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (149/183) (134/168 - 11/10)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d'un astérisque (*)

Doubs - Labergement-Sainte-Marie, mâle rouge ch. *, du 27 mai au 8 juin (N. de Marre, D. Michelat, B. Tissot), mâle gris ch. *, 13 juin (B. Tissot).

Finistère - Île de Sein, mâle gris ch., 29 mai (Y. & J.-P. Trévoux) ; île d'Ouessant : Cost ar Reun, H1, phot., 23 et 24 octobre (A. Audevard, Y. Le Corre *et al.*) ; Stang Meur, fem./imm., 28 octobre (P. & J.-B. Crouzier) ; île de Molène, H1, du 4 au 6 novembre (A. Audevard).

Jura - Les Rousses, mâle ch., du 7 au 10 juin (D. Michelat, J.-P. Paul).

Morbihan - Île d'Hoëdic, H1, 26 et 27 octobre (Y. Kayser, A. Larousse, G. Rault¹).

Pas-de-Calais - Audinghen, mâle gris ch. *, 1^{er} juin (G. Flohart) ; Fort-Vert, mâle gris ch. *, 16 juin (G. Flohart).

Vendée - Île de Noirmoutier : Les Sableaux/Noirmoutier-en-l'Île, H1 du 5 au 8 septembre (D. Desmots, M. Vaslin).

2002 Haut-Rhin - Mestzeral, mâle gris ch. *, 2 juin (J.-L. Cathala).

2002 Vosges - La Bresse, mâle gris ch. * (le même que dans le Haut-Rhin), 2 juin (J.-L. Cathala).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Malheureusement, les observations du Pas-de-Calais sont restées sans suite... comme a priori celles de Franche-Comté. L'oiseau de 2002, à cheval sur deux départements, chantait sur la route des crêtes du massif vosgien du Kastelberg.



46. Roselin cramoisi
Carpodacus erythrinus,
Ouessant, Finistère,
octobre 2003
(A. Audevard).
Scarlet Rosefinch.



47 à 50. Paruline rayée *Dendroica striata*, Ouessant, Finistère, octobre 2003 (47-48 : A. Audevard ; 49 : S. Reeber ; 50 : J.-P.-Paul). Blackpoll Warbler.

PARULINE RAYÉE *Dendroica striata* (3/3) (3/3 - 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Feuten Velen, Ar Ru, Porz Gwenn et Kérivarc'h, phot., du 10 au 21 octobre (A. Audevard, P.-A. Crochet, L. Spanneut *et al.*).

(Amérique du Nord). Nouvelle observation ouessantine de cette paruline après celle, somme toute récente, d'octobre 2000. L'oiseau de 2003 est arrivé 9 jours plus tôt et a beaucoup « voyagé » sur l'île. Les deux autres mentions sont du 9 au 15 octobre 1990 à Ouessant et du 29 octobre 1995 à Sein. À cet égard, signalons qu'une Paruline *sp.* a été vue le 27 octobre sur l'île de Sein, mais que malheureusement les conditions d'observation n'ont pas permis d'exclure, outre la Paruline rayée, une Paruline à poitrine baie *Dendroica castanea* ou certains juvéniles de Paruline des Pins *Dendroica pinus*. Dommage !



51. Bruant nain *Emberiza pusilla*, Hoëdic, Morbihan, octobre 2003 (G. Rault¹). Little Bunting.



52. Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala*, Le Lauzet, Hautes-Alpes, juillet 2003 (O. Tourillon). Black-headed Bunting.

BRUANT À CALOTTE BLANCHE *Emberiza leucocephalos* (28/33) (14/19 - 3/1)

Bouches-du-Rhône - Camargue : Mas L'Auricet, mâle et fem., 2 et 3 janvier (F. Bouzendorf, S. Chambris, M. Zucca) ; Mas Saint-Césaire, 2 mâles ad., mâle H1 et 2 fem., phot., du 30 novembre au 14 février 2004 (A. Flitti, Y. Kayser, N. Vincent-Martin *et al.*) ; Mas Augéry-des-Sansouires, mâle et fem., du 26 décembre au 12 janvier 2004 (Y. Kayser). (Sibérie). Les oiseaux camarguais semblent très mobiles et mis à part un mâle de 1^{er} hiver, il n'y a pas lieu de considérer que les autres soient des nouveaux venus (Y. Kayser, comm. pers.). C'est l'option qui a été retenue pour les statistiques.

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* (26/27) (18/18 - 1/1)

Finistère - Île d'Ouessant : Kerhuel et Kergadou, phot., 26 et 27 octobre (A. Audevard, P. Cruzier *et al.*). (Scandinavie, Sibérie). La dernière observation de ce bruant remontait à 1999.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (75/80) (62/65 - 6/6)

Finistère - Île d'Ouessant : Arland, phot., 13 octobre (J. Gonin *et al.*) ; Parluc'hen, phot., du 19 au 21 octobre (A. Audevard, P.P. Evrard, P. Rouillier *et al.*), phot., 21 octobre (A. Audevard) ; île de Sein, phot., 18 et 19 octobre (J.-F. Darras).

Morbihan - Île d'Hoëdic, 23 avril (A. Le Nevé), phot., 21 et 22 octobre (Y. Kayser, E. Lapous, G. Rault¹ *et al.*). (Scandinavie, Asie septentrionale). Après une année blanche, 2003 est plutôt un bon cru. Sur Ouessant, remarquables observations simultanées de deux oiseaux à Parluc'hen le 21 octobre. Deux individus ont également fréquenté Hoëdic cette année, dont un au printemps. Une nouvelle fois, les îles du Ponant sont « sous les feux de la rampe »...

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (73/85) (57/66 - 3/2)

Hautes-Alpes - Le Lauzet/Monestier-les-Bains, mâle ad. ch., phot., du 7 juin au 25 juillet au moins (G. Berthollon, C. Kerihuel, O. Tourillon).

Alpes-Maritimes - Cipières, 3 mâles ch. et 1 fem., du 9 au 11 juin au moins (D. & J.-L. Dupuy).

Finistère - Île de Sein, mâle imm., phot., 26 et 27 mai (Y. & J.-P. Trévoux).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Trois mâles (au lieu de deux) étaient cantonnés cette année à Cipières, ce qui est plutôt encourageant, toutefois aucun nid n'a été trouvé, mais le suivi n'a pu être effectué. À noter le retour du mâle vu au Lauzet en 2001 (où était-il en 2002 ?).

53. Bruant rustique
Emberiza rustica,
 Ouessant, Finistère,
 octobre 2003
 (A. Audevard).
Rustic Bunting.



53. Bruant nain
Emberiza pusilla,
 Ouessant, Finistère,
 octobre 2003
 (M. Vergès).
Little Bunting.



ANNEXE 1 - ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (64/88) (47/59 - 2/2)

Aude - Bages, ad., 22 août (F. Garcia).

Charente - Saint-Adjutory et Vitrac-Saint-Vincent, ad., du 13 au 16 octobre (L. Précigout).

2002 Bouches-du-Rhône - Berre-l'Étang : étang de Bolmon, canal du Rove, étang du Barlatier, salins, étang du Bastidou, ad., phot., du 13 novembre au 21 mars 2004 au moins (F. Dhermain, P. Lafont, T. Louvel *et al.*).

2002 Var - Fréjus : étangs de Villepey à Saint-Aygulf, ad., phot., 20 et 21 décembre (C. Bury).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). On peut se demander si l'oiseau très mobile des Bouches-du-Rhône ne peut pas être celui précédemment mentionné dans le secteur du Puy-Ste-Réparate en décembre 2002 (*Ornithos* 11-2 : 81), de même pour l'oiseau du Var. Dans le doute, il n'a pas été ajouté de nouvel individu pour ce secteur dans les statistiques.

PÉLICAN GRIS *Pelecanus rufescens* (19/19) (19/19 - 1/1)

Var - Fréjus : étangs de Villepey à Saint-Aygulf, ad., 30 septembre (D. Huin).

(Afrique tropicale et présence quasi continue dans le sud de l'Égypte). Les oiseaux vus dans les départements de l'Aude et de l'Hérault, manifestement issus du zoo de Sigean, ne sont plus pris en compte. Celui de Villepey peut encore bénéficier du doute...

FLAMANT NAIN *Phoenicopterus minor* (19/16) (19/16 - 2/1)

Aube - Piney : lac de la Forêt d'Orient, ad., 27 décembre au moins (P. & J.-B. Crouzier, A. Forest, G. Murtin).

Bouches-du-Rhône - Camargue : étang du Fangassier, au moins 2 ad., du 25 juillet au 5 août (D. Cohez, Y. Kayser, A. Larousse *et al.*).

2001 Charente-Maritime - Port-des-Barques, ad., 2 novembre 2001 (S. Chanel, L. Majorel, V. Rolland-Commarmot).

(Afrique tropicale). Cette espèce était précédemment placée en catégorie E. Une origine sauvage reste possible notamment pour certains oiseaux qui ont pu accompagner des Flamants roses lors de leur migration printanière, et ayant, depuis, adopté un comportement migratoire calqué sur celui de nos oiseaux camarguais. La CAF l'a donc inscrite en catégorie D de la liste des Oiseaux de France (Jiguet & la CAF *op. cit.*).

HARLE COURONNÉ *Lophodytes cucullatus* (14/15) (14/15 - 1/1)

Bouches-du-Rhône - Mallemort, mâle ad. éclipse, du 5 juillet au 28 août (E. Durand, G. Jacotot *et al.*).

(Amérique du Nord). Les dates ne plaident pas en faveur d'une arrivée naturelle... Cet oiseau était sur la retenue EDF qui s'étend aussi sur la commune de Mérindol dans le Vaucluse.



54. Pélican blanc
Pelecanus onocrotalus,
étang de Berre
Bouches-du-Rhône,
mars 2004
(F. Dhermain).
White Pelican.

BUSE DE SWAINSON *Buteo swainsoni* (0/0) (0/0 - 1/1)

Pas-de-Calais - Pont-d'Ardres, H2 probable, phot., du 13 septembre au 28 octobre (P.J. Dubois, G. Flohart, S. Nicolle *et al.*).

(Amérique du Nord). Première observation française de cette grande migratrice américaine. Cette buse ne portait aucun signe de captivité et a été trouvée en même temps que de nombreux limicoles néarctiques en Europe de l'Ouest. Faisait-elle partie, elle aussi, des restes du cyclone Florian ? À noter que cette espèce est rarement détenue en captivité, mais on ne compte qu'une seule mention en Europe. La Commission de l'Avifaune Française (CAF) a donc jugé plus prudent de la placer en catégorie D (Jiguet & la CAF *op. cit.*). Pour la petite histoire, signalons qu'une Buse variable au pattern troublant fréquentait également le secteur par intermittence ; celle-ci a bien sûr semé le doute chez certains observateurs venus spécialement sur le site pour voir autre chose...

TOURTERELLE MAILLÉE *Streptopelia senegalensis* (9/9) (7/7 - 1/1)

Vaucluse - Cavaillon, 10 avril (A. Flitti).

(Afrique, Asie mineure, Istanbul). Les observations de cette espèce en France posent toujours question, mais il est clair qu'une arrivée naturelle est loin d'être invraisemblable. À cet égard, rappelons l'observation de deux oiseaux s'étant posés sur un bateau le 13 mai 1985 entre Corse et continent dans les eaux italiennes (*Ornithos* 5-4 : 176). La dernière observation remonte au 30 août 1998 avec deux individus près d'Arles.

ANNEXE 2 - LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui subsiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si *a priori* l'identification de l'espèce proposée semble aisée.

Note importante : les raisons ayant entraîné la non homologation d'une donnée sont fournies aux observateurs ayant joint une enveloppe timbrée à leur adresse et demandant à être informés de la décision du CHN.

2003

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *columbianus* appelée « Cygne siffleur » - Pas-de-Calais - Duytsche/Sangatte - ad., du 26 au 28 octobre.

Oie des neiges *Anser caerulescens* - Moselle - Rhodes, phot., 11 mai.

Macreuse noire *Melanitta nigra* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *americana* appelée « Macreuse à bec jaune » - Saône-et-Loire - Antully, 2 ind., phot., 23 septembre.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *lucidus* - Loire-Atlantique - Herbignac - 1^{er} mars.

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* - Seine-et-Marne - Jablines - ad., 25 septembre ; Var - Fréjus : étangs de Villepey/Saint-Aygulf - phot., 29 septembre.

Aigrette neigeuse/des récifs/intermédiaire *Egretta thula/gularis/intermedia* - Manche - Bréhal, phot., 10 juillet.

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Loire-Atlantique - en Brière, du 26 avril au 8 mai.

Élanion blanc *Elanus caeruleus* - Allier - Avermes, ad., 24 mars ; Vendée - L'Aiguillon-sur-Mer, 17 juillet.

Buse variable *Buteo buteo* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie » - Ain - Le Plantay, 11 janvier ; Aude - Fitou, 1^{er} avril.

Buse féroce *Buteo rufinus* - Seine-Maritime - Saint-Jacques-d'Aliermont, juv., 14 et 16 juin.

Buse pattue *Buteo lagopus* - Marne - Giffaumont-Champaubert, mâle ad., 9 novembre ; Pas-de-Calais - Le Pacault-d'Hinges, 17 février.

Faucon crécerellette *Falco naumanni* - Haute-Corse - Barcaggio, mâle ad., 15 avril.

Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* - Morbihan - Plumelec, fem. ad., forme claire, 21 février ; Hautes-Pyrénées - Barèges, ad., 6 juillet.

Faucon lanier *Falco biarmicus* - Aude - Port-la-Nouvelle, H1, 23 février.

Faucon sacre *Falco cherrug* - Bouches-du-Rhône - Crau : Miramas, H1, 23 février ; Haut-Rhin - Petite Camargue alsacienne, du 18 au 31 mars.

Faucon lanier/sacre *Falco biarmicus/cherrug* - Bouches-du-Rhône - Camargue : nord Galabert, ad., 14 septembre.

Marouette poussin *Porzana parva* - Haute-Corse - Capendula/Barcaggio, ad., 13 avril.

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* - Charente-Maritime - Île de Ré : Les Portes-en-Ré, 2 ad., du 18 au 23 septembre.

Pluvier fauve *Pluvialis fulva* - Morbihan - Île d'Hoëdic, 12 avril.

Bécassine double *Gallinago media* - Loire-Atlantique - Saint-Joachim, 26 février.

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes* - Hautes-Pyrénées - Puydarieux, 15 novembre.



55. Robin à flancs roux
Tarsiger cyanurus,
Ouessant, Finistère,
octobre 2003
(F. Desage).
Red-flanked Bluetail.

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* - Charente-Maritime - Île de Ré : La Couarde, 2 ind., phot., du 22 décembre au 2 janvier 2004 ; Côtes-d'Armor - Yffiniac, ad., 8 mars ; Finistère - Tregunc, ad., 25 octobre ; Gironde - La Hume/Gujan-Mestras, H1, 10 février ; Arcachon, puis La Hume/Gujan-Mestras, H2, du 20 au 25 mars ; Seine-Maritime - Petit-Couronne, H2, 7 janvier.

Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides* - Loire-Atlantique - Piriac-sur-Mer, ad., 19 octobre.

Sterne royale *Sterna maxima* - Var - Giens, 17 avril.

Sterne voyageuse *Sterna bengalensis* - Côte-d'Or - Arc-sur-Tille, ad., 10 août.

Pipit de Richard *Anthus richardi* - Pas-de-Calais - Audinghen, 20 septembre ; Framzelle/Audinghen, 27 septembre.

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* - Vendée - Île d'Yeu, E1, phot., 16 mai.

Agrobate roux *Cercotrichas galactotes* - Nièvre - Gâcogne, 25 juin.

Rosignol progné *Luscinia luscinia* - Lot - Puy-l'Evêque, phot., du 12 juillet au 16 août.

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola* - Vendée - Maché, 18 septembre.

Hypolaïs pâle *Hippolaïs pallida* - Corse-du-Sud - Bonifacio, 5 septembre.

Hypolaïs bottée *Hippolaïs caligata* - Loire - Saint-Just-Saint-Rambert, du 16 au 18 octobre.

Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* - Vendée - Brétignolles, 10 octobre.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* - Individu présentant les caractéristiques du groupe *tristis/fulvescens* - Bouches-du-Rhône - Le Vigueirat/Mas-Thibert, capt., phot., 10 novembre.

Gobemouche nain *Ficedula parva* - Aude - Pech-Luna, 31 août ; Hautes-Pyrénées - Puydarieux, 20 mai.

Roselin cramois *Carpodacus erythrinus* - Finistère - Île d'Ouessant : Kun, 15 septembre.

Paruline rayée *Dendroica striata* - Finistère - Île de Sein, 27 octobre.

Bruant nain *Emberiza pusilla* - Côte-d'Or - Eringes, 14 mars.

2002

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Jura - Petit-Noir, phot., du 4 juillet au 8 août au moins.

Buse féroce *Buteo rufinus* - Bouches-du-Rhône - Camargue : Redon/Bomborinette, du 30 octobre au 18 décembre ; Isère - Sainte-Marie-d'Alloix, 4 avril.

Marouette de Baillon *Porzana pusilla* - Doubs - Labergement-Sainte-Marie, 27 et 28 mai.

Pluvier bronzé/fauve *Pluvialis dominica/fulva* - Var - Fréjus : étangs de Villepey/Saint-Aygulf, ad., 16 août.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans » - Jura - Petit-Noir, mâle ad., 21 juillet.

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *britannica* - Pas-de-Calais - Audinghen, 4 novembre.

2001

Canard à front blanc *Anas americana* - Moselle - Zommange, fem., 11 décembre.

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *maurus*, appelée « Tarier oriental » - Ardennes - Douzy, mâle, 7 octobre.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* - Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce nord-africaine *seebohmi* appelée « Traquet de Seebohm » - Haute-Savoie - Bonneville, 20 avril.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* - Meuse - Lachaussée, 31 octobre.

2000

Aigrette des récifs *Egretta gularis* - Somme - Saint-Quentin-en-Tourmont - phot., printemps.

Buse pattue *Buteo lagopus* - Ain - Challes-la-Montagne, H1, 26 février.

Pouillot à grands sourcils/de Hume *Phylloscopus inornatus/humei* - Indre-et-Loire - Tours, 21 décembre.

1998

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* - Doubs - Remoray, mâle rouge, 16 juin.

1992

Goéland d'Audouin *Larus audouinii* - Finistère - Lanildut, 27 août.

1982

Pouillot de Hume *Phylloscopus humei* - Charente-Maritime - Rochefort, 1^{er} décembre.

ANNEXE 3 - CATÉGORIE E

Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la liste française ni dans la catégorie D, mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour.

- **Sarcelle cannelle** *Anas cyanoptera* - Charente-Maritime - Cabanes de Moins/Breuil-Magné, mâle, du 7 au 23 avril (P. Trotignon *et al.*); Finistère - Port Rhu/Douarnenez, mâle, du 22 novembre au 15 décembre (Y. Le Corre, G. Rault¹); 1999 Vendée - Saint-Denis-du-Payré, mâle ad., du 19 décembre au 10 mars 2000 (E. Gfeller, A. Larousse, A. Thomas, P. Trotignon *et al.*).

- **Faucon lanier** *Falco biarmicus* - Seine-Maritime - Le Havre, ad., *erlangeri*, phot., 13 octobre (A. Deshandol, P. Provost), espèce de catégorie D, cet individu est mis en catégorie E compte tenu de son caractère peu farouche (semble imprégné), une origine captive étant probable.



56. Mouette atricille
Larus atricilla, Camargue,
Bouches-du-Rhône,
août 2003 (F. Bouzendorf).
Laughing Gull.

REMERCIEMENTS

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 2003, ont contribué à son bon fonctionnement :

- la **Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)** pour l'aide matérielle et financière attribuée au secrétariat du Comité, et nécessaire à son fonctionnement,
- la revue *Ornithos* pour la prise en charge du coût des photos en couleurs qui illustrent ce rapport,
- **Carl Zeiss Division Jumelles** pour le soutien apporté à la publication du rapport annuel,
- Aurélien Audevard, Philippe J. Dubois, Julien Gonin, Nidal Issa, Yves Kayser, Robert Lécaille, Dominique Michelat, Georges Oliosio, Sébastien Reeber, Vivien Rolland-Commarmot, Maxime Zucca qui nous ont apporté leur aide et/ou des informations complémentaires,
- tous les responsables de Centrales Ornithologiques, de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) ou Départementaux (CHD) qui nous ont transmis des données,
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

- DESMOTS D., PONTON A., TAPIN R. & VASLIN M. (2004). Première tentative de nidification du Goéland railleur *Larus genei* sur le littoral atlantique français, en Vendée. *Ornithos* 11-6 : 316-318.
- DUBOIS P.J. & LUCZAK C. (2004). Les limicoles néarctiques en France : synthèse des données pour la période 1965-2000. *Ornithos* 11-5 : 214-229.
- GILROY J.J. & LEES A.C. (2003). Pectoral Sandpipiers in Europe : vagrancy patterns and the influx of 2003. *British Birds* 97-12 : 638-646.
- HARROP H. (2003). Un Fou masqué *Sula dactylatra* dans le golfe de Gascogne. *Ornithos* 10-6 : 294-295.
- JIGUET F. & LA CAF (2004). En direct de la CAF. Décision récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française. *Ornithos* 11-5 : 230-245.
- ROGERS M.J. & THE RARITIES COMMITTEE (2004). Report on rare birds in Great Britain in 2003. *British Birds* 97-11 : 558-625.
- ROUSSEAU E., GONIN J. & CLÉMENT D. (2003). Nidification du Faucon crécerellette *Falco naumanni* dans l'Aude. *Ornithos* 10-6 : 298-299.

57. Bruant nain *Emberiza pusilla*, Ouessant, Finistère, octobre 2003 (A. Audevard). *Little Bunting*.





58. Paruline rayée *Dendroica striata*, Ouessant, Finistère, octobre 2003 (A. Ouwerkerk). Blackpoll Warbler

- ULLMAN M. (2003). Separation of Western and Eastern Black-eared Wheatear. *Dutch Birding* 25-2 : 77-99.
- VAN DER VLIET R.E., VAN DER LAAN J. & CDNA (2004). Rare birds in the Netherlands in 2003. *Dutch Birding* 26-6 : 359-384.
- ZUCCA M. & LE CMR (2003). Le Comité de suivi des Migrateurs Rares : objectifs, fonctionnement, mise en œuvre. *Ornithos* 10-4 : 182-183.

SUMMARY

Rare birds in France in 2003. A new species was added to the French List in 2003 : Masked Booby *Sula dactylatra*. Furthermore, two subspecies were also added to this list : Oriental Lesser Whitethroat *Sylvia curruca minula/halimodendri* (either of these two oriental forms) and Green Warbler *Phylloscopus trochiloides nitidus*. A Forster's Tern *Sterna forsteri* was the second French record, and a Brünnich's Guillemot *Uria lomvia* was the third (and also the first living bird), as was a Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus* and a Pallas's Grasshopper Warbler *Locustella certhiola*. Pink-footed Goose *Anser brachyrhynchus* was recorded in the highest number of individuals (85 birds) since being considered by the French Rarities Committee (FRC), i.e. 1987 ; also of interest are 6 American Golden Plovers *Pluvialis dominica* and 7 Hume's Yellow-browed Warblers *Phylloscopus humei* (France had recorded only 5 Hume's Yellow-browed Warblers previously). A Solitary Sandpiper *Tringa solitaria* was the fifth French record ; it had not been seen in France for 17 years ! 2003, at last, included the first Swainson's Buzzard *Buteo swainsoni* (Category D) for France. The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of French records and individuals (excluding 2003) ; the second pair relate the same thing for the period 1981-2002 ; the last pair relate to the current year (i.e. 2003).

Jean-Yves Frémont, Secrétariat du CHN, 58 rue Laugier, 75017 Paris
Comité d'Homologation National c/o LPO, La Corderie Royale, BP 90263, 17305 Rochefort Cedex



Le rapport annuel du Comité d'Homologation National (CHN) est publié avec le soutien de Carl Zeiss Division Jumelles