



# Les oiseaux rares en France en 2004



*23<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation National*

*Jean-Yves Frémont, Marc Duquet & le CHN*

Ce 23<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 2004. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 2004 est de 490 (533 en 2003, 459 en 2002, 507 en 2001). Le taux d'acceptation atteint 87,2 %, un chiffre identique à celui de 2003 (87,1 %), qui lui-même était nettement supérieur à ceux des deux années précédentes (82,6 % en 2001 et 83,2 % en 2002). En fait, le nombre global de fiches examinées par le CHN est plus élevé, puisque le comité est sollicité notamment par la Commission de l'Avifaune Française (CAF) qui lui demande son avis sur d'anciennes données antérieures à la création du CHN (parfois du XIX<sup>e</sup> siècle) avant de les inscrire éventuellement sur la Liste des oiseaux de France, mais aussi de temps en temps par des comités régionaux ou de simples observateurs. Ces données n'entrent bien sûr pas dans les chiffres mentionnés ci-dessus.

En 2004, Dominique Michelat achevait son mandat, Vincent Palomares lui a succédé. Toutefois, dans le but de remplacer notre collègue et ami Gaël Rault<sup>†</sup> qui nous avait tragiquement quittés en début d'année (et à qui il restait 6 ans à accomplir au sein du CHN), il a été décidé de repousser d'une année la fin du mandat de chacun des 6 prochains membres sortant. C'est ainsi que Dominique Michelat est resté membre pour l'année 2004. Pierre Couzrier et Jean-Yves Frémont ont été, pour leur part, reconduits dans leurs fonctions respectives de Président et de Secrétaire du CHN. En 2004 le CHN se composait donc des membres suivants : Pierre Couzrier (président), Marc Duquet, Amine Flitti, Guy Flohart, Jean-Yves Frémont (secrétaire), Yves Kayser, Dominique Michelat, Alain Rouge et Vincent Palomares. Pour se mettre en conformité avec les directives de l'AERC qui prévoient notamment que les comités européens soient, de préférence, composés de 8 membres, aucun candidat n'a remplacé Dominique Michelat qui a donc cessé ses fonctions en 2005. En 2006, un poste sera vacant. Les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du Secrétaire du CHN avant le 1<sup>er</sup> mai 2006.

## TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CHN

### Révisions de fiches

Des révisions ont été engagées à la demande de la Commission de l'Avifaune Française (CAF), notamment concernant les taxons nouvellement élevés au rang d'espèce (Jiguet & la CAF 2004). C'est ainsi que toutes les données de Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* sont actuellement en cours de révision.

### Puffin yelkouan en Atlantique

L'enquête lancée par le CHN a permis de recueillir des données de cette espèce en Atlantique. Celles-ci ont été examinées, au vu des éléments d'identification les plus récents. Elles paraissent probantes et nous amènent à considérer que le Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan* est bien présent, au moins ponctuellement, sur les côtes atlantiques françaises. Cette opinion doit cependant être nuancée en raison des difficultés inhérentes aux conditions d'observation des oiseaux vus en mer et de l'absence d'une preuve absolue, telle qu'une reprise d'oiseau bague. Le CHN ne souhaite pas engager de processus d'homologation des Puffins yelkouans vus en Atlantique, pour une espèce commune sur les côtes méridionales de notre pays. Une note sur ce sujet sera publiée prochainement dans *Ornithos*.

## Fiches d'homologation

**Délai d'envoi des fiches.** Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (modèle à demander éventuellement au secrétariat du CHN ou à télécharger sur le site du CHN <http://www.lpo.fr/homologation>) dès que possible après l'observation – que vous soyez le découvreur ou simple observateur – et cela avant le 31 décembre de l'année en cours. Cela évite la publication très tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s).

**Fiche et photos.** Il est également important de souligner une nouvelle fois qu'en dépit du développement rapide de la digiscopie et des nombreuses images d'oiseaux occasionnels qu'elle génère, rien ne peut remplacer une bonne description écrite. Les films et les photographies, numériques ou non, les enrichissent réellement et s'avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Le CHN conseille donc aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, fondées seulement sur une ou même plusieurs images, aussi bonnes soient-elles.

**Prise en compte des données.** Rappelons enfin que dans un souci de validation homogène des données, seules celles présentées à un comité d'homologation national sont prises en compte pour la publication de synthèses nationales et européennes concernant une espèce.

## LES FAITS MARQUANTS

En 2004, deux espèces ont été ajoutées à la Liste des oiseaux de France : la Sterne royale *Sterna maxima* et le Gobemouche à demi-collier *Ficedula semitorquata*, ainsi que deux sous-espèces : la Fauvette passerinette « orientale » *Sylvia cantillans albistriata* et le Pouillot à pattes sombres *Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus* ; le Vautour de Rüppell *Gyps rueppellii* enregistre également sa première mention française, mais inscrite en catégorie D. La Pie-grièche brune *Lanius cristatus* fournit sa deuxième mention, le Gravelot mongol *Charadrius mongolus* et la Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* leur quatrième.

Année exceptionnelle pour les grands aigles en France avec, en plus des traditionnels Aigles criards *Aquila clanga*, le troisième Aigle des steppes *A. nipalensis*, le huitième Aigle impérial *A. heliaca* et le septième Aigle ibérique *A. adalberti* français, en même temps que la première nidification de l'Aigle pomarin *A. pomarina*.



1. Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, adulte (à gauche) avec une Bernache cravant à ventre sombre *B. b. bernicla*, Réville, Manche, janvier 2005 (Alain Verneau).  
Adult Black Brant (left) with Dark-bellied Brent Goose.

À noter encore que le Busard pâle *Circus macrourus* établit un record avec 11 individus. La Bartramie des champs *Bartramia longicauda* nous gratifie de deux oiseaux la même année (sixième et septième mentions pour la France), alors que l'espèce n'avait pas été observée depuis 12 ans. Quant au Courvite isabelle *Cursorius cursor* (neuvième donnée depuis le début du XX<sup>e</sup> siècle), il n'avait pas été vu en France depuis 14 ans. Retenons enfin le premier hivernage complet de la Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia*.

## LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A & C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants, à l'exclusion de l'année 2004, les deux suivants les données homologuées depuis 1981 (2004 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 2004.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche<sup>1</sup> et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique) ; la mention « *et al.* » indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question.
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de Voous (1978, *The List of the Birds of the Western Palearctic*), modifiée par la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2003) et par l'AERC TAC (Jiguet & la CAF 2004).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 2004. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Bécasseau falcinelle – un individu à Gruissan, Aude, du 26 avril au 5 mai (R. Baeta, N. Issa & A. Liger, *in* Frémont *et al.* 2006).

### OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (145/1038) (48/199 – 4/16)

**Gironde** – Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, 4 décembre (J. Gernigon).

**Nord** – Le Clipon/Loon-Plage, 13 ind., 14 mars (B. Paepegaey *et al.*).

**Sarthe** – Champfleury/Fillé-sur-Sarthe, phot., 16 février (P.-V. Vandenweghe *et al.*).

**Vendée** – St-Denis-du-Payré, 1<sup>er</sup> hiver, du 8 au 16 novembre (P. Trotignon *et al.*).

**2003 Morbihan** – Séné, 5 décembre (N. Issa).

**2003 Somme** – Marquenterre/St-Quentin-en-Tourmont, ad., du 25 déc. au 22 février 2004 (A. Mathurin *et al.*).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Le groupe du Clipon volait vers le nord ; c'est le deuxième vu sur le site, après un vol de 26 individus le 16 novembre 2002.

### BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (76/40) (76/40 – 5/3)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *nigricans*, appelée « Bernache du Pacifique »

**Côtes-d'Armor** – Le Légué/St-Brieuc, ad., 6 janvier (J.-L. Reuzé).

**Manche** – Vains, 2 ad., vidéo, du 5 au 18 février (S. Provost, M. Zucca *et al.*) ; Réville & St-Vaast-la-Hougue, ad., phot., du 4 décembre au 16 janvier 2005 (A. Verneau *et al.*).

**Seine-Maritime** – Gonfreville-l'Orcher, ad., phot. 25 mars (E. Grossin, P. Provost).

**Vendée** – St-Vincent-sur-Jard, 2 ad., 19 novembre (C. Lartigau *et al.*).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Seuls les oiseaux des Côtes-d'Armor, de Seine-Maritime et un des deux de Vendée ont été considérés comme de nouveaux arrivants. Reçus tardivement, des données des pertuis charentais figureront dans le prochain rapport.

<sup>1</sup> Pour des raisons pratiques, ne figurent désormais que le nom du ou des observateur(s) ayant rédigé une fiche d'homologation ou fourni des images, constituant les archives du CHN. Quelques données publiées dans des revues ou sur Internet peuvent être ponctuellement prises en compte et examinées par le CHN ; la référence bibliographique ou l'adresse URL de ces données est alors indiquée en lieu et place du nom des observateurs.



2. Canard à front blanc *Anas americana*, mâle et Canard siffleur *Anas penelope* femelle, baie de Goulven, Finistère, février 2005 (Vincent Palomares). Male American Wigeon with female Wigeon.



3. Canard noir *Anas rubripes*, mâle adulte, marais du Kun, île d'Ouessant, Finistère, mai 2004 (Aurélien Audevard). Adult male Black Duck.

**CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (41/41) (38/38 – 2/1)**

**Finistère** – Baie de Goulven/Plounéour-Trez & Anse de Kernic/Plouescat, mâle ad., phot. du 14 septembre au 28 février 2005 (F. Barrault, P.J. Dubois, Y. Le Corre, V. Palomares) ; anse de Tresseny/Guissény, mâle ad., phot., du 27 décembre au 1<sup>er</sup> mars 2005 (P.J. Dubois, X. Rozec).


(Amérique du Nord). L'oiseau de Guissény est à priori un nouvel arrivant.

**SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (42/34) (41/33 – 4/1)**

**Charente-Maritime** – Cabane de Moins/Breuil-Magné, mâle ad., phot., du 26 mars au 7 avril (P. Jourde *et al.*).

**Finistère** – Baie de Goulven, mâle ad., phot., du 3 décembre au 1<sup>er</sup> mars 2005 (F. Barrault, P.J. Dubois, E. de Kergariou, L. Thebault, R. Uguen).

**Vendée** – St-Denis-du-Payré, mâle ad., du 18 au 23 février (P. Trotignon *et al.*), mâle ad., phot., du 22 novembre au 26 février 2005 (P. Trotignon, T. Perrier *et al.*).



4. Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis*, mâle, Cabane de Moins, Breuil-Magné, Charente-Maritime, mars 2004 (Philippe Jourde). Male Green-winged Teal.



(Amérique du Nord). Un mâle était déjà présent du 3 au 25 avril 2003 à Breuil-Magné, ce qui fait penser qu'il s'agit du même individu. En janvier 2005, un mâle adulte, différent de l'habitué de St-Denis-du-Payré, était présent en baie de l'Aiguillon, mais aucune fiche ne nous est encore parvenue pour cet oiseau.

**CANARD NOIR *Anas rubripes* (4/4) (2/2 – 1/1)**

**Finistère** – Île d'Ouessant : Kun & Aod Meur, mâle ad., phot., du 5 au 28 mai (A. Audevard).

**1998 Vendée** – La Tranche-sur-Mer, mâle ad., 25 juillet (A. Thomas).

(Amérique du Nord). L'oiseau d'Ouessant est arrivé en même temps qu'un Bécasseau tacheté ce qui plaide en faveur de son origine sauvage.

**SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors* (53/57) (43/47 – 2/1)**

**Loire-Atlantique** – Lac de Grand-Lieu : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, mâle 1<sup>er</sup> hiver, 16 octobre (S. Reeber).

**Vendée** – St-Urbain, fem. ad., 28 avril (W. Raitière).

(Amérique du Nord). L'arrivée de l'oiseau de Grand-Lieu s'est faite à l'occasion de passages perturbés successifs, qui ont également amené des milliers de canards, quelques oies et près de 80 Sternes arctiques sur ce site. Quant à la femelle de Vendée, elle était, comme les années précédentes, appariée à un Canard souchet mâle.

**SARCELLE MARBRÉE *Marmaronetta angustirostris* (31/68) (12/12 – 2/2)**

**Aisne** – Thénelles, 15 octobre (C. Rousseau).

**Vendée** – La Faute-sur-Mer, juv., 8 août (A. Thomas, P. Trotignon, F. Varenne)

(Méditerranée, Moyen-Orient, Inde du Nord). Le juvénile de Vendée a été observé en pleine période de dispersion de l'espèce, tout comme 8 des 12 mentions connues depuis la création du CHN, ce qui laisse supposer qu'une part non négligeable des oiseaux vus en France pourrait avoir une origine naturelle.

**FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (136/115) (128/107 – 4/4)**

**Ariège** – Saverdun, mâle ad., phot. du 7 décembre au 2 janvier 2005 (J.-F. Bousquet, O. Endtz).

**Charente-Maritime** – Moëze-Oléron, fem., phot., du 28 au 30 avril (P. Jourde *et al.*).

**Cher** – Précy, mâle ad., phot., du 23 au 28 février (P. Derrien *et al.*).

**Pyrénées-Orientales** – St-Cyprien, fem., phot., du 10 au 28 janvier au moins (J. Gonin *et al.*) puis Toreilles, phot., du 5 au 8 avril (C. Peignot *et al.*).

(Amérique du Nord). Comparée aux quatre dernières années où le nombre annuel d'observations était compris entre 10 et 18 (pour 5 à 20 individus), 2004 accuse une nette diminution. Ce très faible nombre de données peut s'expliquer par une diminution réelle de l'espèce en France – comme en témoigne l'absence d'oiseaux dans le Finistère et au lac de Grand-Lieu – et/ou peut-être par un certain désintérêt des observateurs pour cette espèce devenue moins rare. L'avenir nous le dira...

5. Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, femelle (à droite) et Sarcelle d'hiver *Anas crecca* mâle, Moëze-Oléron, Charente-Maritime, avril 2004 (Philippe Jourde). *Female Ring-necked Duck (right) with male Common Teal.*



### FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (12/7) (12/7 – 1/1)

**Vendée** – St-Denis-du-Payré, mâle ad., phot., du 1<sup>er</sup> au 14 avril (P.-P. Evrard, P. Trotignon *et al.*).

(Amérique du Nord). Bien qu'étant quasi annuel depuis 1999 (seule 2002 n'a pas fourni de données), ce canard demeure très rare en France, avec en général un seul oiseau par an. L'année 2001 détient le record avec deux individus, une femelle immature au lac de Grand-Lieu et un mâle adulte sur le Rhin dans sa partie franco-germano-suisse. Notons que ce dernier oiseau a été revu sur la partie helvétique du site au cours des hivers suivants, excepté en 2002-2003.

### MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (49/51) (28/30 – 1/1)

**Vendée** – La Terrière/La Tranche-sur-Mer, mâle imm., du 20 décembre au 15 janvier 2005 (A. Thomas *et al.*) (Amérique du Nord). Site classique pour l'espèce en France, où plusieurs autres oiseaux (2 mâles et 4 femelles) seront observés au cours du même hiver (V. prochain rapport du CHN).

### ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* (435/1316) (427/1307 – 22/162)

**Ain** – Bouligneux, mâle ad., tiré, phot., du 7 au 9 mai (A. Bernard, P. & J.-B.<sup>†</sup> Crouzier, P. Varagnat).

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : St-Serein, mâle, 17 janvier (*vide* Y. Kayser) ; Arles, mâle ad., 21 juillet (W.J.M. Scheres).

**Jura** – Champrougier, mâle 1<sup>er</sup> hiver, du 30 octobre au 1<sup>er</sup> novembre (M. Giroud *et al.*).

**Loire-Atlantique** – Lac de Grand-Lieu : fin d'hivernage, 59 mâles & 93 fem./imm., 19 janvier, 80 mâles & 64 fem./imm., 27 janvier, 81 mâles & 79 fem./imm., 16 février, 98 mâles & 90 fem./imm., 24 février (S. Reeber), 99 ind., 28 février (A. Le Nevé) ; nidification et estivage, 39 mâles ad. & 19 fem. dont 5 couples reproducteurs observés avec 24 poussins au total (S. Reeber) ; hivernage, 82 ind., 8 décembre, 190 ind., 20 décembre (S. Reeber). Les Moutiers-en-Retz, juv., du 21 au 29 août (J.-Y. Frémont, Y. Trévoux).

**Maine-et-Loire** – Cantenay-Épinard & Angers, mâle adulte, du 14 au 18 janvier (J.-C. Beaudoin *et al.*).

**Mayenne** – Étangs des Coëvrons (nord-est Mayenne : Aron, Jublains, Hambers, Ste-Gemme-le-Robert & Mézangers), 23 couples au moins, de janvier à mars (J.-F. Arcanger), 16 reproductions certaines avec 18 juv. observés, d'avril à août (J.-F. Arcanger, O. Landelle, E. Marouzé), 37 ind. au moins, de septembre à décembre (J.-F. Arcanger) ; étangs du pays de Loiron (ouest de Laval : Launay-Villiers, St-Cyr-le-Gravelais & Olivet), 5 mâles & 7 fem./imm., aucune preuve de reproduction, du 10 juin au 15 décembre (J.-F. Arcanger) ; étang de la Rincerie/Ballots, fem., 25 mai (J.-F. Arcanger) ; étang de Curessy/Bouère, mâle ad., 15 juillet (J.-F. Arcanger).

**Seine-et-Marne** – Jablines, mâle 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 28 décembre au 9 janvier 2005 (H. Pottiau *et al.*).

**Vendée** – Étang des Boucheries/Les Landes-Génusson, 1 couple, 10 juin, 1 mâle, 29 juillet, 2 fem., du 12 au 26 août, 1 fem., du 9 au 16 septembre.

**2002 Saône-et-Loire** – Martigny-le-Comte, 1 mâle 1<sup>er</sup> hiver, 11 novembre (C. Gentilin).

(Amérique du Nord ; naturalisée en Grande-Bretagne). En comparant les effectifs de décembre 2003 (196 ind.) et de décembre 2004 (190 ind.), on note pour la première fois une certaine stabilité au lac de Grand-Lieu ; celle-ci est cohérente avec le rapport entre le nombre d'oiseaux produits (24 jeunes) et tirés (32 individus en début d'année 2004). Ajoutons que sur ce site, l'effectif nicheur est estimé à 10-15 couples, bien que 5 couples seulement aient été observés. En Mayenne, l'espèce continue à prospérer malgré le tir d'environ 50 oiseaux par les services de l'ONCFS. À l'inverse, la campagne d'éradication conduite à l'automne 2001 en Vendée a porté un coup d'arrêt à la progression de l'espèce, qui n'est réapparue qu'en petit nombre depuis sur le site habituel. Rappelons que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, l'espèce n'est plus soumise à homologation nationale ; les données sont désormais centralisées par le Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR).

### PUFFIN SEMBLABLE *Puffinus assimilis* (49/64) (42/57 – 0/0)

**2002 Finistère** – Île d'Ouessant : Kadoran, 5 octobre (M. Roemhild, T. Sacher, I. Weiss), Créac'h puis Kadoran, 2 ind., 6 octobre (M. Roemhild, T. Sacher, I. Weiss).

(La sous-espèce *baroli* niche à Madère, aux Salvages, aux Canaries et aux Açores). Aucune donnée en 2004 et une seule (1 individu) en 2003. Après l'engouement pour l'observation des oiseaux marins à partir des ferries entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, qui a généré un nombre élevé de mentions de Puffins semblables dans les eaux françaises, on revient à une rareté classique de l'espèce dans notre pays.

### FRÉGATE INDÉTERMINÉE *Fregata sp.* (3/3) (3/3 – 0/0)

**1993 Vendée** – La Terrière/La Tranche-sur-Mer, imm., 31 janvier & 26 février (A. Thomas).

(Mers tropicales). Cet oiseau a été vu à chaque fois en compagnie de Fous de Bassan pêchant au large de la plage.



6. Aigrette des récifs *Egretta gularis schistacea*, adulte, Peyriac-de-Mer, Aude, octobre 2004 (Julien Gonin). *Western Reef Egret*.

**AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (36/26) (30/20 – 3/3)**

**Alpes-Maritimes** – St-Laurent-du-Var, sous-espèce *gularis*, forme sombre, 30 mai (T. Destenay *et al.*).

**Aude** – Peyriac-de-Mer, ad., sous-espèce *schistacea*, forme sombre, phot., du 17 octobre au 4 novembre (F. Garcia, J. Gonin *et al.*).

**Charente-Maritime** – Artouan, sous-espèce *gularis*, forme sombre, phot., du 1<sup>er</sup> mai au 13 juin (C. Dolimont *et al.*).  
(Afrique, Asie). Année faste égalant les précédents records de 1988 et 1996, avec de surcroît cette année un individu de la sous-espèce *schistacea*, la plus rare en France.

**ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (67/140) (59/132 – 4/34)**

**Aude** – Leucate, ad., 3 avril (F. Garcia).

**Haute-Garonne** – Toulouse, 27 juin (J.-F. Bousquet).

**Vienne** – Mauprévoir, ad., phot., du 2 décembre au 14 février (R. Bussière).

**Landes & Pyrénées-Atlantiques** – Localités tenues secrètes : 16 couples produisent 30-31 jeunes à l'envol (F. Delage, S. Duchateau, « Groupe Élanion »).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). L'oiseau de Toulouse a été observé survolant les pelouses du campus universitaire... La population du Sud-Ouest continue sa progression numérique.

**VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (25/25) (23/23 – 4/3)**

**Aude** – Massif des Madres/Le Bousquet, ad. (revu le lendemain dans les Pyrénées-Orientales), 11 août (F. Garcia).

**Bouches-du-Rhône** – Calanques de Marseille, phot., 11 mars (E. Barthélémy, F. Hiely).

**Haute-Garonne** – Juzet-d'Izaut, imm., phot., 30 juin (S. Caggegi, C. Marchal).



**Pyrénées-Orientales** – Massif des Madres, ad. (même oiseau que celui de l'Aude), 12 août (C. Peignot, J. Terraube).

**2003 Ardèche** – Gourdon, imm., 20 mars (A. Buhler).

**2003 Drôme** – Col de Rousset, ad., 25 juillet (A. Mathurin, V. Pelle-Reimers).

**2002 Isère** – Chichilianne, ad., 14 septembre (M. Fonters).

(De l'Espagne à la Chine). Rappelons que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, l'espèce n'est plus soumise à homologation nationale.

Z. Vautour moine *Aegypius monachus*, immature (à droite) et curée de Vautours fauves *Gyps fulvus*, Juzet-d'Izaut, Haute-Garonne, juin 2004 (Cédric Marchal).  
*Monk Vulture (right) with Griffon Vulture.*

### **BUSARD PÂLE** *Circus macrourus* (66/65) (47/46 – 11/11)

**Aude** – Leucate, mâle ad., 2 avril (J. Gonin).

**Bouches-du-Rhône** – Le Vigieirat/Mas Thibert, mâle ad., 18 mars (R. Jamault) ; Camargue : étang du Tampan, mâle ad., 11 avril (Y. Kayser).

**Charente-Maritime** – Île de Ré : St-Clément-des-Baleines, mâle ad., 17 septembre (N. Gendre, R. Perin).

**Doubs** – Houtaud, mâle 2<sup>e</sup> année, 26 & 27 septembre (D. Michelat *et al.*).

**Drôme** – Col du Colombier/Montjoyer, mâle ad., 10 mars (G. Olios).

**Gard** – Bellegarde & Fourques, mâle 3<sup>e</sup> année (2<sup>e</sup> été), 23 septembre (J. Fouert-Pouret).

**Hérault** – Vendémian, mâle ad., 2 avril (M. Duquet).

**Lozère** – Hures-la-Parade, mâle imm., 3 avril (F. Legendre).

**Meuse** – Velosnes, mâle 3<sup>e</sup> année (2<sup>e</sup> été), phot., 2 septembre (R. Dujardin, P. Lorgé *et al.*).

**Vaucluse** – Mondragon, mâle ad., 31 mars (S. Corre).

(Asie centrale, à l'ouest jusqu'en Roumanie). Nouveau record (11 oiseaux) qui pulvérise le précédent (6 individus en 2002). En dehors des quatre données de septembre, assez classiques par les lieux et dates, l'année 2004 se singularise par un véritable afflux printanier de l'espèce dans le Sud-Est, autour de la fin mars et du début d'avril ; à noter que ces données se rapportent presque toutes à des mâles adultes (un seul sub-adulte).

### **BUSE VARIABLE** *Buteo buteo* (26/26) (23/23 – 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse de Russie ».

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : étang Redon, ad., 18 mars (C. Bouffet, Y. Kayser).

**Vendée** – Angles, imm., 30 janvier (A. Thomas).

**1985 Haute-Vienne** – Verneuil-sur-Vienne, ad., mort le 6 mai en centre de soins, naturalisé et conservé au MNHN sous la référence CG 1987 n°1252, phot. (*vide* F. Jiguet). (Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*).

### **BUSE FÉROCE** *Buteo rufinus* (22/18) (18/14 – 3/3)

**Ain** – Pressiat, ad., 14 mars (P. Crouzier).

**Doubs** – Bouverans, 25 mars (L. & C. Mader).

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, juv., sous-espèce *cirtensis*, 1<sup>er</sup> septembre (A. Le Nevé).

**2002 Meurthe-et-Moselle** – Environs de Pont-à-Mousson, 1<sup>er</sup> hiver, sous-espèce *cirtensis*, mâle probable, apporté le 16 novembre au centre de soins luxembourgeois d'Arlon, phot., relâché le 14 décembre à Torgny, Luxembourg (*vide* M. Ameels, R. Dujardin, L. Raty).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Ces deux nouvelles données de *cirtensis* confirment l'importation illégale de l'espèce en France à partir de l'Afrique du Nord, phénomène évoqué dans le précédent rapport du CHN (V. *Ornithos* 12-1 : 11). Les deux observations printanières dans l'Est pourraient



quant à elles se rapporter à des oiseaux retournant vers l'Europe orientale ; toutefois, les descriptions fournies pour ces individus ne permettent pas de préciser la sous-espèce et donc de vérifier cette hypothèse. Signalons en outre que l'oiseau de Meurthe-et-Moselle, pris pour une Buse de Russie, a été réidentifié comme Buse féroce par le CHN, démontrant ainsi que la distinction entre *B. b. vulpinus* et *B. r. cirtensis* est, comme on ne le sait pas forcément, loin d'être évidente ; un article d'identification à paraître prochainement dans *Ornithos* traitera de ce sujet.

#### **BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (354/378) (285/305 – 6/6)**

**Haute-Marne** – Orcevaux, mâle ad., 17 mars (B. Théveny).

**Nièvre** – Saincaize-Meauce, fem. ad., 9 novembre (S. Coquery).

**Nord** – Wahrem, imm., du 11 au 14 février (P. Crouzier, F. Gabillard *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Fouquières-lès-Béthune, 24 octobre (T. Cheyzezy, F. Soty).

**Seine-et-Marne** – Villebéon, juv., 19 novembre (O. Sousbie).

**Vendée** – Champagné-les-Marais, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 18 décembre au 5 février 2005 (P.-P. Evrard, F. Portier, A. Thomas *et al.*).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Année légèrement en-dessous de la moyenne, qui se situe entre 7 et 8 oiseaux par hiver (en dehors d'afflux exceptionnels). Hormis celui de Vendée, les autres individus ont visité des régions « classiques » pour l'espèce.

#### **AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (49/43) (45/39 – 2/2)**

**Côte-d'Or** – localité tenue secrète, mâle ad., du 10 avril au 12 juin (J.-L. Dessolin).

**Franche-Comté** – localité tenue secrète, 1 couple nicheur, phot., du 21 avril au 16 septembre (D. Michelat, D. Pépin *et al.*).

**2003 Côte-d'Or** – localité tenue secrète, mâle ad., du 16 mai au 23 juillet (O. Bardet, J.-L. Dessolin).

**2002 Côte-d'Or** – localité tenue secrète, mâle ad., 2 mai (S. Bouget, J.-L. Dessolin).

**2001 Côte-d'Or** – localité tenue secrète, mâle ad., du 8 mai au 10 juin (G. Boisson).

**2000 Côte-d'Or** – localité tenue secrète, mâle ad., du 30 avril au 15 août (G. Boisson, J.-L. Dessolin).

**1999 Côte-d'Or** – localité tenue secrète, mâle ad., du 17 avril au 24 mai (G. Boisson, J.-L. Dessolin *et al.*).

**1998 Côte-d'Or** – localité tenue secrète, mâle ad., phot., du 29 mars au 21 juillet (G. Boisson, J.-L. Dessolin, L. Strenna *et al.*).

**1997 Côte-d'Or** – localité tenue secrète, mâle ad. probable, du 6 au 20 juillet (G. Boisson).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Le couple franc-comtois s'est reproduit, mais le poussin a succombé aux intempéries (Michelat 2005). Quant à l'oiseau bourguignon, il reste solitaire en dépit de parades intensives.

8. Buse pattue *Buteo lagopus*, 1<sup>er</sup> hiver, Champagné-les-Marais, Vendée, décembre 2004 (Frédéric Portier). *Rough-legged Buzzard*.



9. Aigle pomarin *Aquila pomarina*, mâle, Franche-Comté, août 2004 (Dominique Michelat). *Male Lesser Spotted Eagle*.





▲ 11. Aigle criard *Aquila clanga*, adulte et Buse variable *Buteo buteo*, Lapeyrouse, Ain, mars 2004 (Pierre Crouzier).  
Adult Greater Spotted Eagle with Common Buzzard.

◄ 10. Aigle criard *Aquila clanga*, 1<sup>er</sup> hiver, Grand Romieu, Camargue, Bouches-du-Rhône, novembre 2004 (Frédéric Veyrunes). 1st-winter Greater Spotted Eagle.

#### AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (203/155) (154/102 – 7/5)

**Ain** – Lapeyrouse & St-Marcel-en-Dombes, ad., phot., du 15 février au 7 mars (A. Bernard, P. Crouzier *et al.*) ; Lapeyrouse, St-Marcel-en-Dombes & Birieux, ad. (le même que précédemment), phot., du 13 novembre au 30 décembre (P. Crouzier, Y. Kayser).

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Grand Romieu, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 26 nov. au 9 janvier 2005 (V. Palomares *et al.*).

**Creuse** – Étang des Landes/Lussat, 1<sup>er</sup> hiver, phot. (V. *Ornithos* 12-1 : 55), du 1<sup>er</sup> décembre au 27 janvier 2005 (J.-C. Sautour, A. Virondeau, S. Vrignaud *et al.*).

**Landes** – Saint-Martin-de-Seignanx, ad., phot., du 15 au 19 décembre au moins (*per* <http://david.genoud.free.fr>).

**Loir-et-Cher** – Marcilly-en-Gault, imm., 6 mars (M. Mabilieu).

**Loire-Atlantique** – Lac de Grand-Lieu/St-Lumine-de-Coutais, 2<sup>e</sup> année (1<sup>er</sup> été), du 7 au 10 mars (S. Dulau, S. Reeber).

**2003 Bouches-du-Rhône** – Camargue : Tour-du-Valat, ad., phot., du 27 octobre au 15 février 2004 (M. Gauthier-Clerc, A. Pataud, C. Pin, N. Valet *et al.*) et non jusqu'au 30 janvier 2004 uniquement (*Ornithos* 12-1 : 12).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Une fois n'est pas coutume, la Creuse, le Loir-et-Cher et le lac de Grand-Lieu sont visités par l'espèce. Les autres localités sont plus traditionnelles.

#### AIGLE DES STEPPES *Aquila nipalensis* (2/2) (1/1 – 1/1)

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Tagès & Fiérouse, 3<sup>e</sup> hiver, du 6 décembre au 31 janvier 2005 (D. Clément, F. Garcia, Y. Kayser *et al.*).

(De l'Ukraine à l'Asie centrale). Troisième mention française après celles d'un individu capturé à Plouaret, Côtes-d'Armor, début mai 1960 et d'un immature observé à Rémuzat, Drôme, le 23 mai 2001. Cette donnée fournit en outre le premier cas d'hivernage de l'espèce en France.

#### AIGLE IMPÉRIAL *Aquila heliaca* (8/8) (6/6 – 0/0)

**2003 Bouches-du-Rhône** – Camargue : Château Brunet, Tagès, Amphise et Salin du Caban, 2<sup>e</sup> année, du 5 décembre au 23 janvier 2004 (Y. Kayser *et al.*).

(Balkans, Turquie jusqu'en Asie centrale, Mongolie). Huitième donnée française, la quatrième depuis la création du CHN ; la plupart sont de Camargue.

**AIGLE IBÉRIQUE** *Aquila adalberti* (8/7) (4/3 – 1/1)  
**Pyrénées-Atlantiques** – Bielle, 2<sup>e</sup> année (1<sup>er</sup> été), phot.,  
 5 juin (S. Duchateau)

(Péninsule Ibérique). Bravo à cet observateur qui découvre là son deuxième Aigle ibérique en France ! Quatre données au moins pour le XIX<sup>e</sup> siècle ; la première pour le XX<sup>e</sup> siècle provient de Camargue, en janvier 1999. Les deux autres mentions récentes sont de septembre 2001 dans les Hautes-Pyrénées et de septembre 2002 dans les Pyrénées-Atlantiques. Les quatre oiseaux vus depuis 1999 sont tous des oiseaux de moins d'un an.

12. Aigle ibérique *Aquila adalberti*, 2<sup>e</sup> année, Bielle, Pyrénées-Atlantiques, juin 2004 (Stéphane Duchateau). 2nd calendar-year Spanish Imperial Eagle.



**FAUCON CRÉCERELLETTE** *Falco naumanni* (86/231) (62/201 – 6/25)

En dehors des sites de nidification de la Crau, de l'Hérault et de l'Aude.

**Aude** – Bages, mâle ad., 31 mars (F. Garcia).

**Bouches-du-Rhône** – Cuges-les-Pins, au moins 11 ind. différents, du 11 avril au 25 mai (E. Barthélémy, G. Viricel *et al.*) ; Camargue : Piémanson, mâle 1<sup>er</sup> été, 26 avril (Y. Kayser *et al.*) ; Aix-en-Provence, jusqu'à 8 imm. entre le 27 mai et le 18 juin (A. Flitti *et al.*).

**Haute-Corse** – Barcaggio/Ersa, 3 imm. (1 mâle & 2 fem.), du 16 au 23 avril au moins (S. Provost).

**Finistère** – Île d'Ouessant : Créac'h, mâle ad., 7 mai (A. Audevard).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, sud-est de la France). Compte tenu des dates d'observation, les oiseaux d'Aix-en-Provence pourraient être ceux de Cuges-les-Pins, mais en l'absence de certitude, ils ont été comptabilisés comme de nouveaux arrivants. La mention ouessantine est remarquable. Les données de reproduction seront publiées en 2006 dans le rapport « Oiseaux nicheurs rares et menacés ».

**FAUCON D'ÉLÉONORE** *Falco eleonora* (337/441) (298/395 – 4/4)

En dehors du littoral méditerranéen.

**Charente-Maritime** – Bonne-Anse, mâle ad., forme claire, 31 octobre (P. Jourde).

**Hautes-Pyrénées** – Bagnères-de-Bigorre, ad., forme sombre, 9 octobre (C. & D. Raguét).

**Vaucluse** – Cheval-Blanc, ad., forme claire, 6 juin (S. Durand, A. Flitti) ; Avignon, imm., récupéré blessé, mort par la suite, phot., 9 août (*vide* A. Flitti, S. Uriot).

**2003 Seine-et-Marne** – St-Germain-Laval, ad., forme claire, 23 août (J.-P. Sibley).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Rappelons que depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005, l'espèce n'est plus soumise à homologation dans les départements présentant une façade sur la Méditerranée ; elle le demeure sur le reste du territoire national.

**FAUCON LANIER** *Falco biarmicus* (42/41) (35/34 – 4/4)

**Bouches-du-Rhône** – St-Martin-de-Crau, imm., phot., 18 février (G. Paulus) ; mâle ad., sous-espèce *erlangeri*, phot., 19 février (G. Paulus).

**Vendée** – Île de Noirmoutier : Noirmoutier-en-l'Île, ad., sous-espèce *erlangeri*, phot., 21 octobre (A. Mousseau, M. Vaslin) ; St-Denis-du-Payré, 1<sup>er</sup> hiver, 2 décembre (P. Trotignon).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). Année plutôt bonne avec 4 données.

**MARQUETTE POUSSIN** *Porzana parva* (258/303) (208/242 – 2/2)

**Aude** – Leucate, fem. ad., 10 octobre (F. Garcia).

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Piémanson, mâle, 11 avril (Y. Kayser).

(Europe, Asie centrale). Il faut remonter à 1991 pour trouver une plus mauvaise année ! On est très en dessous de la moyenne annuelle de 10 oiseaux, calculée depuis la création du CHN. De même, aucune donnée de Marouette de Baillon *P. pusilla* !



13. Talève sultane  
*Porphyrio porphyrio*,  
immature, Canet, Pyrénées-  
Orientales, août 2004  
(Thierry Tancrez).  
*Immature Purple Gallinule.*

**TALÈVE SULTANE** *Porphyrio porphyrio* (77/143) (46/110 – 3/8)

**Aude** – Marais de St-Louis/Narbonne, 3-5 couples nicheurs (D. Clément, J. Gonin).

**Gard** – Scamandre/Vauvert, 7 ind. au moins, du 18 mars au 2 mai (L. Demongin *et al.*).

**Hérault** – Étang du Bagnas/Agde, ad., 30 janvier (F. Valles).

**2003 Bouches-du-Rhône** – Camargue : La Capelière, jusqu'à 2 ind. (1 ad. & 1 imm.), du 20 décembre au 22 février 2004 (C. Bouffet, Y. Kayser *et al.*).

(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). La présence d'un certain nombre d'oiseaux se confirme en Camargue (Gard et Bouches-du-Rhône). À l'étang du Bagnas, l'espèce avait déjà été observée en 2001 mais n'avait pas été revue depuis, en dépit du suivi dont bénéficie ce site. Quant aux populations nicheuses de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (17 individus en juillet 2004 à l'étang de Canet ; Y. Aleman, comm. pers.), elles sont stables.

**COURVITE ISABELLE** *Cursorius cursor* (24/24) (4/4 – 1/1)

**Bouches-du-Rhône** – St-Martin-de-Crau, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 11 au 19 septembre au moins (P., M. & J.-B.† Cruzier, P. Defos du Rau, F. Dhermain, A. Flitti, J. Gonin, Y. Kayser, M. Thibault *et al.*).

(Afrique, Asie du Sud-Ouest). Il s'agit de la neuvième donnée depuis le début du xx<sup>e</sup> siècle. De très nombreux ornithos se sont déplacés pour voir cette espèce qui n'avait pas été observée en France depuis 1990, année qui avait fourni deux mentions ! Depuis la création du CHN, les données collectées sont les suivantes : 1 adulte du 22 au 26 septembre 1981 à Tréogat, Finistère ; 1 individu le 3 avril 1989 en Crau, Bouches-du-Rhône ; 1 adulte le 1<sup>er</sup> septembre 1990 à Châtel-le-Neuvre, Allier ; 1 individu le 10 octobre 1990 à La Flèche, Sarthe. À noter que la plupart des données sont de septembre et d'octobre, et que l'espèce avait déjà été vue en Crau.

**GRAVELOT MONGOL** *Charadrius mongolus* (3/3) (3/3 – 1/1)

**Charente-Maritime** – Baie de l'Aiguillon : Charron, ad., phot., 11 mai (F. Mercier).

(Asie centrale, jusqu'en Extrême-Orient). Quatrième donnée française, la seconde pour la baie de l'Aiguillon, où la première mention avait été obtenue sur la partie vendéenne, juste de l'autre côté de la baie.

**PLUVIER BRONZÉ** *Pluvialis dominica* (31/33) (29/31 – 2/2)

**Loire-Atlantique** – Lac de Grand-Lieu : St-Philbert-de-Grand-Lieu, juv., 22 & 23 septembre (S. Reeber).

**Somme** – Marquenterre/St-Quentin-en-Tourmont, ad., phot., 3 octobre (P.J. Dubois, E. Rousseau *et al.*)

(Amérique du Nord). Retour à une année classique après les six oiseaux de 2003.



**VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (70/69) (62/61 – 3/3)**

**Cher** – Bengy-sur-Craon, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 13 novembre (J.-M. Chartendrault, A. Liger).

**Eure-et-Loir** – Cloyes-sur-le-Loir, 1<sup>er</sup> hiver, 31 octobre (J. Présent).

**Indre** – Mézières-en-Brenne, ad., phot., du 22 mai au 6 juillet au moins (P.J. Dubois, C. Kérihuel, J. Présent, A. Virondeau *et al.*).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Année se situant parfaitement dans la moyenne nationale (calculée depuis 1981). L'Indre fournit la première mention d'estivage française.

**BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (16/16) (15/15 – 1/1)**

**Vendée** – Le Fenouiller, ad., phot., du 18 au 21 septembre (G. Besseau, M. Vaslin).

(Amérique du Nord). Le dernier jour d'observation, la petite troupe de limicoles dans laquelle se trouvait cet oiseau a subi l'attaque d'un Faucon hobereau *Falco subbuteo*. Le Bécasseau semipalmé volait à l'arrière du groupe et le faucon est reparti avec un bécasseau dans les serres ! On peut donc craindre le pire pour cet oiseau, non revu les jours suivants...

**BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (31/32) (27/28 – 3/3)**

**Ain** – St-Germain-sur-Renom, ad., phot., du 1<sup>er</sup> au 3 juillet (P. Crouzier *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Les Escardines/Oye-Plage, ad., phot., 11 & 12 août (E. Dansette, G. Flohart, J.-A. Leclercq *et al.*).

**Vendée** – Île de Noirmoutier : Müllembourg/Noirmoutier-en-l'Île, ad., 1<sup>er</sup> septembre, (M. Vaslin).

**1989 Finistère** – Le Curnic/Guissény, juv., phot., 11 novembre (A. Binvel).

(Amérique du Nord). La donnée de l'Ain est remarquable par la localité, la date et le fait qu'il s'agissait d'un adulte en plumage nuptial ! Les autres mentions sont classiques, y compris celle de 1989.

**BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (32/32) (28/28 – 3/3)**

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Rascaillan, ad., du 13 au 15 mai (Y. Kayser *et al.*).

**Finistère** – Île de Sein : Le Corrijou, juv., phot., du 13 au 16 septembre (A. Audevard) ; Île d'Ouessant : Porz Doun, juv., phot., 17 septembre (A. Chabrolle, F. Bouzendorf *et al.*).

**1986 Finistère** – Le Curnic/Guissény, juv., phot., 13 octobre (A. Binvel).

(Amérique du Nord). L'oiseau camarguais, le seul trouvé au printemps, a été vu par de nombreux observateurs. À noter les arrivées concomitantes sur Sein et Ouessant.

14. Vanneau sociable *Vanellus gregarius*, adulte, Mézières-en-Brenne, Indre, juillet 2004 (Christian Kérihuel). *Sociable Lapwing*.



15. Courvite isabelle *Cursorius cursor*, Crau, Bouches-du-Rhône, septembre 2004 (Julien Gonin). *1st-winter Cream-coloured Courser*.



16. Bécasseau de Baird  
*Calidris bairdii*, juvénile,  
Sein, Finistère, septembre  
2004 (Aurélien Audevard).  
*Juvenile Baird's Sandpiper.*



17. Bécasseau semipalmé  
*Calidris pusilla*, adulte,  
Le Fenouiller, Vendée,  
septembre 2004  
(Matthieu Vaslin).  
*Adult Semipalmated Sandpiper.*



**18.** Bécasseau tacheté  
*Calidris melanotos*, adulte,  
Ouessant, Finistère, mai  
2004 (Aurélien Audevard).  
*Adult Pectoral Sandpiper.*



**19.** Bécasseau tacheté  
*Calidris melanotos*, juvénile,  
Ouessant, Finistère,  
septembre 2004  
(Aurélien Audevard).  
*Juvenile Pectoral Sandpiper.*

**BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (324/368) (263/292 – 17/18)**

**Ain** – Le Plantay, ad., 3 mai (P. Crouzier *et al.*).

**Charente-Maritime** – Île d'Oléron : La Cotinière/St-Pierre-d'Oléron, juv., 14 septembre (P. Jourde).

**Finistère** – Île d'Ouessant : Créac'h, ad., phot., du 5 au 9 mai (A. Audevard) ; Créac'h, juv., 20 septembre (A. Audevard), juv., phot., du 22 au 24 septembre (A. Audevard) ; baie de Goulven/Tréfléz, juv., phot., 17 septembre (F. Barrault) ; Le Conquet, juv., phot., 22 septembre (S. Houpert).

**Loire-Atlantique** – Lac de Grand-Lieu/St-Mars-de-Coutais, ad., du 5 au 10 mai (S. Reeber *et al.*) ; lac de Grand-Lieu/St-Philbert-de-Grand-Lieu, juv., phot., du 19 au 26 septembre (S. Reeber).

**Loiret** – St-Denis-en-Val, phot., du 7 au 15 avril (S. Branchereau, B. Delahaie *et al.*).

**Moselle** – Étang de Lindre/Tarquimpol, juv., 25 septembre (M. Hirtz *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Pont-d'Ardres, phot., du 30 avril au 2 mai (H. Verne).

**Vendée** – St-Denis-du-Payré, juv., du 4 au 14 août (P. Trotignon *et al.*) ; lagune de la Belle-Henriette : les Indochinois/La Tranche-sur-Mer, juv., du 27 au 29 août (A. Thomas *et al.*), la Chenolette/La Faute-sur-Mer, juv., du 6 au 9 septembre (A. Thomas *et al.*) ; Champclou/Olonne-sur-Mer, phot., 12 septembre (A. Barzic, D. Desmots *et al.*) ; Beauvoir-sur-Mer, 2 juv., phot., du 16 au 18 septembre (M. Vaslin *et al.*).

(Amérique du Nord, Sibérie). Effectif conforme à la moyenne des années récentes (de 14 à 27 oiseaux par an entre 1998 et 2003, soit une moyenne annuelle de 19 individus), qui se situent à un palier sensiblement supérieur à la période précédente (en moyenne 10 oiseaux de 1981 à 1997). Le juvénile du 20 septembre au Créac'h était en compagnie de deux Bécasseaux roussets ! C'est un autre individu qui était découvert sur le site deux jours plus tard. Au printemps, à noter que l'oiseau de Grand-Lieu a été trouvé le même jour que l'adulte d'Ouessant.

**BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (159/217) (125/167 – 7/14)**

**Ain** – St-Germain-sur-Renom, ad., 28 & 29 mai (A. Bernard, P. Crouzier *et al.*) ; Le Plantay, ad., 31 mai (P. Crouzier).

**Aude** – Gruissan, du 26 avril au 5 mai (R. Baeta, N. Issa, A. Liger).

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Galabert, 6 ad., 13 & 14 mai (Y. Kayser *et al.*), encore 3 ad., 16 mai (V. Palomares), Fangassier, 3 ad., 9 août (J.-L. Rezé).

**Charente-Maritime** – Baie de l'Aiguillon : Charron, ad., 14 mai (A. Thomas, P. Trotignon).

**Vendée** – Île de Noirmoutier : Le Luzan/Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 20 mai (D. Desmots *et al.*).

**2002 Saône-et-Loire** – Lac de la Sorme/Blanzay, juv. 31 août (C. Gentilin).

(Europe septentrionale). Année similaire à 2003 par le nombre de données et d'individus, l'effectif record étant toujours détenu par 1989 avec 23 oiseaux. L'observation de deux Bécasseaux falcinelles différents (ce que confirment les descriptions) en Dombes est tout à fait remarquable. De même, les groupes de 6 et 3 adultes vus en Camargue sont à relever. Quant à l'oiseau de Charente-Maritime, il a été trouvé par des observateurs qui recherchaient le Gravelot mongol de la baie de l'Aiguillon (V. plus haut).

**20.** Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus*, juvénile, Balaneg, Finistère, septembre 2004 (Jean-Yves Le Gall).  
*Juvenile Long-billed Dowitcher.*



**21.** Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus*, adulte, île de Noirmoutier, Vendée, mai 2004 (Didier Desmots).  
*Adult Broad-billed Sandpiper.*





**22. Bécasseaux roussets**  
*Tryngites subruficollis*,  
 juvéniles, Ouessant,  
 Finistère, septembre 2004  
 (David Laloi). *Juvenile*  
*Buff-breasted Sandpiper.*



**BÉCASSEAU ROUSSET** *Tryngites subruficollis* (148/182) (103/115 – 3/5)

**Finistère** – Île de Sein, juv., phot., du 10 au 14 septembre (A. Audevard, F. Barrault, Y. Le Corre) ; île d'Ouessant : Porz Doun puis Créac'h, 3 juv., phot., du 13 au 16 septembre, puis 2 juv., phot., du 17 au 20 septembre (A. Audevard, A. Chabrolle, D. Laloi *et al.*) ; pointe de la Torche/Plomeur, juv., phot., du 23 septembre au 10 octobre (A. Audevard, P. Crouzier).

(Amérique du Nord). Département classique et année conforme à la moyenne. Le groupe de 3 oiseaux est en revanche tout à fait remarquable.

**BÉCASSINE DOUBLE** *Gallinago media* (259/306) (32/33 – 1/1)

**Haute-Saône** – Marnay, 28 & 29 mars (C. Mauvais, J.-P. Paul *et al.*).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). De nouveau, une seule observation cette année, comme c'est le cas depuis 2001.

**BÉCASSIN À LONG BEC** *Limnodromus scolopaceus* (28/29) (19/19 – 1/1)

**Finistère** – Île de Balaneg/Le Conquet, juv., phot., 30 septembre (J.-Y. Le Gall).

(Amérique du Nord). Avec Trielen et Kéménez, Balaneg est l'une des trois petites îles de l'archipel de Molène (au sud-est d'Ouessant) sur laquelle se trouve un plan d'eau, sans doute très attractif pour les limicoles néarctiques arrivant en Europe, comme en témoigne cette observation.

**BARTRAMIE DES CHAMPS** *Bartramia longicauda* (5/5) (3/3 – 2/2)

**Bouches-du-Rhône** – Crau : Istres, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 3 au 7 décembre (Y. Kayser, M. Thibault, N. Vincent-Martin *et al.*).

**Finistère** – Île d'Ouessant : Parluc'hen, juv., phot., du 22 septembre au 4 octobre (A. Audevard *et al.*).

(Amérique du Nord). Sixième et septième mentions pour la France, où l'espèce n'avait pas été observée depuis 1992 ! C'est pourtant, avec 1985, la seconde fois que deux oiseaux sont vus la même année. À noter que l'individu de Crau a été trouvé par un berger dans un pré de fauche... et que sa présence est restée confidentielle. Heureusement, celui d'Ouessant a joué les stars devant une foule d'ornithos comblés, arrivés de toute la France ce samedi 25 septembre 2004.

**CHEVALIER À PATTES JAUNES** *Tringa flavipes* (34/34) (19/19 – 2/2)

**Alpes-Maritimes** – St-Laurent-du-Var, du 18 au 21 août (G. & S. Autran).

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Piémanson, 28 & 29 mars (Y. Kayser *et al.*).

(Amérique du Nord). Deux mentions sur la côte méditerranéenne de ce chevalier nord-américain, habituellement vu sur la façade atlantique. Ce ne sont pourtant pas les premières pour cette région, où un individu avait été vu dans les marais du Vigueirat, Bouches-du-Rhône, en 1995.



23. Bécassine double  
*Gallinago media*, Marnay,  
Haute-Saône, mars 2004  
(Jean-Philippe Paul).  
Great Snipe.



24. Bartramie des champs  
*Bartramia longicauda*,  
1<sup>er</sup> hiver, Crau, Bouches-du-  
Rhône, décembre 2004  
(Marc Thibault).  
1st-winter Upland Sandpiper.



25. Chevalier grivelé *Actitis macularius*, juvénile, Tréffiagat, Finistère, août 2004 (Aurélien Audevard). Spotted Sandpiper.

**CHEVALIER BARGETTE *Tringa cinerea* (106/91) (80/66 – 3/4)**

**Ain** – St-Germain-sur-Renom, 2 ad., phot., du 23 au 29 mai (A. Bernard, P., M. & J.-B.† Cruzier, V. Rolland-Commarmot *et al.*).

**Indre** – Mézières-en-Brenne, 1<sup>er</sup> été, phot., du 21 au 23 mai (P.J. Dubois, A. Virondeau *et al.*).

**Vendée** – La Faute-sur-Mer, ad., 19 mai (A. Thomas).

**2003 Bouches-du-Rhône** – Camargue : Baisse des Cinq-Cents-Francis, phot., du 8 septembre au 2 octobre (D. Cohez, G. Paulus *et al.*).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). L'espèce n'avait pas été signalée en Camargue depuis mai 2002 et en baie de l'Aiguillon depuis mai 1998, deux sites pourtant classiques pour l'espèce. La donnée de Brenne est remarquable par sa localisation. Quant à celle de Dombes, outre le fait qu'elle concerne deux oiseaux ensemble, elle se situe dans une extraordinaire série d'observations de limicoles occasionnels : un Bécasseau de Bonaparte, un Bécasseau tacheté et deux Bécasseaux falcinelles !

**CHEVALIER GRIVELÉ *Actitis macularius* (12/14) (12/14 – 1/1)**

**Finistère** – Étang du Léhan, Léchiagat/Tréffiagat, juv., phot., du 22 août au 11 septembre (A. Audevard *et al.*).

(Amérique du Nord). Le dernier en date se trouvait à l'île d'Yeu, Vendée, les 14 & 17 septembre 1999.

### *Limicoles néarctiques*

Avec dix espèces totalisant 35 données pour 38 individus, l'année 2004 se situe légèrement au-dessus de la moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981, celle-ci étant d'environ 8 espèces pour un peu plus de 26 données et près de 29 individus. Les années record en terme de diversité restent 1995 et 1998 avec 12 espèces de limicoles néarctiques vues en France. En revanche, l'effectif record revient à l'année 2000, avec respectivement 48 données et 56 individus.



**LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (367/1054) (311/970 – 24/161)**

**Finistère** - Île d'Ouessant : Créac'h, 2 juv., 17 septembre (R. Baeta, D. Laloï *et al.*).

**Nord** - Le Clipon/Loon-Plage, 4 juv., phot., 21 août, 5 juv., 26 août, 4 juv., 28 août, 14 juv., phot., 31 août, 2 juv., 7 septembre, 1 juv., 11 septembre, 1 juv., phot., 12 septembre, 2 ind., 14 septembre, 5 juv., 21 septembre, 44 ind. (4 ad., 2 subad. & 38 juv.), 23 septembre, 47 ind., 24 septembre, 4 juv., 25 septembre, 2 juv., 27 septembre, 1 ad. & 8 juv., 29 septembre, 1 juv., 8 octobre, 1 juv., 13 novembre (J. Boulanger, F. Caloin, C. Gruwier, L. Scalabre, N. Selosse *et al.*).

**Pas-de-Calais** - Cap Gris-Nez/Audinghen, 3 juv., 24 septembre (G. Flohart), 1 juv., 26 septembre (A. Perthuis), 3 juv., 2 octobre (P.J. Dubois, G. Flohart) ; Calais, 1 juv., 25 septembre (P.J. Dubois) ; Blériot, 2 juv., 26 septembre (P.J. Dubois) ; baie de Canche : Camiers, 2 ind. dont 1 ad., 27 septembre (F. Caloin).

**Seine-Maritime** - Antifer/St-Jouin-Bruneval, ad., 14 août (O. Benoist).

(Circumboréal). Nouveau record en termes d'individus, lié à l'observation de 44 et 47 individus les 23 et 24 septembre au Clipon. L'année 1991 (152 individus) se trouve reléguée de peu en seconde position, mais conserve la première place en nombre de données (33). Deux observations seulement ont été effectuées en dehors des sites traditionnels du Nord/Pas-de-Calais.

**MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (29/29) (24/24 – 1/1)**

**Finistère** - Anse de Kernic/Plounévez-Lochrist, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 26 novembre (S. Mauvieux).

(Amérique du Nord). Depuis 1981, la moyenne annuelle se situe à une donnée pour un individu, le record étant pour l'instant de trois données pour trois individus (1988, 1998 et 2001).

**MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (15/15) (14/14 – 1/1)**

**Ain** - Le Plantay, ad., phot., 16 mai (P. & J.-B.<sup>1</sup> Crouzier *et al.*).

(Amérique du Nord). Doit-on instaurer un contrôle anti-dopage pour les observateurs dombistes ? Plus sérieusement, ce mois de mai 2004 restera mémorable pour la Dombes.

**MOUETTE DE BONAPARTE *Larus philadelphia* (10/9) (9/8 – 1/1)**

**Finistère** - Lampaul-Plouarzel, ad., phot., du 16 septembre au 14 février 2005 (A. Audevard, F. Barrault, M. Champion *et al.*).

(Amérique du Nord). Il s'agit du premier cas d'hivernage complet de cette espèce en France, ce qui a permis à de nombreux observateurs de se déplacer pour venir la voir.



26. Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia*, adulte, Lampaul-Plouarzel, Finistère, septembre 2004 (Aurélien Audevard).  
*Bonaparte's Gull.*



27. Goéland d'Audouin  
*Larus audouinii*, 3<sup>e</sup> été,  
 Lapalme, Aude, avril  
 2004 (Julien Gonin).  
 3rd-summer Audouin's Gull.



**GOÉLAND RAILLEUR** *Larus genei* (22/55) (19/52 – 3/2)

En dehors du littoral méditerranéen.

**Vendée** – Île de Noirmoutier : Müllembourg/Noirmoutier-en-l'Île, mâle ad., phot., du 8 mars au 15 juillet au moins, fem. 1<sup>er</sup> été, phot., du 24 mai au 15 juillet au moins (M. Vaslin *et al.*) : lagune du Dain/Bouin, ad., phot., 22 mai (M. Vaslin).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). Un article détaillant les observations de Noirmoutier a été publié dans *Ornithos* (Desmots *et al.* 2004). Selon l'observateur, l'oiseau vu sur la lagune du Dain à Bouin n'est pas celui de Noirmoutier, présent à cette époque sur l'île ; la date de cette observation coïncide en outre avec l'arrivée de la femelle 1<sup>er</sup> été à Noirmoutier.

**GOÉLAND D'AUDOUIN** *Larus audouinii* (128/156) (128/156 – 18/26)

En dehors de la Corse.

**Aude** – Lapalme, 3<sup>e</sup> été, phot., 2 avril (J. Gonin), 2 imm. de 2<sup>e</sup> été, phot., du 28 mai au 8 juin (J. Gonin) ; Gruissan, 3<sup>e</sup> été, 26 avril (R. Baeta, N. Issa, A. Liger *et al.*), 2<sup>e</sup> été, 2 mai (F. Garcia) ; Leucate, 2<sup>e</sup> été, 27 avril (S. Nicolle) ; Sainte-Lucie/Port-la-Nouvelle, 3 ad., 1<sup>er</sup> mai (F. Garcia).

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : They de Ste-Ursule & Baisse des Cinq-Cents-Francs, 2 ind. (ad. & imm. de 3<sup>e</sup> été), phot., 30 avril (J. Piette *et al.*), Piémanson, ad., 4 mai (Y. Kayser *et al.*), 2 imm. de 2<sup>e</sup> été, 10 mai (Y. Kayser *et al.*).

**Calvados** – Caen, 2<sup>e</sup> été, 3 mai (T. Box).

**Gironde** – La Teste-de-Buch, 3<sup>e</sup> été, phot., 21 mai (J. Gernigon).

**Hérault** – Au large de la Grande-Motte, 3<sup>e</sup> été, phot., 18 avril (F. Dhermain *et al.*).

**Pyrénées-Orientales** – Canet-en-Roussillon, 2<sup>e</sup> été, vidéo, 24 avril (J. Birard, M. Zucca), 2<sup>e</sup> été, 27 avril (R. Baeta, N. Issa, A. Liger) ; St-Cyprien, 2 imm. de 3<sup>e</sup> été, 27 avril (R. Baeta, N. Issa, A. Liger) ; Alénia, 2 imm. (2<sup>e</sup> été & 3<sup>e</sup> été), 27 avril (R. Baeta, J. Gonin, N. Issa, A. Liger) ; cap Béar/Port-Vendres, 2 imm. (1<sup>er</sup> été & 2<sup>e</sup> été), phot., 28 avril (R. Baeta, N. Issa, A. Liger), 3<sup>e</sup> été, 7 mai (D. Laloi).

(Circum-méditerranéen). Nouveau record, confirmant l'augmentation de données constatée en 2003. À noter une belle série d'observations depuis la frontière espagnole jusqu'à la Camargue, en majorité à la fin avril et dans les premiers jours de mai. Deux oiseaux sortent de ce schéma, celui de Gironde et celui du Calvados, qui a été vu depuis un ferry à 10 minutes au large du port de Caen.

## GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (309/180) (308/179 – 33/17)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (\*).

**Charente-Maritime** – Île d'Oléron : La Baudissière/Dolus-d'Oléron, ad., phot., du 28 août au 14 mars 2005 (J. Gonin, P. Trotignon *et al.*).

**Côtes-d'Armor** – Languieux et Le Légué/Saint-Brieuc, ad., phot., du 7 novembre au 27 février 2005 (A. Beuget *et al.*).

**Finistère** – Ste-Anne-la-Palud, ad.\* , phot., du 16 janvier au 14 mars (A. Audevard), 1<sup>er</sup> hiver\*, phot., du 30 décembre au 16 février 2005 (A. Audevard, F. Barrault *et al.*), ad., du 30 décembre 2004 au 30 janvier 2005 au moins (A. Audevard) ; Trezmalouen, ad., phot., du 17 janvier au 11 février (A. Audevard), ad. (le même), du 30 décembre au 30 janvier 2005 (A. Audevard) ; St-Renan, 1<sup>er</sup> hiver\*, phot., du 2 février au 4 mars (A. Audevard, M. Champion) ; ad., phot., du 15 décembre au 23 mars 2005 (A. Audevard, F. Barrault, M. Champion, V. Palomares) ; Kerameal/Kernoues, ad.\* , 24 février (W. Raitière) ; Le Relecq-Kerhuon, ad., 1<sup>er</sup> novembre (F. Barrault) ; anse de Kernic/Plounévez-Lochrist, ad., 4 décembre (A. Audevard, M. Champion, A. Le Nevé) ; anse de Kernic/Plouescat, 3 ad. (3\*), phot., 13 décembre au moins (F. Barrault, Y. Le Corre).

**Gironde** – La Hume/Gujan-Mestras, ad.\* , phot., du 21 janvier au 15 mars (J. Gernigon), ad., du 3 décembre au 21 juin 2005 (J. Gernigon) ; Larros/Gujan-Mestras, jusqu'à 4 ad. (3\*), phot., du 21 janvier au 7 mars (J. Gernigon), ad., phot., 2 & 3 septembre (A. Audevard, J.-C. Sautour) ; Arcachon, jusqu'à 5 ad., du 28 janvier au 10 avril (J. Gernigon), 1<sup>er</sup> hiver\*, phot., du 24 mars au 10 avril (J. Gernigon), 2 ad., phot., du 15 septembre au 29 mars 2005 (J. Gernigon), 3<sup>e</sup> hiver, phot., du 1<sup>er</sup> décembre au 21 mars 2005 (J. Gernigon).

**Ille-et-Vilaine** – Dinard, ad.\* , 11 mars (L. Godet).

**Landes** – St-Martin-de-Seignanx, ad.\* , 2 mars, (S. Duchateau *et al.*).

**Loire-Atlantique** – Lac de Grand-Lieu/St-Lumine-de-Coutais, 2<sup>e</sup> hiver\*, phot., du 3 au 5 février (S. Reeber) ; lac de Grand-Lieu/St-Philbert-de-Grand-Lieu, ad.\* , phot., 23 novembre (S. Reeber).

**Morbihan** – Pénestin, ad., du 15 au 19 septembre au moins (J.-L. Dourin, J.-P. Trévoux).

**Vendée** – Le Collet/Bouin, 2<sup>e</sup> hiver\*, phot., 3 avril (M. Vaslin *et al.*) ; pointe d'Arçay/La Faute-sur-Mer, ad., 25 août (E. Gfeller, A. Thomas).

**2003 Gironde** – ad. & 2<sup>e</sup> été/3<sup>e</sup> hiver, phot., 29 août (A. Audevard, J.-C. Sautour), et non 2 ad. (*Ornithos* 12-1 : 22).

**2003 Morbihan** – Pénestin, ad., du 1<sup>er</sup> novembre au 13 mars 2004 (J.-L. Dourin, A. Troffigüe), et non 1<sup>er</sup> novembre uniquement (*Ornithos* 12-1 : 22).

**2002 Pyrénées-Atlantiques** – Hendaye, 2 ad., 19 & 20 janvier (S. Duchateau *et al.*).

(Amérique du Nord). Les revenants sont toujours fidèles à leur site et l'arrivée de nouveaux oiseaux se poursuit, avec cette année encore, 17 arrivants. Même si la comptabilité est de plus en plus difficile à effectuer... Compte tenu de cette fidélité au site, les adultes vus à Hendaye en 2002 sont sans doute ceux déjà observés en 1999.

## GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (145/150) (137/141 – 1/1)

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, 1<sup>er</sup> été, 28 avril (A. Le Nevé).

(Arctique canadien, Groenland). Il faut remonter à 1991 pour trouver une année avec un seul oiseau. L'effectif moyen reste cependant inférieur à 5 individus par hiver depuis l'afflux exceptionnel de 1984, au cours duquel 40 individus avaient été observés en France.



### MOUETTE DE ROSS *Rhodostethia rosea*

(3/3) (2/2 – 1/1)

**Nord** – Le Clipon/Loon-Plage, ad., phot., 8 février (D. Haubreux, J. Piette, K. Verbanck).

(Circum-arctique ; hiverne dans l'océan glacial Arctique). Quatrième donnée française, la seconde pour ce site après celle d'un adulte le 26 octobre 2000 ! Les précédentes concernaient un mâle tué à La Faute-sur-Mer, Vendée, le 22 décembre 1913 et un adulte présent en Espagne et survolant brièvement les eaux françaises dans la baie de Chingoudy à Hendaye, Pyrénées-Atlantiques, le 7 avril 1994 (Dubois *et al.* 2001).

28 ♂ 29. Mouette de Ross *Rhodostethia rosea*, adulte, Le Clipon, Loon-Plage, Nord, février 2004 (Koen Verbanck). *Adult Ross's Gull.*

**30.** Goéland à bec cerclé  
*Larus delawarensis*,  
adulte, Gujan-Mestras,  
Gironde, septembre 2004  
(Aurélien Audevard).  
*Adult Ring-billed Gull.*



**STERNE ROYALE *Sterna maxima* (0/0) (0/0 – 1/1)**

**Gironde** – Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, ad. probable, phot., 9 juillet (J. Gernigon *et al.*).

(Afrique de l'Ouest, côtes atlantique et pacifique de l'Amérique du Nord, Amérique centrale). Première mention française pour cette espèce, sur un site qui a déjà accueilli toutes les autres sternes occasionnelles vues en France. Cette donnée a été inscrite en catégorie A de la Liste des oiseaux de France par la CAF ; la sous-espèce n'a pas pu être précisée.

**STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (30/32) (23/17 – 2/1)**

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Baisse des Cinq-Cents-Francis, ad., 5 & 7 juillet (R. Woudstra *et al.*).

**Gironde** – Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, fem. ad., baguée couleur, phot., du 14 mai au 25 juin & du 27 au 31 juillet (J. Gernigon *et al.*).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Pas de reproduction cette année au banc d'Arguin.

**STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (18/7) (17/6 – 2/0)**

**Finistère** – Pointe de Moustierlin & île aux Moutons/Fouesnant, ad., phot., du 10 mai au 25 juillet (G. Leblanc, A. Le Nevé, S. Nedellec *et al.*).

**Gironde** – Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, ad., phot., 10 juin (J. Gernigon).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). Une Sterne élégante avait déjà été observée sur l'île aux Moutons en 1995, 1996 et 2002, ce qui laisse supposer qu'il s'agit du même individu. Celle du banc d'Arguin est aussi un revenant (19 juillet 2003).

**STERNE « À BEC ORANGE » *Sterna sp.***

En 2004, l'oiseau du banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, Gironde, a de nouveau produit un poussin hybride avec une Sterne caugek *S. sandvicensis* (J. Gernigon, comm. pers.). L'identité de cet oiseau n'est toujours pas connue...

#### **TOURTERELLE ORIENTALE *Streptopelia orientalis* (4/4) (4/4 – 1/1)**

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, juv./1<sup>er</sup> hiver, sous-espèce *meena*, phot., 24 octobre (S. Dulau, J.-P. & R. Jordan, A. Le Nevé *et al.*).

**2000 Morbihan** – Île d'Hoëdic, ad., sous-espèce *meena*, phot., 21 octobre (G. Rault<sup>†</sup>), et non 1<sup>er</sup> hiver probable (*Ornithos* 9-1 : 21).

(Asie centrale et Extrême-Orient). Cinquième mention française, la seconde pour Hoëdic et quasiment à la même date !

#### **PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (283/429) (238/362 – 6/8)**

**Bouches-du-Rhône** – Crau : Mas Chauvet/Entressen, jusqu'au 17 ind. (2 imm. 1<sup>er</sup> hiver au moins), phot., du 25 octobre au 23 février 2005 (B. Caula, F. Dhermain, V. Palomares *et al.*). Cuges-les-Pins, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 31 octobre au 2 novembre (R. Pélissier, G. Viricel *et al.*)

**Isère** – Aéroport de St-Geoirs/Gillonay, 2 ad., phot., 30 avril (R. Rufer).

**Manche** – Carolles, 22 octobre (S. Provost).

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, phot., 23 octobre (S. Dulau, R. Jordan, A. Le Nevé *et al.*).

**Pyrénées-Orientales** – Saint-Nazaire, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 22 décembre au 22 mars 2005 au moins (F. Garcia, C. Peignot *et al.*).

**2003 Finistère** – Île d'Ouessant : Toull Dreiz, 1<sup>er</sup> hiver, 17 & 18 octobre (P.-A. Crochet).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). Petite année pour cette « rareté commune », avec notamment l'absence de données sur les îles du Finistère, Ouessant incluse, à l'automne 2004. En revanche, l'hivernage se maintient en Crau avec une majorité d'adultes, donc de revenants, ce qui explique le faible nombre d'individus comptabilisés dans les statistiques. L'autre site d'hivernage du sud de la France (prades de l'embouchure du Réart à St-Nazaire) accueille un nouvel oiseau, ce qui témoigne de l'attractivité du site pour l'espèce.

#### **PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (10/10) (10/10 – 1/1)**

**Finistère** – Île d'Ouessant : Dizro, 10 novembre (R. Baeta, D. Laloi).

(Sibérie, Extrême-Orient). Lieu, date et brièveté du séjour classiques...

#### **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (43/47) (32/34 – 3/3)**

Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans ».

**Ain** – Château-Gaillard, mâle, 1<sup>er</sup> mai (A. Bernard).

**Haute-Corse** – Barcaggio/Ersa, mâle, phot., 29 avril (S. Provost *et al.*).

**Vaucluse** – Monteux, mâle, phot. 14 mai (B. Allegrini, C. Heroguel).

(Sibérie, Extrême-Orient). Plutôt une bonne année pour ce taxon, qui reste une grande rareté dans notre pays. À noter que les trois individus ont eu la bonne idée de crier, fait plutôt rare... en France !

#### **AGROBATE ROUX *Cercotrichas galactotes* (15/15) (9/9 – 0/0)**

**1996 Aude** – Pissevaches/St-Pierre-sur-Mer, ad., sous-espèce *galactotes*, 18 mai (A. Liger).

(Eurasie méridionale, Afrique du Nord). Donnée arrivée tardivement au CHN, mais les dessins réalisés lors de l'observation sont éloquentes.

#### **ROSSIGNOL PROGNÉ *Luscinia luscinia* (4/4) (2/2 – 1/1)**

**Pas-de-Calais** – Tardinghen, du 20 au 24 août (G. Flohart, P.-R. Legrand, N. Valet *et al.*).

(De la Scandinavie et l'Autriche jusqu'en Sibérie). Cette observation n'est pas sans rappeler la précédente, d'un oiseau à Audinghen, Pas-de-Calais, du 27 août au 3 septembre !

#### **LOCUSTELLE DE PALLAS *Locustella certhiola* (4/4) (4/4 – 0/0)**

**2002 Morbihan** – Île d'Hoëdic, juv., du 19 au 21 octobre (Y. Kayser, G. Rault<sup>†</sup> *et al.*)

(Sibérie orientale). Quatrième mention française, à une date classique.

#### **LOCUSTELLE FLUVIATILE *Locustella fluviatilis* (8/9) (5/6 – 1/1)**

**Ain** – Versailleux, phot., 29 & 30 mai (A. Bernard, M. Camiccio, P. & J.-B.<sup>†</sup> Crouzier *et al.*)

(Sud de la Baltique, Balkans, jusqu'en Sibérie occidentale). Ce migrateur chantait sur le site où il s'était arrêté, un comportement classique chez cette espèce, comme chez beaucoup d'autres.





▲ 31. Hypolaïs bottée *Hippolais caligata*, 1<sup>er</sup> hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2004 (Miguel Vergès). 1st-winter Booted Warbler.



► 32. Hypolaïs bottée *Hippolais caligata*, 1<sup>er</sup> hiver, même oiseau que sur la photo 31 (Matthieu Vaslin). 1st-winter Booted Warbler.

**ROUSSEROLLE ISABELLE** *Acrocephalus agricola* (26/26) (26/26 – 1/1)

**Finistère** – Tréogat, mâle ad., capt., phot., 30 août (T. Biteau *et al.*)

**2003 Bouches-du-Rhône** – Le Vigüeriat/Mas-Thibert, capt., phot., 25 août (P. Rapaport).

(Roumanie jusqu'au nord de la Caspienne). Espèce observée annuellement depuis 1993. Avec cette donnée arrivée tardivement, 2003 (4 données et 4 individus) devient la meilleure année pour l'espèce en France.

**HYPOLAÏS BOTTÉE** *Hippolais caligata* (5/5) (5/5 – 1/1)

**Finistère** – Île d'Ouessant : Bougezenn, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 16 au 18 octobre (A. Audevard, P.-P. Évrard, M. Vaslin, M. Vergès *et al.*).

(Iran, Asie centrale, Mongolie). Sixième mention française, la quatrième pour Ouessant ! Cet oiseau était particulièrement coopératif et a été abondamment photographié.

**FAUVETTE SARDE** *Sylvia sarda* (20/19) (19/18 – 2/2)

En dehors de la Corse.

**Bouches-du-Rhône** – Le Verdier/Arles, mâle ad., 4 avril (Y. Kayser).

**Var** – Île de Porquerolles/Hyères, fem. ad., capt., phot., 22 avril (R. André, Y. Beauvallet, P. Miguet, C. Moyon *et al.*). (Méditerranée). Premières mentions continentales pour le XXI<sup>e</sup> siècle ! Les dernières remontent à 1998 : cela reflète-t-il la réalité ou un manque de transmission des données ? Date et lieux sont classiques.

**FAUVETTE PASSERINETTE** *Sylvia cantillans* (0/0) (0/0 – 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *albistriata*.

**Finistère** – Île d'Ouessant : Cost ar Reun, mâle ad., du 20 au 25 avril (A. Audevard).

(De la Slovénie à l'ouest de la Turquie). Première mention française de cette sous-espèce orientale, inscrite en catégorie A de la Liste des oiseaux de France par la CAF. Cette donnée se situe dans un petit afflux de Fauvettes passerinettes (15 oiseaux) en Grande-Bretagne, parmi lesquelles 4 ont été attribuées à cette sous-espèce (Cade & Walker 2004, Rogers & the Rarities Committee 2005).



33. Fauvette épervière *Sylvia nisoria*, 1<sup>er</sup> hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2004 (Guy Durand). 1st-winter Barred Warbler.



34. Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, Ouessant, Finistère, octobre 2004 (Miguel Vergès). Yellow-browed Warbler.

### FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (51/52) (24/24 – 5/5)

**Charente-Maritime** – Plaisance/St-Froult, 1<sup>er</sup> hiver, capt., phot., 31 août (F. Corre, J. Gautier).

**Finistère** – Île d'Ouessant : Penn Jamet, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 26 octobre (G. Durand, A. Flitti *et al.*) ; Arland, 1<sup>er</sup> hiver, 1<sup>er</sup> novembre (A. Dorie).

**Pas-de-Calais** – Wimereux, 1<sup>er</sup> hiver, capt., phot., 15 août (C. Duponchel, G. Flohart, D. Tirmarche) ; Audinghen, 1<sup>er</sup> hiver, 4 septembre (G. Flohart).

**2002 Finistère** – Île d'Ouessant : Poull Dragas, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 14 au 16 octobre (N. Issa, C. Kerihuel, F. Veyrunes *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Année record avec 5 oiseaux ! L'espèce est annuelle en France mais le nombre moyen d'observations est à peine supérieur à 1 depuis la création du CHN.

### POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides*

Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *plumbeitarsus*, appelée « Pouillot à pattes sombres » (0/0) (0/0 – 1/1)

**Finistère** – Île de Sein, phot., 26 octobre (J.-P. & Y. Trévoux *et al.*).

(Sud-est de la Sibérie, du lac Baïkal au nord-est de la Chine). Enfin la première donnée française de ce pouillot oriental, attendu de longue date. Et c'est la petite île de Sein qui fournit une nouvelle « première » pour la France. Cette sous-espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des oiseaux de France par la CAF.

### POUILLOT BORÉAL *Phylloscopus borealis* (13/13) (13/13 – 2/2)

**Finistère** – Île d'Ouessant : Poull Brac, du 28 septembre au 1<sup>er</sup> octobre (A. Audevard, B. Segerer *et al.*) ; Penn ar Rugel, 9 octobre (S. Reeber *et al.*).

(De la Scandinavie au Japon et à l'Alaska). Les derniers vus en France datent de 2000 et 2001 avec le même nombre de données et d'individus (2 et 2). Avec 4 oiseaux, 1988 est l'année record. Notons que la première mention française de cette espèce est de 1984 seulement et que les îles bretonnes, notamment Ouessant, fournissent la majorité des données.

### POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (63/66) (61/64 – 4/4)

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, 30 octobre (A. Larousse *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Ambleteuse, 31 octobre (E. Dansette) ; Wimereux, capt., phot., 1<sup>er</sup> novembre (G. Flohart,

D. Tirmarche *et al.*) ; Audinghen, 7 novembre (G. Flohart *et al.*).

**2003 Finistère** – Île d'Ouessant : Feuten Veulen, phot., 14 octobre (P.-A. Crochet, N. Issa *et al.*).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Le nombre moyen de données et d'individus se situe un peu en dessous de 3 depuis la création du CHN, mais il est de 5 depuis 1994 (maximum de 9 oiseaux en 2003). L'année 2004 est donc légèrement en dessous de la « normale » récente. À noter le « tir groupé » du Pas-de-Calais et l'absence de données en provenance du Finistère.

**POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (782/837) (765/820 – 36/37)**

**Charente-Maritime** – Île d'Oléron : Chassiron/St-Denis-d'Oléron, 10 octobre (P. Jourde).

**Doubs** – Bouverans, 11 septembre (G. Locatelli, D. Michelat).

**Finistère** – Île d'Ouessant : Arland, 7 octobre (A. Audevard, N. Issa), 14 octobre (J. Gonin), 17 octobre (N. Issa), du 23 octobre au 1<sup>er</sup> novembre (P. Crouzier, N. Issa, J. Piette *et al.*) ; Porz Noan, 9 & 12 octobre (J. Gonin, S. Reeber) ; Stang ar Glann, 10 & 11 octobre (A. Audevard, M. Champion, J.-Y. Frémont, N. Issa, M. Vaslin) ; Ty Crenn, 1 ind. les 12 & 13 octobre, puis 2 ind. le 14 octobre et 1 seul le 15 octobre (A. Audevard, M. Champion, J.-Y. Frémont, N. Issa, M. Vaslin), 24 octobre (P. Crouzier *et al.*) ; Ar Picard, 13 octobre (S. Reeber) ; Lampaul, 13 octobre (A. Audevard, M. Champion, J.-Y. Frémont, N. Issa, M. Vaslin) ; Park Raden, 14 octobre (J. Gonin), du 24 au 29 octobre (P. Crouzier *et al.*) ; Pount Salaün, 2 ind., 14 octobre (M. Champion), 17 & 21 octobre (N. Issa), 29 & 30 octobre (P. Crouzier *et al.*) ; Stang ar Merdy, 14 octobre (J.-Y. Frémont, N. Issa) ; Stang Korz, du 16 au 24 octobre (M. Champion, P., J.-B.† & M. Crouzier, N. Issa, M. Vaslin) ; Kerhuel, phot., du 17 au 28 octobre (P. Crouzier, N. Issa, J. Piette, M. Vergès) ; Parkous, 19 octobre (N. Issa), 25 octobre (P., J.-B.† & M. Crouzier) ; Stang Porz Gwenn, 1 ind. du 23 au 27 octobre, puis 2 ind. le 28 octobre et 1 seul du 29 octobre au 2 novembre (P. Crouzier, N. Issa, J. Piette) ; Stang Meur, 26 octobre (P. Crouzier *et al.*) ; Poull Bojer, phot., 30 & 31 octobre (N. Issa). Île de Sein, 12 octobre (J.-F. Darras).

**Hérault** – Aniane, 10 janvier (R. Britton).

**Ille-et-Vilaine** – St-Coulomb, 31 octobre (A. Bellier, G. Hervé).

**Loire-Atlantique** – Préfailles, 12 octobre (O. Penard).

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, phot., 26 octobre (S. Dulau, A. Le Nevé *et al.*).

**Nord** – Malo-les-Bains, 30 septembre & 1<sup>er</sup> octobre (J. Piette *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Audinghen, 28 octobre (G. Flohart).



**35.** Pouillot à pattes sombres  
*Phylloscopus t. plumbeitarsus*,  
Sein, Finistère, octobre 2004  
(Jean-Pierre Trévoux).  
*Two-barred Greenish Warbler.*







36 à 39. Gobemouche à demi-collier *Ficedula semitorquata*, mâle 1<sup>er</sup> été, Porquerolles, Hyères, Var, avril 2004 (Régis André & Pascal Miguet). 1st-summer male Semi-collared Flycatcher





**Vendée** – St-Michel-en-l'Herm, capt., phot., 23 octobre (M. Vaslin *et al.*) ; île d'Yeu : Ker Châlon, 31 octobre (X. Hindermeyer).

**2003 Finistère** – Penhar, 10 octobre (T. Guillosson). Île d'Ouessant : Pount ar Rodez, 25 octobre (J. Piette) ; Stang Porz Gwenn, 1 ind. le 26 octobre puis 2 ind. le 27 octobre (J. Piette) ; Ty Crenn, 2 ind., 30 octobre (J. Piette *et al.*).

**2003 Mayenne** – Pré-en-Pail, du 13 au 17 septembre (D. Tavenon *et al.*).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Après une année 2003 vraiment exceptionnelle, qui totalise désormais 100 individus (record absolu) avec les données arrivées tardivement, 2004 se situe juste dans la moyenne. Les oiseaux du Doubs, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique se distinguent par leur localisation plus inhabituelle.

**POUILLOT DE HUME *Phylloscopus humei* (12/13) (12/13 – 0/0)**

**2003 Finistère** – Île d'Ouessant : Toul al Lann, 31 octobre & 1<sup>er</sup> novembre (S. Mauvieux *et al.*).

(Nord-est de l'Afghanistan à la Chine centrale). Cette donnée, arrivée tardivement au CHN, porte à 8 le nombre de Pouillots de Hume trouvés en France à l'automne 2003, dans le contexte d'un afflux important de l'espèce en Europe de l'Ouest.

**POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (29/30) (29/30 – 2/2)**

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : La Capelière, capt., phot., 26 & 27 octobre (A. Johnson, J. Paoli, P. Thouy *et al.*).

**Finistère** – Île d'Ouessant : Ar Picard, phot., du 20 au 25 octobre (P. Crouzier, F. Jiguet *et al.*).

**2003 Finistère** – Île d'Ouessant : Park Raden, du 15 au 18 novembre (A. Audevard, R. Baeta, N. Issa *et al.*).

(Asie centrale et septentrionale). L'espèce est d'observation annuelle en France depuis 1998 seulement et reste d'une grande rareté, avec en moyenne un ou deux oiseaux par an. L'année 1999 détient le record avec 8 individus ! À noter qu'en 2002, un Pouillot brun avait déjà été observé en octobre en Camargue.



40. Pouillot véloce  
*Phylloscopus collybita*  
de type sibérien,  
île de Noirmoutier,  
Vendée, novembre  
2004 (Matthieu Vaslin).  
Siberian Chiffchaff.



**POUILLOT VÉLOCE** *Phylloscopus collybita*

1 - Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis* (14/19) (11/16 - 2/2)

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Piémanson, capt., du 9 au 15 avril (Y. Kayser *et al.*).

**Loire-Atlantique** - Lac de Grand-Lieu/St-Philbert-de-Grand-Lieu, chant, 21 & 22 novembre (S. Reeber).

(Sibérie orientale). À la lecture des descriptions figurant sur les fiches d'homologation de ces deux oiseaux, on peut exclure '*fulvescens*' dont la position taxonomique reste à confirmer. Dean & Svensson (2005) ont souligné l'erreur d'identification que faisaient les observateurs anglais depuis de nombreuses années en considérant comme *tristis* tout pouillot « gris » vu à l'automne ou en hiver... Le CHN a de tout temps été beaucoup plus restrictif dans ses critères d'acceptation de *tristis* (Dubois, Yésou & le CHN 1995), tout à fait conformes à ce qu'écrivent Dean & Svensson (*op. cit.*). Un article traitant de ce sujet délicat sera publié prochainement dans *Ornithos*.

2 - Pouillots véloces de type sibérien (183/214) (142/151 - 5/5)

**Bouches-du-Rhône** - Camargue : Tour-du-Valat, 7 avril (Y. Kayser).

**Finistère** - Île d'Ouessant : Stang Meur, 25 octobre (P., J.-B.<sup>†</sup> & M. Crouzier) ; Stang ar Merdy, 12 novembre (R. Baeta, D. Laloi *et al.*).

**Deux-Sèvres** - Échiré, 24 janvier (P.-P. Évrard).

**Vendée** - Île de Noirmoutier : marais de Müllembourg/Noirmoutier-en-l'Île, phot., 25 novembre (D. Desmots, M. Vaslin).

**2003 Ain** - Divonne-les-Bains, 22 décembre (B. Piot).

**2003 Bouches-du-Rhône** - Crau : Grand Mas, 9 décembre (Y. Kayser *et al.*).

**2003 Finistère** - Île de Batz, phot., 2 novembre (T. & M. Quelennec).

(Sibérie).

**GOBEMOUCHE NAIN** *Ficedula parva* (327/349) (273/287 - 8/8)

**Doubs** - Charmavillers, mâle ad., chant, phot., vidéo, du 20 mai au 25 juin (M. Farine, M. Zucca *et al.*).

**Finistère** - Île de Sein, 1<sup>er</sup> hiver, 12 octobre (J.-F. Darras) ; Île d'Ouessant : Porz Doun, 1<sup>er</sup> hiver, 12 octobre (A. Audevard, M. Champion, Jean-Yves Frémont, N. Issa, M. Vaslin *et al.*) ; Stang Korz, 1<sup>er</sup> hiver, capt., phot., 12 & 13 octobre (J. Gonin, C. Kerbirou *et al.*) ; Kerhuel, 1<sup>er</sup> hiver, 13 octobre (A. Audevard, M. Champion, M. Vaslin) ; Stang ar Glann, 1<sup>er</sup> hiver, 19 octobre (A. Audevard, N. Issa) ; Kervasdoué, 1<sup>er</sup> hiver, 23 & 24 octobre (P., J.-B.<sup>†</sup> & M. Crouzier *et al.*).

**Manche** - Barfleur, 1<sup>er</sup> hiver, 10 septembre (D. Wooldridge).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Le plus petit effectif annuel des dix dernières années. La moyenne se situe un peu au-dessus de 12 oiseaux par an depuis la création du CHN, les effectifs records étant ceux de 1995 et 2003, avec respectivement 33 et 28 individus. À signaler le mâle cantonné et chanteur du Doubs, qui est malheureusement resté solitaire... Après la Grive litorne, la Cigogne noire et l'Aigle pomarin, la Franche-Comté fournira-t-elle le premier cas de nidification du Gobemouche nain pour la France ?

**GOBEMOUCHE À DEMI-COLLIER** *Ficedula semitorquata* (0/0) (0/0 - 1/1)

**Var** - Île de Porquerolles/Hyères, mâle 1<sup>er</sup> été, capt., phot., 17 avril (R. André, P. Miguet).

(Grèce, Bulgarie, Turquie, Caucase oriental et nord-ouest de l'Iran). Première mention française de cette espèce orientale, qui a été inscrite en catégorie A de la Liste des oiseaux de France par la CAF. Cette donnée se situe dans le cadre d'un afflux sans précédent de ce gobemouche du 11 au 13 avril au Moyen-Orient (P.J. Dubois, comm. pers.) et de Gobemouches à collier en France (Gonin & Zucca 2005). Rappelons qu'une précédente mention du 12 avril 2000 en Corse (V. *Alauda* 68 : 312) n'avait pas été retenue par le CHN.

**PIE-GRIÈCHE BRUNE** *Lanius cristatus* (1/1) (1/1 - 1/1)

**Vendée** - Île de Noirmoutier : marais de Müllembourg/Noirmoutier-en-l'Île, 1<sup>er</sup> hiver, capt., phot., du 3 au 5 novembre (M. Vaslin *et al.*).

(Asie centrale jusqu'à la Chine et au Japon). Deuxième mention française après celle d'un adulte le 24 octobre 2000 sur l'île d'Hoëdic, Morbihan. Comme cette année-là, où un individu avait été observé à Fair Isle (îles Shetland) 3 jours plus tôt (Rogers & the Rarities Committee 2001), un mâle adulte était présent du 19 au 24 septembre 2004 aux îles Shetland (Rogers & the Rarities Committee 2005). À l'instar de ce dernier, l'oiseau de Noirmoutier appartenait à la sous-espèce *cristatus* de Sibérie centrale.



▼41. Pie-grièche brune  
*Lanius cristatus*, 1<sup>er</sup> hiver,  
île de Noirmoutier,  
Vendée, novembre 2004  
(Matthieu Vasin).  
1st-winter Brown Shrike.

▼42. Pie-grièche brune  
*Lanius cristatus*, 1<sup>er</sup> hiver,  
île de Noirmoutier,  
Vendée, novembre 2004  
(Benoît Perrotin).  
1st-winter Brown Shrike.





43. Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*, mâle (à droite) et Étourneau sansonnet *S. vulgaris*, île de Noirmoutier, Vendée, décembre 2004 (Matthieu Vaslin). *Male Spotless Starling (right) with Common Starling.*



44. Étourneau roselin  
*Sturnus roseus*, juvénile,  
Sein, Finistère, septembre  
2004 (Aurélien Audevard).  
*Juvenile Rose-coloured Starling.*





45. Roselin cramoisî *Carpodacus erythrinus*, mâle, Hemmes-de-Marck, Pas-de-Calais, juin 2004 (Thierry Tancrez). *Male Common Rosefinch*.



46. Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos*, Audinghen, Pas-de-Calais, novembre 2004 (Guy Flohart). *Male Pine Bunting*.

#### **PIE-GRIÈCHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (10/10) (10/10 – 1/1)**

**Finistère** – Île d'Ouessant : Stang Meur, 1<sup>er</sup> hiver, sous-espèce *isabellinus*, phot., du 26 octobre au 2 novembre (P. Crouzier, F. Jiguet, B. Segerer *et al.*)

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). L'espèce demeure très rare en France où elle est observée à peine une année sur deux et toujours à l'unité (1999 fait exception et détient le record avec 2 oiseaux). Un article d'identification de cette espèce sera publié prochainement dans *Ornithos* et fera la synthèse des données françaises.

#### **ÉTOURNEAU UNICOLORE *Sturnus unicolor* (62/141) (59/138 – 2/2)**

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuves de reproduction).

**Hérault** – Vailhauquès, 24 janvier (P. Crouzier *et al.*).

**Vendée** – Île de Noirmoutier : L'Épine, mâle ad., chant, phot., du 15 décembre au 17 janvier 2005 (P. Chable, M. Vaslin).

**2003 Bouches-du-Rhône** – Berre-l'Étang, 2 mâles, chant, phot., 7 février (F. Dhermain).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). La présence d'un oiseau sur l'île de Noirmoutier est remarquable, d'autant que cet individu y a été revu durant l'hiver 2005-2006 (V. prochain rapport du CHN).

#### **ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (134/299) (112/256 – 5/6)**

**Finistère** – Île d'Ouessant : Kéridreux, juv., phot., 9 septembre (M. Vaslin *et al.*) ; Kerhuel & Stang Korz, juv., phot., du 9 au 11 octobre (M. Champion, J. Gonin, S. Reeber *et al.*). Île de Sein : Le Corrijou, juv., phot., du 10 au 15 septembre (A. Audevard, F. Barrault, Y. Le Corre).

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, imm., phot., du 24 août au 5 septembre (A. Le Nevé).

**Vendée** – Sion-sur-l'Océan, 2 juv., phot., 8 & 13 octobre (G. Besseau *et al.*).

**2002 Isère** – Vif, 2 ad., 2 juin (T. Naudet).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Pas d'afflux printanier cette année, pour laquelle les effectifs se situent exactement dans la moyenne hors contexte invasionnel.

#### **MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (23/31) (18/25 – 1/0)**

**2003 Corse-du-Sud** – Bonifacio, mâle ad., 2 & 3 juin (D. Parker).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Un des deux oiseaux classiques de Bonifacio.

**ROSELIN CRAMOISI** *Carpodacus erythrinus* (161/194) (146/179 – 2/4)

*NB* : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d'un astérisque (\*).

**Nièvre** – Château-neuf-Val-de-Bargis, 2 ind.\* (mâle rouge & fem. ou mâle gris), phot., du 25 juin au 14 juillet (C. & F. Chapalain, D. Dupuy, E. & S. Merle *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Fort Vert/Hemmes-de-Marck, 1 couple\* (mâle rouge & fem.), phot., du 26 au 31 mai (J. Piette, T. Tancrez, K. Verbanck *et al.*).

**2003 Finistère** – Île d'Ouessant : Porz Doun, 1<sup>er</sup> hiver, 23 octobre (P.-A. Crochet, F. Veyrunes).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). La nidification est probable cette année dans le Pas-de-Calais, possible dans la Nièvre (ce qui est nouveau). Aucun cas de nidification réussie n'a été noté en France depuis 2001 (dans le Pas-de-Calais). Plus rien dans le Doubs ni dans le Jura...

**BRUANT À CALOTTE BLANCHE** *Emberiza leucocephalos* (31/34) (17/20 – 2/2)

**Pas-de-Calais** – Audinghen, mâle, phot., 11 novembre (G. Flohart).

**Hautes-Pyrénées** – Clarac, mâle ad., phot., du 25 au 28 mars (F. Ballereau, A. Nerrière *et al.*).

(Sibérie). Deux données remarquables par leur localisation. Mais où sont donc passés les hivernants camarguais ?

**BRUANT NAIN** *Emberiza pusilla* (81/86) (68/71 – 3/3)

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Petit Badon, 18 & 19 avril (A. Le Nevé, A. Olivier *et al.*).

**Finistère** – Île d'Ouessant : Porz Gwenn, phot., du 11 au 14 octobre (A. Audevard, J.-Y. Frémont, M. Vaslin *et al.*).

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, 1<sup>er</sup> hiver, 22 octobre (A. Le Nevé *et al.*).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Lieux et dates classiques. Avec 3 individus, 2004 se situe tout à fait dans la moyenne annuelle depuis la création du CHN. Le record est détenu par 1994 avec 8 individus.

47. Bruant nain *Emberiza pusilla*, Porz Gwenn, Ouessant, Finistère, octobre 2004 (Matthieu Vaslin). *Little Bunting*.



**BRUANT MÉLANOCÉPHALE** *Emberiza melanocephala* (76/87) (60/68 – 4/5)

**Alpes-de-Hautes-Provence** – Plateau de Valensole : Aubeire/Valensole, 2 mâles & 1 fem., phot., du 16 mai au 27 juin (L. Bouvin, E. Dansette, A. Flitti).

**Hautes-Alpes** – Le Lauzet/Monestier-les-Bains, mâle ad., 5 juin (G. Berthollon).

**Bouches-du-Rhône** – Cuges-les-Pins, mâle ad., 25 mai (G. Viricel).

**Savoie** – St-Rémy-de-Maurienne, mâle, 11 juin (B. Feuvrier).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Le plateau de Valensole accueille de nouveau l'espèce qui s'y était signalée à la fin des années 1980, laissant espérer vainement une nidification. Ce nouveau site d'Aubeire aurait déjà été fréquenté en 2003, mais les éléments fournis n'ont pas permis d'exploiter cette donnée ; des renseignements détaillés à ce sujet sont vivement attendus au CHN. À noter que le mâle des Hautes-Alpes était déjà présent au même endroit en 2001 et 2003. Quant au site de Cipières, Alpes-Maritimes, où a eu lieu la première nidification française (absence notamment constatée du 1<sup>er</sup> au 18 juin ; D. Dupuy, *in litt.*) ; des observateurs locaux évoquent un dérangement des oiseaux par des ornithos peu respectueux de la tranquillité des niches...

**ANNEXE 1 – ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)**

**OIE DES NEIGES** *Anser caerulescens* (52/199) (19/42 – 1/1)

**Somme** – Hâble-d'Ault/Cayeux-sur-Mer, ad., 18 & 27 mars (P. & M.-F. Decory).

(Amérique du Nord, Groenland, Sibérie orientale).

**CANARD À FAUCILLES** *Anas falcata* (5/4) (5/4 – 1/1)

**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Piémanson, mâle ad., 14 & 15 avril (A. Le Nevé *et al.*)

(Sibérie orientale). Cet oiseau se trouvait au sein d'un groupe de Canards chipeaux en halte migratoire.

**PÉLICAN BLANC** *Pelecanus onocrotalus* (67/91) (50/62 – 1/1)

**Aude** – Port-la-Nouvelle, ad., 4 juin (J. Gonin).

**2003 Bouches-du-Rhône** – Goudègues, 19 septembre (F. Tron *et al.*).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Un individu appartenant à la « Réserve africaine » de Sigean, Aude, sort de temps en temps du parc : s'agit-il de cet oiseau ?



**VAUTOUR DE RÜPPELL** *Gyps rueppellii* (0/0) (1/1 – 1/0)

**Drôme** – Chamaloc, ad., 19 mars (G. Oliosio).

**2003 Drôme** – Rémuzat, ad., phot., du 20 septembre au 29 décembre au moins (J.-P. Paul, H. Pottiau, V. Rolland-Commarmot, F. Spada, C. Tessier, O. Tourillon *et al.*).

(Afrique subsaharienne). Première mention française pour cette espèce, qui a été inscrite en catégorie D de la Liste des oiseaux de France par la CAF. L'oiseau vu en 2004 à Chamaloc se nourrissait sur un charnier avec des Vautours fauves ; il s'agit de l'individu qui a fréquenté la colonie de Rémuzat (Baronnies) à l'automne et dans l'hiver 2003.

48. Vautour de Rüppell *Gyps rueppellii*, adulte, Rémuzat (Baronnies), Drôme, septembre 2003 (Christian Tessier). *Adult Rüppell's Vulture.*





49. Vautour de Rüppell *Gyps rueppellii*, adulte (en bas) et Vautours fauves *G. fulvus*, Rémuzat (Baronnies), Drôme, octobre 2003 (Jean-Philippe Paul). Adult Rüppell's with Griffon Vulture.



50. Vautour de Rüppell *Gyps rueppellii*, adulte, Rémuzat (Baronnies), Drôme, septembre 2003 (Frédéric Spada). Adult Rüppell's Vulture.



## ANNEXE 2 – LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non-homologation sont succinctement indiquées entre parenthèses.

### 2004

**Sarcelle élégante** *Anas formosa* – Eure – Léry-Poses, mâle, 31 octobre (description trop faible).

**Sarcelle à ailes bleues** *Anas discors* – Landes – Pontonx-sur-Adour, 2 juv., 5 août (Canards souchets en éclipse très probables).

**Fuligule à tête noire** *Aythya affinis* – Pas-de-Calais – Calais, fem. 1<sup>er</sup> hiver, phot., 17 janvier (hybride possible).

**Macreuse noire** *Melanitta nigra* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *americana* appelée « Macreuse à bec jaune » – Pyrénées-Atlantiques – Canet-en-Roussillon – mâle ad., phot., 24 novembre (description incomplète et photos difficilement exploitables pour éliminer une Macreuse noire classique).

**Garrot d'Islande** *Bucephala islandica* – Maine-et-Loire – Brion, mâle ad., 21 mars (description incomplète, confusion envisageable avec un Garrot à œil d'or immature).

**Érismature rousse** *Oxyura jamaicensis* – Vendée – Jard-sur-Mer, mâle ad. en éclipse, 4 novembre (le renflement du bec exclut une Érismature rousse pure).

**Grande Aigrette** *Egretta alba* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *modesta* – Aude – Gruissan – phot., 27 novembre (structure et taille excluent *modesta*, la coloration rouge des pattes existe aussi occasionnellement chez *alba*).

**Busard pâle** *Circus macrourus* – Haute-Saône – Sornay, fem. imm., 28 mars (des caractères de femelle des trois « busards gris » coexistent ici, une femelle subadulte de Busard St-Martin ne peut notamment être exclue ; axillaires non décrites).

**Buse pattue** *Buteo lagopus* – Marne – Giffaumont, juv., 20 novembre (description incomplète ; une Buse variable blanche, forme commune dans la région du lac du Der, ne peut être écartée) ; Val-d'Oise – Boisemont, 2 ind., 3 janvier (description insuffisante).

**Aigle pomarin** *Aquila pomarina* – Bouches-du-Rhône – Arles, 2 novembre (description insuffisante).

**Aigle impérial** *Aquila heliaca* – Alpes-Maritimes – Mercantour/St-Martin-Vésubie, subad./ad., 7 novembre (description trop mince).

**Faucon crécerellette** *Falco naumanni* – Var – Vinon-sur-Verdon, mâle, 18 février (description insuffisante) ; St-Maximin, 2 mâles imm., 1<sup>er</sup> août (description incomplète et conditions d'observation très moyennes).

**Faucon lanier** *Falco biarmicus* – Loire – Feurs, fem. subad., phot., du 14 juillet au 5 août (les photos montrent une moustache énorme et triangulaire : Faucon pèlerin, au pire un hybride).

**Faucon sacre** *Falco cherrug* – Aube – Marigny-le-Châtel et St-Flavy, ad., 15 avril (la description ne permet pas d'exclure un hybride) ; Haute-Corse – Col de la Serra, 30 avril (là encore, l'hypothèse d'un hybride ne peut être écartée) ; Marne – Lac du Der, imm., 8 février (des éléments en faveur de l'espèce proposée, mais néanmoins insuffisants pour un grand faucon).

**Marouette poussin** *Porzana parva* – Meuse – Étang du Grand Morinval, mâle, 4 octobre (l'absence de précision sur les barres des flancs et la coloration du bec ne permet pas d'exclure une Marouette de Baillon).

**Vanneau sociable** *Vanellus gregarius* – Aisne – Brancourt-le-Grand, 3 ind., 27 mars (description nettement insuffisante).

**Bécasseau semipalmé** *Calidris pusilla* – Gironde – Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, juv., 5 septembre (description insuffisamment détaillée pour exclure avec certitude un Bécasseau minute).

**Bécasseau de Bonaparte** *Calidris fuscicollis* – Landes – Pontonx-sur-l'Adour, 18 août (description insuffisante).

**Bécasseau falcinelle** *Limicola falcinellus* – Bouches-du-Rhône – Camargue : baisse des Cinq-Cents-Francs, juv., bague, 16 août (la taille et les teintes rousses évoquent un Bécasseau minute que les autres éléments fournis ne permettent pas d'exclure).

**Bécasseau rousset** *Tryngites subruficollis* – Loire-Atlantique – St-Brévin-les-Pins, juv., 12 septembre (la description incomplète ne permet pas d'exclure un Combattant varié).

**Bécassine double** *Gallinago media* – Aude – Pexiora, 28 juillet (conditions d'observation défavorables, rien n'exclut une Bécassine des marais *Gallinago gallinago*, et certains éléments, comme la longueur du bec, suggèrent cette espèce) ; Finistère – Guissény, 13 avril (description nettement insuffisante).

**Chevalier à pattes jaunes** *Tringa flavipes* – Landes – Pontonx-sur-l'Adour, du 3 août au 5 septembre (description nettement insuffisante).

**Mouette atricille** *Larus atricilla* – Finistère – Plovan, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 21 septembre (les photos montrent une Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*) ; Gironde – Banc d'Arguin/La Teste-de-Buch, 2<sup>e</sup> hiver, 24 janvier (description insuffisante).

**Goéland railleur** *Larus genei* – Rhône – Lyon, 11 ad., 27 mai.

**Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis* – Charente-Maritime – Aytré, ad., 4 décembre (description imprécise, les éléments fournis ne permettent pas d'emporter le diagnostic) ; Loire-Atlantique – St-Brévin-les-Pins, ad., 15 novembre (description insuffisante).

**Goéland d'Amérique** *Larus smithsonianus* – Manche – Granville, 1<sup>er</sup> hiver, 3 février (des éléments diagnostiques n'ont pas été notés).

**Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides* – Finistère – Penmarch, 1<sup>er</sup> hiver, 13 janvier (la description ne permet pas d'exclure un Goéland bourgmestre, voire un Goéland argenté leucique).

**Sterne de Forster** *Sterna forsteri* – Charente-Maritime – Île de Ré : St-Clément-des-Baleines, 1<sup>er</sup> hiver, 24 octobre (description insuffisante).

**Engoulevent à collier roux** *Caprimulgus ruficollis* – Bouches-du-Rhône – Vallée des Baux-de-Provence : Le Mazet, chant ent., 14 juin. (Le chant décrit est bien celui de cette espèce, mais il est impossible de se prononcer avec certitude sur son origine ; un enregistrement utilisé par un ornitho en quête de l'espèce n'a notamment pas pu être écarté ; rappelons qu'un oiseau avait été découvert mort non loin de là en juin 1997, ce qui constitue la seule mention de l'espèce pour le xx<sup>e</sup> siècle [Badan *et al.* 1998]. Un nouvel oiseau a été trouvé écrasé dans la Drôme en 2005 [V. *Ornithos* 12-4 : 220]).

**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava* – Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans » – Bouches-du-Rhône – Maussane, 7 mâles, 7 mai (absence de plusieurs critères) ; Sarthe – La Ferté-Bernard, mâle ad., 29 avril (absence de plusieurs critères) ; Savoie – Le Bourget-du-Lac, fem. ad., 6 avril (description insuffisante et cri ne correspondant pas).

**Traquet isabelle** *Oenanthe isabellina* – Finistère – Crozon, 11 octobre (absence d'éléments concernant la structure, la posture, le bec, la queue).

**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *samamiscus* – Loire-Atlantique – Pen Bron/La Turballe, mâle ad. en plumage nuptial, 11 novembre (le plumage nuptial étonnamment attardé ne peut-il expliquer l'aspect de la tache blanche de l'aile : usure extrême, mue anormale de l'aile seulement ? En tout état de cause, il est impossible d'homologuer *samamiscus* d'après un oiseau présentant une telle aberration de mue à l'automne, au regard des problèmes soulevés au printemps par les rougequeues dont nous avons de larges preuves d'hybridation entre les deux espèces nichant en France).

**Pouillot à grands sourcils** *Phylloscopus inornatus* – Ain – Serrières-de-Briare, 11 novembre ; Bouches-du-Rhône – Camargue : La Gachole, mâle, 14 mars ; Hautes-Pyrénées – Puydarieux, 10 février (description insuffisante).

**Pouillot véloce de type sibérien** *Phylloscopus collybita* – Doubs – Avasse, 29 février (description insuffisante).

**Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *yakutensis* – Jura – Desnes, 5 septembre (l'identification certaine de *yakutensis* ne semble pas d'actualité *in natura* en Europe de l'Ouest au regard des connaissances actuelles).

**Bruant à calotte blanche** *Emberiza leucocephalos* – Charente-Maritime – St-Georges-de-Didonne, 23 février (observation trop brève, d'où une description insuffisante).

## 2003

**Oie des neiges** *Anser caerulescens* – forme bleue – Oise – Le Plessis-Brion et Longueil-Ste-Marie – ad., du 12 avril au 16 mai (impossible d'exclure totalement un hybride).

**Garrot d'Islande** *Bucephala islandica* – Nord – Loon-Plage – mâle ad., 7 décembre (description trop mince).

**Chevalier à pattes jaunes** *Tringa flavipes* – Charente-Maritime – Île d'Oléron : St-Pierre-d'Oléron, ad., phot., 24 juillet (manque d'éléments que la photo ne permet pas de pallier pour emporter le diagnostic).

**Goéland à ailes blanches** *Larus glaucooides* – Pas-de-Calais – Boulogne-sur-Mer, ad., 22 février (ambiguïté concernant la taille de l'oiseau : la très grande rareté des adultes de cette espèce exige une description sans faille).

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* – Individu présentant les caractéristiques du groupe *tristis/fulvescens* – Rhône – St-Priest, chant., vidéo, du 26 novembre au 3 décembre (présence trop importante de vert d'après la vidéo).

## 2002

**Grande Aigrette** *Egretta alba* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *modesta* – Loir-et-Cher – Marcilly-en-Gault – phot., vidéo, 15 septembre (structure et taille excluent *modesta*, la coloration rouge des pattes existe aussi chez *alba*).

**Buse féroce** *Buteo rufinus* – Bouches-du-Rhône – Camargue : Roquemaure – 1<sup>er</sup> février (description incomplète notamment en ce qui concerne parties inférieures, silhouette et type de vol).

**Buse pattue** *Buteo lagopus* – Aube – Bailly-le-Franc – fem. juv. probable, 3 novembre (éléments contradictoires par rapport aux conditions d'observation).

**Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *magna* – Lot-et-Garonne – La Mazière/Aiguillon, capt., phot., 7 septembre (il est impossible d'exclure la sous-espèce *wolffii* qui présente une grande taille, une gorge fréquemment toute bleue ou ponctuée de blanc, une absence de collier noir [Zucca & Jiguet 2002]).

**51. Bartramie des champs** *Bartramia longicauda*, juvénile, Ouessant, Finistère, septembre 2004 (Aurélien Audevard).  
*Juvenile Upland Sandpiper.*



## 2001

**Grande Aigrette** *Egretta alba* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *modesta* – Gironde – Le Teich, phot., du 18 novembre au 6 décembre (structure et taille excluent *modesta*, la coloration rouge des pattes existe aussi chez *alba*).

**Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *hafizi* – Lot-et-Garonne – La Mazière/Aiguillon, capt., phot., 1<sup>er</sup> septembre (*hafizi* ne diffère pas seulement de *megarhynchos* par sa longueur alaire, il a notamment une queue rousse, longue, qui contraste avec le reste du corps, et surtout des liserés crème sur les rémiges tertiaires et les couvertures alaires, et un sourcil très marqué, son comportement et son jizz à l'automne rappellent un Agrobate roux en plumage usé).

**Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *magna* – Lot-et-Garonne – La Mazière/Aiguillon, capt., phot., 27 septembre et non le 17 septembre comme signalé précédemment (*Ornithos* : 10-2 : 81) ; à noter que cette donnée a fait l'objet d'un réexamen (la sous-espèce *wolffi* ne peut être écartée ; par ailleurs, la possibilité d'une *svecica* sans miroir existe aussi, comme 8 % de chaque population de cette espèce [Zucca & Jiguet 2002, Cramp 1988]).

## 1991

**Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus* – Pas-de-Calais – Cap Gris-Nez/Audinghen, 241 ind., du 6 au 8 septembre (donnée insuffisamment documentée pour permettre d'éliminer des Labbes parasites parmi sans doute un certain nombre de Labbes à longue queue, mais combien ?).

### Annexe 3 – Catégorie E

Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la liste française ni dans la catégorie D, mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour.

• **Sarcelle cannelle** *Anas cyanoptera* – Indre-et-Loire – Rillé, mâle ad., 18 avril (N. Issa) ; Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu/St-Lumine-de-Coutais, mâle, phot., 6 avril (S. Reeber *et al.*) ; 2003 Gironde – Bruges, mâle, phot., 8 avril (P. Grisser *et al.*) ; 2003 Indre-et-Loire – Rillé, fem. ad., du 26 juillet au 5 août (N. Issa, A. Liger, J. Prément) ; 2003 Yvelines – Le Perray-en-Yvelines, mâle ad. (le même qu'en 2002, du 22 février au 21 avril (L. Chevallier, C. Letourneau *et al.*) ; 2002 Yvelines – Le Perray-en-Yvelines, mâle ad., du 10 au 17 mars (L. Chevallier, C. Letourneau *et al.*). L'accroissement récent des mentions de cette espèce est à noter ; un phénomène similaire est observé en Espagne (R. Gutierrez *in litt.*)...

• **Harle couronné** *Lophodytes cucullatus* – 2001 Isère – Courtenay, 3 fem. au moins, phot., du 4 novembre au 13 mars 2002 (C. Deliry *et al.*). Bien que l'espèce figure en catégorie D, ces individus sont placés en catégorie E, les éléments fournis indiquant que l'origine captive de ce groupe est probable.

• **Marabout d'Afrique** *Leptoptilos crumeniferus* – 1996 Sarthe – St-Jean-du-Bois, phot., 26 novembre (C. Kerihuel).

• **Faucon de l'Amour** *Falco amurensis* – 1984 Lot – Rocamadour, mâle ad., phot., 12 mai (A. Dalmolin *in* F. Jiguet). Ce faucon trouvé au Rocher des Aigles de Rocamadour a été obtenu à Sète, Hérault, sans que les conditions de l'obtention aient été précisées. Il a été relâché le 25 juillet 1984 après avoir récupéré ses aptitudes au vol. Cet oiseau a été retrouvé groggy suite à un choc avec une voiture en Angleterre au cours de l'été, puis relâché et enfin tué par un garde-chasse le 17 septembre toujours en Angleterre. Un article retraçant l'épopée de ce Faucon de l'Amour paraîtra prochainement dans *Ornithos*. Compte tenu des origines douteuses de cet oiseau, la CAF n'a pas inscrit cette espèce sur la Liste des oiseaux de France.

• **Grue demoiselle** *Grus virgo* – Saône-et-Loire – Fretterans, du 26 mai au 31 août (S. Mezani *et al.*). Bien que l'espèce figure en catégorie D, cet individu est mis en catégorie E compte tenu de son comportement peu farouche et de ses bagues colorées indiquant une origine captive probable.

• **Étourneau soyeux** *Sturnus sericeus* – 2002 Paris – Parc des Buttes-Chaumonts/19<sup>e</sup> arr., phot., du 25 au 31 mai au moins (G. Bertier).

### REMERCIEMENTS

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 2004, ont contribué à son fonctionnement :  
• la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière attribuée au secrétariat du Comité, et nécessaire à son fonctionnement,

• la revue *Ornithos* pour la prise en charge du coût des photos en couleurs qui illustrent ce rapport,

• Carl Zeiss Division Jumelles pour le soutien apporté à la publication du rapport annuel,

• Jean-François Arcanger, Aurélien Audevard, Philippe J. Dubois, Stéphane Duchateau, Nidal Issa, Yves Kayser, Robert Lécaille, Dominique Michelat, Georges Oliosio, Sébastien Reeber, Julien Thurel, Maxime Zucca qui nous ont apporté leur aide et/ou des informations complémentaires,

- tous les responsables de Centrales Ornithologiques, de Comités d'Homologation Régionaux (CHR) ou Départementaux (CHD) qui nous ont transmis des données,
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

## BIBLIOGRAPHIE

- BADAN O., KOWALSKI H. & KAYSER Y. (1998). Première mention d'un Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis* en France pour le XX<sup>e</sup> siècle. *Ornithos* 5-4 : 192-193.
- CADE M. & WALKER D. (2004). Eastern Subalpine Warblers in spring 2004. *Birding World* 17 (5) : 202-203.
- CRAMP S. (1988). *The Birds of the Western Palearctic*. Vol. V. Oxford University Press, Oxford.
- DEAN A.R. & SVENSSON L. (2005). 'Siberian Chiffchaff' revisited. *British Birds* 98 (8) : 396-410.
- DESMOTS D, PONTON A, TAPIN R. & VASLIN M. (2004). Première tentative de nidification du Goéland railleur *Larus genei* sur le littoral atlantique français, en Vendée. *Ornithos* 11-6 : 316-318.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P. (2001). *Inventaire de la Faune de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan, Paris.
- DUBOIS P.J., YÉSOU P. & LE CHN (1995). Les Pouillots véloces *Phylloscopus collybita* de type *tristis/fulvescens* en France : statut et critères d'acceptation par le CHN. *Ornithos* 2-4 : 170-174.
- DUPUY D. & DUPUY J.-L. (2000). Premier cas de nidification du Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* en France (Alpes-Maritimes). *Ornithos* 7-4 : 174-179.
- GONIN J. & ZUCCA M. (2005). Afflux de Gobemouches à collier *Ficedula albicollis* dans le sud-est de la France au printemps 2004. *Ornithos* 12-2 : 94-101.
- JIGUET F. & LA CAF (2004). En direct de la CAF. Décisions récentes prises par la Commission de l'Avifaune Française. *Ornithos* 11-5 : 230-245.
- MICHELAT D. (2005). Une nouvelle espèce nicheuse pour l'avifaune française : l'Aigle pomarin *Aquila pomarina*. *Ornithos* 12-6 : 310-320.
- ROGERS M.J. & THE RARITIES COMMITTEE (2001). Report on rare birds in Great Britain in 2000. *British Birds* 94-10 : 452-504.
- ROGERS M.J. & THE RARITIES COMMITTEE (2005). Report on rare birds in Great Britain in 2004. *British Birds* 98-12 : 628-694.
- ZUCCA M. & JIGUET F. (2002). La Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* en France : nidification, migration et hivernage. *Ornithos* 9-6 : 242-252.

## SUMMARY

**Rare birds in France in 2004.** *Two new species were added to the French List in 2004 : Royal Tern *Sterna maxima* and Semi-collared Flycatcher *Ficedula semitorquata*. Furthermore, two subspecies were added to this list : Oriental Subalpine Warbler *Sylvia cantillans albirostrata* and Two-barred Greenish Warbler *Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus* ; 2004 also included the first Ruppell's Griffon Vulture *Gyps rueppellii* (Category D) for France. A Brown Shrike *Lanius cristatus* was the second French record, a Lesser Sand Plover *Charadrius mongolus* and a Ross's Gull *Rhodostethia rosea* were the fourth for both. This was also an exceptional year for eagles with (in addition to traditional Spotted Eagles *Aquila clanga*) : the third Steppe Eagle *A. nipalensis*, the eighth Imperial Eagle *A. heliaca*, the seventh Spanish Imperial Eagle *A. adalberti* and the first breeding of Lesser Spotted Eagle *A. pomarina*. Pallid Harrier *Circus macrourus* experienced its best ever number of individuals (11 birds) since its consideration by the French Rarities Committee (FRC). Two Upland Sandpipers *Bartramia longicauda* were seen in 2004 (sixth and seventh records for France), though this species had not been observed for 12 years, whilst Cream-coloured Courser *Cursorius cursor* (ninth record for France) had not been recorded for 14 years. Of interest was a Bonaparte's Gull *Larus philadelphia*, which overwintered for the first time. The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of French records and individuals (excluding 2004) ; the second pair relate the same thing for the period 1981-2003 ; the last pair relate to the current year (i.e. 2004).*

Jean-Yves Frémont, Secrétariat du CHN, 58 rue Laugier, 75017 Paris ([jeanyves.fremont@noos.fr](mailto:jeanyves.fremont@noos.fr))

Comité d'Homologation National c/o LPO, La Corderie Royale, BP 90263, 17305 Rochefort Cedex ([chn@lpo.fr](mailto:chn@lpo.fr))



Le rapport annuel du Comité d'Homologation National (CHN) est publié avec le soutien de Carl Zeiss Division Jumelles