



Les oiseaux rares en France en 2005



24^e rapport du Comité d'Homologation National

Jean-Yves Frémont, Sébastien Reeber & le CHN

Ce 24^e rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 2005. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 2005 est de 513 (chiffre supérieur à 2004 malgré le retrait de deux espèces de la liste des espèces soumises à homologation nationale : l'Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* et le Vautour moine *Aegypius monachus*. Le taux d'acceptation est de 86,7 %, légèrement inférieur à celui de l'année précédente (87,2 %). Comme nous le soulignons dans le précédent rapport, le nombre global de fiches examinées par le CHN est en fait nettement plus élevé, puisque le comité est sollicité notamment par la Commission de l'Avifaune Française (CAF) qui lui demande son avis sur d'anciennes données antérieures à la création du CHN (parfois du XIX^e siècle) avant de les inscrire éventuellement sur la Liste des Oiseaux de France, mais aussi de temps en temps par des comités régionaux ou de simples observateurs. Ces données n'entrent bien sûr pas dans les chiffres mentionnés ci-dessus.

En 2005, Dominique Michelat a achevé son mandat. Comme nous l'avons expliqué l'an dernier, dans le but de remplacer notre collègue et ami Gaël Rault qui nous a tragiquement quittés en début d'année 2003 (et à qui il restait 6 ans à accomplir au sein du CHN), il a été décidé de repousser d'une année la fin du mandat de chacun des 6 prochains membres sortants. C'est ainsi que Guy Flohart est resté membre pour l'année 2005. Pierre Crouzier et Jean-Yves Frémont ont été, pour leur part, reconduits dans leur fonction respective de Président et de Secrétaire du CHN. En 2005, le CHN se composait donc des membres suivants : Pierre Crouzier (président), Marc Duquet, Amine Flitti, Guy Flohart, Jean-Yves Frémont (secrétaire), Yves Kayser, Alain Rouge et Vincent Palomares. Pour se mettre en conformité avec les directives de l'AERC qui prévoient notamment que les comités européens soient de préférence composés de 8 membres, aucun candidat n'a remplacé Dominique Michelat qui a donc cessé ses fonctions en 2005. En 2006, Guy Flohart est parvenu, à son tour, au terme de son mandat. Philippe J. Dubois et Sébastien Reeber ont été élus. Pour 2008, un poste sera à pourvoir : les candidats à ce poste sont priés de se faire connaître auprès du Secrétaire du CHN avant le 1^{er} mars 2008.

TRAVAUX ET DÉCISIONS DU CHN

Révisions de fiches

Comme annoncé dans les précédents rapports, des révisions ont été engagées à la demande de la Commission de l'Avifaune Française (CAF) notamment concernant les taxons nouvellement élevés au rang d'espèce. C'est ainsi que toutes les données de la Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* ont été révisées. Pour ce faire, l'aide de notre spécialiste national en matière de pies-grièches, Norbert Lefranc, a été précieuse (Lefranc 2007). Toutes les données françaises sont reprises dans ce rapport. La révision de toutes les données du Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* a, elle aussi, été entreprise et est actuellement en cours au vu des nouveaux critères maintenant connus et de la solide expérience de terrain d'un certain nombre des membres du CHN. Enfin, la révision des quelques mentions françaises de Bernaches de Hutchins *Branta hutchinsii* est en voie d'achèvement. Un compte rendu concernant ces révisions sera également publié dans un prochain rapport.

Révision de la liste des espèces soumises à homologation nationale

Le CHN a décidé de réviser la liste des espèces soumises à homologation nationale. Au fil des années, le nombre de fiches lui ayant été soumises a beaucoup augmenté. En effet, grâce aux recherches passionnées des ornithos de terrain et à la compilation de leurs données par le CHN, certaines espèces ont, en une vingtaine d'années, vu leur statut évoluer. Beaucoup mieux connues, elles sont désormais observées en France de manière régulière sur les sites favorables aux périodes les plus propices. Par ailleurs, leurs critères d'identification sont désormais bien connus et largement publiés. La plupart d'entre elles ont d'ailleurs donné lieu à plus d'une centaine de données au cours des dix dernières années. Les 16 espèces suivantes ne seront donc plus soumises à homologation nationale.

- Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*
- Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*
- Faucon crécerellette *Falco naumanni*
- Faucon d'Éléonore *Falco elenorae*
- Marouette poussin *Porzana parva*
- Talève sultane *Porphyrio porphyrio* (de la sous-espèce type seulement)
- Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*
- Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*
- Goéland railleur *Larus genei*
- Goéland d'Audouin *Larus audouinii*
- Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*
- Pipit de Richard *Anthus richardi*
- Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*
- Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (de la sous-espèce *tristis* et de type sibérien)
- Gobemouche nain *Ficedula parva*
- Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*

Cette décision a pris effet rétroactivement au 1^{er} janvier 2006 (Crouzier & le CHN 2006). Les données concernant ces espèces seront désormais collectées par le Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR) et, là où ils existent, par les Comités d'homologation régionaux ou départementaux.

Enfin, l'Oie de taïga *Anser fabalis fabalis* suit le chemin inverse. Devenue rare en France (Dronneau 2006), elle est soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006. La liste révisée des espèces soumises à homologation nationale est disponible sur le site du CHN (<http://www.lpo.fr/homologation>).

Fiches d'homologation

Délai d'envoi des fiches. Le CHN rappelle une nouvelle fois qu'il est recommandé de rédiger la fiche (modèle à télécharger sur le site du CHN) dès que possible après l'observation – que vous soyez le découvreur ou simple observateur – et cela avant le 31 décembre de l'année en cours. Cela évite la publication très tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues. Trop de données restent encore dans les carnets de leur(s) observateur(s). Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour faire parvenir une fiche au secrétariat, même après plusieurs années. Le secrétariat du CHN est désormais informatisé et il est à cet égard recommandé d'envoyer ses données par messagerie électronique (chn@lpo.fr), ceci permet de gagner du temps dans le traitement des données et donc dans l'information des observateurs ainsi que dans les futures publications.

Fiche et photos. Il est également important de souligner une nouvelle fois qu'en dépit du développement rapide de la digiscopie et des nombreuses images d'oiseaux occasionnels qu'elle génère, rien ne peut remplacer une bonne description écrite. Les films et les photographies, numériques ou argentiques, les enrichissent réellement et s'avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement.

Le CHN conseille donc aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, fondées seulement sur une ou même plusieurs images, aussi bonnes soient-elles.

Prise en compte des données. Rappelons enfin que dans un souci de validation homogène des données, seules celles validées par un comité d'homologation nationale sont prises en compte pour la publication de synthèses nationales et européennes concernant une espèce.

LES FAITS MARQUANTS

En 2005, deux espèces ont été ajoutées à la Liste des Oiseaux de France : la Bécassine de Wilson *Gallinago delicata* et le Martinet ramoneur *Chaetura pelagica* (Trévoux 2007). Plusieurs espèces enregistrent leur deuxième mention, il s'agit du Pétrel gongon/de Madère *Pterodroma feae/madeira* (Dubois 2007), de la Marouette de Caroline *Porzana carolina* et du Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus* (la dernière observation de coulicou en France remontait à 1957 !). On remarquera aussi la troisième donnée de la Sterne de Forster *Sterna forsteri*, de l'Hypolaïs obscure *Hippolais opaca* et du Goglu des prés *Dolichonyx oryzivorus*. Certaines espèces se sont signalées par leur nombre exceptionnel : Faucon crécerellette *Falco naumanni* (827 individus), Mouette atricille *Larus atricilla* (7), Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (130) et Roselin githagine *Bucanetes githagineus* (4). Enfin, la clôture de l'étude d'une donnée d'Hypolaïs rama *Hippolais rama* de 2000, permet à cette espèce d'être inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A & C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants à l'exclusion de l'année 2005, les deux suivants les données homologuées depuis 1981 (2005 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 2005.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus (pour les données printanières, une précision est fournie seulement quand l'oiseau n'est pas en plumage nuptial adulte).
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), enregistré en vidéo (vidéo) ou en audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche¹ et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention « *et al.* » indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question.
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste officielle des Oiseaux de France (CAF 2007).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Sauf indication contraire, les données se rapportent à 2005. Les données présentées sont la propriété des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Oie à bec court – un adulte au lac de Rillé, Indre-et-Loire, du 14 au 28 février (N. Issa *et al.*, in Frémont *et al.* 2007).

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (150/1 058) (53/219 – 7/7)

Charente-Maritime – Réserve naturelle de Moëze-Oléron, Moëze et Saint-Froult, ad., phot., du 16 au 18 février (J. Gonin), ad., phot., du 19 octobre au 3 mars 2006 (P.-P. Évrard, J. Gonin *et al.*).

Indre-et-Loire – Lac de Rillé, Rillé, ad., phot., du 14 au 28 février (N. Issa *et al.*).

Maine-et-Loire – Bouchemaine, 1^{er} hiver, phot., 1^{er} et 2 octobre (A. Fossé, F. Halligon *et al.*).

Marne – Lac du Der, Giffaumont-Champaubert, 1^{er} hiver, phot., 20 novembre (B. Segerer *et al.*).

¹ Depuis le précédent rapport, et pour des raisons pratiques, ne figurent désormais que le nom du ou des observateur(s) ayant rédigé une fiche d'homologation ou fourni des images, constituant les archives du CHN. Les données publiées dans des revues ou sur Internet peuvent être prises en compte et examinées par le CHN ; la référence bibliographique de ces données est alors indiquée en lieu et place du nom des observateurs.

Vendée – Baie de l'Aiguillon, digue des Wagons, Saint-Michel-en-l'Herm, 1^{er} hiver, 16 janvier (A. Thomas *et al.*), ad., 10 décembre (A. Thomas *et al.*).

2004 Nord – Le Clipon, Loon-Plage, 4 ad., 10 octobre (A. Lepretre *et al.*).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). La différence importante existant entre les moyennes du nombre de données (un peu plus de 3) et d'individus (quasiment 12) depuis 1987 (année de prise en compte de l'espèce par le CHN), reflète bien les arrivées de groupes d'oiseaux dues aux vagues de froid. Ce n'est pas le cas cette année. Mis à part la Marne, ce sont les départements de l'ouest qui ont accueilli l'espèce, ce qui est sans doute à mettre en relation avec les nicheurs islandais hivernant dans le nord-ouest de la Grande-Bretagne. Cela dit, on peut se demander si les oies de Moëze et de la baie de l'Aiguillon ne sont pas celles vues en début d'année 2005. Dans le doute, elles ont été considérées comme de nouveaux oiseaux.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (88/45) (88/45 – 8/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *nigricans*, appelée « Bernache du Pacifique ».

Finistère – Anse de Tressény, Guissény, ad., phot., du 26 janvier au 1^{er} mars (F. Barrault, P.J. Dubois).

Gironde – Bassin d'Arcachon : île aux Oiseaux, La Teste-de-Buch, ad., du 14 au 30 janvier ; ad., phot., du 7 décembre au 21 janvier 2006 (J. Gernigon).

Manche – Genêts, ad., 15 janvier (S. Provost *et al.*).

Vendée – Île de Noirmoutier : le Luzan, Noirmoutier-en-l'île, du 20 au 28 janvier ; 26 octobre ; 2 ind., 23 décembre puis 1 seul le 26 décembre (D. Desmots) ; Sébastopol, Noirmoutier-en-l'île, ad., phot., 23 septembre (G. Réthoré, C. Tessier *et al.*).

2004 Charente-Maritime – Île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines et Martray, 3 ad., 22 novembre et 4 ad., 24 décembre, phot., (A. & A. Chabrolle).

2004 Côtes-d'Armor – Baie de la Fresnaye, Port-à-la-Duc, 2 ad., phot., 6 novembre (A. Chabrolle).

2004 Vendée – Île de Noirmoutier : le Luzan, Noirmoutier-en-l'île, du 6 au 10 décembre (D. Desmots).

2004 Vendée – Île de Noirmoutier : la Berche, Barbâtre, 8 décembre (J. Thurel).

2003 Charente-Maritime – Île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines, de 1 à 5 ad. dont 2 accouplés à des Bernaches cravants « à ventre sombre » *B. b. bernicla*, accompagnés respectivement de 4 et 5 jeunes, phot., du 8 novembre au 5 mars 2004 (A. & A. Chabrolle *et al.*).

2001 Pas-de-Calais – Platier-d'Oye, Oye-Plage, ad., phot, 11 novembre (S. Chambris *et al.*).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Pour 2005, seuls les oiseaux du Finistère et de Gironde ont été comptabilisés comme de nouveaux oiseaux (celui de Gironde sera d'ailleurs revenu l'hiver suivant) ; par ailleurs, un seul a été ajouté à la liste en automne 2004 sur les deux présents dans les Côtes-d'Armor, département qui n'avait accueilli qu'un individu en janvier 2004. On peut penser que des déplacements ont lieu au cours de l'hiver et qu'il devient très difficile d'obtenir une comptabilité exhaustive de ces bernaches. La présence d'hybrides issus de couples mixtes avec des Bernaches cravants « à ventre sombre » et de plus en plus nombreux ajoute à la complexité de la situation. De ce fait, la Bernache du Pacifique a été retirée de la liste des espèces ou sous-espèces soumises à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis* (38/39) (22/21-1/1)

Bouches-du-Rhône – Camargue : Grau de Piémanson, ad., du 15 au 23 mars (Y. Kayser *et al.*).

(Sibérie). Cinq oiseaux ont hiverné en Italie dans le delta du Po et ont quitté les lieux début mars (J. Piette *in litt.*) ; faut-il y voir une relation avec l'observation camarguaise ?

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (43/42) (40/39 – 5/4)

Bouches-du-Rhône – Camargue : Consécanière, mâle ad., phot., 26 février (P.-A. Crochet *et al.*).

Eure – Igoville, fem./imm., 16 et 17 octobre (Y. Créau *et al.*).

Finistère – Baie de Goulven, mâle ad., phot., du 30 octobre au 25 février 2006 (F. Barrault, Y. Le Corre *et al.*).

Somme – Hâble d'Ault, Woignarue, mâle, du 26 mars au 3 avril, mâle (oiseau différent), 28 mars (P. Decory, T. Rigaux *et al.*).

(Amérique du Nord). Année nettement au-dessus de la moyenne (un peu moins de 2 oiseaux par an depuis 1981, année de prise en compte de l'espèce par le CHN) et intéressante aussi par la localisation des observations (de la Somme – qui réunit d'ailleurs 2 mâles en même temps – à la Camargue). L'oiseau de la baie de Goulven, lui, était déjà connu.

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (46/35) (45/34 – 2/2)

Charente-Maritime – Baie de l'Aiguillon, Charron, mâle, du 6 au 22 janvier (P. Trotignon).

Seine-et-Marne – Meaux, mâle, phot., 5 et 6 novembre (S. Chambris, S. Vincent *et al.*).

(Amérique du Nord). Année classique, il semble toutefois que la réserve de Saint-Denis-du-Payré, Vendée, fréquentée de longue date par l'espèce ait été désertée.

SARCELLE MARBRÉE *Marmaronetta angustirostris* (33/70) (14/14 – 1/2)

Vendée – Pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer, 2 ind., 18 juin (P. Yésou).

(Méditerranée, Moyen-Orient, nord de l'Inde). À noter qu'un juvénile avait déjà été observé en août 2004 dans ce même secteur de la Vendée...

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris* (142/121) (134/113 – 1/1)

Doubs – Bonnevaux, mâle, phot., du 26 au 31 mars (L. Bellingheri, D. Michelat).

2004 Finistère – Étang du Poulinoc, Saint-Renan, mâle, phot., du 15 au 17 avril (F. Barrault, M. Champion).

2004 Yvelines – Base de loisirs, Lavacourt, mâle ad., phot., du 12 décembre au 20 février 2005 (B. Lebrun, H. Pottiau).

(Amérique du Nord). Année très faible, il faut remonter à 1990 pour trouver un tel effectif ! Pour mémoire, la moyenne annuelle depuis 1981, date de la création du CHN, est de 8 données et 8 individus ! La mention du Finistère parvenue tardivement nous rappelle qu'une femelle avait hiverné sur le même site les années précédentes. Rappelons que l'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (51/53) (29/31 – 3/6)

Vendée – La Terrière, la Tranche-sur-Mer, mâle 2^e hiver, du 4 au 26 février, fem. 2^e hiver, du 4 février au 18 mars, 2 fem. imm., du 10 au 19 février (P. Trotignon *et al.*), mâle ad. et fem., 15 avril (A. Thomas).

(Amérique du Nord). Hivernage remarquable sur ce site traditionnel pour l'espèce. Pour mémoire, un 7^e oiseau, un mâle immature, a séjourné du 20 décembre 2004 au 15 janvier 2005 (V. rapport précédent) et doit être considéré comme un oiseau différent du mâle 2^e hiver de février 2005 (A. Thomas *in litt.*).

ALBATROS À SOURCILS NOIRS *Thalassarche melanophrys* (8/8) (8/8 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Créac'h, 2^e été probable, 21 octobre (A. de Broyer *et al.*).

(Mers australes). Enfin un albatros à Ouessant pendant « la grand-messe » d'automne ! Celui-ci a eu la bonne idée de patrouiller environ 20 minutes devant la côte, ce qui n'a malheureusement pas permis à tous les observateurs d'arriver à temps... La dernière observation de l'espèce remonte au 14 septembre 2002 au large des Sables-d'Olonne en Vendée ; il s'agissait alors d'un adulte.



1. Oie à bec court
Anser brachyrhynchus,
Moëze-Oléron,
Charente-Maritime,
novembre 2005
(Julien Gonin).
Pink-footed Goose.

PUFFIN DE MACARONÉSIE *Puffinus baroli* (49/64) (42/57 – 1/1)**Finistère** – Île d'Ouessant : pointe de Pern, 25 août (A. Audevard).

(Madère, Salvages, Canaries et Açores). Une seule donnée pour cette année, aucune en 2004, on est loin de la « folie » des années 1999 à 2001, où les ornithos embarquaient sur les ferries reliant la Grande-Bretagne à l'Espagne pour voir l'espèce... Rappelons qu'il s'agit ici de l'ex-Puffin semblable (Jiguet *et al.* 2007).

OCÉANITE DE CASTRO *Oceanodroma castro* (3/3) (3/3 – 1/1)**Nord** – Le Clipon, Loon-Plage, 17 septembre (J. Boulanger *et al.*).

(Atlantique et Pacifique, colonies les plus proches aux Canaries, à Madère et au Portugal). Il s'agit de la première observation effectuée depuis la côte. Les précédentes concernaient un oiseau trouvé mort en Ardèche le 7 octobre 1984 après le passage d'une queue de cyclone tropical, un individu observé près de Hoëdic, Morbihan, le 15 octobre 1987 et un au large des Sables-d'Olonne, Vendée, le 16 août 1988.

PÉTREL GONGON/DE MADÈRE *Pterodroma feae/madeira* (1/1) (1/1 – 1/1)**Pas-de-Calais** – Cap Gris-Nez, Audinghen, 29 septembre (L. Scalabre *et al.*).

(Îles du Cap-Vert, Madère). Deuxième observation d'un *Pterodroma*, au même endroit et à la même époque que la précédente, le 9 septembre 2001. Une note vient d'ailleurs d'être publiée dans *Ornithos* sur cette observation qui constituait une première française (Dubois 2007).

FRÉGATE INDÉTERMINÉE *Fregata sp.* (3/3) (3/3 – 1/1)**Côtes-d'Armor** – Port-Blanc, Penvenan, mâle ad., 8 novembre (P. Mell, J.-C. Jézéquel *vide* G. Bentz).

(Mers tropicales). Peut-être une Frégate superbe *Fregata magnificens*, mais la description fournie n'a pas permis de préciser l'espèce. À signaler qu'une Frégate superbe a été trouvée épuisée également en novembre en Angleterre (Eaton *et al.* 2005)... Il n'existe que deux mentions de cette espèce en France – l'une au XIX^e siècle et l'autre au XX^e siècle (avant 1981, date de création du CHN) –, et trois autres mentions de Frégate indéterminée depuis 1981. Cette donnée se situe à la même période que l'afflux de Mouettes atricilles et de Mouettes de Franklin qui s'est produit en Europe.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (71/174) (63/166 – 10/34)**Ain** – Plaine de l'Ain, ad., phot., du 6 juin au 14 août (J.-B. & P. Crouzier *et al.*).**Allier** – La Grange, Villeneuve-sur-Allier, ad., phot., du 2 au 7 octobre (D. Houston *et al.*).**Ardennes** – La Neuville-en-Tourne-à-Fouy, ad., phot., du 4 au 21 septembre (E. Leguay, F. Lepage, S. Paris *et al.*).**Bouches-du-Rhône** – Lançon-de-Provence, ad., 1^{er} novembre (J. & M.-J. Marchand) ; Camargue : La Bomborinette, ad., 19 et 20 novembre (Y. Kayser *et al.*).**Isère** – Saint-Didier, ad., 7 mars (O. Sousbie).**Landes & Pyrénées-Atlantiques** – Localités tenues secrètes, 12 couples produisent 20 jeunes à l'envol (F. Delage, S. Duchateau & le Groupe Élanion Aquitaine).**Meurthe-et-Moselle** – Boucq, ad., phot., 2 et 3 avril (K.-H. Heyne *et al.*).**Pyrénées-Orientales** – Saint-Cyprien, ad., 25 septembre (F. Legendre *et al.*).**Rhône** – Saint-Laurent d'Agny, un couple ayant produit 4 jeunes à l'envol, du 30 avril au 5 mai au moins (D. Tissier, V. Rolland-Commarmot *et al.*).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). L'Élanion blanc continue son expansion sur notre territoire quand on regarde le nombre de données et de départements concernés, avec parfois une nidification réussie comme celle, remarquable, qui



2. Élanion blanc *Elanus caeruleus*, La Neuville-en-Tourne-à-Fouy, Ardennes, septembre 2005 (Frédéric Lepage). *Black-shouldered Kite*.

a eu lieu en 2005 dans le Rhône (Dubois 2006). La donnée de Meurthe-et-Moselle est-elle à mettre en relation avec l'observation d'un oiseau les 29 et 30 mars près de Mons en Belgique (J. Piette *in litt.*) ? Il s'agit en tout cas d'une première pour la Lorraine (T. Besançon *in litt.*). En revanche, dans le noyau originel du Sud-Ouest, on note cette année un fléchissement avec 12 couples contre 16 en 2004. Un cas de nidification a toutefois été rapporté de Gironde (un jeune volant) par le groupe Élanion, mais n'a pu être pris en considération pour l'instant faute d'éléments (P. Grisser comm. pers.).

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (32/31) (30/29 – 0/0)**2004 Cantal** – Vassivière, Laveissière, 3 ind., phot., 18 juillet (H. Verne).**2004 Haute-Savoie** – Le Hucel, Thollon-les-Mémises, 7 mars (J.-P. Jordan *et al.*).**2003 Haute-Savoie** – Bonneville, ad., 18 mai (J.-P. Matérac *et al.*).

(De l'Espagne à la Chine). Deux des trois individus du Cantal étaient bagués, mais les codes n'ont pu être lus. Rappelons que l'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2005.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (82/81) (60/59 – 10/10)**Ain** – Ceyzeriat, mâle ad., 25 septembre (P. Crouzier *et al.*).**Ardèche** – Col de l'Escrinet, Saint-Étienne-de-Boulogne, mâle ad., 12 avril (R. Fonters *et al.*).**Ardennes** – Saulces-Champenoises, mâle ad., 20 mars (L. Gizart).**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Tour-du-Valat, mâle ad., 12 mars (Y. Kayser).**Doubs** – Sainte-Colombe, fem. 1^{er} été, 22 mai (D. Michelat, L. Strenna).**Finistère** – Aérodrome, Île d'Ouessant, 1^{er} été, 3 mai (A. Audevard).**Haute-Savoie** – Sciez-sur-Léman, mâle ad., 11 avril (J.-P. Jordan *et al.*).**Indre-et-Loire** – Reignac, mâle ad., 31 mars (A. Liger *et al.*).**Pas-de-Calais** – Audresselles, fem. 1^{er} été, phot., 13 mai (G. Flohart).**Pyrénées-Atlantiques** – Ger, mâle 2^e été, 9 septembre (J.-L. Grangé).**2004 Haute-Savoie** – Le Hucel, Thollon-les-Mémises, mâle ad., 27 mars (J.-P. Jordan *et al.*).**2000 Meuse** – Torgny-Velosnes, juv., 30 septembre (R. Dujardin).

(Asie centrale, à l'Ouest jusqu'en Roumanie). Encore un afflux printanier en 2005 (10 oiseaux) après celui de 2004, année qui détient le nouveau record avec 12 individus suite à la donnée de Haute-Savoie parvenue tardivement. Phénomènes exceptionnels ou amorce de changements plus profonds ?

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (28/28) (25/25 – 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse des steppes ».

Finistère – Presqu'île de Crozon, Roscanvel, 13 octobre (P. Hamon).**Pyrénées-Atlantiques** – Behorléguy, ad., 12 mars (B. Lamothe).

(Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). Deux mentions, comme en 2004.

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (26/22) (21/17 – 1/1)**Bouches-du-Rhône** – Camargue : Mas de Griffueille/Bois-Verdun, ad. sous-espèce *rufinus*, 21 septembre (Y. Kayser).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Retour à une situation plus « normale » avec une seule donnée, la Camargue restant la région privilégiée pour observer cette espèce, même si les Buses variables (certaines parfois trompeuses) y sont quand même majoritaires !

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (361/385) (292/312 – 4/4)**Aube** – Le long de la D 396, Courcelles-sur-Voire, Labraux & Yèvres-le-Petit, 1^{er} hiver, phot., du 8 au 24 janvier (R. Riols) ; Le Périchon, Fontaine-Mâcon, 1^{er} hiver, du 7 au 9 février (Y. Brouillard).**Bas-Rhin** – Aéroport, Entzheim, 1^{er} hiver, 25 décembre (A. André).**Indre** – Mézières-en-Brenne, fem. ad., du 6 janvier au 5 février (R. Bussièrre, E. & M. Holtof).**2004 Saône-et-Loire** – Blanzay, fem., percutée par une voiture, morte en centre de soins, phot., 11 décembre (G. Moynes *vide* P. Durllet).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Petite année. Il faut remonter à 2001 pour ne trouver que 4 individus également, l'année 2000, la plus faible, n'en ayant accueilli qu'un seul. On peut de toutes façons penser que dans les années à venir, le réchauffement climatique entraînera une raréfaction de cette espèce sous nos latitudes...

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (210/160) (161/107 – 7/6)

Ain – Les Conches, Ceyzeriat, 1^{er} hiver, 16 octobre (J.-B.† & P. Crouzier *et al.*).

Bouches-du-Rhône – Camargue : Basses-Méjanès, 1^{er} hiver, phot., 12 mars (P.-A. Crochet) ; Amphise & Tour-du-Valat, imm., phot., du 29 octobre au 2 novembre au moins (M. Thibault) ; Salin-de-Badon et Baisse Salée, imm., phot., 1^{er} et 2 novembre au moins (M. Thibault) ; imm., phot. (différent du précédent) 2 novembre au moins (M. Thibault) ; Saint-Seren, 1^{er} hiver, phot., 20 novembre (P.-A. Crochet) ; marais du Grenouillet, Arles, 2^e hiver, phot., 20 novembre (D. Combrisson).

2004 Cher – Étang de Javoulet, Sancoins, subad., phot., du 28 novembre au 3 décembre (A. Trompat *et al.*). (De la Pologne à la Sibérie orientale). La comptabilité des oiseaux camarguais est toujours délicate entre les nouveaux hivernants et les revenants. En 2004, un oiseau de 1^{er} hiver avait été signalé ; celui de cette année au Grenouillet, un 2^e hiver, n'a donc pas été considéré comme un nouveau venu ; cela dit, parmi les 3 immatures, certains ont peut-être déjà séjourné sur le secteur, d'où un total statistique du nombre d'individus sans doute surestimé.

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (52/46) (48/42 – 4/3)

Bouches-du-Rhône – Camargue : Tour-du-Valat, 1^{er} hiver, 22 février (Y. Kayser *et al.*) ; Saint-Seren, ad., 18 décembre (Y. Kayser *et al.*).

Côte-d'Or – Localité tenue secrète, mâle ad., du 30 avril au 4 juin (J.-L. Dessolin).

Franche-Comté – Localité tenue secrète, un couple ayant produit 1 jeune à l'envol, phot., du 18 avril au 10 septembre (D. Michelat *et al.*).

2002 Bouches-du-Rhône – Fos-sur-Mer, juv./1^{er} hiver, 26 septembre (N. Beck).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Non seulement le couple de Franche-Comté est revenu cette année encore, mais il a produit un jeune à l'envol (après l'échec de 2004) ; un article relatant cet événement a d'ailleurs été publié dans *Ornithos* (Michelat 2005). Quant à l'oiseau bourguignon, il est toujours solitaire...

AIGLE IBÉRIQUE *Aquila adalberti* (9/8) (5/4 – 1/1)

Pyrénées-Atlantiques – Ustaritz, 2^e été, 11 juin (B. Lamothe).

(Péninsule Ibérique). Encore une mention en 2005 après celle de 2004 (un oiseau de 1^{er} été) à la même époque.

FAUCON CRÉCERELLETTE *Falco naumanni* (92/256) (68/226 – 18/827)

En dehors des sites de nidification de l'Aude, de l'Hérault et de la Crau.

Ain – Les Conches, Ceyzeriat, 3 ind. dont au moins 1 mâle ad., 11 octobre (J.-B.† & P. Crouzier).

Ardèche – Col du Faux, Lalouvesc, mâle ad., 25 août (V. Palomarès).

Aude – Montplaisir, Espézel, au moins 187 ind., 14 août ; 485 ind., 24 août (F. Garcia *et al.*) ; pic d'Ourtiset, Niort-de-Sault, 22 ind., 25 août (F. Garcia) ; Milobre de Bouisse, Bouisse, 47 ind., 26 août (F. Garcia) ; Villardebelle, 7 ind., 26 août (F. Garcia) ; Mouthoumet, 5 ind., 4 septembre (F. Garcia) ; Salza, mâle ad., mâle 1^{er} été. et juv., 4 septembre (F. Garcia) ; Leucate-Plage, mâle 1^{er} été, 11 octobre (F. Garcia).

Aveyron – Causse du Larzac, Creissels, mâle 1^{er} été, 29 août (F. Legendre).

Bouches-du-Rhône – Cuges-lès-Pins, au moins 8 ind. dont 1 mâle ad. et 1 mâle 1^{er} été, phot., du 7 avril au 8 mai (R. Péliissier, G. Viricel *et al.*).

Finistère – Île d'Ouessant, fem., phot., du 22 septembre au 22 octobre (O. Laporte, M. Vaslin, M. Zucca *et al.*).

Hérault – Les Cayrelles, Lansargues, 2 mâles et 1 fem., phot., 9 mai (P.-A. Crochet).

Lozère – Causse Méjean : Aven Armand/Hures-la-Parade, au moins 2 mâles ad., 19 août (P.J. Dubois *et al.*) ; Nivoliers/Hures-la-Parade, jusqu'à 17 ind. dont 2 mâles ad., du 21 août au 14 septembre ; Vébron, 22 ind. dont au moins 1 mâle ad., 3 septembre ; Causse de Sauveterre : Sainte-Énimie, jusqu'à 7 ind. dont 1 mâle ad., 2 septembre au moins (F. Legendre).

Var – Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, mâle ad., mâle 1^{er} été et 2 fem., phot., du 17 au 19 avril (G. Viricel) ; Nans-lès-Pins, fem., phot., 17 avril (G. Viricel).

(Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, sud-est de la France). Afflux sans précédent par son ampleur en cette fin d'été (un minimum de 827 individus retenus, alors que seulement 256 oiseaux hors zones de nidification avaient été répertoriés depuis le début du xx^e siècle) et qui a amené des oiseaux jusque dans l'Ain ou sur l'île d'Ouessant dans le Finistère. Ces localisations sont bien sûr remarquables, mais s'inscrivent cependant dans un contexte assez cohérent à plusieurs égards : en effet si l'espèce déserte ses quartiers de nidification dès le mois d'août, elle n'entame alors souvent qu'une période d'errance (elle peut ainsi réapparaître en Crau en septembre). La migration à proprement parler ne bat son plein dans le

3. Faucon crécerellette

Falco naumanni, femelle, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Olivier Laporte & Hubert Pottiau).
Female Lesser Kestrel.



bassin méditerranéen qu'en octobre. L'automne 2005 a été marqué par d'importantes remontées de Faucons crécerellettes espagnols, puis par des données tardives d'oiseaux perdus loin au nord de leur zone de nidification – sud du Massif central, vallée du Rhône et jusqu'en Bretagne. Pour l'Aude, il a été considéré que les 22 individus du pic d'Ourtiset appartenaient au groupe de 485 d'Espézel (ainsi que les 187 vus sur le même site en début de période), et que les quatre communes de Milobre, Mouthoumet, Villardebelle et Salza situées dans un rayon de 10 km totalisaient 54 oiseaux (47 plus 7 du 26 août), ce qui représente avec le retardataire du 11 octobre à Leucate un minimum de 540 oiseaux au total pour ce département ! En Lozère, indépendamment des oiseaux mentionnés ici, un groupe de 30 individus le 2 septembre sur la cause de Sauveterre appartenaient sans doute à cette espèce, mais néanmoins trop éloignés pour confirmation. Quant aux données de reproduction sur les sites de l'Hérault et de plaine de la Crau, elles ont été publiées dans le rapport sur les oiseaux nicheurs rares et menacés en France (V. *Ornithos* 14-3 : 146). L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonora* (341/445) (302/399 – 5/6)

En dehors du littoral méditerranéen.

Ardèche – Lachapelle-sous-Aubenas, ad. probable, forme sombre, 26 août (T. Curial, F. Veau).

Aveyron – Le Pas de la Livre, Cornus, 2 ad. forme sombre, 28 juillet (F. Legendre) ; plateau du Guilhaumard, Le Clapier, ad. forme claire, 16 août (F. Legendre).

Lozère – Col du Bourbon, Cubières, ad. probable, forme claire, 6 août (A. Dorie) ; Le Regourdell, Marjevols, ad. forme claire, 29 août (P.J. Dubois).

(Bassin méditerranéen, Maroc atlantique, Canaries). Dates classiques. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

FAUCON LANIER *Falco biarmicus* (46/45) (39/38 – 4/4)

Aude – Espézel, fem. juv., 29 juillet (C. Riols).

Bouches-du-Rhône – Camargue : mas du Carrelet, ad., sous-espèce *feldeggi*, 5 mars (Y. Kayser *et al.*).

Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu : Prées neuves, Saint-Mars-de-Coutais, mâle ad., sous-espèce *erlangeri*, du 18 avril au 1^{er} mai (S. Reeber).

Marne – Lac du Der, Giffaumont-Champaubert, fem. probable, ad./subad., 12 mars (J.-P. Delapré *et al.*).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). Quatre mentions comme en 2004. On remarque une prédominance des apparitions printanières, mais les régions concernées sont bien différentes, ainsi que la sous-espèce quand, chez les adultes, elle a pu être déterminée. Difficile d'avoir des certitudes quant à l'origine de ces oiseaux.

MARQUETTE DE CAROLINE *Porzana carolina* (1/1) (0/0 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Ty Crenn, juv./1^{er} hiver, phot., du 4 octobre au 18 novembre (M. Ameels, A. Audevard, P.-P. Évrard *et al.*).

(Amérique du Nord). Deuxième mention française de cette marouette, la première étant celle d'un oiseau tué en Brenne, Indre, le 3 janvier 1963. C'est Ouessant qui a été le théâtre de cette découverte pour le plus grand bonheur de nombreux observateurs présents à cette époque, d'autant que l'oiseau a joué les prolongations.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (262/307) (212/246 – 15/15)

Alpes-Maritimes – Embouchure du Var, Saint-Laurent-du-Var, fem., du 18 au 26 mars (O. Soldi *et al.*).

Aude – Grand Tournebelle, Narbonne, juv., trouvé mort, phot., 11 septembre (F. Garcia *et al.*).

Bouches-du-Rhône – Camargue : Tour-du-Valat, mâle, chant, 12 mars (Y. Kayser).

Haute-Corse – Macinaggio, mâle ad., du 19 au 21 mai (F. Portier).

Indre – Brenne, étang des Essarts, Saint-Michel-en-Brenne, juv., 23 juillet (J. Trotignon).

Indre-et-Loire – Étang du Louroux, Le Louroux, fem. ad., phot., du 3 au 13 avril (N. Cailleret, P.-P. Évrard, A. Liger, J. Thurel *et al.*).

Marne – Lac du Der, Giffaumont-Champaubert, fem. ad., chant, 16 juillet (J. François *et al.*).

Savoie – Base de loisirs, Motz, mâle ad., phot., du 3 au 14 avril (J.-P. Jordan), mâle 2^e année, phot., 22 et 23 avril (J.-P. Jordan *et al.*).

Tarn – Cambounet-sur-le-Sor, mâle, chant, phot., 17 avril (A. Calvet, H. Darmandieu *et al.*).

Var – L'Ayguade, Hyères, fem., phot., 25 mars (J.-M. Bompar *vide* A. Flitti) ; Signes, fem., 12 mai (F. Bircher) ; Canal du Palyvestre, Hyères, fem., phot., 19 et 20 août (N. Issa *et al.*).

Vendée – La Belle-Henriette, La Faute-sur-Mer, fem., 10 septembre (A. Thomas).

Yvelines – Parc de Fromainville, Achères, juv., phot., du 4 au 7 octobre (T. Josse).

2004 Indre – Brenne, étang de la Rouère, Ruffec, mâle, chant, du 2 au 5 mai (J. Trotignon).

2004 Savoie – Base de loisirs, Motz, juv., phot., 24 juillet (J.-P. Jordan *et al.*).

(Europe, Asie centrale). Après une année 2004 plutôt morose (4 mentions), 2005, avec 15 oiseaux, se situe nettement au-dessus de la moyenne annuelle depuis la création du CHN (un peu plus de 10 individus par an) et les départements concernés par la présence de l'espèce sont aussi très divers. La reproduction en Brenne est très probable (juvénile en juillet). L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (90/130) (45/57 – 5/5)

Bouches-du-Rhône – Camargue : Tour-du-Valat, ad., 12 mars (Y. Kayser).

Charente-Maritime – Marais de Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée, ad., phot., 15 août (V. Delecour).

Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu, Saint-Mars-de-Coutais, juv., phot., 12 et 13 août (L. Bauza *et al.*).

Manche – Genêts, juv., 12 août (S. Provost *et al.*).

Seine-Maritime – Marais du Hode, Saint-Vigor-d'Ymonville, juv., capt., phot., 19 août (D. Mauras *et al.*).

(Europe, Asie centrale, Japon). Année plutôt meilleure que les deux précédentes (aucune mention en 2004 et une nidification avec 2 poussins en 2003), mais l'espèce reste toutefois très rare ou en tout cas très peu détectée. À part la donnée de Camargue, les observations de cette marouette concernent toutes le littoral Manche-Atlantique lors de la migration postnuptiale.

TALÈVE SULTANE *Porphyrio porphyrio* (80/151) (49/118 – 0/0)

(Espagne, Roussillon, Sardaigne, Afrique, Asie, Nouvelle-Zélande, Australie). Rien de nouveau pour 2005. Les données concernant la reproduction sont publiées dans le rapport sur les oiseaux nicheurs rares et menacés en France (V. Ornithos 14-3 : 156). L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

GLARÉOLE À AILES NOIRES *Glareola nordmanni* (22/19) (18/14 – 2/1)

Bouches-du-Rhône – Camargue : entre la Chassagne et le mas d'Agon, ad., du 8 mai au 4 juin, puis le 30 juillet, phot. (F. Dhermain, Y. Kayser, O. Laporte, A. Pataud, N. Vincent-Martin *et al.*).

(Asie occidentale). La Camargue n'avait pas accueilli l'espèce depuis 2002. L'observation du 30 juillet d'un adulte en plumage d'hiver concerne probablement le même oiseau que celui observé de mai à juin, mais un doute subsiste (Y. Kayser comm. pers.).



4. Marouette de Caroline *Porzana carolina*, 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Aurélien Audevard). 1st-winter Sora.

5. Marouette poussin *Porzana parva*, femelle, Le Louroux, Indre-et-Loire, avril 2005 (Julien Thurel). Female Little Crane.





6. Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*, juvénile avec un Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* et un Bécasseau sanderling *Calidris alba*, Lampaul-Ploudalmézeau, Finistère, octobre 2005 (Philippe J. Dubois).
Juvenile American Golden Plover with Ringed Plover and Sanderling.

GRAVELOT MONGOL *Charadrius mongolus* (4/4) (4/4 – 1/1)

Charente-Maritime – Réserve naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, mâle ad. du groupe *atrifrons*, phot., du 20 au 26 septembre (J. Gonin *et al.*).

(Asie centrale, jusqu'en Extrême-Orient). Belle découverte que ce gravelot (5^e mention française) qui appartenait à priori au groupe *atrifrons* (oiseau haut sur pattes, bec long, front noir, pas de ligne noire entre le roux de la poitrine et la gorge blanche).

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (33/35) (31/33 – 1/1)

Finistère – Lampaul-Ploudalmézeau, juv., phot., du 26 octobre au 2 novembre (P.J. Dubois, T. Quélénnec *et al.*). (Amérique du Nord). La Bretagne, toujours aux avant-postes pour cette espèce...

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (74/73) (66/65 – 2/2)

Côte-d'Or – Réservoir de Cercey, Thoisy-le-Désert, 1^{er} hiver, phot., du 13 au 17 novembre (O. Bardet *et al.*).

Seine-et-Marne – Sorques/La Genevraye, ad., phot., du 15 au 23 octobre (T. Bara, F. Bouzendorf *et al.*).

2004 Haute-Vienne – Saint-Yrieix-la-Perche, 1^{er} hiver probable, du 18 au 21 janvier (F. Desage *et al.*).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Année en dessous de la moyenne annuelle qui se situe à quasiment 3 oiseaux par an depuis 1981 (année de la création du CHN). À noter que de 5 à 7 oiseaux ont été vus de 1997 à 2000, un fléchissement s'est opéré ensuite (encore 4 oiseaux toutefois en 2004).

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (17/17) (16/16 – 3/3)

Finistère – Île d'Ouessant : Porz Doun, juv., 13 septembre (G. Olioso) ; Porz Doun, juv., phot., du 26 septembre au 7 octobre (A. Audevard *et al.*).

Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu, Saint-Philbert de Grand-Lieu, juv., phot., du 19 au 29 septembre (S. Reeber *et al.*).

(Amérique du Nord). Plutôt une bonne année pour ce bécasseau qui s'égaré fort peu en France et dont l'identification reste très délicate. L'île d'Ouessant, aux avant-postes avec Sein pour recevoir les limicoles américains, a accueilli à priori deux juvéniles, car il est peu probable que celui de septembre soit passé ensuite inaperçu, compte tenu de la pression d'observation exercée sur cette île. Donnée remarquable également pour le lac de Grand-Lieu qui a retenu 11 jours ce bécasseau sur un bout de vase grand comme un mouchoir de poche au milieu du lac.

BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (34/35) (30/31 – 2/2)

Bouches-du-Rhône – Salins de Berre, Berre-l'Étang, ad., 16 août (T. Louvel).

Seine-et-Marne – Jablines, 1^{er} été, phot., 13 août (F. Bouzendorf, S. Chambris, S. Rochard, S. Vincent).

(Amérique du Nord). Le littoral méditerranéen a déjà accueilli l'espèce. Quant à la donnée de Jablines, elle est bien sûr remarquable par sa localisation (dommage pour certains que l'oiseau ait semblé si pressé !).

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (35/35) (31/31 – 3/3)

Finistère – Brèche de Trunvel, Tréogat, juv., phot., du 8 au 21 septembre (F. Barrault, M. Cannévet, A. Le Nevé, S. Nedellec *et al.*) ; Sémaphore de Penmarc'h, Saint-Guérolé, juv., phot., du 19 au 24 septembre (F. Barrault, P. Crouzier, F. Desage *et al.*).

Hautes-Alpes – Lac de la Saulce, Curbans/La Saulce, ad., phot., 16 mai (O. Tourillon).

(Amérique du Nord). Si la baie d'Audierne, Finistère, a accueilli deux Bécasseaux de Baird en même temps (ce qui est réellement remarquable), la présence de cette espèce dans les Hautes-Alpes, au printemps, et en compagnie d'un Bécasseau tacheté *C. melanotos* et d'un Bécasseau minute *C. minuta*, les trois seuls bécasseaux présents sur le site (!), est véritablement étonnante.

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (342/387) (281/311 – 19/20)

Ain – Étang Biollay, Marlieux, juv., phot., du 25 au 31 août (P. Crouzier *et al.*).

Bouches-du-Rhône – Camargue : marais du Grenouillet, puis Palunette de Fiélose, ad., phot., du 24 avril au 1^{er} mai (N. Issa, V. Palomarès *et al.*) ; Le Fangassier, ad., fem. possible, phot., 23 août (P.J. Dubois) ; They-Sainte-Ursule, juv., phot., 26 septembre (A. Hargreaves *et al.*).

Eure-et-Loir – Saumeray, juv., phot., 24 septembre (T. Cense).

Finistère – Balaneg, archipel de Molène, 31 août (B. Cadiou) ; baie de Goulven, Plounéour-Trez, 5 septembre (E.J. Williams) ; île de Sein, juv., 15 et 16 octobre (P. Yésou).

Hautes-Alpes – Lac de la Saulce, Curbans/La Saulce, ad., phot., 16 mai (O. Tourillon).

Ille-et-Vilaine – Marais des Guettes, Saint-Suliac, ad., du 15 au 17 juin (L. Godet *et al.*) ; juv., phot., du 23 au 25 août (A. Chabrolle, L. Godet *et al.*) ; barrage de la Cantache, Val-d'Izé, juv., phot., du 2 au 11 octobre (J.-L. Reuzé *et al.*).

Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu/Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, juv., phot., du 22 au 27 août (S. Reeber) ; 2 juv., l'un les 30 et 31 août, l'autre du 30 août au 11 septembre, phot. (S. Reeber *et al.*) ; juv., phot., du 15 au 26 septembre (S. Reeber) ; juv., 28 septembre (S. Reeber).

7. Gravelot mongol *Charadrius mongolus*, mâle adulte, Moëze-Oléron, Charente-Maritime, septembre 2005 (Julien Gonin). *Male Lesser Sand Plover.*



8. Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*, juvénile, Trunvel, Tréogat, Finistère, septembre 2005 (Aurélien Audevard). *Juvenile Baird's Sandpiper.*



Somme – Parc ornithologique du Marquenterre/Saint-Quentin-en-Tourmont, 18 juillet (A. Lepretre, N. Hermann *et al.*) ; juv., phot., du 9 au 18 septembre (A. Lepretre, N. Hermann *et al.*).

Var – Salins des Pesquiers, Hyères, 1^{er} été, phot., du 16 mars au 9 mai (N. Issa, P. Orsini *et al.*).

2002 Finistère – Trunvel/Tréogat, juv., 19 septembre (A. Liger).

2002 Saône-et-Loire – Barrage de la Somme/Blanzay, juv., phot., du 6 au 13 septembre (J.-M. Frolet, P. Gayet, C. Gentilin *et al.*) et non les 7 et 8 septembre uniquement (*Ornithos* 11-2 : 66).

(Amérique du Nord, Sibérie). Très bonne année, puisque 2005, avec 20 oiseaux, arrive en quatrième position derrière 2000 (27 individus), 2003 (26) et 1984 (22). À noter que cinq individus différents ont fréquenté la petite vasière du lac de Grand-Lieu, où a séjourné le Bécasseau semipalmé mentionné précédemment. Rappelons aussi ce fait extraordinaire du printemps dans les Hautes-Alpes, où un Bécasseau tacheté se trouvait en compagnie d'un Bécasseau de Baird et d'un Bécasseau minute, seuls limicoles alors présents sur le site ! L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (169/235) (135/185 – 11/11)

Alpes-Maritimes – Embouchure du Var, Saint-Laurent-du-Var, juv., 11 septembre (A. Lovering).

Bouches-du-Rhône – Camargue : Fangassier, ad., phot., du 28 avril au 1^{er} mai (P.-A. Crochet, V. Palomarès *et al.*) ; They-Sainte-Ursule, ad., phot., les 10 et 11 mai (A. Le Nevé *et al.*) ; Galabert, ad., phot., 27 juillet (P.-A. Crochet) ; juv., 17 et 18 août (E. Franc *et al.*) ; Baisse des Cinq-Cents-Francs, ad., 20 août (A. Flitti *et al.*) ; juv., phot., du 26 au 28 août (P.J. Dubois, E. Franc, V. Palomarès *et al.*).

Ille-et-Vilaine – Chapelle-Sainte-Anne, Cherruex, juv., 10 septembre (E. Dupoux).

Loire-Atlantique – Le Pointeau, Saint-Brévin-les-Pins, juv. probable, phot., 6 septembre (D. Tavenon).

Var – Étang des Pesquiers, Hyères, ad., 9 mai (N. Issa).

Vendée – Baie de Bourgneuf : le Collet et port des Brochets, Bouin, ad., phot., 6 et 7 mai (J.-Y. Frémont, F. Portier, S. Reeber, A. Verneau).

2004 Bouches-du-Rhône – Camargue : Baisse de la Blancarde, Saintes-Maries-de-la-Mer, 2 ad., 8 mai (J.-P. Jordan *et al.*) ; Baisse des Cinq-Cents-Francs, juv., phot., 15 août (P.-A. Crochet) ; Fangassier, juv., phot., 15 août (P.-A. Crochet).

(Europe septentrionale). La moyenne pour ce bécasseau est d'un peu moins de 8 individus par an depuis la création du CHN en 1981. Avec 11 individus, 2005 est donc une année fort honorable. Si le littoral méditerranéen, de la Camargue à l'estuaire du Var, est sans surprise le plus fréquenté par cette espèce, celui de la Loire-Atlantique et de la Vendée, en toute logique, est loin d'être concerné tous les ans. La donnée d'Ille-et-Vilaine est encore plus remarquable.


BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (151/187) (106/120 – 8/9)

Bouches-du-Rhône – Camargue : entre le mas d'Agon et la Chassagne, ad., 10 mai (A. Le Nevé *et al.*).

Charente-Maritime – Bourcefranc, juv., phot., 14 septembre (R. Cuinet *et al.*).

Finistère – Étang de Nérizélec, Plovan, juv., phot., 3 septembre (A. Audevard, M. Canévet, A. Le Nevé *et al.*) ; île de Sein, juv., phot., du 8 au 20 septembre (A. Audevard, F. Barrault, A. Chabrolle, P. Crouzier, A. Le Nevé

9. De gauche à droite, Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, Bécasseau de Baird *C. bairdii* et Bécasseau minute *C. minuta* adultes, Curbans/La Saulce, Hautes-Alpes, mai 2005 (Olivier Tourillon). From left to right, adult Pectoral, Baird's Sandpiper and Little Stint.



10. Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*, Plovan, Finistère, septembre 2005 (Aurélien Audevard). Juvenile Buff-breasted Sandpiper.

et al.) ; Trielen, archipel de Molène, 2 ind., phot., 9 septembre (J.-Y. Le Gall *vide* A. Audevard) ; dunes de Tronoën, Plomeur, juv., phot., 10 septembre (A. Audevard, S. Nedellec *et al.*) ; île d'Ouessant : Ru Niou et Porz Doun, juv., 16 septembre (A. Audevard).

Vendée – Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré, ad., 26 octobre (P. Trotignon).

2004 Hérault – Décharge de Thot, Lattes, juv., phot., 8 octobre (B. Barbanson *vide* J. Fouert-Pouret).

(Amérique du Nord). Belle série d'observations en septembre dans le Finistère, ce qui n'est pas le cas tous les ans, puisque avec 9 individus, 2005 arrive en troisième position à égalité avec 1984, dépassant largement la moyenne annuelle qui est un tout petit peu supérieure à 5 individus ; il faut remonter à l'année 2000 pour avoir un score supérieur avec 15 individus cette année-là, puis à 1995 avec 10 oiseaux.

BÉCASSINE DE WILSON *Gallinago delicata* (0/0) (0/0 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Ty-Crenn, juv., phot., du 17 au 19 octobre (V. Legrand).

(Amérique du Nord). Première mention française pour cette bécassine d'identification très délicate au regard des variations que peut présenter la Bécassine des marais *Gallinago gallinago*. Cette espèce a été inscrite par la CAF en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France. Une note sera publiée prochainement.

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (260/307) (33/34 – 3/3)

Cher – Sablières du Bois Blanc, Vierzon, ad., 6 juin (A. Liger *et al.*).

Haute-Corse – Barcaggio, Ersa, 6 mai (M. Zucca *et al.*).

Jura – Pagney, 3 ad., 15 avril (C. Mauvais).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Il faut remonter à 1999 pour retrouver 3 données de Bécassine double sur notre territoire. Si la Corse et le Jura sont encore assez régulièrement fréquentés par l'espèce, le Cher peut s'enorgueillir de cet hôte de marque.



11. Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla*, juvénile, Ouessant, Finistère, septembre 2005 (Aurélien Audevard). *Juvenile Semipalmated Sandpiper*.

12. Bécasseau roussel *Tryngites subruficollis*, Plovan, Finistère, septembre 2005 (Aurélien Audevard). *Juvenile Buff-breasted Sandpiper*.



13. Bartramie des champs *Bartramia longicauda*, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Aurélien Audevard). *Upland Sandpiper*.

14. Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*, adulte, Ouessant, Finistère, mai 2005 (Aurélien Audevard). *Adult Lesser Yellowlegs*.





15. Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus*, juvénile, Moëze-Oléron, Charente-Maritime, novembre 2005 (Julien Gonin). Juvenile Long-billed Dowitcher.



16. Bartramie des champs *Bartramia longicauda*, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Nidal Issa). Juvenile Upland Sandpiper.

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (29/30) (20/20 – 1/1)

Charente-Maritime – Réserve naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, juv., phot., du 21 octobre au 23 décembre (P.-P. Évrard, J. Gonin *et al.*).

(Amérique du Nord). Ce bécassin demeure d'une grande rareté en France, puisque la moyenne depuis 1981, date de la création du CHN, est de moins d'un individu par an. Cet oiseau a séjourné longuement.

BARTRAMIE DES CHAMPS *Bartramia longicauda* (7/7) (5/5 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Kervasdoué, juv., phot., du 16 octobre au 4 novembre (M. Ameels, A. Audevard, P.-P. Évrard, X. Rozec, M. Vaslin *et al.*).

(Amérique du Nord). Une autre Bartramie sur Ouessant un peu plus d'un an après celle qui avait déplacé les foudres, c'est plutôt incroyable, et celle-ci nettement plus coopérative que la première a « électrisé » les nombreux observateurs présents à cette époque sur l'île.

CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (36/36) (21/21 – 3/3)

Charente-Maritime – Prise de la Groie, Saint-Clément-des-Baleines, juv., phot., du 15 au 24 novembre (R. Perin *et al.*).

Finistère – Île d'Ouessant : Porz Doun, ad., phot., du 25 au 29 mai (A. Audevard *et al.*).

Vendée – Loirs de Champclou, Olonne-sur-Mer, juv., 2 octobre (D. Desmots).

(Amérique du Nord). Avec 3 données, 2005 détient le record depuis la création du CHN en 1981. La façade atlantique est selon toute logique privilégiée.

CHEVALIER BARGETTE *Xenus cinereus* (109/95) (83/70 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Camargue : Fangassier, 29 juillet (Y. Kayser).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). La Camargue n'avait pas accueilli l'espèce depuis 2003.

Limicoles néarctiques

Avec 10 espèces totalisant 42 données pour 44 individus, l'année 2005 se situe au-dessus de la moyenne annuelle (8,2) depuis la création du CHN en 1981 pour le nombre d'espèces, en troisième position pour le nombre d'individus et en deuxième position pour le nombre de données. Les années record en terme de diversité restent 1995 et 1998 avec 12 espèces de limicoles néarctiques vues en France. En revanche, l'effectif record revient à l'année 2000, avec respectivement 48 données et 56 individus.

LABBE À LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus* (392/1216) (336/1132 – 44/111)

Bas-Rhin – Bischoffsheim, ad., 5 mai (S. Didier).

Côtes-d'Armor – Réserve naturelle des Sept-Îles, île aux Moines, Perros-Guirec, juv., trouvé mort, phot., 7 septembre (G. Bentz *et al.*).

Haute-Savoie – Lac Léman : Sciez-sur-Léman, 2 juv., 22 août (R. Jordan) ; au large de Thonon-les-Bains, juv., phot., 19 septembre (P.J. Dubois *et al.*), juv., phot., 24 septembre (E. Bernardi *et al.*).

Hautes-Pyrénées – Laslades, juv., capt., phot., du 14 au 20 septembre (F. Ballereau, C. Bergès, P. Mayet *et al.*).

Indre-et-Loire – La Chapelle-aux-Naux, juv., 28 août (R. Baeta, M. Delagarde).

Manche – Quinéville et Saint-Vaast-la-Hougue, juv., du 22 au 24 octobre (R. Aubry, S. Chambris, S. Vincent).

Nord – Le Clipon, Loon-Plage : 3 juv., 20 août, juv., 22 août, 3 juv., 23 août, juv., 2 septembre, juv., 10 septembre, 9 juv., 11 septembre, juv., 12 septembre, 2 juv., 17 septembre, juv., 18 septembre, juv., 25 septembre, juv., 1^{er} octobre, 9 juv., 2 octobre, juv., 3 octobre, 2 juv., 23 octobre, juv., 9 novembre (J.-Y. Barnagaud, J. Boulanger, C. Dutoit, N. Dutoit, O. Fontaine, C. Gruwier, D. Haubreux, B. Herman, R. Lebrun, C. Leprêtre, J. Piette, J. Vanwynsberghe, G. Vergauwen).

Pas-de-Calais – Cap Gris-Nez, Audinghen : 2 juv., 15 août, 3 juv. et 1 ad., 20 août, 7 juv., 23 août, juv., 24 août, juv., 3 septembre, juv., 4 septembre, juv., 7 septembre, 7 juv., 11 septembre, 7 juv., 12 septembre, juv., 13 septembre, juv., 15 septembre, juv., 17 septembre, 2 juv., 1^{er} octobre, 18 juv., 2 octobre, juv., 13 novembre, juv., 16 novembre (T. Braves, F. Caloin, F. Cavalier, T. Daumal, P.J. Dubois, G. Flohart, F. Le Gallo, K. Maes, B. Paepegaey, W. Putterman, H. Rijdonk, L. Scalabre, N. Selosse, J.-P. & S. Siblet, M. Spencer, M. Van Looy, I. Watson, *et al.*). Calais : juv., 11 septembre, juv., 2 octobre (P.J. Dubois) ; cap Blanc-Nez, Sangatte, ad., 27 octobre (H. Verne) ; Fort Mahon, Blériot-Plage, Sangatte, 5 juv., 11 septembre (P.J. Dubois).

2003 Haute-Savoie – Lac Léman : au large de Thonon-les-Bains, juv., 30 août (E. Bernardi *et al.*).

(Circumboréal). Sites classiques excepté la donnée sur la Loire en Indre-et-Loire et celle, printanière, du Bas-Rhin. Les Hautes-Pyrénées avaient déjà accueilli un juvénile le 9 septembre 2002. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (30/30) (25/25 – 7/7)

Finistère – Île d'Ouessant : Porz Noan et Korz, ad., phot., du 3 au 5 novembre (A. Audevard), Korz, ad., capt., phot., du 4 novembre au 6 novembre (A. Audevard, A. Joris) ; étang de Kerescar, Ploumoguier, 1^{er} hiver, phot., 6 novembre (M. & T. Quélenec).

Oise – Baillleul-sur-Thérain, 1^{er} hiver, phot., du 28 décembre au 5 janvier 2006 (F. Bouchinet, G. Lepoutre *et al.*).

17. Mouette atricille *Larus atricilla*, adulte, Ouessant, Finistère, novembre 2005 (Aurélien Audevard). Adult Laughing Gull.



Pas-de-Calais – Le Portel et Boulogne-sur-Mer, 1^{er} hiver, phot., du 29 novembre au 5 décembre (B. Paepegaey *et al.*).
Vendée – Île d'Yeu : rochers de la Galiote, 1^{er} hiver, phot., du 7 au 29 décembre (F. Portier *et al.*) ; base de loisirs « les Guifettes », Luçon, 1^{er} hiver, 10 décembre (A. Thomas *et al.*).

(Amérique du Nord). Phénomène sans précédent avec 7 individus, qui a été perceptible aussi ailleurs en Europe (5 individus présents le 3 novembre en Angleterre, et 7 aux Açores à la même époque, D. Mitchell *in litt.*), mais aussi en Afrique de l'Ouest avec un individu dans le Sine Saloum au Sénégal à la mi-décembre (A. Flitti, comm. pers.). Ce qui est exceptionnel, c'est que l'état du plumage des oiseaux indiquait que ceux-ci avaient nettement entamé leur mue, laquelle se déroule en mer des Caraïbes. Il est probable que la tempête tropicale issue de l'ouragan *Wilma* qui a fini sa course à la fin octobre de ce côté-ci de l'Atlantique a entraîné avec elle un cortège d'oiseaux, ce qui est corroboré par l'arrivée également d'une frégate en Bretagne et en Angleterre (V. plus haut). À signaler que le second oiseau ouessant in épuisé, capturé et bagué a été relâché le 7 novembre 2005 dans le port du Conquet. Le premier est mort au bout de 3 jours.

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (16/16) (15/15 – 2/2)

Finistère – Plage des Trois Moutons, Lampaul-Ploudalmézeau, 1^{er} hiver, phot., du 2 novembre au 25 février 2006 (A. Audevard, F. Barrault, M. Champion, Y. Jacob, Y. Le Corre, A. Le Nevé *et al.*).

Vendée – Grand-Landes, 1^{er} hiver, 26 décembre (J.-P. & Y. Trévoux).

(Amérique du Nord). Comme pour l'espèce précédente, l'ouest de l'Europe et de l'Afrique du Nord ont connu un afflux au cours de l'hiver 2005-2006. C'est ainsi qu'à la fin octobre, l'Irlande, la Grande-Bretagne et le Maroc étaient touchés (B. Paepegaey, *in litt.*). Même la Suisse a accueilli un peu plus tard une Mouette atricille et une Mouette de Franklin en même temps, ce qui constitue des premières pour ce pays (B. Volet, comm. pers.). Indépendamment de ces deux mentions françaises, d'autres observations du début de l'année 2006 seront publiées dans le prochain rapport. Compte tenu de son séjour prolongé, l'oiseau breton a fait les beaux jours d'un nombre impressionnant d'observateurs venus lui rendre visite... Quant à l'oiseau vendéen, il s'agit peut-être de celui qui a été revu sur le lac de Grand-Lieu le 18 janvier 2006, ce site drainant en effet en dortoir les laridés de cette région (V. prochain rapport).



18. Mouette de Franklin *Larus pipixcan*, 1^{er} hiver, Lampaul-Ploudalmézeau, Finistère, novembre 2005 (Aurélien Audevard).
1st-winter Franklin's Gull.

MOUETTE DE BONAPARTE *Larus philadelphia* (11/10) (10/9 – 1/1)

Vendée – Île de Noirmoutier : réserve naturelle des marais de Müllembourg et le Luzan, Noirmoutier-en-l'île, 1^{er} hiver/1^{er} été, phot., du 29 avril au 3 mai (M. Vaslin *et al.*).

(Amérique du Nord). Annuelle depuis 2003 après s'être montrée fort rare dans notre pays (10 oiseaux depuis le XIX^e siècle).

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei* (25/57) (22/54 – 1/0)

En dehors du littoral méditerranéen.

Vendée – Île de Noirmoutier : Müllembourg, Terrains neufs, Sébastopol et plage de la Canche, ad., du 1^{er} mars au 25 novembre (D. Desmots, M. Vaslin *et al.*).

(Europe méridionale, Proche- et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, nord et ouest de l'Afrique). Il s'agit toujours du même individu qui continuait à parader avec les Mouettes rieuses *L. ridibundus* au cours du printemps ; il n'a toutefois pas été vu pendant l'hiver 2004-2005. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii* (148/184) (148/184 – 15/17)

En dehors de la Corse.

Alpes-Maritimes – Embouchure du Var, Saint-Laurent-du-Var, ad., 19 mai (A. Lovering).

Aude – Avant-Port, Port-la-Nouvelle, ad., 6 avril (F. Garcia), 2^e été, 26 avril (F. Garcia) ; salins de Lapalme, 2^e été, phot., 1^{er} mai (P.-A. Crochet).

Bouches-du-Rhône – Camargue : Grau de Piémanson et Fangassier, ad., du 5 au 22 avril, 2^e été du 8 au 22 avril et 1 second 2^e été le 22 avril, phot. (Y. Kayser, C. Pin) ; Fangassier, 2^e été, phot., 25 avril (J. Laesser, V. Palomarès) ; Baisse des Cinq-Cents-Francis, Arles, 2^e été, phot., 29 avril (V. Palomarès *et al.*) ; plage de Piémanson, 2^e été, 13 mai (A. Le Nevé).

Haut-Rhin – Village-Neuf, 2^e été, 26 avril (B. Regisser *et al.*).

Pyrénées-Orientales – Cap Béar, Port-Vendres, ad., du 2 au 4 avril (C. Peignot *et al.*) ; étang de Leucate, Saint-Laurent-de-la-Salanque, ad., phot., 20 avril (C. Peignot).

Var – Étang des Pesquiers, Hyères, 3^e été, 18 avril (N. Issa), 2^e été, 8 mai (N. Issa) ; phare de Porquerolles, 2^e été, 27 avril (P. Crouzier) ; salins des Pesquiers, Hyères, 2^e été, phot., 6 août (N. Issa).

2004 Aude – Plage des Coussouls, Leucate-Plage, 2^e été, phot., 23 avril (F. Bouzendorf, A. Vinot).

2004 Pyrénées-Orientales – Étang de Canet, Saint-Nazaire, 2^e été, 21 avril (F. Bouzendorf, A. Vinot).

(Circum-méditerranéen). Départements classiques en dehors bien sûr de la donnée printanière pour le moins remarquable d'un oiseau immature dans le Haut-Rhin. On constate un très léger fléchissement des mentions par rapport à 2004, mais il est vrai que quelques données audoises sans description n'ont pu être prises en compte. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis* (344/198) (343/197 – 21/2)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*).

Charente-Maritime – Île d'Oléron : La Baudissière, ad., phot., 20 novembre (R. Bussière).

Finistère – Baie de Douarnenez : Trezmalaouen, Kerlaz, ad., phot., du 10 décembre au 7 janvier 2006 (F. Barrault, G. Coulomb, Y. Le Corre) ; Sainte-Anne-la-Palud, ad., phot., du 10 décembre au 7 janvier 2006 (F. Barrault, G. Coulomb, Y. Le Corre) ; Ty-Colo, Saint-Renan, ad., phot., 10 décembre (A. Audevard) ; Plouescat, ad., 30 décembre (Y. Le Corre *et al.*).

Gironde – Bassin d'Arcachon : La Hume, Gujan-Mestras, ad., du 1^{er} janvier au 21 janvier (J. Gernigon), ad., phot., du 31 janvier au 21 mars (J. Gernigon), ad., 24 février (J. Gernigon), ad., du 23 octobre au 3 avril 2006 (J. Gernigon) ; Arcachon, 2^e hiver, phot., du 31 janvier au 21 mars (J. Gernigon), ad., phot., du 15 septembre au 24 mars 2006 (J. Gernigon), mais 2 ad., le 2 décembre (B. Lamothe *et al.*), 3^e hiver, phot., du 19 octobre au



19. Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, adulte, Saint-Renan, Finistère, décembre 2005 (Aurélien Audevard). *Ring-billed Gull.*

24 mars 2006 (J. Gernigon) ; port de Roché, La Teste-de-Buch, 1^{er} hiver*, phot., du 6 au 29 mars (J. Gernigon) ; port de Larros, Gujan-Mestras, ad., 31 mai (J. Gernigon), ad., du 23 octobre au 3 avril 2006 (J. Gernigon).

Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu : grand port, Saint-Lumine-de-Coutais, ad., phot., 4 février (S. Reeber).

Vendée – Pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer, ad., phot., du 22 août au 18 septembre (A. Chabrolle, A. Thomas, P. Trotignon *et al.*) ; île de Noirmoutier, Barbâtre, ad., 1^{er} novembre (W. Raitière), Le Luzan, ad., 12 décembre (D. Desmots, M. Vaslin *et al.*) ; réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 2^e hiver*, 20 décembre (P. Trotignon).

2004 Finistère – Ty-Colo, Saint-Renan, 1^{er} hiver*, 30 novembre (M. Champion).

2004 Vendée – Île de Noirmoutier : Le Luzan, Noirmoutier-en-l'île, ad., du 26 février au 14 avril 2005 (D. Desmots, M. Vaslin *et al.*).

2004 Vendée – pointe d'Arçay, La Faute-sur-Mer, ad., du 25 au 28 août au moins (E. Gfeller, A. Thomas *et al.*) et non le 25 août uniquement (*Ornithos* 13-2 : 94).

(Amérique du Nord). Les revenants sont au rendez-vous en Charente-Maritime, dans le Finistère, en Gironde, en Loire-Atlantique et en Vendée. Sur l'île de Noirmoutier, difficile de savoir si l'adulte vu du 26 février 2004 au 14 avril 2005 n'est pas celui signalé du 20 août 2003 au 9 mars 2004 dans le précédent rapport ; quoi qu'il en soit, en automne 2001, deux oiseaux de 2^e hiver avaient fréquenté l'île et depuis un ou deux adultes sont signalés par intermittence à différents endroits de l'île. Pour les statistiques, il n'a pas été compté de nouvel oiseau sur Noirmoutier. Dans le bassin d'Arcachon, le complexe La Hume-Arcachon-Larros avait accueilli à priori 9 adultes, un 1^{er} hiver et un 2^e hiver en 2004, tout en considérant les échanges qui peuvent s'opérer au cours de l'hivernage entre les différents sites. En 2005, quelques adultes semblent ne pas être revenus (6 adultes présents ?) et le 3^e hiver vu à compter du 19 octobre est peut être le 2^e hiver qui a achevé son hivernage le 21 mars. En ce qui concerne les statistiques, seul le 1^{er} hiver de La Teste-de-Buch a donc été comptabilisé pour la Gironde. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoideus* (146/151) (138/142 – 9/9)

Finistère – Cap Coz et Port-la-Forêt, Fouesnant, 1^{er} hiver, 7 et 8 janvier (S. Nedellec *et al.*) ; Saint-Guénolé, 1^{er} hiver, phot., du 20 janvier au 23 février (A. Audevard, F. Barrault, P. Canévet, V. Palomarès *et al.*) ; Le Conquet, ad., phot., 29 et 30 janvier (F. Barrault *et al.*) ; île d'Ouessant : baie de Lampaul, 1^{er} hiver, phot., du 17 au 22 février (A. Audevard *et al.*), Penn Arland, 1^{er} hiver, phot., 19 mars (A. Audevard) ; Le Conquet, 2^e hiver, phot., 21 février (F. Barrault).

Landes – Tarnos, 1^{er} hiver, phot., 22 février (<http://david.genoud.free.fr/pages/ornithophotopag.html>).

Maine-et-Loire – La Séguinière et La Tessoualle, 1^{er} hiver, phot., du 20 février au 4 mars (J.-L. Blouin, E. Douillard, A. Dorie, A. Fossé, F. Gabillard, J.-D. Vrignault *et al.*).

Vendée – Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1^{er} hiver, 19 janvier (B. Perrotin).

(Arctique canadien, Groenland). Belles arrivées en ce début d'année (dates classiques pour les goélands boréaux) avec 9 oiseaux. La moyenne annuelle depuis 1981 (date de création du CHN) est de 6 individus, mais cette espèce est sujette à des arrivées en nombre certains hivers suite à des conditions météorologiques tempêteuses (12 individus en 2002, 11 en 1988 et 40 – le record – en 1984).

STERNE FULIGINEUSE *Onychoprion fuscata* (12/12) (8/8 – 0/0)

2003 Finistère – Sémaphore de Brignogan, ad., 11 septembre (A. Chabrolle, J. Gruet, J. Martinez)

(Mers tropicales). Observation remarquable de cette sterne si rare, qui n'avait pas été observée depuis 1997 sur le banc d'Arguin en Gironde (elle y a d'ailleurs été notée 3 autres fois : 1983, 1985 et 1987). Jusqu'à présent, toutes les observations (sauf une d'avril) étaient de juin et juillet.

STERNE FULIGINEUSE/BRIDÉE *Onychoprion fuscata/anaethetus* (3/3) (3/3 – 1/1)

Vendée – Pointe du Grouin du Cou, La Tranche-sur-Mer, ad., 11 septembre (L. Chaillot)

Hormis le dos « pas franchement noir », pas de quoi trancher avec certitude. La Sterne fuligineuse n'est elle même pas noire, mais bien... fuligineuse, les critères du front, du trait loreal, des rémiges primaires ne sont pas décrits, sans doute une Sterne bridée, mais sans possibilité de l'affirmer.

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (32/33) (25/18 – 1/0)

Gironde – Banc d'Arguin, La Teste-de-Buch, ad., phot., du 2 mai au 1^{er} août (J. Gernigon).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Oiseau bague en 2001, pas de reproduction cette année.

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (20/7) (19/6 – 2/0)

Vendée – Bouin (lagune du Dain) et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mâle ad., du 6 au 13 juin à Bouin, puis nourrissant un juv. à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 22 août, phot. (G. Besseau, M. Vaslin *et al.*).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). L'oiseau qui était apparié à une Sterne caugek *S. sandvicensis* et qui a fréquenté la lagune du Dain à Bouin en début de saison a ensuite disparu pour être retrouvé nourrissant un juvénile à bec jaune à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au cours de l'été ; sachant qu'il n'y a eu cette année-là que deux colonies de reproduction de Sturnes caugeks en Vendée (lagune du Dain avec une cinquantaine de couples et polder de Sébastopol sur l'île de Noirmoutier avec presque une centaine de couples), ce couple a dû nicher sans être vu dans la colonie de sternes du polder de Sébastopol à Noirmoutier (M. Vaslin, comm. pers.). Signalons qu'une Sterne élégante a séjourné dans le Dorset (Angleterre) le 10 mai avant d'être vue filant vers le sud (Chappell 2005). Par ailleurs, il a été évoqué le fait que d'après les photos des oiseaux observés sur le banc d'Arguin au cours de ces deux années, il pouvait s'agir d'oiseaux différents. Le CHN n'a pas entériné cette hypothèse, et rappelle par ailleurs que compte tenu de son aire de répartition et de son historique, l'espèce n'est pas « programmée » pour arriver chaque année sur nos côtes...

STERNE « À BEC ORANGE » *Sterna sp.*

Gironde – Banc d'Arguin, La Teste-de-Buch, ad. apparié à une Sterne caugek, produit 1 poussin hybride, phot., du 4 mai au 21 juillet (J. Gernigon).

Cette sterne baguee couleur et dont l'identité n'est toujours pas connue a été photographiée en mars en Afrique du Sud (J. Gernigon *in litt.*). De retour sur le banc d'Arguin début mai, elle a, comme en 2003, produit un poussin hybride. Comme pour les Bernaches du Pacifique et les grands faucons, une extrême rigueur en matière d'identification s'impose pour les sternes à bec orange... Le CHN recommande d'être très attentif à la forme et à la couleur du bec, à l'étendue du noir de la calotte et surtout à la couleur du croupion et du dos chez les oiseaux découverts à l'avenir.

STERNE DE FORSTER *Sterna forsteri* (2/2) (2/2 – 2/1)

Vendée – Pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer, ad., phot., 14 septembre (J. Thurel *et al.*) ; baie de Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez, ad., phot., du 24 décembre au 6 janvier 2006 (G. Besseau, F. Portier *et al.*).

(Amérique du Nord). La première mention de l'espèce en France concerne un adulte vu en décembre 1999 sur l'île de Ré, la deuxième un adulte présent à Saint-Pol-de-Léon et Carantec, Finistère, de janvier à mars 2003. Il y a fort à parier que les deux nouvelles mentions de 2005 ne concernent qu'un seul et même oiseau.

GUILLEMOT À MIROIR *Cephus grylle* (47/58) (25/30 – 1/1)

Manche – En mer, entre Granville et Chausey, ad., 19 février (A. Mellies).


(Arctique, Atlantique Nord).

COULICOU À BEC JAUNE *Coccyzus americanus* (1/1) (0/0 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Pount Ar Rodez, juv./1^{er} hiver, phot., 5 et 6 octobre (A. Audevard *et al.*).

(Amérique du Nord). Première donnée depuis la création du CHN en 1981 ! Il existait dans la littérature deux anciennes mentions du xx^e siècle que la CAF a demandé au CHN de réviser : seule celle d'un oiseau tué le 31 octobre 1957 à l'embouchure de l'Orne dans le Calvados a été validée (et non deux oiseaux comme les archives le mentionnaient). Celle du 6 novembre 1924 à Ronces-les-Bains, Charente-Maritime, a été refusée. Ce coulicou ouessantin a amené sur l'île une vague d'observateurs par le bateau du lendemain de sa découverte, mais tout le monde n'a pas eu la chance de l'observer dans des conditions satisfaisantes...

20. Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus*, juvénile/1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Aurélien Audevard). *Juvenile/1st-winter Yellow-billed Cuckoo.*





21. Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis*, mâle, Tulette, Drôme, mai 2005 (Jean-Noël Héron). *Red-necked Nighthawk*.



22. Martinet ramoneur *Chaetura pelagica*, Sein, Finistère, novembre 2005 (Thierry Quélennec). *Chimney Swift*.

ENGOULEVENT À COLLIER ROUX *Caprimulgus ruficollis* (5/5) (1/1 – 1/1)

Drôme – Ferme Rua, Tulette, mâle ad., trouvé mort sur la route, phot., 28 mai (J.-N. Héron).

(Espagne, Afrique du Nord). Nouvelle donnée d'Engoulevent à collier roux dans le sud-est du pays (V. *Ornithos* 12-4 : 220), après celle, non homologuée, d'un chanteur en 2004 dans la vallée des Baux-de-Provence, Bouches-du-Rhône (*Ornithos* 13-2 : 111) et celle d'un oiseau trouvé mort en juin 1997 près d'Arles, Bouches-du-Rhône (Kayser *et al.* 1998).

MARTINET RAMONEUR *Chaetura pelagica* (0/0) (0/0 – 1/1)

Finistère – Île de Sein, phot., du 30 octobre au 1^{er} novembre (T. & M. Quélennec, J.-P. & Y. Trévoux *et al.*).

(Amérique du Nord). Première mention française de ce martinet qui a séjourné deux jours sur la petite île de Sein (Trévoux 2007). Il faut dire que cette observation s'inscrit dans un afflux exceptionnel de l'espèce en Europe de l'Ouest provoqué par les restes de l'ouragan *Wilma*. Cette donnée a été inscrite en catégorie A de la Liste des oiseaux de France par la CAF (CAF 2006).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (289/437) (244/370 – 20/46)

Ain – Les Conches, Ceyzeriat, 14 octobre (P. Crouzier *et al.*).

Bouches-du-Rhône – Plaine de la Crau : mas Chauvet, Istres, 24 ind., 6 octobre, 10 ind., 9 octobre, 4 ind., 27 novembre, 2 ind., 22 décembre, 12 ind., 16 janvier 2006, phot. (G. Passavy *et al.*) ; Camargue : clos d'Amphise, 2 ind., 17 décembre (Y. Kayser).

Charente-Maritime – Réserve naturelle de Moëze-Oléron, Moëze, de 1 à 9 ind., du 30 octobre au 9 décembre (9 ind. le 17 novembre), phot. (J. Gonin *et al.*).

Côtes-d'Armor – Réserve naturelle des Sept-Îles, Perros-Guirec, 1^{er} hiver, trouvé mort, phot., 22 novembre (G. Bentz *et al.*).

Finistère – Île de Sein, 17 octobre (P. Yésou) ; île d'Ouessant : Niou-Uhella, 25 octobre (C. Peignot *et al.*) ; Lampaul-Ploudalmézeau, 2 ind., phot., 3 novembre, 4 ind., 4 novembre, 1 ind., 5 novembre (F. Barrault, T. Quélennec *et al.*).

Manche – Carolles, 2 ind., 21 septembre (S. Provost) ; Genêts, 29 octobre (S. Provost *et al.*) ; Réthoville, 31 octobre et 1^{er} novembre (A. Verneau *et al.*) ; Gatteville-le-Phare, 6 novembre (A. Verneau).

Morbihan – Île de Hoëdic, phot., 6 mai (A. Le Nevé *et al.*).

Pas-de-Calais – Audinghen, 2 ind., phot., du 4 au 9 octobre (G. Flohart), 22 novembre (G. Flohart).

Pyrénées-Orientales – Prades du delta du Réart, Saint-Nazaire, 2 ind., 20 avril (C. Peignot).

Seine-Maritime – Cap de la Hève, Sainte-Adresse, 11 octobre (P. Provost) ; Saint-Vigor-d'Ymonville, 3 ind., 15 novembre, 2 ind., 18 novembre (P. Provost *et al.*).

Vendée – Champagné-les-Marais, 2 ind., du 5 au 14 janvier (B. Perrotin, A. Thomas *et al.*) ; La Pire Claire, Champagné-les-Marais, 2 ind., du 13 décembre au 21 janvier 2006 (A. Thomas *et al.*).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie). L'espèce continue sa progression dans notre pays. Indépendamment du nombre croissant de départements où l'espèce se manifeste désormais, l'effectif

d'hivernants augmente également ; à titre d'exemple en Crau : 17 individus hivernants du 25 octobre 2004 au 23 février 2005, 24 cette année, et jusqu'à 9 individus en Charente-Maritime. Dans les Pyrénées-Orientales, les 2 oiseaux du 20 avril sont à priori des migrateurs (phénomène connu dans ce secteur) ; rappelons qu'un individu avait hiverné du 22 décembre 2004 au 22 mars 2005 et jusqu'à 4 individus du 21 décembre 2003 au 7 mars 2004 dans ce même delta du Réart. Pour les statistiques, le problème vient surtout du secteur Crau-Camargue, où il est particulièrement difficile de faire la part des choses entre les migrateurs postnuptiaux (hypothétiques dans cette région) et les hivernants, ainsi que des hivernants de retour ; par rapport aux chiffres fournis, 9 oiseaux supplémentaires seront comptabilisés cette année en ayant conscience que nous resterons dans le flou tant qu'une opération de marquage coloré n'aura pas été mise au point dans ce secteur (passage d'automne, hivernage, nombre d'oiseaux concernés, âge des oiseaux, revenants, déplacements au cours de l'hiver...). Pour le sud vendéen, on peut également supposer que les 2 individus de décembre 2005 sont les mêmes que ceux ayant hiverné en début d'année, mais sans preuve, ils ont été comptabilisés comme de nouveaux oiseaux. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewskii* (4/4) (4/4 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Créac'h, juv./1^{er} hiver, phot., 14 et 15 octobre (A. Audevard, M. Vaslin *et al.*).

(Sud de la Sibérie, Chine et nord-est de l'Inde). Une donnée supplémentaire pour Ouessant (l'île de Sein et la plaine de la Crau ont accueilli les deux premiers oiseaux français en 1998).



23. Pipit de Richard *Anthus richardi*, Crau, Bouches-du-Rhône, octobre 2005 (Thomas Perrier). *Richard's Pipit*.



24. Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii*, 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Aurélien Audevard). *1st-winter Blyth's Pipit*.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (46/50) (35/37 – 4/6)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans ».

Doubs – Houtaud, mâle, du 8 au 12 mai (D. Michelat).

Haute-Corse – Barcaggio, Ersu, mâle, 2 et 3 mai (M. Zucca) ; 2 mâles, 18 mai ; Maccinaggio, mâle, 20 mai (F. Portier).

Var – Salins des Pesquiers, Hyères, mâle ad., 25 juillet (N. Issa *et al.*).

(Sibérie, Extrême-Orient). Cinq oiseaux consacrent 2005 année record pour cette sous-espèce, et dans une frange de notre pays plutôt classique.

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (10/10) (10/10 – 4/4)

Hautes-Alpes – Lac de Mison, Le Poët, fem., phot., 21 avril (O. Tourillon).

Morbihan – Île d'Hoëdic, fem., phot., 24 avril (A. Le Nevé).

Savoie – Base de loisirs, Motz, mâle 1^{er} été, phot., 20 et 21 avril (J.-P. Jordan *et al.*).

Vendée – Lagunage de La Tranche-sur-Mer, juv./1^{er} hiver, 27 août (A. Thomas *et al.*).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). L'espèce n'avait pas été observée en France depuis le printemps 2001 (dans le Doubs). 4 mentions en 2005 représentent donc une excellente année et même un record, qui était détenu jusqu'à présent par 1998 avec 3 données. À noter que l'observateur des Hautes-Alpes avait découvert une Bergeronnette des Balkans en avril 2003 dans ce même département...

ROSSIGNOL PROGNÉ *Luscinia luscinia* (5/5) (3/3 – 1/1)

Pas-de-Calais – Fond du Phare, Wissant, juv./1^{er} hiver, capt, phot., 5 septembre (C. Hildebrand *et al.*).

(De la Scandinavie et l'Autriche jusqu'en Sibérie). Ce Rossignol progné a été capturé le même jour et sur le même site qu'une Fauvette épervière !

ROBIN À FLANCS ROUX *Tarsiger cyanurus* (3/3) (3/3 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Ar Reun, juv./1^{er} hiver, phot., du 23 au 27 octobre (A. Audevard, N. Issa, T. et M. Quélennec *et al.*).

(De la Finlande à la Sibérie orientale et au Japon). Troisième mention pour Ouessant et toujours dans les mêmes dates (précédentes : 27 octobre 1993 et du 24 octobre au 2 novembre 2003). Entre temps, une autre observation avait été obtenue à Blériot, Pas-de-Calais, du 20 au 23 octobre 2002.

25. Bergeronnette citrine *Motacilla citreola*, mâle 1^{er} été, Motz, Savoie, mai 2005 (Maxime Birot). *1st-summer male Citrine Wagtail*.



26. Bergeronnette citrine *Motacilla citreola*, femelle, Hoëdic, Morbihan, mai 2005 (Arnaud Le Nevé). *Female Citrine Wagtail*.



27. Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus*, 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Nidal Issa). *1st-winter Red-flanked Bluetail*.



28. Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus*, 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Thierry Quélennec). *1st-winter Red-flanked Bluetail*.



29. Tarier oriental
Saxicola torquatus maura,
1^{er} hiver, Ouessant,
Finistère, octobre 2005
(Philippe J. Dubois).
1st-winter Siberian Stonechat.

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus* (1/1) (5/5 – 5/5)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *samamisisicus*.

Aude – Leucate, mâle ad., 26 mars (F. Garcia).

Hérault – La Caunette, mâle ad., 19 septembre (S. Nicolle) ; Montouliers, mâle ad., phot., 21 septembre (R. Weenink *vide* F. Neijts) ; Vendémian, mâle ad., 23 septembre (M. Duquet), mâle ad., 12 octobre (M. Duquet). (Crimée et Caucase jusqu'en Iran). Année tout à fait extraordinaire pour cette sous-espèce dont il n'existe qu'une seule donnée au XX^e siècle antérieure à la création du CHN. À noter bien sûr les arrivées concomitantes de septembre dans l'Hérault. Pour mémoire, deux oiseaux ont été découverts à Texel, Pays-Bas, le 10 septembre 2005 (van der Vliet, van der Laan, Berlijn and CDNA 2006).

TARIER PÂTRE *Saxicola torquatus* (23/23) (19/19 – 2/2)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *maura*, appelée « Tarier oriental ».

Finistère – Île d'Ouessant : Créac'h, fem. 1^{er} hiver, phot., du 16 au 30 octobre (A. Audevard, P. Cruzier, P.J. Dubois, J.-Y. Frémont, N. Issa, M. Vaslin *et al.*).

Pas-de-Calais – Audinghen, fem. 1^{er} hiver, phot., 16 octobre (G. Flohart).

(Mer Blanche, Sibérie). La similitude des dates d'arrivée des oiseaux du Finistère et du Pas-de-Calais est remarquable !

TRAQUET PIE *Oenanthe pleschanka* (4/4) (4/4 – 1/1)

Loire-Atlantique – Le Croisic, fem., phot., 12 novembre (J.-M. Thibault).

(De la Roumanie au Moyen-Orient jusqu'en Sibérie orientale). Belle découverte sur la jetée du port du Croisic de ce traquet rare, qui n'a malheureusement pas été retrouvé le lendemain... La dernière mention était du 1^{er} novembre 2003 au cap de la Hague dans la Manche.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica* (-/-) (3/3 – 0/0)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *melanoleuca*.

2004 Vendée – Marais de la Guittière, Jard-sur-Mer, fem. ad., phot., 24 et 25 octobre (L. Bellanger, S. Courant). (Des Balkans aux bords de la Caspienne). Les deux premières mentions précédentes sont du printemps 2003 en Haute-Corse et en Vendée.

TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (24/25) (23/23 – 1/1)

Morbihan – Île d'Hoëdic, mâle 1^{er} hiver, 22 et 23 janvier (A. Le Nevé).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). L'Île de Hoëdic n'avait pas accueilli l'espèce depuis l'afflux de 1997 (10 données en France), où le Morbihan avait reçu un total de 3 individus.

GRIVE DORÉE *Zoothera dauma* (12/13) (3/3 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Kerhuel, 15 octobre (M. Vaslin *et al.*).

(Sibérie centrale et septentrionale). Comme souvent, cette grive n'a pas été revue, engendrant bien des frustrations...

LOCUSTELLE LANCÉOLÉE *Locustella lanceolata* (3/3) (3/3 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Stang Meur, 26 octobre (P. Cruzier, P.J. Dubois, G. Flohart).

(Sibérie, Japon). Les 4 données françaises sont ouessantines, les précédentes étant des 15 et 16 août 1986, 11 septembre 1986 (oiseau trouvé mort au pied du phare du Créac'h) et 28 octobre 1990 (cette dernière à Stang Meur également).

LOCUSTELLE FLUVIATILE *Locustella fluviatilis* (9/10) (6/7 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Étang de Berre, Saint-Chamas, 7 septembre (T. Louvel).

(Sud de la Baltique, Balkans, jusqu'en Sibérie occidentale). Si la dernière donnée est de 2004 (dans l'Ain), la précédente était de 1998 (dans le Nord). À part un oiseau capturé le 11 septembre 1962 à Ouessant, Finistère, toutes les autres mentions proviennent de chanteurs printaniers (et une seule d'août en Corse).

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (28/28) (28/28 – 1/1)

Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu, Saint-Philbert de Grand-Lieu, juv./1^{er} hiver, capt., phot., 28 août (S. Reeber).

2004 Finistère – Île de Sein, phot., 19 octobre (P.-A. Crochet, E. Didner).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Depuis 1997, un oiseau au moins a été mentionné chaque année en France. L'année record est 2003 avec 4 individus. La donnée de 2004 parvenue tardivement nous rappelle que Sein avait déjà accueilli l'espèce du 19 au 22 octobre 2000.



30. Rousserole isabelle
Acrocephalus agricola,
1^{er} hiver, lac de Grand-Lieu,
Loire-Atlantique, août 2005
(Sébastien Reeber).
1st-winter Paddyfield Warbler.

HYPOLAÏS OBSCURE *Hippolais opaca* (2/2) (1/1 – 1/1)

Var – Île du Levant, barrage du Bas, Hyères, 19 mai (N. Issa).

2004 Haute-Corse – Barcaggio, Ersu, ad., capt., phot., 1^{er} mai (A. Le Dru, G. Faggio, C. Jolin *et al.*).

(Afrique du Nord, Espagne). Jusqu'à cette donnée de 2004, il n'existait qu'une seule mention française : un oiseau capturé le 21 mai 1960 au Grau-du-Roi, Hérault. Deux observations deux années de suite, c'est donc tout à fait remarquable.

HYPOLAÏS BOTTÉE *Hippolais caligata* (6/6) (6/6 – 0/0)

2004 Finistère – Île d'Ouessant : Bougezenn, ad., phot., du 16 au 18 octobre (A. Audevard, P.-P. Évrard, M. Vaslin, M. Vergès *et al.*) et non 1^{er} hiver comme précédemment mentionné.

(Iran, Asie centrale, Mongolie).

HYPOLAÏS RAMA *Hippolais rama* (1/1) (1/1 – 0/0)

2000 Finistère – Île d'Ouessant : Gouzoul, phot., 13 octobre (R. Armada, E. Didner, A. Joris, L. Spanneut).

(Asie centrale). Première mention française pour cette hypolaïs qui avait déjà été notée en automne ailleurs en Europe. Cette donnée a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France (CAF 2006).

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (56/57) (29/29 – 6/6)

Finistère – Île d'Ouessant : Kun, 1^{er} hiver, 18 octobre (A. de Broyer *et al.*).

Lot-et-Garonne – Étang de la Mazière, Villeton, 1^{er} hiver, capt., phot., 15 octobre (A. Dal Molin).

Morbihan – Île de Hoëdic, 1^{er} hiver, phot., 20 octobre (A. Le Nevé) ; 1^{er} hiver, capt., phot., 23 octobre (A. Le Nevé *et al.*).

Pas-de-Calais – Audinghen, 1^{er} hiver, 3 septembre (G. Flohart) ; fond du Phare, Wissant, 1^{er} hiver, capt., phot., 5 septembre (C. Hildebrand *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Après une bonne année 2004 qui totalisait 5 individus, 2005 devient l'année record pour cette espèce avec 6 oiseaux. À noter les deux captures sur Hoëdic à 3 jours d'intervalle, ainsi que celles du Pas-de-Calais à deux jours d'écart ; soulignons également que l'oiseau d'Audinghen du 3 septembre a été vu sur le même site que celui du 4 septembre 2004...

FAUVETTE SARDE *Sylvia sarda* (24/23) (23/22 – 0/0)

En dehors de la Corse.

2004 Bouches-du-Rhône – Camargue : Piémanson, mâle, phot., 14 mars (M. Thibault).

2004 Pyrénées-Orientales – Salses-le-Château, mâle 1^{er} été, 9 avril (J. Gonin, S. Provost).

(Méditerranée). Deux nouvelles mentions pour 2004 qui en avait déjà deux (V. rapport précédent) ; avec un total de 4 données, 2004 est donc plutôt un bon millésime. Il faut souligner que les précédentes observations remontaient à 1998.

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans* (1/1) (1/1 – 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *albistriata*.

Var – Île de Porquerolles : station d'épuration, mâle 1^{er} été, 26 avril (P. Crouzier, P.J. Dubois) ; mâle 1^{er} été, capt., phot., 9 mai (S. Uriot, B. Vollot).

(De la Slovénie à l'ouest de la Turquie). Après la première mention française de cette sous-espèce en 2004 (Audevard 2007), deux nouvelles données viennent enrichir le fichier du CHN.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (68/71) (66/69 – 8/7)

Finistère – Île d'Ouessant : Poull Dragas, phot., 13 et 14 octobre (N. Issa, M. Vaslin *et al.*), Pount Salaün, 16 octobre (F. Barrault, Y. Le Corre, W. Raitière *et al.*), Prad Meur, 20 octobre (Y. Le Corre *et al.*) ; île de Sein, du 16 au 18 octobre (P. Yésou *et al.*), du 29 au 31 octobre (J.-P. & Y. Trévoux).

Manche – Mare de Vauville, Vauville, 28 et 29 octobre (R. Aubry, S. Chambris, S. Vincent *et al.*).

Vendée – Île d'Yeu : pointe des Corbeaux, 30 octobre (X. Hindermeier) ; mare des Agaures, la Chaume, Les Sables-d'Olonne, 31 octobre (B. Vallée-Mounier *et al.*).

2001 Indre-et-Loire – Saint-Pierre-des-Corps, 9 octobre (L. Le Gal).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Très bonne année avec 7 oiseaux, le record étant détenu par 1997 et 2003 qui totalisent toutes deux 9 individus. Sur Ouessant, selon les observateurs, l'oiseau de Pount Salaün

reconnaissable à son plumage plutôt délavé serait le même que celui de Prad Meur. À noter aussi la fréquentation de secteurs inhabituels comme le Cotentin ou l'île d'Yeu, comme l'est d'ailleurs également la donnée (remarquable) de 2001 parvenue tardivement.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (819/875) (801/857 – 94/130)

Aude – La Franqui, Leucate, 31 octobre (T. Guillosson).

Charente-Maritime – Sablières de Plaisance, Moëze, 28 octobre (J. Gonin), 3 novembre (J. Gonin), 7 et 8 novembre (J. Gonin *et al.*) ; bords de la Charente, Rochefort-sur-Mer, 31 octobre (J. Gonin *et al.*).

Finistère – Île d'Ouessant : Stang Korz, du 29 septembre au 12 octobre, 2 ind., 13 octobre, 1 ind., 14 octobre (J.-F. Arcanger, A. Audevard, N. Issa *et al.*), 2 ind., 22 octobre (A. Chabrolle *et al.*), 1 ind., du 26 octobre au 2 novembre (A. Audevard, F. Bouzendorf, E. Gousset) ; Stang Porz Gwenn, 30 septembre (A. Audevard), 5 et 6 octobre (A. Audevard, N. Issa *et al.*), 2 ind., 8 et 9 octobre (J.-F. Arcanger, R. Baeta), 1 ind., du 17 au 19 octobre, 2 ind., 20 octobre (R. Baeta, P.-P. Évrard), 3 ind., 22 octobre (A. Chabrolle), 1 ind., 24 octobre (A. Chabrolle), 26 et 27 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart), du 30 octobre au 6 novembre (A. Audevard, A. Chabrolle) ; Arland, 2 ind., 4 et 5 octobre (A. Audevard *et al.*), 1 ind., 22 et 23 octobre (R. Baeta, A. Chabrolle, F. Bouzendorf, E. Gousset), 2 ind., du 24 au 28 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart), 4 ind., 4 novembre (A. Chabrolle) ; Feunteun Velen, 5 octobre (A. Audevard *et al.*) ; Gorrekear, 5 octobre (A. Audevard *et al.*) ; Kéranchas, phot., du 5 au 9 octobre (A. Audevard, M. Zucca *et al.*) ; Pount Ar Rodez, 2 ind. du 5 au 9 octobre, 1 ind. du 10 au 13 octobre (A. Audevard, N. Issa, A. Le Nevé *et al.*), 26 et 27 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, A. Virondeau *et al.*) ; Ty Crenn, 5 et 6 octobre (A. Audevard, N. Issa *et al.*), du 16 au 19 octobre (P.-P. Évrard, X. Rozec), 2 ind., du 21 au 27 octobre (R. Baeta, F. Bouzendorf, P.J. Dubois, P.-P. Évrard, E. Gousset, N. Issa), du 19 au 21 novembre (A. Audevard) ; Kun, du 6 au 13 octobre (A. Audevard, N. Issa, R. Baeta *et al.*), 25 octobre (F. Bouzendorf, E. Gousset) ; Porz Noan, 6 octobre (A. Audevard *et al.*) ; Stang Meur, 6 octobre (A. Audevard *et al.*), 15 octobre (W. Raitière *et al.*), du 23 au 27 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart, A. Virondeau *et al.*), 3 ind., 28 et 29 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart) ; Stang Ar Stiff, 6 octobre (A. Audevard *et al.*), 2 ind., 27 octobre, 1 ind., 28 octobre (F. Bouzendorf, G. Flohart, E. Gousset, A. Virondeau *et al.*), 2 ind., 4 novembre (A. Chabrolle) ; Dalar, 9 octobre (N. Issa) ; Kernonnen, 9 octobre (A. Audevard, N. Issa, M. Vaslin) ; Ar Godec, 14 octobre (R. Baeta, N. Issa) ; Kerhuel, 14 et 15 octobre (A. Audevard), 22 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart), 24 octobre (F. Bouzendorf, E. Gousset), 22 novembre (A. Audevard) ; Pount Salaün, 15 et 16 octobre (R. Baeta, N. Issa, W. Raitière), 3 ind., 23 octobre (A. Chabrolle) ; Toull Al Lann, 16 octobre (W. Raitière) ; Frugullou, 17 octobre (R. Baeta, N. Issa) ; Pount Mikeal, 19 octobre (W. Raitière, Y. le Corre) ; Kervasdoué, 2 ind., du 20 au 26 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, N. Issa), 28 et 29 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, A. Virondeau *et al.*) ; Poull Bojer, 20 octobre (N. Issa) ; Penn Ar Lann, 21 octobre (W. Raitière, Y. le Corre) ; Kadoran, du 22 au 28 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, N. Issa, A. Virondeau *et al.*), 5 novembre (A. Audevard) ; Lampaul, 22 octobre (R. Baeta) ; Park Raden, 22 octobre (R. Baeta), 27 octobre (G. Flohart) ; Parkou, 4 ind., 22 octobre (R. Baeta), 14 ind., 25 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois), 1 ind., 26 octobre, 3 ind., 30 octobre (F. Bouzendorf, E. Gousset) ; Ar Reun, 3 ind., du 23 au 27 octobre (R. Baeta, F. Bouzendorf, E. Gousset, N. Issa) ; réservoir aval, 24 et 25 octobre (A. Audevard, N. Issa) ; Poull Brac, 25 au 28 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart) ; Penorz, 25 octobre (A. Virondeau *et al.*). Étang de Nérizélec, Plovan, 7 octobre (P. Durllet) ; Porspoder, 9 octobre (T. Quélenec, M. Quélenec) ; île de Sein, 18 octobre (P. Yésou *et al.*).

Ille-et-Vilaine – Anse du Guesclin, Saint-Coulomb, 28 octobre (L. Godet).

Loire-Atlantique – Port Barbe, La Chapelle-sur-Erdre, 4 novembre (W. Raitière) ; La Chantrerie, Nantes, 10 novembre (S. Dulau) ; Mauves-sur-Loire, 26 novembre (Y. Trévoux).

Manche – Carolles, capt., phot., 18 septembre (S. Provost *et al.*).

Mayenne – Montaigu, Hambers, 8 octobre (B. Duchenne).

Morbihan – Île de Hoëdic, phot., 17 et 18 octobre (A. Le Nevé *et al.*), 1^{er} novembre (A. Le Nevé *et al.*).

Pas-de-Calais – Haringzelle, Audinghen, 4 octobre (G. Flohart) ; Cran Poulet, Audinghen, 4 octobre (G. Flohart), 8 et 9 octobre (G. Flohart *et al.*), 15 octobre (G. Flohart *et al.*) ; Fond Pignon, Sangatte, 11 octobre (F. Gabillard *et al.*) ; Floringzelle, Audinghen, phot., 13 octobre (F. Gabillard *et al.*), 19 octobre (G. Flohart) ; Audinghen, 15 octobre (G. Flohart).

Rhône – Plan d'eau du Grand Large, Meyzieu, capt., phot., 8 octobre (J.-M. Béliard *cf.* Y. Thonnerieux).

Vendée – Île de Noirmoutier : polder Sébastopol, Barbâtre, 4 et 5 octobre (M. Zucca *et al.*) ; lotissement du Grand Müllembourg, Noirmoutier-en-l'île, 10 et 11 octobre (D. Desmots *et al.*) ; mare des Agaures, la Chaume, Les Sables-d'Olonne, 15 octobre (F. Portier), du 20 au 21 octobre (B. Vallée-Mounier *et al.*) ; La Dive, Saint-Michel-en-l'Herm, 23 octobre (A. Thomas), 27 octobre (A. Thomas) ; île d'Yeu : pointe des Corbeaux, 23 octobre (X. Hindermeier, F. Portier) ; vallée du Brandeau, Brétignolles-sur-Mer, 6 novembre (D. Desmots).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale). Avec 130 oiseaux, 2005 accroche la première place du classement devant 2003, jusqu'à présent année record avec 100 individus (1988 occupe la troisième



31. Pouillot de Hume *Phylloscopus humei*, 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, décembre 2005 (Aurélien Audevard). *Hume's Leaf Warbler*.



32. Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus*, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Nidal Issa). *Dusky Warbler*.

place avec 94 individus). La moyenne annuelle depuis 1981, année de création du CHN, se situe entre 39 et 40 oiseaux. Cette bonne performance de 2005 est à mettre en relation avec l'afflux très important qui s'est produit un peu partout en Europe ; à titre d'exemple, le record du mois d'octobre en Grande-Bretagne a été multiplié par deux avec 1 250 Pouillots à grands sourcils ; il y en a eu jusqu'à 100 sur l'île d'Utsira en Norvège, 75 en Irlande et des dizaines en Allemagne (*Birding World* 18-10). De même sur Ouessant, la journée du 25 octobre restera dans les mémoires, avec 36 oiseaux différents (un record), dont 14 sur le seul site des Parkou ! Cet afflux a également été visible dans les départements plus inhabituellement concernés (Aude, Charente-Maritime, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Rhône). En Loire-Atlantique, l'oiseau du 10 novembre à La Chantrerie est sans doute le même que celui vu tout près de là le 4 novembre, il n'a donc pas été comptabilisé. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006, mais elle termine sa prestation au CHN (dont elle reste le logo) en beauté.

POUILLOT DE HUME *Phylloscopus humei* (12/13) (12/13 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Prad Meur et Lampaul, 1^{er} hiver, phot., du 16 décembre au 4 mai 2006 (A. Audevard *et al.*). (Du nord-est de l'Afghanistan à la Chine centrale). Premier cas d'hivernage complet de ce pouillot que le printemps venu a même incité à chanter. Ce séjour prolongé a permis à un certain nombre d'observateurs qui avait manqué l'afflux de l'automne 2003 de venir le voir...

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (31/32) (31/32 – 3/3)

Finistère – Île d'Ouessant : Créac'h et Cost Ar Reun, phot., du 16 au 23 octobre (J.-Y. Frémont, N. Issa, P.-P. Évrard *et al.*).
Manche – Carolles, 20 octobre (S. Provost).

Vendée – Île d'Yeu : pointe des Corbeaux, du 23 au 25 octobre (X. Hindermeier, F. Portier).

(Asie centrale et septentrionale). Arrivée notable autour du 20 octobre. L'île d'Yeu enregistre sa première mention de l'espèce. La moyenne annuelle depuis 1981 (date de la création du CHN) est d'un peu plus d'une donnée par an.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

1 – Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis* (16/21) (13/18 – 1/1)

Ardèche – Rochemaure, capt., phot., 24 décembre (J. Girard-Claudon). (Sibérie orientale).

2 – Pouillots véloces de type sibérien (188/219) (147/156 – 8/8)

Bouches-du-Rhône – Camargue : plage de Piémanson, 19 mars (Y. Kayser) ; Tour-du-Valat, du 4 au 7 novembre (Y. Kayser *et al.*).



33. Gobemouche nain *Ficedula parva*, 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Nidal Issa). *1st-winter Red-breasted Flycatcher*.



34. Gobemouche nain *Ficedula parva*, mâle, Ouessant, Finistère, octobre 2005 (Fabrice Jallu). *Male Red-breasted Flycatcher*.

Finistère – Île de Sein, 19 octobre (P. Yésou *et al.*) ; Île d'Ouessant : Ar Picard, du 28 octobre au 1^{er} novembre (J. Piette *et al.*) ; Stang Ar Stiff, 28 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart).

Morbihan – Île de Hoëdic, 30 octobre (Y. Kayser *et al.*).

Vendée – Mare des Agaures, la Chaume, Les Sables-d'Olonne, 5 novembre (P. Yésou) ; île de Noirmoutier : réserve naturelle des marais de Müllembourg, phot., 28 novembre (D. Desmots *et al.*).

2004 Morbihan – Île de Groix : Quehello, 31 octobre (M. Zucca *et al.*).

(Sibérie). Année presque dans la moyenne annuelle qui se situe à un peu moins de 9 individus par an depuis 1981 pour les Pouillots véloces de type sibérien. Ce commentaire vaut aussi pour les oiseaux de la sous-espèce *tristis*, puisque la moyenne annuelle est d'un peu moins d'un individu par an. La sous-espèce *tristis* ainsi que les Pouillots véloces de type sibérien (à savoir les oiseaux présentant les caractéristiques de *tristis* mais non chanteurs et non capturés) ne sont plus soumis à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (339/361) (284/298 – 24/24)

Doubs – Mont-de-Vougney, mâle ad., chant., enr., vidéo, 26 juin (L. Eloy).

Finistère – Île d'Ouessant : Stang Meur, 1^{er} hiver, phot., 20 septembre (B. Segerer *et al.*), 1^{er} hiver, trouvé mort, 11 octobre (R. Baeta *et al.*) ; Stang Ar Stiff, 1^{er} hiver, 30 septembre (A. Audevard), 1^{er} hiver, phot., du 27 octobre au 2 novembre (A. Audevard, F. Desage *et al.*) ; Kervasdoué, 1^{er} hiver, 1^{er} et 2 octobre (A. Audevard, F. Barrault *et al.*) ; Stang Korz, 1^{er} hiver, 1^{er} octobre (A. Audevard), 1^{er} hiver, 17 octobre (F. Jallu, C. Kerihuel) ; mâle ad., phot., du 17 au 20 octobre (P.-P. Évrard, F. Jallu, C. Kerihuel), 1^{er} hiver, 22 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart) ; Ty Crenn, 3 octobre (A. Audevard), 1^{er} hiver, 8 octobre (J.-F. Arcanger *et al.*) ; Porz Gwenn, 1^{er} hiver, phot., 3 octobre (A. Audevard, Y. Toupin) ; Pount Salaün, 1^{er} hiver, 6 octobre (A. Audevard, R. Baeta, N. Issa) ; Ar Reun, 1^{er} hiver, 8 octobre (R. Baeta) ; Kerscao, 1^{er} hiver, phot., du 14 au 18 octobre (A. Audevard, R. Baeta) ; Kéridreux, 1^{er} hiver, 15 octobre (P.-P. Évrard, W. Raitière *et al.*) ; Arland, 1^{er} hiver, 15 octobre (P.-P. Évrard) ; Kun, 1^{er} hiver, 15 octobre (F. Barrault *et al.*) ; Kerhuel, 1^{er} hiver, phot., du 16 au 21 octobre (M. Ameels, A. Audevard, N. Issa *et al.*), 2 ind., 22 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois, G. Flohart). Île de Sein, phot., 15 octobre (P. Yésou *et al.*).

Loire-Atlantique – Le Croisic, 1^{er} hiver, phot., 5 novembre (J.-P. & Y. Trévoux).

Pas-de-Calais – Blériot-Plage, 1^{er} hiver, phot., 24 septembre (J. Boulanger, S. Chambris *et al.*).

2004 Manche – Grande île, archipel de Chausey, Granville, 1^{er} hiver, 14 octobre (F. Gallien *et al.*).

2002 Bouches-du-Rhône – Calanque de Marseille, Marseille, 1^{er} hiver, 13 octobre (E. Dansette).

2000 Vendée – La Chaume, Les Sables-d'Olonne, 1^{er} hiver, 1^{er} octobre (B. Vallée-Mounier *et al.*).

(Europe de l'Est, Asie centrale jusqu'au Kamtchatka). Avec 22 oiseaux dont un mâle adulte sur Ouessant (le dernier était de 2003 sur Sein), 2005 est un bon millésime puisqu'elle se situe en troisième position (après 1995 et 2003) depuis la création du CHN. À noter aussi un mâle chanteur pour la deuxième année consécutive en Franche-Comté. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

PIE-GRIÈCHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (11/11) (11/11 – 1/1)

1 – Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *isabellinus*.

1996 Finistère – Île d'Ouessant : Cost Ar Reun, 1^{er} hiver, phot., du 1^{er} au 8 novembre (D. Laloi, S. Pignocchi *et al.*).

1998 Gironde – Domaine de Certes, Audenge, 1^{er} hiver, phot., du 27 novembre au 15 décembre (F. Dupuy, P. Nadé *et al.*).

2004 Finistère – Île d'Ouessant : Stang Meur, 1^{er} hiver, phot., du 26 octobre au 2 novembre (P. Crouzier, F. Jiguet, B. Segerer *et al.*).

2 – Individus présentant les caractéristiques de la race *phoenicuroides*, appelée « Pie-grièche du Turkestan ».

1982 Finistère – Île d'Ouessant, fem. ad., 27 septembre (P.J. Dubois, H. du Plessix).

1986 Finistère – Île d'Ouessant : Gouzoul, fem. ad. probable, du 16 au 19 août (Y. Guermeur *et al.*).

1987 Finistère – Île d'Ouessant, 1^{er} hiver, 14 septembre (A. Thomas, V. R. Tucker *et al.*).

1991 Corse-du-Sud – Ajaccio, 1^{er} hiver, du 1^{er} au 3 novembre (S. Harrap *et al.*).

1999 Finistère – Île d'Ouessant : Locqueltas, 1^{er} hiver, 17 octobre (P.-P. Évrard, T. & M. Quélenec *et al.*).

2002 Seine-Maritime – Baie de Seine, marais du Hode, Le Havre, 1^{er} hiver probable, 17 novembre (F. Malvaud *et al.*).

2005 Bouches-du-Rhône – Camargue : mas du Petit Badon, Salin-de-Giraud, 1^{er} hiver, 14 septembre (Y. Kayser).

3 – Individus présentant des caractéristiques intermédiaires entre les sous-espèces *isabellinus* et *phoenicuroides*.

1999 Haute-Saône – Vitrey-sur-Mance, 1^{er} hiver, phot., du 23 au 27 octobre (B. Bourriot, R. Dujardin, J. Menetrey, D. Michelat *et al.*).

4 – Individus dont la sous-espèce n'a pas pu être déterminée.

1997 Hérault – Fréjorgues, Pérols, 1^{er} hiver, 29 novembre (G. Balança, P.-Y. Henry).

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). La révision demandée par la CAF de toutes les données de Pie-grièche isabelle, afin d'assigner dans la mesure du possible un taxon à chaque cas, est terminée. C'est pourquoi, à l'instar de ce qui avait été fait après la révision des Hypolaïs pâle et bottée (V. Ornithos 12-1 : 29), toutes les mentions sont reprises ici. L'avis de notre expert, Norbert Lefranc, a été déterminant, puisque comme il aime à le rappeler lui-même, il s'est « mouillé », ce qui n'est pas toujours le cas des experts sollicités. En effet, il n'y a pas de cas faciles (pas de mâle adulte) dans ces 12 observations françaises (une seule femelle adulte). En résumé, on trouve donc 7 *phoenicuroides* sûres et probables (dont au moins une femelle adulte, peut-être deux) et 3 *isabellinus* de 1^{er} hiver. S'y ajoutent 2 individus pour lesquels il est trop délicat de proposer une sous-espèce pour le moment. Un article complet sur la question vient d'être publié (Lefranc 2007).

ÉTOURNEAU UNICOLE *Sturnus unicolor* (64/143) (61/140 – 2/3)

En dehors de la Corse (nouvelles localités seulement ou preuves de reproduction).

Bouches-du-Rhône – Camargue : Salin-de-Giraud, mâle probable, ad., 5 avril (Y. Kayser).

Landes – Seignosse-le-Penon, 2 ad., 2 mai, 1 ad., du 3 au 5 mai, phot. (A. Le Calvez).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord). Un des deux adultes landais se reproduisait dans un nichoir avec un Étourneau sansonnet *S. vulgaris*. L'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2006.

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (139/305) (117/262 – 6/6)

Bouches-du-Rhône – Camargue : Cabano dis Ego, Le Sambuc, juv., 16 août (Y. Kayser).

Charente-Maritime – Île de Ré : Les Guillieux, Saint-Clément-des-Baleines, juv., phot., du 28 août au 6 septembre (A. Chabrolle, J.-L. Reuzé *et al.*).

Finistère – Île de Sein, juv., phot., du 7 au 17 septembre (A. Audevard, F. Barrault, A. Chabrolle, A. Le Nevé) ; île d'Ouessant : pointe de Pern, juv., 16 octobre (P.-P. Évrard).

Maine-et-Loire – La Mastelle, Montreuil-Juigné, mâle probable, 1^{er} été, phot., du 25 juin au 15 juillet (A. Fossé *et al.*).

Pas-de-Calais – Berck-sur-Mer, juv., 29 septembre (A. Lepretre).

2004 Côtes-d'Armor – Plévenon, mâle, 1^{er} été probable, phot., 7 septembre (A. Chabrolle).

2004 Finistère – Pointe Saint-Matthieu, Plougouvelin, juv., du 31 octobre au 20 novembre (M. Champion *et al.*).

2004 Ille-et-Vilaine – Cherrueix, juv., 5 novembre (A. Chabrolle).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Petite année après les trois glorieuses successives de 2000, 2001 et surtout 2002 (année record avec 121 individus) encore dans les mémoires. L'oiseau du Maine-et-Loire présentait une anomalie à la patte gauche (absence d'ongles aux doigts antérieurs, ongle postérieur long), laissant planer un doute sur son origine. Il a toutefois été maintenu en catégorie A.

MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (25/31) (20/25 – 1/1)

Haute-Corse – Barcaggio, Ersu, mâle ad., capt., phot., 14 mai (M. Vaslin *et al.*).

1999 Corse-du-Sud – Bonifacio, mâle ad., 25 juillet (A. Liger *et al.*).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Première donnée de l'espèce en Haute-Corse (et ce n'est pas un hybride comme il y en a tant sur la côte sud-est de l'île !).

ROSELIN GITHAGINE *Bucanetes githagineus* (7/7) (7/7 – 3/4)

Finistère – Île d'Ouessant : pointe de Pern, mâle imm. probable, phot., 9 mai (A. Audevard).

Manche – Îles Chausey, Granville, mâle 1^{er} été, 14 juin (S. Provost).

Var – Île du Levant, Hyères, mâle et fem. ad., 9 mai (A. Zammit).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, jusqu'à l'Inde). Ces données s'inscrivent parfaitement dans l'afflux sans précédent qui s'est produit au printemps 2005 en Europe avec plus de 25 individus. Indépendamment des pays méditerranéens, la Grande-Bretagne, la Suisse, les Pays-Bas ont été touchés, mais aussi la Suède et même Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise (*Dutch Birding* 27-4 : 281) ! À priori une sécheresse particulière au Maroc aurait affecté les ressources alimentaires et par là-même les conditions de reproduction de plusieurs espèces comme le Roselin githagine dont des bandes erratiques étaient observées en pleine période normale de nidification (O. Fontaine *vide* B. Paepegaey *in litt.*). Cette hypothèse est appuyée par l'apparition en France dans des régions inhabituelles de certaines autres espèces comme l'Alouette calandre *Melanocorypha calandra* en Lozère (reproduction de 3 ou 4 couples sur le Causse Méjean), en Aveyron, en Isère, dans les Alpes-de-Haute-Provence ou sur l'île de Porquerolles, Var (Legendre & Scher 2006). L'Espagne a accueilli une Ammomane élégante *Ammomanes cincturus* (*Birding World* 18-5 : 196), la Suisse un nombre inhabituel d'Alouettes calandre et calandrelle *Calandrella brachydactyla* (B. Paepegaey *in litt.*).

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (163/198) (148/183 – 4/4)

NB : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d'un astérisque (*).

Doubs – Labergement-Sainte-Marie, mâle ad. jaune*, chant., du 28 mai au 18 juin (B. Tissot *et al.*).

Finistère – Île d'Ouessant : Gouzoul, 1^{er} hiver, 17 novembre (A. Audevard).

Pas-de-Calais – Cran de Quette, Audinghen, chant. *, 27 mai (G. Flohart) ; Châtelet, Tardinghen, chant. *, 30 mai au moins (G. Flohart).

2004 Doubs – Labergement-Sainte-Marie, mâle gris*, chant., du 8 juin au 1^{er} juillet (D. Michelat *et al.*).

2004 Finistère – Île d'Ouessant : Arland, 1^{er} hiver, 13 octobre (F. Portier *et al.*).

2002 Haut-Rhin – Wittelsheim, mâle gris*, chant., 8 et 9 juin (A. Mauss *et al.*).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Des chanteurs sont entendus sur les anciens bastions de nidification de l'espèce (Doubs, Pas-de-Calais) mais sans suite...



35. Roselin githagine
Bucanetes githagineus,
Ouessant, Finistère,
mai 2005
(Aurélien Audevard).
Trumpeter Finch.

BRUANT À CALOTTE BLANCHE *Emberiza leucocephalos* (33/36) (19/22 – 1/0)

Bouches-du-Rhône – Camargue : mas Saint-Cézaire/Saliers, fem. ad., 8 et 9 janvier (V. Palomarès, M. Zucca *et al.*). (Sibérie). La Camargue semble être désertée de ses hivernants habituels à part cette femelle sans doute revenante qui n'a donc pas été comptabilisée.

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* (27/28) (19/19 – 2/2)

Morbihan – Île de Hoëdic, phot., du 28 au 31 octobre (F. Garcia, J.-P. Jordan, A. Le Nevé *et al.*).
Somme – Réserve naturelle de la baie de Somme, La Maye/Le Crotoy, du 12 au 16 octobre (A. Lepretre). (Scandinavie, Sibérie). Le Bruant rustique est loin d'être vu chaque année en France. Entre 2000 et 2004, il n'a par exemple été observé qu'une fois (2003). En revanche, curieusement, on note 3 années records avec 3 oiseaux : 1986, 1994 et 1998. Avec 2 mentions, 2005 est donc plutôt une bonne année et cette donnée de la baie de Somme est bien intéressante, car elle provient d'un site tout à fait inhabituel pour l'espèce.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (85/90) (72/75 – 8/9)



Bouches-du-Rhône – Camargue : Le Sambuc, 30 octobre (A. Flitti).
Finistère – Île d'Ouessant : Gouzoul, 28 et 29 septembre (A. Audevard *et al.*) ; pointe de Pern, 2 ind., du 9 au 11 octobre, puis 1 seul, 12 et 13 octobre, phot. (A. de Broyer, V. Legrand, M. Vaslin *et al.*) ; île de Sein, du 16 au 19 octobre (P. Yésou *et al.*) ; 28 et 29 octobre (Y. Trévoux *et al.*).
Morbihan – Île de Hoëdic, phot., du 28 octobre au 2 novembre (F. Garcia, J.-P. Jordan, A. Le Nevé *et al.*).
Seine-et-Marne – Gravières de Précy-sur-Marne, 3 janvier (Y. Bas).
Vaucluse – Villes-sur-Auzon, 21 novembre (M. Gunther).
2004 Finistère – Île de Sein, phot., 19 octobre (P.-A. Crochet *et al.*). (Scandinavie, Asie septentrionale). Neuf oiseaux constituent un record, puisque jusqu'à présent le maximum avait été noté en 1994 avec 8 individus ! On remarquera les arrivées concomitantes en Bretagne le 28 octobre sur les îles de Sein et Hoëdic et sur cette dernière, l'arrivée simultanée d'un Bruant rustique (V. ci-dessus). On notera également que le Vaucluse et la Seine-et-Marne ne sont habituellement pas une terre d'accueil pour ce bruant.

BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (80/92) (64/73 – 3/3)

Alpes-de-Haute-Provence – Plateau de Valensole, 3 mâles ad. chant. : un du 14 mai au 29 juin, un le 15 mai et un du 23 mai au 4 juin, phot. (A. Flitti, N. Issa *et al.*) ; Espinouse, Le Chaffaut-Saint-Jurson, mâle ad., chant., phot., du 25 juin au 23 juillet (N. Issa, J. Piette *et al.*).
Ille-et-Vilaine – Biez du Milieu, Lillemer, mâle, 21 mai (P. Briand). (Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Deux mâles et une femelle avaient fréquenté le plateau de Valensole en 2004, trois mâles cette année (donc un seul oiseau comptabilisé pour ce site). La donnée bretonne est



36. Bruant nain
Emberiza pusilla,
 Hoëdic, Morbihan,
 octobre 2005
 (Jean-Pierre Jordan).
 Little Bunting.



37 et 38. Bruant rustique *Emberiza rustica*, Hoëdic, Morbihan, octobre 2005 (Jean-Pierre Jordan). Rustic Bunting.

bien sûr remarquable. En revanche, pas de nouvelle du mâle chanteur du Lauzet dans les Hautes-Alpes, présent en 2001, 2003 et 2004, ni du secteur de Cipières, Alpes-Maritimes, qui semble malheureusement avoir été déserté.

GOGLU DES PRÉS *Dolichonyx oryzivorus* (2/2) (2/2 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Gouzoul, phot., 25 septembre (F. Maillot *et al.*). (Amérique du Nord). Troisième mention française de ce passereau néarctique après celle des 15 et 16 octobre 1987 à Ouessant suite à la tempête mémorable, et celle du 17 août 1995 à l'étang de Trunvel en baie d'Audierne.

ANNEXE 1 – ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)**PÉLICAN BLANC** *Pelecanus onocrotalus* (68/92) (51/63 – 6/6)

Bouches-du-Rhône – Camargue : La Palunette, ad., 11 mai (A. Le Nevé).
Ille-et-Vilaine – Montreuil-sous-Pérouse, ad., phot., 12 septembre (M. Letue).
Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu, Saint-Philbert de Grand-Lieu, ad., du 23 au 31 juillet (S. Reeber) ; Le Migron/Frossay, Donges et Paimboeuf, ad., revu en plusieurs endroits de l'estuaire de la Loire, épisodiquement jusqu'en avril 2006 (D. Mauras, J. Pitois *et al.*).
Manche – Genêts et Vains, du 21 septembre au 22 octobre (S. Provost *et al.*).
Var – Étangs de Villepey, Fréjus, ad., phot., 17 et 18 mai (O. Soldi). (Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Avec 6 oiseaux, 2005 prend la troisième place après 2001 (17 individus) et 1990 (14 individus), très peu d'oiseaux entre temps, ce qui peut faire penser qu'il s'agit sans doute d'arrivées naturelles ces années-là. En Loire-Atlantique, le seul et même oiseau a fréquenté plusieurs sites.

FLAMANT NAIN *Phoenicopterus minor* (21/17) (21/17 – 2/1)

Bouches-du-Rhône – Camargue : Fangassier, au moins 2 ind., nidification, phot., du 2 juin au 18 juillet (A. Arnaud, P. Bacquet, C. Germain).
Maine-et-Loire – La Daguenière, ad., phot., 2 et 3 octobre (A. Fossé, F. Noël *et al.*). (Afrique tropicale). Les oiseaux de Camargue sont connus et n'ont donc pas été comptabilisés. La mention concernant un adulte à l'automne dans le Maine-et-Loire fait plutôt penser à un oiseau issu de captivité.

GRUE DEMOISELLE *Grus virgo* (13/15) (6/6 – 1/1)

Cher – Avord, ad., 9 mars (F. Besson *et al.*).

(De la Turquie au nord de la Chine, Maroc). Un individu avait été replacé en catégorie E en 2004, compte tenu de son comportement, ce qui explique un recalage des statistiques. L'oiseau de cette année a été observé posé se nourrissant avec une centaine de Grues cendrées *G. grus*.

ANNEXE 2 – LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non-homologation sont succinctement indiquées entre parenthèses.

2005

Océanite de Swinhoe *Oceanodroma monorhis* – Vendée – Les Sables-d'Olonne, 4 décembre (description insuffisante pour une telle espèce, même si les éléments fournis vont dans le bon sens).

Pélican indéterminé *Pelecanus sp.* – Aude – Gruissan, 2 ind., 20 avril (description nettement insuffisante).

Aigrette des récifs *Egretta gularis* – Charente-Maritime – Île de Ré : Les Portes-en-Ré, phot., 24 août (il s'agit d'un juvénile, donc d'identification plus délicate, le bec ne fait penser ni à *schistacea* ni à *gularis*, silhouette d'Aigrette garzette *Egretta garzetta*, il s'agit a priori d'un hybride entre une Aigrette des récifs et une Aigrette garzette).

Aigrette sombre *Egretta sp.* – Landes – Le Courant d'Huchet, phot., septembre (Aigrette garzette grise, comme il s'en observe tous les ans en Camargue).

Héron indéterminé *Ardea sp.* – Ain – Lagnieu, 6 septembre (description insuffisante, sans doute un Héron cendré *Ardea cinerea* juvénile vu de très près, à contre-jour et très brièvement ; en tout cas pas un Héron goliath *Ardea goliath* comme semblait le suggérer l'observateur).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* – Bouches-du-Rhône – Camargue : Fiérouse, juv., 18 juin (l'œil rouge est incompatible avec la coloration des parties supérieures de juvénile décrite, épaules noires non mentionnées) ; Jura – entre Savigny et Arlay, ad., 13 août (observation de quelques secondes, à l'œil nu, sur autoroute, les observateurs voient l'œil jaune et le jaune du bec mais pas de mention des épaules noires, mais « ailes unies ») ; Saône-et-Loire – Chalon-sur-Saône, ad., 30 décembre (observation de quelques secondes, à l'œil nu, sur autoroute, face inférieure de l'oiseau aperçue mais face supérieure de la queue décrite, fiche pas assez solide, c'est donc possible mais pas probant).

Busard pâle *Circus macrourus* – Aube – Saint-Oulph et Etreilles, fem. 2^e année (1^{er} été), phot., 9 et 10 juillet (description pas assez précise et les photos ne sont guère exploitables, la description des parties inférieures conduit à une femelle de 1^{er} été, mais aucun mot sur les axillaires, ce qui aurait pu emporter le diagnostic, la tête très claire ne correspond pas à celle très contrastée des femelles immatures de Busard pâle).

Épervier à pieds courts *Accipiter brevipes* – Indre – Meunet-sur-Vatan, 25 et 27 avril (il s'agirait d'une première française... vue par un seul observateur et sans document photographique – et en même temps qu'un Gobemouche à demi-collier *Ficedula semitorquata* dont il n'existe qu'une mention française – ne permet pas une homologation en application des règles de l'AERC).

Buse féroce *Buteo rufinus* – Côte-d'Or – Cirey-lès-Nolay, 23 janvier (silhouette fine et petite taille, queue barrée, pattern de tête et poitrine évoquent a priori une Buse des steppes *Buteo b. vulpinus*, mais l'auteur ne la présente pas comme telle) ; Vendée – Saint-Michel-en-L'Herm, imm., phot., du 1^{er} au 11 novembre au moins (les descriptions fournies sont différentes voire contradictoires ; quoi qu'il en soit, il est question d'un oiseau de grande taille type Buse pattue *Buteo lagopus*, aux allures d'aigle, alors que les photos qui concernent toutes le même oiseau montrent une structure de buse de faible taille ; parmi les autres éléments, certaines photos semblent montrer une barre subterminale noire sur la queue, ce qui exclurait une Buse féroce adulte ; absence de description des poignets sur le dessous de l'aile ; pas suffisamment d'éléments pour prouver ou éliminer une Buse des steppes ; dans le meilleur des cas, on aurait pu envisager une *cirtensis*, mais ce serait contradictoire par rapport à la taille mentionnée et à la queue ; dessin atypique de la tête (tache sur la joue) qui ne correspond pas à une Buse féroce).

Buse pattue *Buteo lagopus* – Charente-Maritime – Île de Ré : Ars-en-Ré, 15 février (trop d'éléments contradictoires ; tête claire = femelle ou immature, poitrine claire = mâle, barre caudale sur la moitié de la queue = immature, bande noire aux secondaires = adulte ; tibias massifs et emplumés et tarsi jaune vif) ; Indre – Mézières-en-Brenne, mâle ? immature ?, 19 février (éléments contradictoires sur la fiche et sur son complément notamment en ce qui concerne les teintes de la poitrine et du ventre ; la taille décrite comme moyenne et la silhouette dite de Buse variable *Buteo buteo* ne correspondent pas à une Buse pattue ; les taches partielles de blanc estompé au niveau du croupion ne forment pas une zone blanche délimitée correspondant à une Buse variable) ; Sarthe – La Bazoge, ad. ?, 16 février (description insuffisante d'un oiseau observé à l'œil nu ;

peut-être une Buse variable pâle ou pourquoi pas un Pygargue à queue blanche immature *Haliaeetus albicilla* puisque l'observateur fait référence à un gros rapace de couleur claire, à la queue qui n'est pas longue mais en éventail, au vol lourd et aux formes massives...) ; Essonne – Saint-Maurice-Montcouronne, ad. ?, 27 octobre (dessous très blanc, taille de Buse variable voire plus petite que les 3 autres qui craquaient en même temps, queue de juvénile mais aile d'adulte, bout des ailes peu digité, le ventre ne convient pas, il s'agit sans conteste d'une Buse variable blanche).

Aigle pomarin *Aquila pomarina* – Jura – Villeveux, mâle ?, au moins 3 ans, 10 avril (problème de taille en comparaison avec un Milan noir *Milvus migrans* ; la taille d'un Aigle pomarin reste modeste mais dans la nature, c'est très différent, l'oiseau paraît gros, large et lourd, et la fiche ne mentionne pas cette structure ; un Milan noir à queue usée et donc arrondie a-t-il vraiment été écarté ? Un doute subsiste...).

Aigle criard *Aquila clanga* – Maine-et-Loire – Le Louroux-Béconnais, imm., 6 novembre (queue semblant plus longue que celle d'une buse ne convient pas pour un Aigle criard et le reste des éléments fournis demeure insuffisant pour conclure).

Aigle pomarin/criard *Aquila pomarina/clanga* – Haute-Savoie – Le Hucel/Thollon-les-Mémises, plutôt ad., 2 avril (insuffisant pour trancher entre les deux espèces, et des hybrides issus des populations de Biélorussie existent...).

Aigle impérial *Aquila heliaca* – Haute-Savoie – Le Hucel/Thollon-les-Mémises, 1^{er} hiver (2^e année), 19 mars (la description évoque bien un aigle de type impérial, mais aucune allusion aux épaisses flammèches typiques présentes sur les parties supérieures, une bonne partie des parties inférieures, ainsi que les couvertures sus- et sous-alaires qui combinées au vol, à la silhouette permettent d'identifier un Impérial de cet âge ; l'espèce montre d'ailleurs ces critères jusqu'à la 3^e année au moins et ceux-ci sont visibles à grande distance ; l'hypothèse d'un Aigle ibérique *Aquila adalberti* est sérieusement à envisager, ce que corrobore la teinte et la comparaison avec un Aigle ravisseur *Aquila rapax*).

Faucon crécerellette *Falco naumanni* – Charente-Maritime – Île de Ré : Les Portes-en-Ré, mâle 1^{er} été, 12 avril (description pas assez complète notamment pour une observation en ce lieu) ; Haute-Pyrénées – Cieutat, 21 ind., 28 août (le nombre d'oiseaux, la date, le lieu et le contexte invasionnel plaident bien sûr pour cette espèce, mais les observateurs eux-mêmes n'en sont pas certains en raison, entre autres, des conditions de lumière).

Faucon lanier *Falco biarmicus* – Pyrénées-Orientales – Étang de Canet, 16 octobre (description nettement insuffisante).

Faucon sacre *Falco cherrug* – Gironde – Lège-Cap-Ferret, mâle ?, subad. ?, 5 novembre (description beaucoup trop incomplète et rien ne permet d'éliminer un hybride) ; Pas-de-Calais – Waben, imm., 27 et 28 juillet (la politique du CHN est d'exiger des descriptions détaillées des grands faucons compte tenu du risque important d'hybridation et des oiseaux échappés de captivité. Ici, la description est assez favorable pour un Sacre mais ne peut être reçue en raison de la non description des parties supérieures et inférieures des ailes).



39. Marouette poussin
Porzana parva, femelle,
Le Louroux, Indre-et-Loire,
avril 2005 (Nicolas Caillaret).
Female Little Crane.

Faucon lanier/sacre *Falco biarmicus/cherrug* – Bouches-du-Rhône – Camargue : mas d'Agon, ad., 13 avril (deux fiches du même lieu à la même date par deux observateurs différents pour deux espèces différentes ! La description du Lanier est trop imprécise pour conclure à cette espèce. Celle du Sacre n'est pas non plus suffisante, mais semble toutefois désigner un Sacre notamment par la taille, la coloration des parties supérieures et le pattern de la tête. On peut aussi penser que la fiche de Lanier se rapporte à un autre oiseau, mais tout ceci manque de précisions. Pour information, un hybride de fauconnerie a été observé 15 jours plus tard au Grenouillet, celui-ci était intermédiaire entre ces deux espèces : davantage Lanier pour les parties inférieures et la tête, davantage Sacre pour les parties supérieures).

Marouette poussin *Porzana parva* – Aude – La Franqui, mâle, 1^{er} mai (description malheureusement insuffisante).

Marouette de Baillon *Porzana pusilla* – Meuse – Lisle-en-Barrois, mâle chant., 21 mai (pas de description du chant).

Gravelot semipalmé *Charadrius semipalmatus* – Pas-de-Calais – Hemmes-de-Marck/Marck, ad., 4 juin (impossible d'accepter cette première française sans le cri typique de l'espèce, par ailleurs certains critères ne sont pas signalés).

Pluvier bronzé/fauve *Pluvialis dominica/fulva* – Pas-de-Calais – Platier d'Oye/Oye-Plage, 1^{re} année, 14 août (le côté doré élimine *dominica*, mais par ailleurs, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour accepter *fulva*).

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* – Manche – Neville-sur-Mer, ad., 24 juillet (la description, le comportement et les lieux fréquentés excluent cette espèce ; la description semble indiquer un Bécasseau violet *Calidris maritima* adulte en mue).

Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* – Bouches-du-Rhône – Saint-Martin-de-Crau, 9 septembre (trop peu d'éléments pour conclure).

Bécassin indéterminé *Limnodromus sp.* – Manche – Biville, 28 octobre (description bien relative, aucun critère certain, trop peu d'éléments, même pour en faire un bécassin).

Goéland ichthaète *Larus ichthaetus* – Finistère – Saint-Guérolé, 1^{er} hiver, phot., 24 avril (il s'agissait d'un Goéland argenté *Larus argentatus* de 2^e hiver).

Goéland railleur *Larus genei* – Charente-Maritime – Île de Ré : Saint-Clément-des-Baleines, ad., phot., 3 novembre (il s'agit d'une Mouette rieuse *Larus ridibundus* schizochrome, comme celle qui a fréquenté les marais guérandais en Loire-Atlantique pendant les années 1990 ou encore celle de Pénestin dans le Morbihan à la même époque et qui avait également été prise par certains observateurs pour un Goéland railleur).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* – Loire-Atlantique – Indre, 2^e hiver, 1^{er} janvier (un 2^e hiver au 1^{er} janvier ne peut présenter 3 taches blanches visibles aux rémiges primaires et la queue est loin d'être toute blanche à cet âge, le dos est gris de la même couleur que les Mouettes rieuses et non « plus sombre », toujours à cet âge).

Goéland d'Arménie *Larus armenicus* – Vendée – Damvix, ad., 6 juin (sans doute un Goéland leucophaée *Larus michahellis* 2^e été).

Sterne de Forster *Sterna forsteri* – Nord – Dunkerque, 6 décembre (la taille ne correspond pas et il manque certains éléments caractéristiques).

Harfang des neiges *Bubo scandiacus* – Doubs – Magny-Châtellard, 23 mars (description insuffisante et certains éléments ne peuvent convenir pour l'espèce).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* – Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans » – Meuse – Erize-la-Petite, mâle, 29 avril (absence d'éléments probants concernant la tête, la nuque, le cri) ; Haute-Savoie – Passy, mâle, 9 avril (absence d'éléments probants concernant la tête, la nuque, le cri).

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* – Gironde – Lège-Cap-Ferret, mâle ad., 30 octobre (description insuffisante, conditions d'observation trop fugaces, pas de cri.).

Locustelle fasciée *Locustella fasciolata* – Finistère – Île d'Ouessant, 26 octobre (brièveté de l'observation et observateur unique pour cette potentielle 2^e française, la première d'un oiseau vivant ; la possibilité d'une Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* adulte n'est pas exclue à 100 % en raison du plumage plus gris à l'automne et du contexte d'observation difficile [fond de buisson peu éclairé] ; l'extrême rareté au niveau européen ne peut qu'inciter à la prudence).

Hypolaïs bottée *Hippolais caligata* – Finistère – Île de Sein, 17 octobre (sans doute cette espèce, mais impossible d'être certain compte tenu de la brièveté de l'observation).

Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* – Alpes-Maritimes – Falcon, 2 août (à une date aussi étrange, la description du croupion est indispensable, sans parler des barres alaires ; description trop imprécise).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* – Meurthe-et-Moselle – Heillecourt, 22 octobre (description insuffisante).

Pouillot véloce de type sibérien *Phylloscopus collybita* – Charente-Maritime – Moëze, 21 et 22 octobre (ça y fait bien penser, mais sans le cri, impossible d'être certain) ; Pas-de-Calais – Wissant, 1^{er} novembre (le cri paraît bon, mais la teinte gris-vert du manteau et des couvertures ne convient pas).

Mésange azurée *Parus cyanus* – Bas-Rhin – Sélestat, 22 janvier (il s'agit d'une Pie-grièche grise *Lanius excubitor*...).

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* – Cher – Le Démon, 11 ind., 20 août (problème d'interférence lumineuse sur les plumages ; il s'agit d'Étourneaux sansonnets *Sturnus vulgaris*).

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* – Gironde – Lège-Cap-Ferret, mâle ad., 27 octobre (un mâle adulte est rarissime à l'automne, problème de deux barres alaires blanches, difficulté de repérage dans une troupe de pinsons ; possibilité non négligeable d'un exotique échappé de captivité).

2004

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* – Loire-Atlantique – Le Migron/Frossay, mâle ad., phot., 2 janvier (barre horizontale blanche sur les grandes couvertures, barre verticale blanche d'épaisseur inférieure à celle des Sarcelles à ailes vertes classiques, contour jaune du masque facial vert peu visible sur les photos : aucun de ces critères pris séparément ne permet d'éliminer la Sarcelle à ailes vertes. Mais la conjonction des trois facteurs qui sont soit dans les limites de la variation individuelle de cette espèce, soit évocateurs de la Sarcelle d'hiver, laissent à penser que cet oiseau n'est probablement pas une Sarcelle à ailes vertes pure, mais plutôt un hybride entre cette espèce et la Sarcelle d'hiver, peut-être pas de première génération).

Busard pâle *Circus macrourus* – Manche – Carolles, juv., 10 septembre (relative brièveté de l'observation, le vol décrit comme souple rappelant celui du Busard cendré *Circus pygargus* ne correspond pas tout à fait, le critère du collier est délicat à exploiter dans les conditions d'observations présentes compte tenu de ce que peut présenter à cet égard le Busard cendré, une description précise du pattern sous-alaire aurait été nécessaire, en conclusion le Busard pâle est possible, voire probable, mais en tout cas pas certain).

Buse pattue *Buteo lagopus* – Val-d'Oise – Asnières-sur-Oise, 19 mars (rien sur la silhouette, le type de vol ; globalement la description pourrait correspondre à un mâle de forme pâle, notamment en raison du ventre pâle et des flancs foncés qui excluent juvénile et femelle, mais alors la tête ne devrait pas être blanche mais présenter une bavette sombre ; la description de la queue aurait été utile... La tête est plutôt de type juvénile ou femelle, le dessous des ailes plutôt mâle, mais le dessus avec une zone pâle sur les grandes couvertures indiquent un juvénile ; en résumé difficile de trancher).

Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla* – Gironde – Le Teich, juv., phot., 21 octobre (la forme et la structure du bec ne sont pas caractéristiques, 3 rémiges primaires dépassent des tertiaires, ce qui ne convient pas pour cette espèce sauf rémiges tertiaires manquantes, traces de roux encore marquées sur les scapulaires supérieures pour l'époque, et les couvertures ne sont pas convaincantes dans la mesure où les ancrs flous ne sont pas incompatibles avec un plumage usé de jeune Bécasseau minute *Calidris minuta* fin octobre ; un Bécasseau minute n'est pas exclu compte tenu des éléments fournis, la description étant trop faible pour contrebalancer les hésitations provoquées par les photos).

Bécasseau minuscule *Calidris minutilla* – Vendée – Lac d'Aprémont/Maché, ad., phot., 13 août (des éléments de doute : profil général de l'oiseau trop allongé, taille décrite par certains comme trop grande, forme et longueur du bec trop long, trop droit, faiblesse des taches pectorales, poitrail trop fondu, trop uniforme, stries fines et non taches comme chez le Bécasseau minuscule. Des éléments positifs : sourcil, tache auriculaire notamment, le cri mais ceci est bien relatif car difficile à transcrire ; dommage qu'on ne puisse pas apprécier le dessin des scapulaires inférieures qui est décrit différemment selon les personnes qui examinent les photos. Donc Bécasseau minuscule non exclu, mais un doute subsiste, ce qui ne permet pas une homologation. Certains experts consultés sont arrivés aux mêmes conclusions).

Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* – Charente-Maritime – Charron, juv., 19 août (compte tenu de la date très précoce pour un juvénile de cette espèce en France, le besoin d'une fiche très solide est évident ; ici, il manque la couleur des pattes, la longueur du bec est dite moyenne alors que le bec est court chez le Rousset ; le risque de confusion avec un jeune Combattant varié *Philomachus pugnax* ne peut être écarté).

Sterne voyageuse *Sterna bengalensis* – Manche – Saint-Germain-sur-Ay, 30 juillet (rien sur le croupion, aspect très clair, rien pour en faire une Sterne voyageuse plutôt qu'une Sterne élégante *Sterna elegans* ou un hybride).

Tarier pâtre *Saxicola torquatus* – Individu présentant les caractéristiques de la sous-espèce *maura*, appelée « Tarier oriental » – Bas-Rhin – Erstein, fem. imm., 7 septembre (description insuffisante).

Pouillot à grands sourcils/de Hume *Phylloscopus inornatus/humei* – Haute-Savoie – Meythet, 9 décembre (ressemble à un Pouillot de Hume, mais le plumage du Pouillot à grands sourcils devient terne au fur et à mesure que l'automne avance ; sans le cri, difficile de se prononcer).

2003

Buse pattue *Buteo lagopus* – Bas-Rhin – Reichshoffen, juv., 18 février (description trop légère, rien sur l'allure pourtant si étonnante, la combinaison des éléments fournis va pourtant dans le bon sens).

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* – Loiret – Dry, ad., 22 et 23 septembre (description floue, pas d'éléments probants pour l'espèce envisagée) ; Eure – Poses, juv., phot., du 20 au 26 septembre (il s'agit ici de l'oiseau blessé à une patte, puisqu'un second individu a été homologué [V. *Ornithos* 12-1 : 16] ; plutôt un Bécasseau tacheté, mais des éléments comme la teinte de la calotte, le large sourcil blanc non tacheté et les côtés de la poitrine évoquent un Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* ; les éléments fournis ne permettent pas de dissiper le doute).

Hypolaïs obscure *Hippolais opaca* – Finistère – Île d'Ouessant : Le Kun, 14 et 15 septembre (le fait que les bordures blanchâtres sur les rectrices externes aient pu être vues sur un oiseau sans cesse en mouvement et qui hoche la queue est troublant, d'autant que ce caractère se voit bien en main mais est très difficile à noter dans la nature. De même, arriver à estimer aussi précisément la longueur de la projection primaire est troublant. Le lieu et la date incitent vraiment à la prudence).

Fauvette de Rüppell *Sylvia rueppelli* – Calvados – Cheux, fem. ad., 6 mai (impossible d'accepter une troisième française avec une description aussi incomplète et un comportement inhabituel. On ne peut pas exclure une confusion avec une femelle ou un immature de Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* qui peut présenter pattes et cercle orbitaire rougeâtres, gorge tachetée, moustache blanche. Pas de description des liserés alaires blancs très évidents chez la Fauvette de Rüppell).

2002

Pélican gris *Pelecanus rufescens* – Haute-Corse – Biguglia, sans doute le même qu'en décembre 2001, phot., 19 février (pas de description, photo floue).

2001

Pélican gris *Pelecanus rufescens* – Haute-Corse – Biguglia, phot., 7 et 9 décembre (pas de description, photo floue).

Mouette blanche *Pagophila eburnea* – Somme – Port-le-Grand, ad., 13 et 16 février (les circonstances laissent planer un doute sur cette potentielle quatrième mention française d'une espèce dont il n'existe qu'une mention au ^{XX} siècle, les 2 autres datant du ^{XIX} siècle).

Étourneau roselin *Sturnus roseus* – Haute-Corse – Biguglia/Furiani, imm., 30 novembre (description insuffisante).

1992

Faucon sacre *Falco cherrug* – Manche – Le Mont-Saint-Michel, 31 octobre (des éléments peuvent l'évoquer mais la description reste insuffisante pour ce type de faucon).

Annexe 3 – Catégorie E

Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la Liste officielle des Oiseaux de France ni dans la catégorie D, mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour.

• **Sarcelle cannelle** *Anas cyanoptera* – Loire-Atlantique – Lac de Grand-Lieu, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, jusqu'à 3 mâles et 3 fem., phot., du 13 août au 20 novembre (S. Reeber *et al.*). L'accroissement des mentions signalé l'an dernier se confirme cette année. Ce phénomène a été relevé également en Grande-Bretagne, où l'hypothèse d'arrivées naturelles commence à être sérieusement envisagée (Scott 2004), même s'il est clair que la majorité des individus observés jusqu'à récemment concernaient des oiseaux issus de captivité. À suivre...

• **Grande Outarde** *Otis tarda* – Yonne – Moulin-sur-Ouane et Leugny, fem. imm., phot., du 27 janvier au 27 mars (P. Dagnas, N. Durand, J.-P. Leau, A. Rolland). Cet oiseau, bague, était issu d'un programme de réintroduction conduit en Allemagne.

• **Pie bleue** *Cyanopica cyana* – Bouches-du-Rhône – Camargue : Mas de Bois Verdun, 18 décembre (Y. Kayser).

REMERCIEMENTS

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 2005, ont contribué à son bon fonctionnement :

- la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière attribuée au secrétariat du Comité, et nécessaire à son fonctionnement,
- la revue *Ornithos* pour la prise en charge du coût des photos en couleurs qui illustrent ce rapport,
- Carl Zeiss Division Jumelles pour le soutien apporté à la publication du rapport annuel,
- Aurélien Audevard, Philippe J. Dubois, Stéphane Duchateau, Nidal Issa, Robert Lécaille, qui nous ont apporté leur aide et/ou des informations complémentaires,
- tous les responsables de Centrales ornithologiques, de Comités d'homologation régionaux (CHR) ou départementaux (CHD) qui nous ont transmis des données,
- enfin, l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHN ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

- AUDEVARD A. (2007). Première mention française de la Fauvette passerinette orientale *Sylvia cantillans albistriata*. *Ornithos* 14-3 : 198-199.
- BADAN O., KOWALSKI H. & KAYSER Y. (1998). Première mention d'un Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis* en France pour le ^{XX} siècle. *Ornithos* 5-4 : 192-193.
- CAF (2006). En direct de la CAF. Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française en 2004-2005. *Ornithos* 13-4 : 244-257.
- CAF (2007). En direct de la CAF. Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). *Ornithos* 14-4 : 234-246.
- CHAPPELL L. (2005). The Elegant Tern in Dorset. *Birding World* 18-5 : 211-213.
- CROUZIER P. & LE CHN (2006). Modification de la liste des espèces soumises à homologation en France. *Ornithos* 13-3 : 145.

- DRONNEAU C. (2006). L'Oie des moissons *Anser fabalis* : taxonomie, identification et statut actuel en France. *Ornithos* 13-1 : 33-47.
- DUBOIS M. (2006). Nidification réussie d'un couple d'Élanions blancs *Elanus caeruleus* dans le Rhône en 2005. *Ornithos* 13-2 : 114-119.
- DUBOIS P.J. (2007). Première observation française d'un pétrel de type Pétrel gongon/Pétrel de Madère *Pterodroma feae/Pterodroma madeira*. *Ornithos* 14-2 : 128-130.
- EATON M., BRADBURY R. & BOWDEN C. (2005). The Magnificent Frigatebird in Shropshire. *Birding World* 18 (11) : 479-481.
- JIGUET F., CROCHET P.-A., DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., PONS J.-M. & YÉSOU P. (2007). Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française en 2006-2007. 11^e rapport de la CAF. *Ornithos* 14-2 : 108-115.
- LEFRANC N. (2007). La Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* : taxonomie, identification, statut en France. *Ornithos* 14-4 : 201-229.
- LEGENDRE F. & SCHER O. (2006). Nidification de l'Alouette calandre *Melanocorypha calandra* sur le causse Méjean (Lozère). *Ornithos* 13-2 : 120-123.
- MICHELAT D. (2005). Une nouvelle espèce nicheuse pour l'avifaune française : l'Aigle pomarin *Aquila pomarina*. *Ornithos* 12-6 : 310-320.
- SCOTT M. (2004). The Cinnamon Teal on the Outer Hebrides – a new Western Palearctic bird ? *Birding World* 17-5 : 200-201.
- TRÉVOUX Y. & J.-P. (2007). Première mention française du Martinet ramoneur *Chaetura pelagica*. *Ornithos* 14-2 : 126-127.
- TUCK L. (1972). *The Snipes*. Environnement Canada Wildlife service.
- VAN DER VLIET R.E., VAN DER LAAN J., BERLIJN M. & CDNA (2006). Rare birds in the Netherlands in 2005. *Dutch Birding* 28-6 : 345-365.

SUMMARY

Rare birds in France in 2005. Two new species were added to the French List in 2005 : Wilson's Snipe *Gallinago delicata* and Chimney Swift *Chaetura pelagica*. Further, several species were recorded for a second time : Fea's Petrel/Zino's Petrel *Pterodroma feae/Pterodroma madeira*, Sora *Porzana carolina* and Yellow-billed Cuckoo *Coccyzus americanus* (the first Yellow-billed Cuckoo was in 1957!) ; Also recorded were the third occurrences of Forster's Tern *Sterna forsteri*, Western Olivaceous Warbler *Hippolais opaca* and Bobolink *Dolichonyx oryzivorus*. A few species were remarkable owing to their high totals including 827 Lesser Kestrels *Falco naumanni*, 7 Laughing Gulls *Larus atricilla*, 130 Yellow-browed Warblers *Phylloscopus inornatus* and 4 Trumpeter Finches *Bucanetes githagineus*. At last, the conclusion of the examination of the record of Sykes' Warbler *Hippolais rama* enables this species to be added to the French List.

The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of French records and individuals (excluding 2005) ; the second pair relate to the same for the period 1981-2004 ; the last pair relate to the current year (i.e. 2005).

Jean-Yves Frémont, Secrétariat du CHN, 58 rue Laugier, 75017 Paris (jeanyves.fremont@noos.fr)

Comité d'Homologation National c/o LPO, La Corderie Royale, BP 90263, 17305 Rochefort Cedex (chn@lpo.fr)



Le rapport annuel du Comité d'Homologation National (CHN) est publié avec le soutien de Carl Zeiss Division Jumelles