

Les oiseaux rares en France en 2008



26^e rapport du Comité d'Homologation National

Sébastien Reeber & le CHN

Ce 26^e rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 2008. Le nombre de fiches examinées par le CHN en 2008 est de 331, soit environ 10 % de plus qu'en 2006 et 2007. Le taux d'acceptation est de 84 %, ce qui est conforme à la normale (84,5 % de fiches acceptées sur les 2 625 traitées entre 2001 et 2007). En 2008, la réunion plénière annuelle s'est tenue les 15 et 16 mars et le compte rendu de cette réunion a été publié récemment (V. *Ornithos* 15-2: 132-133). Cette réunion a vu le départ d'Yves Kayser, parvenu au terme de son mandat, que nous remercions tous chaleureusement pour sa compétence et son expérience de terrain considérables. Matthieu Vaslin a été élu pour le remplacer. Pierre Crouzier avait été pour sa part reconduit dans sa fonction de Président du CHN. Devant la charge de travail croissante et dans cette phase de transition vers un mode de fonctionnement nouveau, le Secrétariat a été confié conjointement à trois membres: Amine Flitti (Secrétaire, en charge de la circulation des fiches), Jean-Yves Frémont (responsable des relations avec la communauté ornithologique) et Sébastien Reeber (chargé de l'élaboration de la base d'archives et de la préparation du rapport annuel). En 2008, le CHN se composait donc de Pierre Crouzier, Philippe J. Dubois, Marc Duquet, Amine Flitti, Jean-Yves Frémont, Vincent Palomarès, Sébastien Reeber et Matthieu Vaslin. L'année 2008 a permis de se roder sur le nouveau fonctionnement informatisé de la circulation des fiches, en supprimant complètement la circulation des fiches papier. Ce système, mis en place sous la houlette d'Amine Flitti, permet aux membres du CHN de se prononcer plus rapidement, tout en améliorant les échanges entre les membres. Autre avantage, les décisions du CHN sont désormais consultables immédiatement après avoir été formulées (www.lpo.fr/homologation).

En 2009, la réunion plénière s'est tenue les 13 et 14 juin (V. *Ornithos* 16-3: 192-195 pour le compte rendu). Marc Duquet succède à Pierre Crouzier à la Présidence du CHN. Que Pierre soit remercié ici pour les années qu'il a consacrées au CHN, pour sa grande compétence et la diplomatie dont il a fait preuve pour assurer le bon fonctionnement du comité. Le secrétariat tripartite mis en place en 2008, essentiellement pour assurer la transition délicate au poste de Secrétaire, a pu prendre fin cette année. Jean-Yves Frémont cède donc sa place à Sébastien Reeber, après 21 ans passés à assurer cette fonction. Chacun sait le rôle primordial qu'il a joué au sein du CHN, inutile donc de se perdre en superlatifs ! Un grand merci pour ses avis d'ornithologue éclairé, la pédagogie qu'il continue à montrer pour assurer sa propre succession et les trésors relationnels qu'il a mis au service du CHN. Deux nouveaux membres font leur entrée en 2009 – Benoît Paepegaey et Alain Verneau – portant le nombre de membres à neuf. En 2010, un nouveau poste sera à pourvoir; les candidats désireux de s'investir dans les tâches du CHN sont invités à se faire connaître auprès du Secrétariat avant le 1^{er} mars 2010 (chn@lpo.fr).

ENVOI DES FICHES D'HOMOLOGATION

Le CHN tient à rappeler qu'il est préférable de rédiger la fiche (à télécharger sur le site du CHN) dès que possible après l'observation, que vous soyez le découvreur ou un simple observateur. Cela évite une publication tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données



1. Goéland à ailes blanches
Larus glaucoides, 1^{er} hiver,
Pas-de-Calais, janvier
2008 (Julien Boulanger).
First-winter Iceland Gull.

déjà parues. Cela permettra aussi de tenir le rythme actuel de parution du rapport annuel, et de rester ainsi au plus près de l'actualité ornithologique. À noter aussi que les documents photographiques obtenus par les observateurs non découvreurs peuvent être des compléments précieux aux fiches déjà reçues. Ils sont donc les bienvenus !

Le travail du CHN sera d'autant plus appréciable et utile à tous que le nombre de fiches à nous parvenir sera important. Malheureusement, des données restent encore dans les carnets des observateurs. Bien sûr, il n'est jamais trop tard pour faire parvenir une fiche au secrétariat, même après plusieurs années, et cela même en n'étant pas le découvreur de l'oiseau. Enfin, le secrétariat du CHN étant désormais informatisé, il est demandé à chacun d'envoyer ses documents de préférence par mail à l'adresse du CHN (chn@lpo.fr). Ceci permet de gagner du temps dans leur traitement et leur publication. Le format *Word* est préféré, en joignant les éventuelles photos (*JPEG* ou *PDF*) séparément.

Fiche et photos

Il est également important de souligner une nouvelle fois qu'en dépit du développement rapide de la digiscopie et des nombreuses images d'oiseaux occasionnels qu'elle génère, rien ne peut remplacer une bonne description écrite. Les films et les photographies, numériques ou non, les enrichissent réellement et s'avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Ce point est fondamental dans la détermination d'espèces ou de sous-espèces délicates, et un certain nombre de fiches sont légitimement refusées par un manque d'éléments précis les concernant. Le CHN conseille donc aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, fondées seulement sur une image ou même sur plusieurs, aussi bonnes soient-elles.

Prise en compte des données

Rappelons enfin que dans un souci de validation homogène des données, seules celles présentées à un comité d'homologation nationale sont prises en compte pour la publication de synthèses nationales et européennes concernant une espèce.

LES FAITS MARQUANTS

L'année 2008 a fourni la première mention française du Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis*. Les espèces nord-américaines sont d'ailleurs à l'honneur, avec pas moins de 12 espèces de limicoles et 4 de passereaux néarctiques, dont la seconde mention de la Paruline des ruisseaux *Seiurus noveboracensis* et la quatrième de la Grive à joues grises *Catharus minimus*. Le Héron vert *Butorides virescens* de Berre, Bouches-du-Rhône, effectuée en 2008-2009 son troisième hivernage consécutif, fournissant une seconde mention pour la France. Seconde mention également pour la Pie-grièche masquée *Lanius nubicus*, le Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis* et la Grive de Sibérie *Zoothera sibirica* (celle-ci depuis le début du xx^e siècle), et troisième mention pour le Pétrel gongon/de Madère *Pterodroma feae/madeira*. Sur le plan quantitatif, de nouveaux records d'affluence ont été notés pour le Busard pâle *Circus macrourus* avec un total de 18 oiseaux et le Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* (30 oiseaux).

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A & C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants à l'exclusion de l'année 2008, les deux suivants les données homologuées depuis 1981 (2008 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 2008.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique)¹. La mention « *et al.* » indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseaux en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CHN est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou transmis une photo).
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste officielle des Oiseaux de France (CAF 2007).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Canard à front blanc, un mâle de 1^{er} hiver du 26 mars au 5 avril 2008, île d'Ouessant, Finistère (A. Audevard, C. Cain *et al.*).

OIE DE LA TAÏGA *Anser fabalis fabalis* (-/-) (-/- - 1/2)

Pas-de-Calais – Beuvrequen, 2 ind., 15 février (G. Flohart, C. Capelle).

(Taïga entre le nord de la Scandinavie et l'Oural, hiverne principalement en Suède, au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas). Cette sous-espèce hivernait autrefois régulièrement en France, avec des effectifs de l'ordre de plusieurs centaines d'oiseaux au cours des années 1970. Elle s'est considérablement raréfiée ensuite, jusqu'à disparaître en tant qu'hivernante régulière au cours des années 1990 (Dronneau 2006, Dubois *et al.* 2008). L'Oie de taïga a donc intégré au 1^{er} janvier 2006 la liste des espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale. Il s'agit ici de la première et seule mention de cette oie depuis, en un lieu et à une date auxquels on pouvait toutefois s'attendre.

¹ Ne figurent que le nom du ou des observateur(s) ayant rédigé une fiche d'homologation ou fourni des images, constituant les archives du CHN. Quelques données publiées dans des revues ou sur Internet peuvent être ponctuellement prises en compte et examinées par le CHN ; la référence bibliographique de ces données est alors indiquée.

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (170/1 082) (73/243 – 3/8)

Calvados – Saint-Samson : réserve ornithologique, 6 ind., 23 décembre (J.-P. Marie *et al.*).

Charente-Maritime – Moëze : réserve naturelle de Moëze-Oléron, 28 janvier (J. Gonin).

Meuse – Sasse-sur-Meuse, ad., phot., 10 octobre (M. Collet *et al.*).

2006 Nord – Eppe-Sauvage, 2 ind., phot., du 4 au 7 février (A. Piette).

2005 Vendée – Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., du 23 novembre au 18 février 2006 (P. Trotignon), ad., du 24 novembre au 6 décembre (P. Trotignon), ad., porteur d'un collier posé en 2003 au Danemark, du 14 au 16 décembre (P. Trotignon).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Trois oiseaux de plus pour l'année 2005, qui totalise désormais 12 individus, avec une mention spéciale pour cet oiseau équipé d'un collier danois en mars 2003. Avec 8 nouveaux individus, l'année 2008 se situe juste sous la moyenne annuelle, ce qui est normal en l'absence de vague de froid marquée.

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (49/46) (46/43 – 4/4)

Finistère – Île d'Ouessant : marais du Kun, mâle 1^{er} hiver, phot., du 26 mars au 5 avril (A. Audevard, C. Cain *et al.*).

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, fem. ad., 21 janvier (S. Reeber), fem. 1^{er} hiver, phot., 9 avril (S. Reeber).

Pas-de-Calais – Tardinghen, mâle, phot., du 15 au 17 février (G. Flohart, C. Capelle).

2006 Finistère – Goulven, mâle ad., du 9 décembre au 26 mars 2007 (X. Rozec, S. Mauvieux, F. Erbs *et al.*), et non du 16 décembre au 25 février seulement (V. *Ornithos* 15-5 : 317).

(Amérique du Nord). Après deux années blanches pour ce canard nord-américain – l'oiseau finistérien de 2006 étant revenu hiverner sur le site régulièrement depuis octobre 2001 – quatre nouvelles données en 2008. Les localités du littoral Manche-Atlantique sont classiques, de même que les dates comprises entre l'hivernage et la migration prénuptiale.

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (54/43) (53/42 – 4/4)

Cher – Lignièrès, mâle ad., phot., du 9 au 12 mars (A. Rougeron *et al.*).

Finistère – Loctudy, mâle ad., phot., 23 mars (A. Dordoigne, D. Madiot).

Loire-Atlantique – Frossay : réserve du Massereau, mâle, phot., 23 décembre (F. Normand, F. Latraube).

Manche – Saint-Côme-du-Mont : réserve ornithologique des Ponts d'Ouve, mâle ad., phot., du 30 mars au 5 avril (B. Lecaplain, G. André *et al.*).

(Amérique du Nord). Quatre oiseaux en 2008, comme c'était déjà le cas en 2007. Aucun des sites de 2008 n'avait été fréquenté par l'espèce au cours des deux hivers précédents, ce qui permet de comptabiliser ces oiseaux comme de nouveaux arrivants. Le Cher accueille sa première Sarcelle à ailes vertes, tandis que la Manche avait déjà fourni la première mention française de l'espèce, en 1979.

2. Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*, adulte, Meuse, octobre 2008 (Michel Collet). *Adult Pink-footed Goose*.



3. Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis*, mâle, Cher, mars 2008 (Antoine Rougeron). *Male Green-winged Teal*.



4. Canard à front blanc *Anas americana*, mâle 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, mars 2008 (Aurélien Audevard). *First-winter male American Wigeon*.



5. Canard à front blanc *Anas americana*, mâle 1^{er} hiver, Ouessant, Finistère, mars 2008 (Aurélien Audevard). *First-winter male American Wigeon*.



SARCELLE À AILES BLEUES *Anas discors* (62/64) (52/54 – 1/1)

Vendée – La Barre-de-Monts : La Croix-Givrand, mâle ad., du 24 mars au 3 avril (M. Vaslin).

(Amérique du Nord). Une seule et unique donnée en 2008, tout comme en 2007, alors que la moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981 est de deux oiseaux. Cette raréfaction des contacts avec l'espèce semble se confirmer, et est aussi évoquée ailleurs en Europe de l'Ouest. La localité atlantique ainsi que la date sont parfaitement classiques et rappellent la dernière donnée en date, d'un mâle sur l'île de Noirmoutier, Vendée, du 17 au 27 avril 2007. Pour rappel, une Sarcelle à ailes bleues femelle avait été observée lors des printemps 2002, 2004 et 2006 dans le même secteur, appariée à un Canard souchet *Anas clypeata* mâle ; au moins trois nichées de poussins hybrides avaient été produites.

FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (18/13) (18/13 – 5/3)

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, fem., 20 février (S. Reeber).

Pyrénées-Atlantiques – Bésingrand, mâle ad., phot., du 23 octobre au 26 mars 2009 (J.-L. Grangé, P. Navarre) ; lac d'Artix, mâle ad., phot., du 17 février au 23 mars (A. Guyot, A. Anton *et al.*), le même mâle, du 1^{er} au 8 novembre (A. Guyot).

Seine-et-Marne – Jablines, mâle ad., phot., du 8 au 29 mars (S. Chambris, P.-J. Dubois, M. Zucca *et al.*).

2007 Pyrénées-Atlantiques – Bésingrand, mâle ad., phot., du 5 décembre au 23 février 2008 (J.-L. Grangé, S. Hommeau).

2003 Haut-Rhin – Huningue, mâle ad., phot., du 6 novembre au 9 février 2004 au moins (V. Palomarès, A. Torkler), précédemment accepté en catégorie A (V. *Ornithos* 12-1 : 8), désormais placé en catégorie E.

2001 Haut-Rhin – Huningue, mâle ad., phot., du 14 janvier au 10 février (R. Aye), précédemment accepté en catégorie A (V. *Ornithos* 11-2 : 57), désormais placé en catégorie E.

(Amérique du Nord). L'année 2007 avait déjà vu arriver cinq nouveaux oiseaux, en plus d'une femelle revenue hiverner dans le Finistère. Avec cette donnée supplémentaire, 2007 totalise donc près de la moitié des Fuligules à tête noire vus en France ! Il apparaît que l'oiseau transfrontalier de Huningue, Haut-Rhin, déjà signalé en 2001 et 2003 sur le site, est porteur d'une bague. Toutes les données se rapportant à cet oiseau ont donc été placées en catégorie E (V. Annexe 2) et retirées des statistiques. La même décision a par ailleurs été prise du côté suisse (P. Knauss, comm. pers.). En 2008, la femelle du lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique, a été comptabilisée comme nouvelle, l'espèce n'ayant pas été notée sur le site depuis janvier 2004, tandis que deux mâles ont passé deux hivers consécutifs dans les Pyrénées-Atlantiques. Rien de nouveau par contre en provenance du Finistère, où deux oiseaux avaient séjourné du 2 novembre 2007 au 21 avril 2008.

EIDER À TÊTE GRISE *Somateria spectabilis* (9/10) (7/8 – 1/1)

Calvados – Berneville-sur-Mer/Villerville/Deauville, mâle 1^{er} hiver, phot., du 12 février au 22 avril (J. Jean-Baptiste, P.-J. Dubois *et al.*).

(Océan glacial arctique). La dernière donnée en date provenait de Douarnenez, Finistère, où une femelle de 1^{er} hiver avait séjourné du 30 décembre 2000 au 7 avril 2001 (V. *Ornithos* 9-1 : 7). Ce nouveau mâle a lui aussi fait le bonheur de nombreux ornithologues, venus dans le Calvados pour l'admirer.

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (59/63) (37/41 – 1/1)

Vendée – La Tranche-sur-Mer : La Terrière, mâle 1^{er} hiver, 26 mars (P. Trotignon).


2006 Vendée – La Tranche-sur-Mer : La Terrière, fem ad., 20 et 27 janvier (S. Reeber, P. Trotignon, M. Vaslin), et non 27 janvier seulement ; fem. 1^{er} hiver du 27 janvier au 23 mars (S. Reeber, A. Thomas, P. Trotignon, M. Vaslin) et non du 27 janvier au 4 février seulement (V. *Ornithos* 15-5 : 319).

(Amérique du Nord). Une seule mention en 2008, sur ce qui est incontestablement le meilleur site français pour cette macreuse, et par un observateur coutumier de l'espèce...

PÉTREL GONGON/DE MADÈRE *Pterodroma feae/madeira* (2/2) (2/2 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant, 4 miles au sud-ouest de l'île, 28 juillet (F. Barrault, Y. Le Corre).

(Îles du Cap-Vert, Madère). Troisième mention française d'un *Pterodroma*, les deux précédentes provenant du cap Gris-Nez, Pas-de-Calais, les 9 septembre 2001 et 29 septembre 2005.



6. Eider à tête grise *Somateria spectabilis*, mâle 1^{er} hiver, Calvados, février 2008 (James Jean-Baptiste). *First-winter male King Eider*.



7. Élanion blanc *Elanus caeruleus*, adulte, Cher, février 2008 (Johann Pitois). *Black-shouldered Kite*.

PUFFIN DE MACARONÉSIE *Puffinus baroli* (54/69) (47/65 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Kadoran, 21 octobre (P. Crouzier *et al.*).

2007 Finistère – Brignogan : Sémaphore, 11 novembre (A. Le Nevé).

(Madère, Salvages, Canaries et Açores). Une donnée vient combler le vide de 2007, en une localité normale, mais à une date très tardive. En 2008, Ouessant accueillait son dix-septième Puffin de Macaronésie... Rappelons que le Puffin de Macaronésie était autrefois considéré comme sous-espèce du Puffin semblable *P. assimilis*.

HÉRON VERT *Butorides virescens* (3/2) (3/2 – 1/0)

Bouches-du-Rhône – Berre-l'Étang, ad., phot., du 8 novembre au 6 mai 2009 (C. Seguin, A. Flitti *et al.*).

2007 Bouches-du-Rhône – Berre-l'Étang, 2^e hiver, phot., du 31 octobre au 4 mai 2008 (C. Seguin, A. Flitti *et al.*).

2006 Bouches-du-Rhône – Berre-l'Étang, 1^{er} hiver, phot., du 16 décembre au 2 mai 2007 (C. Seguin, A. Flitti *et al.*).

(Amérique du Nord, Amérique centrale). Ce héron a largement défrayé la chronique, en premier lieu parce qu'il a pris l'habitude d'estiver aux Pays-Bas entre ses différents séjours hivernaux en France, mais aussi en raison des doutes qui ont longtemps persisté sur son identité spécifique... Le risque d'une éventuelle confusion avec un Héron strié *B. striatus*, dont certaines populations sont particulièrement colorées, est dorénavant levé. L'appartenance subsécifique de ce Héron vert demeure toutefois incertaine, son plumage montrant une pâleur inhabituelle pour la sous-espèce nominale de l'est de l'Amérique du Nord. Des investigations complémentaires sont actuellement en cours pour tenter de répondre à cette question.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (96/340) (88/332 – 16/96)

Allier – Deneuille-lès-Chantelle, ad., phot., 18 avril (E. Amor).

Charente – localité tenue secrète, couple, phot., 3 août au moins (P.-P. Evrard *et al.*).

Cher – Herry, ad., phot., du 11 au 13 février (J. Pitois *et al.*).

Doubs – Frasnès, ad., phot., 23 août (D. Michelat *et al.*).

Drôme – Colonzelle, ad., 25 juillet (S. Moreno).

Haute-Saône – Fédry, juv., 2 septembre (A. Schmitt).

Haute-Savoie – Jonzier-Epagny : les Crêts, ad., 14 juillet (J.-M. Matérac *et al.*).

Hérault – Vendres, 1^{er} été, phot., 15 mai (X. Rufay, D. Clément, F. Cazin, V. Fradet).

Indre-et-Loire – Ballan-Miré, ad., 27 avril (C. Guinut, F. Guinut).

Loire – Saint-Forgeux-Lespinnasse, ad., 22 mai (E. Vericel, N. Lorenzini).

Loire-Atlantique – Pannecé : butte des Gas, ad., 19 et 20 mars (W. Raitière, P. Berthelot, P. Cahier, J. Mérot).



8. Héron vert *Butorides virescens*, 1^{er} hiver, Bouches-du-Rhône, décembre 2006 (Thomas Perrier). *First-winter Green Heron.*

NDLR. Pour des raisons de mise en pages, ces quatre photos de Héron vert ont été inversées horizontalement. C'est donc le côté gauche de l'oiseau qui est visible ici, et non le droit. Noter l'évolution du plumage en 2 ans.



10. Héron vert *Butorides virescens*, 2^e hiver, Bouches-du-Rhône, avril 2008 (Frank Dhermain). *Second-winter Green Heron.*



9. Héron vert *Butorides virescens*, 2^e hiver, Bouches-du-Rhône, février 2008 (Frank Dhermain). *Second-winter Green Heron.*



11. Héron vert *Butorides virescens*, adulte, Bouches-du-Rhône, décembre 2008 (Julien Vêque). *Adult Green Heron.*

Loiret – Ouzouer-sur-Loire, 19 et 20 avril, et Sully-sur-Loire, 21 avril, ad., phot. (R. Wahl, R. Thain, C. Lartigau *et al.*).

Saône-et-Loire – Simard, ad., phot., 26 avril (J.-M. Frolet, H. Billay *et al.*).

Yvelines – Bonnelles, ad., phot., 21 avril (J. Chevallier); Verneuil-sur-Seine, ad., phot., 20 avril (J.-M. Fenerole).

2007 Tarn-et-Garonne – Garganvillar, jusqu'à 3 ad., phot., du 3 octobre au 24 mars 2008 (A. Calvet *et al.*), et non ad., 3 octobre seulement (V. *Ornithos* 15-5 : 320).

2005 Haute-Garonne, Pibrac, ad., 7 septembre (A. Mauss).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). En 2008, l'Élanion blanc connaît une nouvelle année record, avec pas moins de 16 oiseaux signalés en dehors de son aire de nidification habituelle, dont un beau tir groupé dans le nord-est du pays... Il faut y ajouter les résultats de la reproduction de 2008 dans le Sud-Ouest : 6 couples présents dans les Pyrénées-Atlantiques, 19 dans les Landes, 1 dans le Gers, 2 dans les Hautes-Pyrénées et plusieurs autres en Gironde (Delage 2009). Sur 17 couples suivis, 14 ont élevé un total de 36 jeunes à l'envol, mais l'estimation de 90 jeunes produits a été avancée pour la totalité de la population (Delage *in* De Seynes *et al.* 2009). S'agissant dorénavant plus d'un nicheur rare que d'une espèce occasionnelle en France, les observations d'Élanion blanc ne seront plus soumises à homologation nationale à compter du 1^{er} janvier 2010.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (123/124) (101/102 – 18/18)

Allier – Châtel-de-Neuvre, mâle ad., phot., 17 avril (F. Guélin).

Alpes-Maritimes – Èze, fort de la Revère, mâle ad., 18 septembre (M. Belaud, G. Joannès).

Aube – Bergères : Les Terres noires, mâle ad., 26 mars (Y. Brouillard).

Aude – Port-la-Nouvelle, mâle ad., 25 mars (G. Oliosio).

Aveyron – Laval-Rocquécézière, mâle imm., 9 septembre (A. Calvet).

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, La Chassagne, fem. ad., 3 mai (E. Franc), mâle ad., 27 septembre (Y. Ponthieux).

Doubs – Houtaud, mâle 2^e année, 22 août (D. Michelat), mâle 3^e année, phot., 7 septembre (D. Michelat).

Eure-et-Loir – Guillonville, mâle ad., 13 mars (E. Gueret); Garancières-en-Beauce, juv., 7 septembre (L. Chevallier).

Haute-Corse – Aléria, mâle ad., 26 mars (J. Hahn, O. Rollet); Macinaggio, mâle 2^e année, phot., 23 et 24 avril (P. Crouzier, F. Portier, A. Rougeron, J. Vêque).

Manche – Vain, mâle 2^e année, 4 mai (S. Provost *et al.*).

Pyrénées-Orientales – Vingrau, mâle 3^e année, 4 avril (G. & M. Oliosio); Alénia, mâle 2^e année, 23 avril (F. Legendre).

Vendée – La Barre-de-Monts, mâle 2^e année, 15 septembre (M. Vaslin).

Yonne – Vergigny, mâle ad., 8 septembre (J. Grévilot).

2007 Bouches-du-Rhône – Plaine de la Crau, point kilométrique 17 sur la N568, mâle ad., 6 avril (M. Crouzier).

2006 Aisne – Mont-d'Origny, mâle ad., 21 septembre (F. Cochon, D. Denoyelle).

2006 Aube – Prunay-Belleville, mâle subad., phot., du 1^{er} au 9 mars (Y. Brouillard, S. Paris *et al.*), et non subad., du 1^{er} au 7 mars seulement; Saint-Lyé, mâle ad., 6 avril (A. Bonnetterre), et non ad. (V. *Ornithos* 15-5 : 321).

2006 Bouches-du-Rhône – Aureille : La Tapie, mâle ad., phot., 22 septembre (J. Renet, G. Paulus, N. Vincent-Martin).

2006 Var – Hyères : île de Porquerolles, mâle ad., 15 avril (N. Issa, J.-M. Chartendault).

(Asie centrale, à l'ouest jusqu'en Roumanie). À nouveau un record du nombre de données pour cette espèce, avec 18 oiseaux, contre 16 pour 2006 et 2007. Leur répartition géographique est sans surprise, la moitié est du pays restant largement privilégiée. La donnée vendéenne fait figure d'exception à cet égard. Terminons enfin en exprimant un vif regret face à l'absence des données pré-nuptiales de Gruissan, Aude...

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (31/31) (28/28 – 2/3)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *vulpinus*, appelée « Buse des steppes ».

Aude – Gruissan : Roc de Conilhac, 2 ind., phot., 16 septembre (T. Guillosson, G. Schoutteten, J. Bultots *et al.*).

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas de Fiérouse, 1^{er} hiver, 24 et 28 mars (M. Gauthier-Clerc, Y. Kayser). (Eurasie, au nord et à l'est de *B. b. buteo*). Deux données en 2008, toutes deux sur la frange méditerranéenne. La mention de l'Aude faisait état de 17 oiseaux vus le même jour, mais des descriptions individualisées et des photographies systématiques auraient été préférables pour entériner un effectif qui constituerait un véritable « scoop » pour une sous-espèce aussi rare et d'identification aussi délicate.

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (31/27) (26/22 – 3/3)

Aude – Leucate/Fitou, imm., sous-espèce *rufinus*, 25 avril (F. Morlon).

Hérault – Béziers, aéroport de Béziers-Vias, sous-espèce *rufinus*, imm., 16 mai (X. Rufay, A. Rondeau).

Loiret – Entre Batilly et Barville-en-Gâtinais, imm. 2^e année, sous-espèce *rufinus*, phot., du 12 septembre au 22 février 2009 (A. Larousse *et al.*).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Trois mentions en 2008, et comme en 2007, aucune en provenance de Camargue, où l'hivernage du Mas Neuf semble avoir eu lieu pour la dernière fois en 2006-2007... On ne peut pas exclure que les données de l'Aude et de l'Hérault concernent en fait le même oiseau, mais dans le doute, les deux ont été comptabilisées. La donnée du Loiret est remarquable par sa localisation et par la durée de stationnement de l'oiseau.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (382/409) (313/336 – 11/13)

Bas-Rhin – Lingolsheim, fem. imm., 27 janvier (Y. Carasco).

Charente-Maritime – Rochefort : école des Fourriers, fem. ad., phot., 1^{er} décembre (P. Jourde).

Doubs – Sainte-Colombe, 1^{er} hiver, 16 mars (D. Michelat, D. Reymond, B. Cotte); Bannans, 1^{er} hiver, du 16 mars au 16 avril (D. Michelat, D. Reymond, B. Cotte); Bulle, 2 ind. de 1^{er} hiver, du 16 mars au 6 avril (D. Michelat, D. Reymond, B. Cotte); Bouverans, imm., 19 mars (D. Michelat); Chapelle-d'Huin, imm., 8 avril (D. Michelat); Avoudrey, mâle ad., 28 décembre (D. Michelat).

Oise – La Neuville-Saint-Pierre, mâle ad., phot., 20 janvier et 22 mars (H. de Lestanville, J.-C. Delasalle); Lachaussée du Bois d'Écu, mâle ad., phot., du 28 décembre au 3 janvier 2009 (H. de Lestanville *et al.*).

Pas-de-Calais – Saint-Aubin, fem. probable, phot., 23 novembre (T. Daumal).

Seine-et-Marne – Monterau-sur-le-Jard : aéroport de Melun-Villaroche, 1^{er} hiver, phot., du 13 janvier au 16 mars (J. Crespo, S. Barbéris *et al.*).

2007 Somme – Quesnoy-sur-Ayraines, 1^{er} hiver, phot., du 19 novembre au 26 décembre (T. Rigaux *et al.*); Herleville, 1^{er} hiver, phot., 22 décembre (T. Rigaux, G. Proot *et al.*).

2006 Aube – Avon-la-Pèze et Saint-Lupien, 2^e année probable, du 12 au 26 mars (Y. Brouillard, S. Paris), et non Avon-la-Pèze, 12 mars (S. Paris *et al.*) seulement (V. *Ornithos* 15-5 : 322).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Avec 13 oiseaux en 2008 et 15 en 2007, les deux dernières années se situent donc un peu au-dessus de la moyenne, qui est de 12,8 oiseaux par an depuis 1981. Ce chiffre masque cependant de très fortes disparités interannuelles, liées aux « invasions » auxquelles se livre la Buse pattue de temps à autre. L'hiver 2007-2008 a donc connu un afflux modeste mais bien réel, regroupant tous les oiseaux de 2007 et 9 oiseaux en 2008, soit 22 individus au total. Toutes les mentions proviennent du quart nord-est de la France, à l'exception d'une donnée de la Sarthe et d'une autre de l'Aveyron en novembre 2007 (V. *Ornithos* 15-5 : 322). Quatre autres observations marquent la fin de l'année 2008, dont une en Charente-Maritime.

12. Élanion blanc *Elanus caeruleus*, adulte, Doubs, août 2008 (Dominique Michelat). Adult Black-shouldered Kite.



13. Busard pâle *Circus macrourus*, mâle 2^e année, Haute-Corse, avril 2008 (Antoine Rougeron). 2nd-cy male Pallid Harrier.



AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (235/176) (186/123 – 35/7)

NB : Les oiseaux apparemment nouveaux sont marqués d'un astérisque (*)

Ain – Dombes : Lapeyrouse puis Birieux, ad., du 2 novembre au 17 mars 2009 (P. Crouzier *et al.*).

Aude – Fleury-d'Aude, 1^{er} hiver*, phot., 28 octobre au 10 mars 2009 (D. Clément, J. Piette).

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas Michel, 2^e hiver*, 24 février (H. Isenbrandt), Tour-du-Valat, le même oiseau, 29 février (D. Cohez, A. Olivier), Consécanière, ad., du 6 au 10 mars (Y. Kayser, H. Isenbrandt), Paradis, subad., 8 novembre (H. Isenbrandt), Consécanière, imm.*, du 21 novembre au 20 février 2009 (D. Cohez, Y. Kayser, J. Paoli *et al.*), Tour-du-Valat, imm.*, du 23 novembre au 10 mars 2009 (D. Cohez, Y. Kayser, A. Olivier *et al.*); Saintes-Maries-de-la-Mer, juv.*, phot., 24 octobre au moins (F. Jourdain); Mas-Thibert : marais du Vigueirat, ad., du 1^{er} janvier au 3 février (M. Chambouleyron, G. Massez, J.-P. Grillet), imm., 17 janvier, 12 février et 19 mars (G. Massez), ad., du 19 novembre au 28 janvier 2009 (R. Tine, G. Massez, J.-L. Lucchesi).

Landes – Saint-Martin-de-Seignanx, ad., 13 et 14 novembre (Y. Toutain, F. Cazaban).

Vaucluse – Orange, ad.*, 9 mars (Y. Kayser).

Parcours 2008 de « Tönn », Aigle criard estonien de 1^{er} hiver équipé d'une balise

Cet Aigle criard ayant traversé la France entre le 26 octobre et le 16 novembre 2008 (responsable du programme : Urmas Sellis), tous les points où il a été précisément localisé grâce à une émission de sa balise sont pris en compte ci-après (aucune de ces données ne correspond à un contact visuel). Les départements et communes concernés sont présentés ci-dessous par ordre chronologique d'apparition de l'oiseau. (Voir aussi le « En direct du CHN » dans le présent numéro.)

Moselle – Barst, du 26 octobre au 1^{er} novembre; Lelling, 1^{er} et 2 novembre; Guessling-Hémering, 2 novembre.

Meurthe-et-Moselle – Leyr, 2 novembre; Eulmont, 2 et 3 novembre; Viterne, 3 novembre; Goviller, 3 novembre; Souveraincourt, 4 novembre.

Vosges – Bazoilles-sur-Meuse, 4 novembre.

Haute-Maine – Is-en-Bassigny, du 4 au 12 novembre; Nogent, 12 novembre; Cusey, 12 novembre.

Côte-d'Or: Chevigny-Saint-Sauveur, 12 et 13 novembre.

Saône-et-Loire: La Charmée, 13 novembre.

Loire – Izieux/Saint-Chamond, 13 novembre.

Hérault – Vias, 14 et 15 novembre; Béziers, 15 novembre.

Aude – Bizanet, 15 novembre; Fraissé-des-Corbières, 15 novembre.

Pyrénées-Orientales: Arles-sur-Tech, 16 novembre; Baixas, 16 novembre.

2007 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Consécanière, 2 imm. du 1^{er} décembre au 24 février 2008, puis un seul jusqu'au 1^{er} mars 2008 (H. Isenbrandt, Y. Kayser, A. Flitti *et al.*), et non imm., du 1^{er} au 31 décembre seulement (V. *Ornithos* 15-5 : 323); Mas-Thibert : marais du Vigueirat, imm.*, 3 novembre (M. Chambouleyron, G. Massez).

2006 Bouches-du-Rhône – Mas-Thibert : marais du Vigueirat, ad., du 6 novembre au 14 mars 2007 (G. Massez, M. Chambouleyron, C. Pin), et non jusqu'au 31 décembre seulement (V. *Ornithos* 15-5 : 323).

2006 Gironde – Bruges, mâle juv.*, trouvé mort, phot., 7 novembre (P. Grisser, L. Labatut).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Une donnée s'ajoute pour l'année 2006, qui compte désormais quatre nouvelles arrivées. Cet oiseau avait été bagué au nid le 20 juin 2006 en Biebrza, Pologne (source : G. Maciorowski, T. Mizera). L'autopsie pratiquée a révélé qu'il était apparemment mort d'épuisement (P. Grisser & L. Labatut, comm. pers.) et les mensurations confirment qu'il s'agit d'un mâle. L'année 2008 compte 14 données pour 7 nouveaux oiseaux, les adultes de l'Ain et des Landes n'ayant pas été comptabilisés, puisque de retour sur des sites déjà fréquentés en 2006 et 2007. En Camargue, 4 oiseaux sont considérés comme nouveaux, avec les précautions d'usage... Au marais de Vigueirat, Bouches-du-Rhône, les deux individus semblent les mêmes qu'en 2007. Il faut ajouter à ces chiffres les résultats obtenus lors de la traversée de notre pays par « Tönn », un jeune Aigle criard équipé d'une balise sur son nid en Estonie (V. encadré). L'oiseau est arrivé en France par le sud-ouest allemand le 26 octobre et a quitté le pays par les Pyrénées-Orientales le 16 novembre. Sa balise a émis un signal de position à 66 reprises entre ces deux dates, en 21 communes et 10 départements différents. Une formidable aventure, riche en enseignements (V. « En direct du CHN » dans le présent numéro).



14. Aigle pomarin *Aquila pomarina*, juvénile, Bouches-du-Rhône, septembre 2008 (Thomas Galewski). *Juvenile Lesser Spotted Eagle*.

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (67/59) (63/55 – 6/6)

Alpes-Maritimes – Èze, Fort de la Revère, phot., 21 septembre (M. Belaud, M. Flauw); phot., 29 septembre (M. Belaud, P. Caillat).

Bouches-du-Rhône – Camargue : Tour du Valat, juv., phot., 24 septembre (T. Galewski).

Franche-Comté – Localité tenue secrète, couple nicheur, produit un jeune à l'envol, mâle du 6 avril au 6 septembre, fem. du 12 avril au 6 septembre et juv. du 28 juin au 14 septembre (D. Michelat *et al.*).

Indre – Mézières-en-Brenne, ad., phot., du 3 au 10 septembre (N. Issa, F. Van der Lans).

Pyrénées-Atlantiques – Bénéjacq, ad., 23 avril (J.-L. Grangé).

2006 Côtes-d'Or – Localité tenue secrète, mâle ad., 24 juillet (A. Rougeron).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Encore une année tout à fait honorable quant au nombre d'oiseaux signalés, bien que quelques fiches d'homologation de début mai dans le sud-est de la France manquent encore à l'appel. L'oiseau de 2006 n'a pas été comptabilisé, puisqu'il s'agit du même individu revenant sur le site depuis 1997, de même que les deux adultes reproducteurs de Franche-Comté.

AIGLE DES STEPPES *Aquila nipalensis* (4/3) (3/2 – 0/0)

2006 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas du Petit Badon, imm. 4^e hiver, 4 janvier (Y. Kayser).

(De l'Ukraine à l'Asie centrale). Il s'agit très vraisemblablement de l'oiseau de 3^e hiver présent en Camargue du 6 décembre 2004 au 31 janvier 2005 (V. *Ornithos* 13-2 : 82).



15. Aigle impérial *Aquila heliaca*, 1^{er} hiver, Lozère, novembre 2008 (Bruno Berthémy). *First-winter Imperial Eagle*.

AIGLE IMPÉRIAL *Aquila heliaca* (9/9) (5/5 – 2/1)

Cantal – Saint-Flour, 1^{er} hiver, phot., du 4 au 13 décembre (R. Riols *et al.*).

Lozère – Gorges de la Jonte, 1^{er} hiver, phot., 22 novembre (B. Berthémy).

(Balkans, Turquie jusqu'en Asie centrale, Mongolie). Dixième et onzième mentions françaises, qui concernent le même individu (comme en attestent certains détails de plumage) en erratisme hivernal, et ce à peine plus d'un an après la précédente donnée, le 13 octobre 2007 à Gruissan, Aude (V. *Ornithos* 15-5 : 323).

MARQUETTE DE BAILLON *Porzana pusilla* (98/138) (53/65 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas d'Agon, juv., 20 août (A. Flitti).

2001 Charente-Maritime – Floirac : La Citerne, juv., capt., 23 août (G. Mays *et al.*).

(Europe, Asie centrale, Japon). Une donnée ancienne s'ajoute aux cinq oiseaux déjà enregistrés en 2001. Après une année 2007 blanche pour cette espèce, une seule donnée en 2008.

GLARÉOLE À AILES NOIRES *Glareola nordmanni* (27/21) (23/16 – 1/0)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Mas de la Chassagne, ad., 9 juin (Y. Kayser *et al.*).

(Asie occidentale). Nouvelle observation d'un adulte en Camargue, à la même époque que celle de 2007. Il s'agit vraisemblablement du même oiseau depuis 2005 et il n'a donc pas été comptabilisé.

GRAVELOT MONGOL *Charadrius mongolus* (5/5) (5/5 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, étang de Brasol, fem. ad., 21 mai (Y. Kayser).

(Asie centrale jusqu'en Extrême-Orient). Sixième mention française de ce gravelot asiatique, la première pour la côte méditerranéenne. Il n'existe qu'une seule autre donnée printanière, du 11 mai 2004 en Charente-Maritime.

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (41/43) (39/41 – 2/2)

Finistère – Penmarc'h, juv., 7 septembre (A. Rougeron, J. Vêque, T. Michel).

Gironde – La Teste-de-Buch : Banc d'Arguin, 5 août (J. Gernigon).

2007 Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, la Chassagne, phot., du 17 au 25 avril (Y. Kayser, A. Faure, B. Olson *et al.*). (Amérique du Nord). Un an après son premier Pluvier bronzé, la Camargue en accueille un autre en 2007, portant le total à cinq mentions françaises pour cette année-là. En 2008, deux données ont été obtenues, dont une première pour la Gironde, ce qui est parfaitement conforme à la moyenne annuelle.

16. Aigle impérial
Aquila heliaca, 1^{er} hiver,
Cantal, décembre
2008 (Romain Riols).
First-winter Imperial Eagle.



17. Aigle impérial
Aquila heliaca, 1^{er} hiver,
Lozère, novembre
2008 (Bruno Berthémy).
First-winter Imperial Eagle.



18. Vanneau sociable *Vanellus gregarius* (premier plan), Seine-et-Marne, octobre 2008 (Bernard Bougeard). Sociable Plover (foreground).

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (86/85) (78/77 – 6/6)

Ariège – Les Pujols : aérodrome et Montaut, 1^{er} hiver, phot., du 16 décembre au 21 janvier 2009 (T. Guillosson, O. Endtz *et al.*).

Cher – Lignéres : étang de la Chelouze, ad., phot., 13 mars (P. Derrien).

Haute-Marne – Lac du Der-Chantecoq : le Grand Étang, 1^{er} hiver, phot., du 19 au 24 octobre (P. Laur-Fournier *et al.*).

Marne – Aigny, ad., phot., 15 et 19 avril (E. Martin).

Meuse – Mouzay, ad., phot., du 18 mai au 3 juin (M. Ameels, M. Collet *et al.*).

Seine-et-Marne – Balloy, phot., 11 août (B. Bougeard).

2006 Indre-et-Loire – Saint-Laurent-en-Gâtines, ad., phot., du 10 au 24 octobre (L. Sallé, J. Présent).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Après 5 oiseaux en 2006 et en 2007, 6 oiseaux ont été vus en 2008, soit près de deux fois la moyenne annuelle depuis la création du CHN en 1981. Les dates d'observation sont étonnamment dispersées au long de l'année, avec un stationnement estival remarquable dans la Meuse, sur un site qui avait déjà accueilli l'espèce le 23 septembre 2007 (V. *Ornithos* 15-5 : 326). Les départements visités sont classiques pour la plupart, en dehors de l'Ariège, qui accueille son premier Vanneau sociable et s'offre du même coup le record de durée d'un séjour hivernal en France...

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (21/21) (20/20 – 1/1)

Vendée – Bouin : lagune du Dain, juv., phot., 13 et 14 septembre (N. Issa, M. Delagarde, D. Sallé, L. Sallé).

(Amérique du Nord). La précédente mention remonte à septembre 2006 et avait été obtenue sur l'île de Noirmoutier toute proche. La Vendée accueille là son dixième Bécasseau semipalmé, ce qui représente près de la moitié des oiseaux signalés en France.

BÉCASSEAU À COU ROUX *Calidris ruficollis* (1/1) (1/1 – 1/1)

Finistère – Baie de Goulven, ad., phot., du 1^{er} au 4 août (M. Champion, X. Rozec *et al.*).

(Sibérie orientale). Très belle découverte finistérienne, et seconde mention française pour ce bécasseau sibérien, après celle du 15 au 21 juillet 1994, au Platier d'Oye, Pas-de-Calais (V. *Ornithos* 2-4 : 154). Et avec de nombreuses photos en prime !

BÉCASSEAU MINUSCULE *Calidris minutilla* (12/12) (7/7 – 1/1)

Loire – Chambéon : écopôle du Forez, ad., phot., du 30 septembre au 27 octobre (A. Faure, H. Pottiau, R. Sève, D. Tissier *et al.*).

(Amérique du Nord). Après onze mentions en provenance de la façade Manche-Atlantique et une de Camargue, il s'agit ici de la première donnée à l'intérieur des terres. Les dates sont classiques pour l'espèce, mais la durée du stationnement l'est moins. Quoi qu'il en soit, une bonne surprise pour ces observateurs du Forez, assurément !

BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (40/41) (36/37 – 4/4)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Galabert, phot., 6 mai (S. Houpert).

Charente-Maritime – Moëze, ad., phot., du 5 au 25 août (J. Gonin, P. Jourde *et al.*).

Finistère – Île de Sein, juv., phot., du 15 au 17 octobre (Y. Le Corre, W. Raitière).

Vendée – Bouin : port du Collet, juv., phot., 12 octobre (E. Archer).

(Amérique du Nord). Une nouvelle donnée méditerranéenne après celle de 2007, la septième pour l'espèce. Les dates et localités des trois autres mentions correspondent parfaitement au patron des apparitions de l'espèce en France.

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (42/43) (38/39 – 3/3)

Finistère – Île d'Ouessant : Porz Doun, juv., phot., du 11 au 16 septembre (A. Audevard *et al.*); baie de Goulven, juv., du 16 au 19 septembre (X. Rozec, B. Guyonnet *et al.*).

Landes – Capbreton, juv., phot., du 15 au 21 septembre (F. Cazaban *et al.*).

(Amérique du Nord). Trois Bécasseaux de Baird en 2008, tous découverts entre le 11 et le 16 septembre. Le département des Landes accueille l'espèce pour la première fois, alors que le Finistère en est à son vingt-deuxième...

BÉCASSEAU À ÉCHASSES *Calidris himantopus* (7/7) (7/7 – 1/1)

Loire-Atlantique – Guérande, ad., phot., 28 et 29 juillet (J. Mérot *et al.*).

(Amérique du Nord). Belle découverte d'un adulte en plumage nuptial, la dernière en date remontant à 2002 dans le Finistère. Quatre autres mentions françaises datent déjà de fin juillet et début août.

BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (194/262) (160/212 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Camargue : Salin-de-Giraud, 10 mai (M. Giroud *et al.*).

2006 Bas-Rhin – Krafft-Plobsheim, ad., phot., 4 juin (N. Hoffmann *et al.*).

2006 Var – Hyères : salins des Pesquiers, ad., 26 avril (N. Issa).

(Europe septentrionale). L'année 2006 voit son total passer à 5 oiseaux, dont une donnée plutôt atypique de juin dans le Bas-Rhin. L'unique donnée de 2008 est beaucoup plus classique. À signaler qu'il s'agit de l'année la plus faible depuis la création du CHN en 1981.

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (170/208) (125/141 – 8/7)

Bouches-du-Rhône – Istres : Crau, Peyre-Estève, juv., phot., du 19 au 25 septembre (T. Perrier, A. Flitti *et al.*).

Finistère – Penmarc'h : plage du Ster, juv., 6 et 7 septembre (S. Nédellec); Tréogat : Brèche de Trunvel, juv., 7 et 8 septembre (S. Nédellec); île d'Ouessant : Ru Niou et Créac'h Meur, juv., phot., du 7 au 21 septembre (A. Audevard, E. Matthieu), juv., phot., du 17 au 21 septembre (A. Audevard *et al.*).

19. Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis*, adulte, Finistère, août 2008 (Yvon Le Corre). Adult Red-necked Stint.



20. Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis*, adulte, Finistère, août 2008 (Xavier Rozec). Adult Red-necked Stint.



21. Bécasseau de Bonaparte
Calidris fuscicollis, juvénile,
Finistère, octobre
2008 (Yvon Le Corre).
Juvenile White-rumped Stint.



23. Bécasseau de Baird
Calidris bairdii, juvénile,
Finistère, septembre 2008
(Aurélien Audevard).
Juvenile Baird's Sandpiper.



22. Bécasseau de Bonaparte
Calidris fuscicollis, juvénile,
Finistère, octobre
2008 (Yvon Le Corre).
Juvenile White-rumped Stint.



24. Bécasseau de Baird
Calidris bairdii, juvénile,
Finistère, septembre 2008
(Aurélien Audevard).
Juvenile Baird's Sandpiper.



25. Bécasseau rousset
Tryngites subruficollis,
juvénile, Crau,
Bouches-du-Rhône,
septembre 2008
(Thomas Perrier).
Juvenile Buff-breasted Sandpiper.



26. Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*, juvénile, Finistère, septembre 2008 (Aurélien Audevard). *Juvenile Buff-breasted Sandpiper.*

Maine-et-Loire – Saint-Mathurin-sur-Loire : La Grande Levée, juv., phot., vidéo, du 17 au 28 septembre (R. Provost, J.-C. Beaudoin, E. Beslot, A. Fossé *et al.*).

Somme – Fort Mahon : estuaire de l'Authie, phot., 1^{er} juin (M. Guerville).

Vendée – Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré, juv., du 14 au 17 septembre (P. Trotignon).

(Amérique du Nord). Les données de Penmarc'h et de Tréogat, Finistère, ont été comptabilisées comme concernant un seul et même oiseau, vu la distance réduite entre les deux sites. Avec sept Bécasseaux roussets, cette année se hisse au-dessus de la moyenne annuelle (5,5 oiseaux par an depuis 1981). La donnée de Somme est à remarquer pour sa date, et celle du Maine-et-Loire pour sa localisation plutôt intérieure.

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (274/323) (47/50 – 1/1)

Haute-Corse – Macinaggio, 24 avril (P. Crouzier, F. Portier).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Après une année 2007 à marquer d'une pierre blanche pour ses 9 individus, retour à la triste normalité... Macinaggio devient un site habituel à cette époque de l'année pour l'espèce.

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (32/33) (23/23 – 2/2)

Finistère – Plouarzel, juv., phot., du 19 au 23 octobre (C. Audrin, M. Champion, T. Quélenec).

Loire-Atlantique – La Turballe : salines de Trévaly, 1^{er} hiver, phot., du 24 décembre au 1^{er} mars 2009 (A. Gentric, W. Raitière, W. Maillard, A. Mousseau *et al.*).

2006 Vendée – Réserve naturelle de Saint-Denis-du-Payré, 1^{er} hiver, phot., du 2 novembre au 8 janvier 2007, puis 2, 3 et 21 avril (E. Beslot, P. Trotignon *et al.*), et non « puis 2 les 3 et 21 avril » (V. *Ornithos* 15-5 : 328).

(Amérique du Nord). L'oiseau de Loire-Atlantique fournit un nouveau cas d'hivernage pour la France et s'est montré à nombre d'amateurs venus le voir... Celui de Plouarzel – magnifiquement photographié – a été trouvé en un lieu et à une date parfaitement classiques, les bécassins arrivant plus tard dans l'automne que la majorité des autres limicoles nord-américains.



27. Bécassin à long bec
Limnodromus scolopaceus,
juvénile, Finistère, octobre
2008 (Thierry Quélenec).
Juvenile Long-billed Dowitcher.

CHEVALIER CRIARD *Tringa melanoleuca* (5/5) (5/5 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, étang de Brasol, 21 mai (Y. Kayser). (Amérique du Nord). Voici la sixième mention française de ce chevalier, pas moins de 12 ans après la précédente, du 2 janvier 1996 à Cayeux-sur-Mer, Somme. La Camargue et le littoral méditerranéen français accueillent leur premier Chevalier criard.

CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (44/44) (29/29 – 3/3)

Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, Enfores de la Vignolle, 8 avril (Y. Kayser, A. Arnaud); La Capelière, phot., du 4 au 6 juillet (J. Paoli *et al.*).

Finistère – Île-Tudy, phot., du 21 décembre au 3 janvier 2009 (R. Pavec, A. Pavec, C. Kermarec *et al.*). (Amérique du Nord). Il n'y a jamais eu plus de trois oiseaux la même année depuis la création du CHN, ce chiffre ayant été atteint en 2005, en 2006 et donc en 2008. On peut évidemment se demander si les deux données camarguaises ne concernent pas le même individu, mais trois mois séparant les deux dates, les deux oiseaux ont été comptabilisés. Il s'agit des seconde et troisième mentions pour la Camargue. Le Finistère fournit quant à lui la quatrième donnée hivernale française de l'espèce.

CHEVALIER SOLITAIRE *Tringa solitaria* (5/5) (2/2 – 1/1)

Nord – Hondschoote, 8 juillet (E. Dansette).

(Amérique du Nord). Sixième mention française et la première en dehors du Finistère... La date est assez précoce, puisque deux données sont du mois d'août, deux autres de septembre et la dernière de janvier. L'oiseau n'a malheureusement pas stationné suffisamment longtemps pour être vu par d'autres observateurs que l'heureux découvreur...

28. Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*, Finistère, décembre 2008 (Matthieu Canévet). Lesser Yellowlegs.



29. Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes*, Finistère, décembre 2008 (Raymond Pavec). Lesser Yellowlegs.

**CHEVALIER BARGETTE** *Xenus cinereus* (116/102) (90/77 – 7/4)

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, étangs des Impériaux, phot., 9 mai (S. F. Burch), phot., du 17 au 24 octobre (F. Jourdain, P. Knaus); Arles: Camargue, Baisse du Quenin, phot., 17 septembre (F. Latraube, J. Renet); pont des Cinq Gorges, ad., phot., 9 novembre (F. Morlon, G. Perron *et al.*).

Mayenne – Bourgon: lac de Haute-Vilaine, du 13 au 15 septembre (F. Rose *et al.*).

Nièvre – Neuvy-sur-Loire, ad., phot., 6 mai (J. Pitois).

Pas-de-Calais – Camiers: estuaire de la Canche, ad., phot., 29 juillet (F. Caloin, G. Terrasse).

2007 Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, pont des Cinq Gorges, phot., du 7 décembre au 27 janvier 2008 (E. Durand, S. Durand, Y. Blanchon, A. Faure *et al.*), et non à partir du 26 décembre seulement (V. Ornithos 15-5: 329).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Savoir combien d'oiseaux fréquentent la Camargue et s'ils ont déjà été homologués en 2007 est une gageure... Deux bargettes y avaient été comptabilisées comme nouvelles cette année-là, sur les Impériaux et au pont des Cinq Gorges, l'une des deux étant baguée. Seule celle de la Baisse de Quenin a donc été considérée comme nouvelle en 2008, étant donné l'éloignement de ce site par rapport aux deux précédents. Les trois autres observations proviennent de localités originales pour l'espèce...

MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (37/37) (32/32 – 1/1)

Hérault – Lansargues, ad., phot., 21 et 23 mars (B. Nabholz *et al.*).

(Amérique du Nord). Après les sept oiseaux de la fin de l'année 2005, aucun n'avait été observé ni en 2006 ni en 2007. Il s'agit de la troisième Mouette atricille pour la côte méditerranéenne, et de la première pour le Languedoc-Roussillon. Cet oiseau adulte en plumage nuptial était porteur d'une bague alphanumérique blanche. Il pourrait s'agir d'un oiseau bagué en Allemagne en 2001, surnommé « Atze » et observé notamment en Italie, en Suisse et en Espagne ensuite (www.ebnitalia.it/qb/QB013/sghignazzante.htm) ou d'un autre individu espagnol également bagué (www.rarebirdspain.net/arbsr701.htm#Latricilla). L'oiseau en question ne s'est malheureusement pas laissé détailler d'assez près pour que l'on puisse en être certain.



30. Mouette de Franklin *Larus pipixcan*, 2^e été, Finistère, septembre 2008 (Yvon Le Corre). *Second-summer Franklin's Gull.*



31. Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides*, 1^{er} hiver, Finistère, janvier 2008 (Nidal Issa). *First-winter Iceland Gull.*

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (27/26) (26/25 – 3/3)

Finistère – Penmarc'h, Saint-Guérolé, 2^e été, phot., du 28 août au 21 septembre (M. Baudard, M. Canévet *et al.*).

Vendée – Île d'Yeu : Pierre des Amporelles, ad., 15 mai (F. Portier) ; île de Noirmoutier : côte ouest, 2^e hiver, phot., du 4 septembre au 21 octobre (M. Vaslin, J.-M. Porteau *et al.*)

(Amérique du Nord). Après 3 oiseaux en 2007 et 5 en 2006, à nouveau un très bon cru en 2008, puisqu'il n'y avait jamais eu plus de deux oiseaux au cours de la même année auparavant.

MOUETTE DE BONAPARTE *Larus philadelphia* (17/16) (16/15 – 3/3)

Finistère – Ploudalmézeau, ad., du 5 au 21 octobre (M. Champion, T. Quélenec).

Vendée – Île de Noirmoutier : Barbâtre, plage de la Fosse, 1^{er} hiver, phot., 27 mars (D. Desmots), côte ouest, juv./1^{er} hiver, phot., du 4 au 8 septembre (M. Vaslin *et al.*).

2004 Nord – Loon-Plage : Le Clipon, 2^e hiver, 17 janvier (D. Haubreux & K. Verbanck *vide* J. Piette).

(Amérique du Nord). Trois oiseaux en 2008, ce qui prolonge une série de cinq années lors desquelles l'espèce a été vue en France. Sur 19 oiseaux vus dans notre pays depuis la première mention en 1910, 13 ont été signalés entre 2003 et 2008. La Vendée accueille là ses cinquième et sixième oiseaux.

GOÉLAND D'AMÉRIQUE *Larus smithsonianus* (8/7) (8/7 – 2/2)

Finistère – Île d'Ouessant : plage de Korz, 2^e hiver, phot., du 28 janvier au 13 février (A. Audevard).

Vendée – Île de Noirmoutier : Barbâtre, Anse du Gois, 2^e hiver, phot., 3 octobre (M. Vaslin).

(Amérique du Nord). Deux nouvelles données pour ce goéland d'identification très délicate (V. Ornithos 15-5 : 331), en des lieux où sévissent des « laridologues » avertis ! L'île de Noirmoutier, Vendée, et le Finistère avaient déjà accueilli l'espèce respectivement en 2001-2002 et en 2007.

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucooides* (179/183) (171/174 – 25/30)

Côtes-d'Armor – Pleumeur-Bodou, 1^{er} hiver, phot., 27 et 28 janvier (G. Bentz, A. Deniau).

Deux-Sèvres – Saint-Loup-sur-Thouet : lac du Cébron, 1^{er} hiver, phot., du 19 février au 14 mars (P.-P. Evard, B. Griad).

Finistère – Île d'Ouessant : baie de Lampaul, 1^{er} hiver, phot., du 11 au 13 janvier (A. Audevard *et al.*) ; Concarneau, 3 ind. de 1^{er} hiver et 1 ind. de 2^e hiver, phot., du 19 janvier au 3 avril (N. Issa, A. Liger, E. Sansault, S. Nédellec *et al.*), 1^{er} hiver, phot., du 28 décembre au 10 février 2009 (P.-J. Dubois, E. Rousseau *et al.*) ; Le Conquet : la Ria, 1^{er} hiver, phot., du 25 janvier au 6 février (B. Griad), le port : 2^e année, phot., du 6 avril au 1^{er} juin au moins (A. Audevard) ; Douarnenez, 1^{er} hiver, phot., 29 février (S. Mauvieux) ; Fouesnant, 1^{er} hiver, phot., 14 mars puis



32. Mouette de Bonaparte *Larus philadelphia*, adulte, Finistère, octobre 2008 (Thierry Quélenec). *Adult Bonaparte's Gull.*



33. Mouette de Franklin *Larus pipixcan*, 2^e hiver, Vendée, octobre 2008 (Matthieu Vaslin). *Second-winter Franklin's Gull.*

2 ind. de 1^{er} hiver le 29 (R. Pavec, J. Le Bail); Penmarc'h: port de Kéridy, 1^{er} hiver, 22 et 23 mars (P. Bounie).
Indre-et-Loire – Tours: ile aux Vaches, 2^e hiver probable, 16 février (N. Issa, E. Sansault).
Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu: lac de Grand-Lieu, 1^{er} hiver, 17 mars (S. Reeber); La Turballe, 1^{er} hiver, phot., du 13 au 15 décembre (C. Gentic, G. Couroussé).
Maine-et-Loire – La Séguinière, 1^{er} hiver, phot., 25 février (A. Fossé).
Mayenne – Saint-Fraimbault-de-Prières, 2^e hiver, phot., du 1^{er} au 15 février (D. Madiot, D. Tavenon *et al.*).
Morbihan – Lorient, 1^{er} hiver et 2^e hiver, phot., du 26 janvier au 18 février (N. Issa, A. Liger, E. Sansault *et al.*).
Nord – Thumeries, 1^{er} hiver, phot., 17 avril (C. Capelle); Curgies, 1^{er} hiver, phot., du 26 novembre au 3 décembre (G. Smal, V. Leirens *et al.*).
Pas-de-Calais – Calais: port, 1^{er} hiver, phot., du 3 janvier au 5 février (H. Verne, P.-J. Dubois *et al.*); Boulogne-sur-Mer, 1^{er} hiver, phot., du 2 mars au 12 avril (P.-J. Dubois, G. Flohart, J.-M. Sauvage, D. Haubreux), 1^{er} hiver, phot., 16 mars (G. Flohart), pointe de la Crèche, 1^{er} hiver, phot., 2 février (S. Peten).
Pyénées-Atlantiques – Biarritz, 1^{er} hiver, phot., 23 janvier (A. Aldalur); Hendaye, 1^{er} hiver, 27 février (A. Herrero).
Vendée – Les Sables d'Olonne, 1^{er} hiver, 27 janvier et 23 février (M. Bibard, F. Portier *et al.*).
2007 Vendée – Les Sables-d'Olonne, 1^{er} hiver, phot., du 8 janvier au 27 février (A. Barzic *et al.*).
 (Arctique canadien, Groenland). Après l'excellent chiffre de 2007 (17 oiseaux avec la donnée vendéenne qui s'y ajoute), l'année 2008 totalise 30 Goélands à ailes blanches. Il est néanmoins possible qu'il y ait eu des doublons, notamment dans le Finistère, qui reste le département le plus visité par l'espèce, avec 12 oiseaux en 2008. Le reste du littoral atlantique totalise 8 oiseaux, le Nord-Pas-de-Calais 6 autres, les 4 derniers provenant de départements intérieurs du Centre-Ouest. Le cru 2008 est donc le second par ordre d'importance après 1984 (40 oiseaux), mais avec des effectifs que le début de l'année 2009 fera pâlir!

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (29/7) (28/6 – 1/0)

Vendée – Île de Noirmoutier: Barbâtre, polder de Sébastopol, mâle ad., phot., apparié à une Sterne caugek *S. sandvicensis*, produit un poussin hybride à l'envol, du 6 mai au 18 juillet (M. Vaslin *et al.*).
 (Côte pacifique, de la Californie au Mexique). Il s'agit du mâle bagué en 2007 au Banc d'Arguin, Gironde, et sans doute de celui déjà vu le 9 mai 2007 sur l'île de Noirmoutier (V. *Ornithos* 15-5: 332).



34 & 35. Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis*, Camargue, Bouches-du-Rhône, avril 2008 (Thomas Blanchon). *Red-necked Nightjar*.



36. Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides*, 1^{er} hiver, Pas-de-Calais, janvier 2008 (Thierry Tancrez). *First-winter Iceland Gull*.

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (39/34) (32/19 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, phot., 7 septembre (A. Foux, M. Battais).
 (Méditerranée, océan Indien, Australie). Une nouvelle donnée pour la Méditerranée, mais aucun écho de l'oiseau vu à partir de 1998 et bagué en 2001 au Banc d'Arguin, Gironde, vu à maintes reprises le long du littoral atlantique jusqu'en 2007.

GUILLEMOT À MIROIR *Cephus grylle* (49/60) (27/32 – 2/1)

Morbihan – Île d'Hoëdic, ad., du 8 au 30 octobre 2008 et 22 mars 2009 (A. Le Névé).
Seine-Maritime – Saint-Jouin-Bruneval: port d'Antifer, ad., phot., du 7 décembre au 3 janvier 2009 (F. Gallien, Y. Jacob, A. Guillemont *et al.*).
2007 Morbihan – Île d'Hoëdic, 1^{er} hiver, 30 et 31 décembre (A. Le Névé).

(Arctique, Atlantique Nord). On peut raisonnablement penser que l'oiseau vu près de l'île d'Hoëdic, Morbihan, en décembre 2007 a bien été revu au cours de l'hiver suivant (A. Le Névé, comm. pers.). Un seul oiseau a donc été comptabilisé pour 2008, en Seine-Maritime, apportant la douzième mention pour ce département.

ENGOULEVENT À COLLIER ROUX *Caprimulgus ruficollis* (8/8) (4/4 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, Piémanson, capt., phot., du 12 au 16 avril (T. Jourdain, Y. Kayser *et al.*).
2004 Bouches-du-Rhône – Vallée des Baux-de-Provence: le Mazet, chant entendu, 14 juin (F. Tron). Donnée précédemment refusée (V. *Ornithos* 13-2: 111), à présent acceptée après réexamen.
 (Espagne, Afrique du Nord). La donnée de 2004 concerne un oiseau uniquement entendu; elle avait été refusée car l'utilisation d'un enregistrement par un tiers n'avait pu être écartée, mais aussi parce qu'il n'existait alors qu'une mention antérieure (de juin 1997) en France. Depuis, deux autres oiseaux ont été trouvés en 2005 dans la Drôme et en 2007 dans les Bouches-du-Rhône, permettant de réviser favorablement cette donnée de 2004. Ce dernier département accueille d'ailleurs un nouvel oiseau en 2008.



37. Pipit de Godlewski *Anthus godlewski*, 1^{er} hiver, Manche, janvier 2008 (Sébastien Provost). *First-winter Blyth's Pipit*.

PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewski* (8/8) (8/8 – 1/1)

Manche – Genêts, 1^{er} hiver, phot., du 22 janvier au 17 février (S. Provost *et al.*).

(Sud de la Sibérie, Chine et nord-est de l'Inde). Le séjour d'un oiseau du 16 janvier au 25 février 1998 en Crau, Bouches-du-Rhône, fournissait la première mention française et le premier cas d'hivernage en Europe (Dubois *et al.* 2008). Ce nouveau séjour hivernal prolongé en compagnie de Pipits de Richard A. *richardi* a laissé à bon nombre d'observateurs la possibilité de comparer les deux espèces sur le terrain.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (63/74) (52/61 – 4/5)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans ».

Ain – Mussengué, Pérouges, mâle, 1^{er} mai (A. Bernard).

Côte-d'Or – Échigey, mâle ad., phot., 1^{er} mai (A. Rougeron).

Haute-Corse – Macinaggio, mâle, phot., 21 avril (F. Portier, P. Crouzier).

Haute-Savoie – Les Condamines, Sciez, 2 mâles, 24 avril (J.-P. Matérac).

2006 Var – Hyères: vieux salins, mâle, forme '*melanogrisea*', phot., 26 mars (N. Issa), 2 mâles, phot., 26 avril (N. Issa, J. Bernardi); salins des Pesquiers, couple, phot., 19 avril (N. Issa).

(Balkans jusqu'en Iran et en Afghanistan). Cinq oiseaux s'ajoutent aux quatre déjà enregistrés pour l'année 2006, qui égalise donc le record établi en 2007. L'année 2008 totalise cinq mâles, ce qui reste deux fois supérieur à la moyenne annuelle depuis 1981. Les dates sont très homogènes et parfaitement classiques, de même que les localités orientales. La Côte-d'Or accueille sa première Bergeronnette des Balkans. Plusieurs données concernant des oiseaux présentant des caractéristiques intermédiaires entre *M. f. feldegg* et d'autres sous-espèces sont désormais présentées dans les données non homologuées, exceptées celles de la forme '*melanogrisea*' actuellement considérée comme partie intégrante de *feldegg* (V. Ornithos 16-3 : 194). Par exemple, l'observation d'un oiseau de la forme '*xanthophrys*' – que l'on suppose être intermédiaire entre *M. f. feldegg* et *M. f. lutea* – le 13 avril 2007 dans l'Aude (C. Peignot, comm. pers.) fera l'objet d'une note dans un « En direct du CHN » à paraître dans *Ornithos*. Un autre oiseau intermédiaire, de la forme '*superciliaris*', a été vu le 2 avril 2006 à Hyères, Var (N. Issa, A. Coillet).

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (18/18) (18/18 – 3/3)

Finistère – Île d'Ouessant: réservoir amont, 1^{er} hiver, 22 août (A. Audevard *et al.*); Penmarc'h: phare d'Eckmühl, juv., 13 septembre (X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer).

Tarn – La Bruguière: Hauterive, mâle ad., 13 avril (B. Rey).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). Le Finistère avait déjà accueilli deux oiseaux en 2006, à des dates très similaires. Il s'agit en revanche d'une première pour le Tarn. Plus globalement, avec un total de 11 oiseaux entre 2005 et 2008, la fréquence croissante de l'espèce en France semble bien se confirmer.



38. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, mâle, Loire-Atlantique, octobre 2008 (Nidal Issa). *First-winter mâle Desert Wheatear*.

ROSSIGNOL PROGNÉ *Luscinia luscinia* (7/7) (5/5 – 2/2)

Haute-Savoie – Samoëns: col du Bretolet, ad., capt., phot., 30 septembre (F. Steiner *et al.*).

Pas-de-Calais – Oye-Plage, juv./1^{er} hiver, capt., phot., 21 septembre (X. Gruwier *et al.*).

(De la Scandinavie et l'Autriche jusqu'en Sibérie). Le Rossignol progné reste rarissime en France, en partie en raison de sa discrétion et de la difficulté qu'il y a à le distinguer du Rossignol philomèle *L. megarhynchos*. C'est aussi ce qui explique que sept des neuf oiseaux français ont été capturés lors de séances de baguage ou trouvés morts. Il s'agit respectivement de la seconde mention pour le col du Bretolet et de la quatrième pour le Pas-de-Calais. Les deux dates sont un peu plus tardives que celles connues pour la France, sept d'entre elles étant comprises entre le 20 août et le 20 septembre.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica* (3/3) (3/3 – 2/2)

Oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *melanoleuca*.

Haute-Corse – Macinaggio, mâle, phot., 21 avril (P. Crouzier).

Var – Hyères: île de Porquerolles, mâle ad., 3 mai (P.-J. Dubois).

(Des Balkans aux bords de la mer Caspienne). Parmi les trois précédentes données, deux proviennent de Vendée et une avait déjà été enregistrée en Haute-Corse. L'île de Porquerolles était un site attendu pour cette sous-espèce... Il convient de garder à l'esprit que l'identification de cette dernière, tout comme celles du Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus samamiscus* et de la Fauvette passerinette *Sylvia cantillans albistriata*, fait l'objet de recherches actuelles et que l'homologation de telles données ne doit être considérée qu'à la lumière des éléments disponibles.

TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (27/28) (26/26 – 1/1)

Loire-Atlantique – Guérande: Sissable, mâle 1^{er} hiver, phot., 25 octobre (N. Issa, E. Sansault).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). La dernière mention de Loire-Atlantique avait été obtenue à des dates très proches de celle-ci: du 18 au 20 octobre 2003 (V. Ornithos 12-1 : 29).

GRIVE À JOUES GRISES *Catharus minimus* (3/3) (2/2 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant: Prad Meur, juv./1^{er} hiver probable, phot., 7 octobre (J. & V. Mazenauer *et al.*).

(Amérique du Nord, extrême-est de la Sibérie). Quatrième mention française de l'espèce, après celle du 20 octobre 1974 en Vendée, puis du 22 au 25 octobre 1986 et du 12 au 14 octobre 2002, déjà à Ouessant.



39. Grive à joues grises *Catharus minimus*, 1^{er} hiver, Finistère, octobre 2007 (Antoine Joris). *First-winter Grey-cheeked Thrush*.



39. Grive de Sibérie
Zoothera sibirica, femelle,
Sein, Finistère, octobre
2008 (Willy Raitière).
Female Siberian Thrush.

40. Locustelle de Pallas
Locustella certhiola, Lot-et-
Garonne, octobre 2008
(RN Étang de la Mazière).
Pallas's Grasshopper Warbler.



41. Rousserolle isabelle
Acrocephalus agricola, 1^{er} hiver,
Sein, Finistère, octobre
2008 (Willy Raitière).
First-winter Paddyfield Warbler.

GRIVE À GORGE NOIRE *Turdus atrogularis* (13/13) (7/7 – 2/2)

Bouches-du-Rhône – Simiane-Collongue : col de la Jalassière, fem. 1^{er} hiver, capt., phot., vidéo, 5 décembre (R. Manassero *fade* F. Jiguet).

Charente-Maritime – Loix : la Lasse, ad. possible, 6 décembre (P.-P. Evrard *et al.*).

(Sibérie). La Grive à gorge noire est désormais considérée comme une espèce à part entière et non plus comme une sous-espèce de la Grive à gorge rousse *T. ruficollis* (V. « En direct de la CAF » à paraître dans *Ornithos*). Parmi les 16 données connues pour ces deux taxons en France, seules deux concernent *T. ruficollis* et une autre un oiseau intermédiaire (donc devenu hybride !). Cette grive engrange donc deux nouvelles mentions en 2008, ce qui est d'autant plus remarquable que la dernière en date remonte au 20 février 1999 dans l'Ardèche (V. *Ornithos* 11-2 : 75). L'oiseau des Bouches-du-Rhône a été capturé dans le cadre des chasses « traditionnelles » du sud-est de la France, tout comme les deux Grives obscures de 2007 dans le Var (V. *Ornithos* 12-2 : 338)...

GRIVE DE SIBÉRIE *Zoothera sibirica* (5/7) (1/1 – 1/1)

Finistère – Île de Sein, fem., phot., 15 octobre (W. Raitière, Y. Le Corre).

(Sibérie). Très belle trouvaille finistéenne, trois semaines environ après la découverte d'un mâle de 1^{er} hiver à Fair Isle, en Écosse (V. *British Birds* 101 : 638). Il s'agit de la sixième mention française, les quatre premières datant du XIX^e siècle, et la suivante du 7 janvier 1982 dans l'Aube (Dubois *et al.* 2008). Une note détaillée relatant cette observation a été publiée dans *Ornithos* (Raitière & Le Corre 2008).

LOCUSTELLE DE PALLAS *Locustella certhiola* (5/5) (5/5 – 1/1)

Lot-et-Garonne – Aiguillon : étang de la Mazière, capt., phot., 4 octobre (A. Dal Molin *et al.*).

(Sibérie orientale). Sixième mention française pour cette locustelle, et étonnamment la première dans le cadre d'opérations de baguage (Dal Molin *et al.* 2009). La localité est bien sûr inattendue pour une espèce sibérienne, mais l'effort de baguage sur ce site multiplie les probabilités de ce genre de rencontres.

LOCUSTELLE LANCÉOLÉE *Locustella lanceolata* (5/6) (5/6 – 0/0)

2007 Finistère – Île de Sein, 2 ind. dont 1 trouvé mort, 15 septembre (A. Le Névé, J.-P. Jordan, A. Larousse, C. Dumortier). (Ouest de la Sibérie jusqu'au Japon). Cinquième mention française, les quatre précédentes sont toutes d'Ouessant, Finistère : 15 et 16 août 1986, 11 septembre 1986, 28 octobre 1990 et 26 octobre 2005. C'est donc au tour de l'île de Sein d'accueillir l'espèce, avec 2 oiseaux arrivés ensemble ! L'un d'eux aura eu une fin tragique, comme l'oiseau de septembre 1986, trouvé mort au pied du phare du Créac'h à Ouessant.

LOCUSTELLE FLUVIATILE *Locustella fluviatilis* (10/11) (7/8 – 1/1)

Côte-d'Or – Arc-sur-Tille, mâle, cht., 2 mai (R. Desbrosses, S. Desbrosses).

(Sud de la Baltique, Balkans, jusqu'en Sibérie occidentale). La Locustelle fluviatile est généralement contactée en France par le biais de chanteurs printaniers. C'est le cas pour cette nouvelle donnée, obtenue en une localité orientale qui entre également bien dans le cadre des mentions précédentes. L'espèce ayant niché en Belgique en 2009 (V. *Ornithos* 16-4 : 270-271), elle pourrait le faire un jour dans le nord-est de la France...

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (32/32) (32/32 – 2/2)

Finistère – Île de Sein, 1^{er} hiver, phot., 14 octobre (W. Raitière, Y. Le Corre).

Pyrénées-Atlantiques – Villefranque, 1^{er} hiver, capt., phot., 21 octobre (P. Fontanilles).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). À nouveau deux données en 2008, ce qui est dans la moyenne. Les Pyrénées-Atlantiques accueillent leur première Rousserolle isabelle, alors que le Finistère en est à sa douzième. Les deux dates sont parfaitement classiques.

HYPOLAÏS BOTTÉE *Hippolais caligata* (6/6) (6/6 – 1/1)

Gironde – Lège-Cap-Ferret : presqu'île du cap Ferret, 17 septembre (L. Barbaro, S. Corre, V. Couanon).

(Iran, Asie centrale, Mongolie). Belle découverte et septième mention française de l'espèce, après celle du 16 au 18 octobre 2004 à Ouessant, Finistère (V. *Ornithos* 14-5 : 294). Quatre autres mentions proviennent de ce département, et la dernière du Pas-de-Calais.

FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (68/69) (41/41 – 2/2)

Manche – Vains: Grouin du Sud, 1^{er} hiver, 18 et 19 octobre (S. Provost *et al.*).

Morbihan – Île d'Hoëdic, juv./1^{er} hiver, capt., phot., 14 septembre (M. Zucca *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Année normale, la moyenne étant de deux oiseaux environ par an. Même si la Manche accueille là sa première Fauvette épervière, la localité n'est pas surprenante.

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans* (14/14) (14/14 – 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *albistriata*.

Haute-Corse – Macinaggio, mâle, 21 avril (P. Crouzier).

Hérault – Villeneuve-les-Maguelone, mâle ad., 13 avril (J.-Y. Barnagaud).

(De la Slovénie à l'ouest de la Turquie). Après les neuf oiseaux de 2007, deux ont été notés en 2008. Les localités méditerranéennes et les dates d'avril sont parfaitement conformes à ce qui est connu du statut de cette sous-espèce en France. À noter qu'un travail publié récemment sur la phylogénie des différentes populations de cette espèce (Brambilla *et al.* 2008) pourrait dans un avenir proche modifier leurs positions taxonomiques, sans pour autant concerner la sous-espèce *albistriata*.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (84/86) (82/84 – 2/2)

Finistère – Île d'Ouessant: Porz Noan, 27 et 28 octobre (C. Peignot *et al.*).

Nord – Loon-Plage: Capitainerie, phot., 6 et 7 novembre (Q. Dupriez *et al.*).

2007 Haut-Rhin – Saint-Locus, 15 décembre (M. Solari).

2006 Finistère – Île d'Ouessant: Stang Yusin, 18 octobre (A. Faure *et al.*).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Les années 2006 et 2007 totalisent donc quatre oiseaux chacune, ce qui est parfaitement conforme à la moyenne annuelle depuis la création du CHN. La donnée du Haut-Rhin se distingue évidemment par sa localité intérieure (la quatrième seulement en France) et sa date très tardive. L'année 2008 est plus modeste, avec deux oiseaux trouvés en des lieux et à des dates classiques.

POUILLOT DE HUME *Phylloscopus humei* (16/17) (16/17 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant: Cost ar Reun, 1^{er} hiver, phot., 8 et 9 novembre (A. Audevard, V. Borne, E. Sansault *et al.*).

(Nord-est de l'Afghanistan à la Chine centrale). Le Pouillot de Hume a été observé annuellement en France depuis 2005. Cette nouvelle donnée entre bien dans le cadre de ce qui est connu des apparitions de l'espèce dans notre pays, la moitié des mentions datant du mois de novembre et l'île d'Ouessant accueillant là son onzième oiseau.

POUILLOT DE SCHWARZ *Phylloscopus schwarzi* (11/11) (10/10 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant: Pount Salaün, phot., 16 et 17 octobre (A. Boussemart, L. Gavory *et al.*).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Un an après le dernier en date, l'île d'Ouessant accueille son septième Pouillot de Schwarz. Celui-là s'est bien laissé observer par les ornithos présents sur l'île... En revanche, rien en 2008 pour le Pouillot brun *P. fuscatus*, qui avait totalisé 8 oiseaux en 2007 et 3 en 2006.

PIE-GRIÈCHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (13/13) (13/13 – 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la race *phoenicuroides*, appelée « Pie-grièche du Turkestan ».

Pas-de-Calais – Étaples, réserve naturelle de la baie de Canche, mâle, phot., 9 juin (M. Blond, J.-P. Guerra).

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). Neuf données sur les quatorze existantes concernent cette sous-espèce. Il s'agit ici de la première mention pour le Nord-Pas-de-Calais, à une date radicalement différente, puisqu'il s'agit aussi de la première donnée printanière française.

PIE-GRIÈCHE MASQUÉE *Lanius nubicus* (1/1) (0/0 – 1/1)

Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, Piémanson, mâle probable, 10 avril (Y. Kayser, F. Dhermain, J. Paoli).

(Sud-est des Balkans, Turquie, Moyen-Orient). Voici enfin la seconde mention française de cette pie-grièche, à une date proche de la précédente, du 18 avril 1961 dans les Alpes-Maritimes. La localité n'est pas surprenante, le site ayant déjà apporté nombre de surprises venues de l'est de la Méditerranée.



42. Étourneau roselin *Sturnus roseus*, femelle, Vendée, juin 2008 (Frédéric Portier). Female Rose-coloured Starling.

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus* (162/330) (140/287 – 12/12)

Finistère – Penmarc'h, Saint-Guénolé, juv., phot., 1^{er} septembre (M. Canévet *et al.*); Tréfléz: dunes de Keremma, juv., 14 septembre (S. Mauvieux); Penmarc'h, juv./1^{er} hiver, 17 septembre (B. Griad); île d'Ouessant: Parluc'hen, juv., 20 septembre (A. Audevard *et al.*), Pern, Créac'h puis Lampaul, juv./1^{er} hiver, phot., du 28 septembre au 1^{er} novembre (N. Issa, A. Audevard, A. Le Névé, A. Joris *et al.*); Tréffiagat: étang de Léchiagat, juv./1^{er} hiver, 25 septembre (B. Griad).

Morbihan – Erdeven, juv., phot., 19 septembre (S. Guérin); île d'Hoëdic, juv., phot., 25 octobre (A. Le Névé, J. Thurel *et al.*).

Pyrénées-Atlantiques – Bénéjacq, juv., 9 septembre (J.-L. Grangé).

Somme – Fort Mahon, ad., phot., 2 août (T. Rigaux).

Vendée – Saint-Hilaire-de-Riez, fem. ad. trouvée affaiblie puis relâchée, phot., du 25 au 28 juin (F. Portier, B. Isaac *et al.*); Île de Noirmoutier: l'Épine, juv./1^{er} hiver, phot., 22 et 23 septembre (D. Desmots *et al.*).

2007 Vendée – Île d'Yeu, 2 juv., phot., du 14 au 16 septembre (F. Portier, X. Hindermeyer), et non 14 et 15 septembre seulement (V. *Ornithos* 15-5: 343).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). À nouveau une bonne année pour l'Étourneau roselin, sans aucune donnée méditerranéenne toutefois. Deux données estivales ont été obtenues en Vendée et dans la Somme, les autres correspondant classiquement à l'arrivée de juvéniles sur le littoral atlantique, principalement au cours du mois de septembre.

MOINEAU ESPAGNOL *Passer hispaniolensis* (27/33) (22/27 – 2/2)

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, parc ornithologique de Pont-de-Gau, mâle ad., phot., capt., 27 mai (B. Vollot, F. Lamouroux, R. Lamouroux).

Corse-du-Sud – Bonifacio, mâle ad., phot., 22 avril (A. Rougeron, J. Vêque).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Le Moineau espagnol continue donc à fréquenter en très petit nombre la région de Bonifacio, Corse-du-Sud, où les deux dernières données remontent à l'année 2003 (V. *Ornithos* 12-1: 35 et *Ornithos* 13-2: 106). La mention camarguaise est plus remarquable, puisque le delta du Rhône engrange là sa quatrième donnée, la dernière remontant au 3 août 1991.



43. Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus,
Finistère, octobre 2008
(Corentin Kermarrec).
Pallas's Leaf Warbler.



45. Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus,
Nord, novembre 2008
(Quentin Dupriez).
Pallas's Leaf Warbler.



44. Pouillot de Schwarz
Phylloscopus schwarzi,
Finistère, octobre 2008
(Christian Kerihuel).
Radde's Warbler.



46. Pouillot de Schwarz
Phylloscopus schwarzi,
Finistère, octobre
2008 (Fabrice Jallu).
Radde's Warbler.



47. Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*, mâle, Nord, mai 2008 (Christophe Capelle).
Male Scarlet Rosefinch.

VIRÉO À CÉIL ROUGE *Vireo olivaceus* (9/9) (9/9 – 1/1)

Finistère – Île d'Ouessant : Ar Picard, 14 et 15 octobre (L. Veyrunes *et al.*).

(Amérique du Nord). L'île d'Ouessant conserve son monopole sur les observations de l'espèce en France, qui sont désormais au nombre de dix. Toutes sont du mois d'octobre, à l'exception d'une donnée du 14 septembre 1998.

ROSELIN GITHAGINE *Bucanetes githagineus* (11/12) (11/12 – 1/1)

Vendée – Île d'Yeu : pointe des Corbeaux, mâle 2^e année, 2 mai (C. Lanzani, X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer). (Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Une nouvelle mention pour ce roselin, la première depuis l'afflux notable du printemps 2005 et ses 5 oiseaux (V. *Ornithos* 14-5 : 299 et *Ornithos* 15-5 : 344). L'un d'entre eux avait déjà été vu en Vendée, le 30 avril... sur l'île d'Yeu.

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (185/219) (170/204 – 5/7)

N.B. : les oiseaux apparemment nouveaux (zones de reproduction) sont marqués d'un astérisque (*).

Hautes-Alpes – Ailefroide, 2 mâles ad.*, 4 juillet (S. Risser).

Nord – Péronne-en-Mélantois : marais de Bonnance, mâle ad.*, phot., 31 mai (C. Capelle).

Savoie – L'Écot, 2 mâles ad.*, 10 juillet (S. Risser).

Vendée – Les Sables-d'Olonne, mâle 1^{er} été*, 19 juin (M. Bibard) ; île de Noirmoutier : Fort-Larron, juv., phot., 13 novembre (M. Vaslin).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). La donnée du Nord pourrait bien sûr faire penser à un mâle en quête d'un territoire de reproduction, mais elle ne suffit pas à masquer l'absence de mentions en provenance du Doubs. Ce département, le seul encore concerné par une éventuelle nidification, avait accueilli au moins trois chanteurs en 2006 et deux en 2007. Pour mémoire, l'année 1994 avait totalisé 34-37 mâles chanteurs en France ! Les deux observations de 2 mâles dans les Alpes apportent en revanche une lueur d'espoir, et sont peut-être le début d'une colonisation de l'arc alpin, qui semble se poursuivre en 2009.

PARULINE DES RUISSEAUX *Seiurus noveboracensis* (1/1) (0/0 – 1/1)

Finistère – Lampaul-Plouarzel, ad. probable, 21 octobre (J.-Y. Frémont, M. Champion).

(Amérique du Nord). Voici la seconde mention française de cette étonnante paruline, après celle du 17 septembre 1955 sur Ouessant, Finistère. C'est aussi la première fois qu'une paruline est observée ailleurs que sur une île. C'est la preuve que le littoral finistérien peut lui aussi réserver de belles surprises côté passereaux.

BRUANT À GORGE BLANCHE *Zonotrichia albicollis* (0/0) (0/0 – 1/1)

Morbihan – Saint-Marcel, ad., phot., 20, 21 avril et 29 juin (W. T. Jackson).

(Amérique du Nord). Première mention française de ce bruant nord-américain, l'un des plus fréquemment notés dans les îles Britanniques (34 individus jusqu'en 2007 : 32 en Grande-Bretagne, 2 en Irlande; Slack 2009). L'oiseau a été trouvé dans un jardin du Morbihan, où il a stationné longuement en compagnie de Moineaux domestiques *Passer domesticus*. Les premières dates d'observation ne correspondent pas forcément à l'arrivée de l'oiseau dans l'Ancien Monde, même si beaucoup d'observations européennes de bruants néarctiques sont printanières. Il s'agit ici d'un oiseau de la forme à raie médiane blanche, sachant qu'il existe une forme sympatrique à raie médiane grise. La CAF a admis le Bruant à gorge blanche en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France. Une note relatant cette observation sera publiée prochainement dans *Ornithos*.

BRUANT RUSTIQUE *Emberiza rustica* (30/31) (22/22 – 2/2)

Finistère – Île d'Ouessant : Ty Korn, phot., 13 octobre (S. Reeber *et al.*).

Morbihan – Île d'Hoëdic, mâle 1^{er} hiver probable, phot., du 26 au 29 octobre (A. Le Névé *et al.*).

(Scandinavie, Sibérie). L'observation de deux Bruants rustiques la même année reste peu fréquente (deux oiseaux avaient toutefois été vus sur l'île de Sein, Finistère, le même automne : un adulte du 19 au 21 octobre et un 1^{er} hiver le 22 octobre 1998), l'espèce ayant été notée en France un peu moins d'une année sur deux depuis la création du CHN en 1981. Les dates et localités des deux observations sont parfaitement classiques.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (108/113) (95/98 – 5/5)

Bouches-du-Rhône – Arles : Camargue, Amphise, 8 janvier (Y. Kayser).

Finistère – Île d'Ouessant : Créac'h, juv., 12 octobre (A. Le Névé *et al.*), Kéranchas, phot., du 29 novembre au 15 mars 2009 (A. Audevard), Runiou, phot., du 13 décembre au 10 janvier 2009 (A. Audevard).

Pas-de-Calais – Wimereux : dunes de la Slack, 1^{er} hiver, capt., phot., 27 septembre (D. Tirmarche *et al.*).

2007 Haut-Rhin – Saint-Louis, mâle ad., capt., phot., 5 octobre (M. Baumann, B. Scaar).

2007 Morbihan – Île d'Hoëdic, fem./1^{er} hiver, capt., phot., 25 octobre (A. Le Névé, R. Jordan, J. Thurel *et al.*). (Scandinavie, Asie septentrionale). Deux individus supplémentaires portent à quatre le nombre d'oiseaux pour 2007, ce qui correspond à la moyenne annuelle depuis 1981. La donnée alsacienne est remarquable. En 2008, deux mentions sont du mois d'octobre et trois sont hivernales, en des localités plus classiques. L'île d'Ouessant accueille même deux hivernants, dont un aura battu le record de durée de stationnement en France, jusqu'ici détenu par un ou deux oiseaux présents en Camargue du 17 novembre 1956 au 18 janvier 1957 (Dubois *et al.* 2008). Pour mémoire toutefois, un Bruant nain vu le 22 avril 2006 sur l'île de Sein, Finistère, avait été considéré par les observateurs comme étant le même que celui vu exactement dans le même jardin les 28 et 29 octobre 2005 (V. *Ornithos* 15-5 : 346-347), sans preuve d'un séjour continu.

48. Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis*, mâle, Morbihan, juin 2008 (Will Jackson). *Male White-throated Sparrow.*



49. Bruant rustique *Emberiza rustica*, mâle, Morbihan, octobre 2008 (Raphaël Jordan). *Male Rustic Bunting.*



BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (89/103) (73/84 – 3/2)

Alpes-de-Haute-Provence – Saint-Julien d'Asse, La Tour, 2 mâles et 1 fem., phot., du 15 mai au 6 juillet (L. Bouvin, A. Rougeron, A. Flitti *et al.*).

Aude – Port-Fitou, mâle, phot., 22 mai (F. Morlon).

Var – Hyères: île du Levant, mâle ad., 20 mai (A. Zammit).

2004 Hautes-Alpes – Le Mûnetier-les-Bains: Le Lauzet, mâle, phot., 30 juin (P. Lacouloumère, A. Prudor). (Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). La donnée de 2004 concerne le même mâle que celui déjà observé sur le site le 5 juin de cette année (V. *Ornithos* 13-2: 108). Le site des Alpes-de-Haute-Provence avaient déjà été fréquenté par deux mâles, une femelle et un juvénile en 2007. Les trois oiseaux vus sur ce site en 2008 n'ont donc pas été comptabilisés.

ANNEXE 1 – ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)**SARCELLE ÉLÉGANTE** *Anas formosa* (16/27) (7/7 – 1/1)

Pas-de-Calais – Boulogne-sur-Mer, mâle 1^{er} hiver, phot., 3 janvier (C. Capelle).

(Sibérie, Asie). Évidemment, la date et le lieu ne seraient pas étonnants pour une arrivée naturelle, et rien dans la description n'indique le contraire...

HARLE COURONNÉ *Lophodytes cucullatus* (15/16) (15/16 – 1/1)

Ain – Birieux: Dombes, étang du Bois Renard, mâle ad., tué à la chasse, phot., novembre (fide P. Crouzier).

(Amérique du Nord). Onze des quinze mentions françaises proviennent de localités situées dans la moitié est de la France, tout comme celle de 2008, ce qui ne plaide pas en faveur d'une éventuelle arrivée naturelle pour ces oiseaux.

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (86/107) (69/78 – 2/1)

Ardèche – Andance, ad., phot., 10 septembre (V. Palomarès).

Loire-Atlantique – Donges: estuaire de la Loire, ad., du 1^{er} janvier au 31 décembre (F. Normand *et al.*).

(Europe du Sud-Est, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Deux données en 2008, l'une concernant un oiseau présent dans l'estuaire de la Loire depuis 2005 (V. *Ornithos* 14-5: 301) et l'autre un migrateur intégré à un vol de Cigognes blanches *Ciconia ciconia*. Celui-ci a également été repéré au défilé de Fort l'Écluse, Haute-Savoie, le 8 septembre et à Gruissan, Aude, le 12 septembre. Le même oiseau accompagnant à nouveau des cigognes était de retour en France les 25 et 26 février 2009, après son séjour hivernal en Espagne... (V. note dans le présent numéro).



50. Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus*, adulte, Ardèche, septembre 2008 (Vincent Palomarès). *White Pelican with White Storks*.

Ornithos 16-5: 273-315 (2009)

FLAMANT NAIN *Phoenicopterus minor* (28/21) (28/21 – 2/0)

Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, Fangassier, 4 ad., du 1^{er} mai au 24 juillet, un nid avec un œuf, aucun jeune à l'envol (A. Arnaud, A. Bechet, G. Souchay), 10 mai, les mêmes oiseaux (M. Giroud *et al.*).

2007 Bouches-du-Rhône – Salin-de-Giraud, 2 ad., 17 et 19 avril (A. Arnaud, B. Phéline); Arles: Camargue, étang de Tampan, 5 ad., 16 octobre (A. Arnaud, S. Befield).

2007 Gard – Aigues-Mortes – 1 couple avec œufs, 30 avril (A. Arnaud, B. Phéline).

(Afrique tropicale). La nidification a échoué en 2007, de même que celle de tous les Flamants roses camarguais (de Seynes *et al.* 2009). En 2008, quatre oiseaux ont été repérés dans la colonie, dont deux avec un nid, mais apparemment sans succès... (A. Arnaud, comm. pers.). Un nouvel individu est compté pour 2007, avec cette observation de cinq adultes ensemble, mais aucun en 2008.

ANNEXE 2 – LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si a priori l'identification de l'espèce proposée semble aisée. La non homologation d'une donnée ne préjuge évidemment pas de l'identité de l'oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité du ou des observateur(s), mais du manque de robustesse de la description, notamment au regard des archives du CHN et de l'inventaire des oiseaux de France. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non homologation sont succinctement indiquées entre parenthèses.

2008

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* – Charente-Maritime – Moëze: réserve naturelle de Moëze-Oléron, 28 janvier (Seules les parties supérieures grisâtres indiquent qu'il pourrait s'agir de cette espèce, mais l'oiseau n'a pu être vu qu'en vol et d'autres critères malheureusement non notés [bec, pattes, queue, cou...] ne lèvent pas le doute par rapport à une Oie des moissons de la toundra *A. fabalis rossicus*).

Canard à front blanc *Anas americana* – Loire-Atlantique – Saint-Joachim: Chaussée de Loncé, mâle ad., 4 avril (Plusieurs éléments vont dans le bon sens, mais la description ne permet pas d'éliminer un hybride tel que Canard siffleur *A. penelope* x Canard de Chiloe *A. sibilatrix*, déjà signalé en nature en France).

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* – Charente-Maritime, Moëze: réserve naturelle de Moëze-Oléron, mâle, 3 mai (L'observatrice n'a semble-t-il pas relevé les critères nécessaires pour éliminer le risque d'un hybride avec la Sarcelle d'hiver *A. crecca*. Pour cette espèce, l'absence de barre horizontale demande à être vérifiée positivement).

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* – Vendée – Talmont-Saint-Hilaire: Bourgenay, fem. 1^{er} hiver, phot., du 25 décembre au 16 janvier 2009 (Les photos parvenues au CHN montrent pour certaines une femelle de Fuligule morillon *A. fuligula*, pour d'autres une femelle hybride Fuligule morillon x Fuligule milouin *A. ferina*. Ce type d'oiseaux constitue un piège d'identification bien réel, avec une silhouette, une coloration générale et une barre alaire bicolore de Fuligule à tête noire, mais s'en distingue notamment par le dessous de l'aile blanc, ce qu'une photo de l'oiseau vendéen montre bien).

Garrot sp. *Bucephala* sp. – Pas-de-Calais – Sangatte: sablière de Duytsche, fem. ad., phot., 19 et 20 janvier (Il ne s'agit sans doute pas d'un Garrot à œil d'or *B. clangula*, mais la distance et les conditions d'observation n'ont pas permis de relever les critères qui permettraient de confirmer soit un Garrot d'Islande *B. islandica*, soit un hybride entre les deux espèces).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* – Haute-Saône – Monnières: Mont Roland, juv., 7 septembre (Trop d'éléments manquent...), Vy-lès-Rupt, 8 septembre (Description nettement trop sommaire); Yonne – Autoroute A6, vers Savigny-sur-Clairis, ad., 29 avril (Il manque au moins une description des épaules noires pour éliminer un Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*, même si on ne peut en vouloir à l'observateur d'avoir gardé les yeux sur la route!).

Buse des steppes *Buteo buteo vulpinus* – Gard – Gallician, ad., 8 novembre (L'oiseau montre manifestement un plumage et une queue roux, mais l'évaluation de l'envergure – 1,5 mètre – et d'autres critères non mentionnés ne permettent pas d'écarter une Buse variable *B. b. buteo* ou une Buse féroce *B. rufinus*); Vendée – Jard-sur-Mer: le Plumet, ad., phot., 2 novembre (Les photographies montrent une Buse variable *B. buteo buteo* de 1^{er} hiver, dans un plumage pâle effectivement troublant, mais excluant la Buse des steppes).

Busard pâle *Circus macrourus* – Allier – Verneix, fem. ad., 8 avril (Plusieurs éléments sont intéressants, mais la description de la silhouette de type Busard cendré *C. pygargus* et le fait que le pattern facial n'ait pu être noté jettent un doute sur l'identification).

Buse féroce *Buteo rufinus* – Doubs – Les Grangettes, 25 mars (Il manque notamment une description des parties inférieures, du dessous de l'aile et de la silhouette en vol pour pouvoir certifier l'identification).

Buse pattue *Buteo lagopus* – Doubs – Bonnevaux-le-Prieuré, 7 septembre (Des éléments indispensables à l'acceptation d'une

donnée aussi précoce en France font défaut), Chassagne-Saint-Denis, 6 janvier (Le dessous des ailes et de la queue ne sont pas décrits et il y a une confusion manifeste entre culottes et tarses emplumés... [V. article dans le présent numéro]).

Aigle pomarin/criad *Aquila pomarina/clanga* – Alpes-Maritimes – Èze, 20 septembre (La date plaide fortement en faveur d'un Aigle pomarin, mais les conditions d'observations n'ont pas permis d'exclure un Aigle criard. Dommage!).

Faucon lanier *Falco biarmicus* – Loiret – Huêtres: Champs de Trogny, imm. 2^e année, phot., 8 mai (Plusieurs éléments dans la description et les photos indiquent un mâle de la sous-espèce *erlangeri*, mais les joues franchement roussâtres excluent un oiseau pur, la plus grande prudence étant de mise pour écarter le risque d'un hybride, fréquent en fauconnerie).

Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* – Haute-Corse – Santa-Maria-Canonica, 29 avril (On ne peut éliminer un Bécasseau tacheté *C. melanotos*, notamment en raison d'une description trop sommaire et d'éléments indiquant plutôt cette espèce [calotte brune], que rien dans la description n'élimine par ailleurs).

Chevalier grivelé *Actitis macularia* – Calvados – Hérouville-Saint-Clair, 1^{er} hiver, 28 décembre (Plusieurs éléments vont dans le bon sens, d'autres manquent [couleur de la base du bec, longueur de la barre alaire] ou induisent un doute [pattes jaune-verdâtre]).

Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* – Finistère – Douarnenez: plage du Ry et port de Rosmeur, 1^{er} hiver, phot., du 26 décembre au 28 février 2009 (Nombre d'éléments ne conviennent pas pour l'espèce proposée: structure de l'oiseau, dessin des sus- et sous-caudales où les rayures blanches sont trop larges, cou et poitrine à rayures sombres sur fond blanchâtre, etc. Il est possible qu'il s'agisse d'un Goéland argenté islandais, de la sous-espèce type, effectivement bien plus sombre que les oiseaux bretons).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoideus* – Côtes-d'Armor – Saint-Laurent-de-la-Mer, 2^e été, phot., 31 juillet (L'oiseau présente un plumage entièrement blanc et surtout un bec largement noir, ce qui n'est pas le cas du Goéland à ailes blanches à cette époque de l'année, quel que soit l'âge. Cet élément plus la silhouette et la projection primaire courte indiquent plutôt un Goéland argenté *L. argentatus* leucique, que l'on ne peut de toutes façons pas exclure); **Finistère** – Ploudaniel, 1^{er} été, phot., 3 mai (Description et photos évoquent davantage un Goéland argenté *L. argentatus* leucique, avec par exemple une projection primaire courte, ce type d'oiseaux ne pouvant de toute manière pas être exclu); **Pas-de-Calais** – Dannes, 3^e hiver, phot., 21 avril (Plusieurs éléments indiquent davantage un Goéland brun *L. fuscus* ou argenté *L. argentatus* leucique, que rien n'exclut par ailleurs).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg* appelée Bergeronnette des Balkans – Charente – Villefagnan, mâle ad., 29 mai (La description ne permet malheureusement pas d'exclure la sous-espèce *thunbergi*, sachant de plus que la localité est très occidentale et la date tardive). **Loire** – Chambéon: Gravière de Randan, mâle, phot., 28 et 29 avril (Un oiseau intéressant, montrant des caractères intermédiaires entre *feldegg* et *flava*, comme on en voit en limite d'aire de répartition de la première. Comme indiqué dans le commentaire des données acceptées, le CHN souhaite n'homologuer que les oiseaux typiques, tout en conservant en archive ceux correspondant à des formes intermédiaires. [V. également *Ornithos* 16-3: 194]).

Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* – Paris – VII^e arr., 1^{er} décembre (Ça y ressemble bien, mais la mention d'un robin « *picorant* » sur une pelouse en plein Paris au mois de décembre est par trop invraisemblable pour pouvoir être acceptée avec une description aussi peu robuste).

Rougequeue à front blanc oriental *Phoenicurus phoenicurus samamisisicus* – Haute-Corse – Macinaggio, mâle 2^e année, phot., 21 avril (L'oiseau décrit ici montre des critères évoquant la sous-espèce *samamisisicus*, mais le panel alaire pâle n'est ni très grand ni blanc, même s'il est bien visible. Une publication récente sur le sujet [Small 2009] montre que l'identification de cette sous-espèce est beaucoup plus difficile que ce qui était admis auparavant. Le CHN a d'ailleurs entamé une révision de l'ensemble des mentions françaises de ce taxon [V. *Ornithos* 15-2: 195]).

Tarier pâtre oriental *Saxicola torquatus maurus/stejnegeri* – Bouches-du-Rhône – Istres: Crau, Mas de Chauvet, phot., 21 janvier (Le plumage rappelle globalement un oiseau de la sous-espèce locale, l'identification d'un Tarier pâtre oriental demandant notamment une observation précise des plumes du croupion); **Essonne** – Villiers-le-Bac, mâle (et peut-être une femelle en plus), phot., 12 mai (Encore un oiseau local évoquant le type sibérien. Le manteau strié et plus pâle que la calotte indiquent bien qu'il ne s'agit pas d'un Pâtre oriental).

Traquet à tête blanche *Oenanthe leucopyga* – Pyrénées-Atlantiques – Laruns, ad., phot., 20 juillet (Il s'agit d'un mâle de Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*, qui sous une lumière crue et dans un pierrier peut effectivement évoquer superficiellement ce traquet).

Fauvette épervière *Sylvia nisoria* – Finistère – Île d'Ouessant: Stang Korz, juv./1^{er} hiver, 8 octobre (Des critères indiquent tour à tour un oiseau adulte et un oiseau de l'année, et le comportement démonstratif ne colle pas avec cette espèce plutôt discrète).

Pouillot verdâtre *Phylloscopus trochiloides* – Var – Île de Port-Cros, 5 octobre (Quelques contradictions dans la fiche s'ajoutent à des critères surprenants – silhouette ronde, barre alaire et sourcils larges – et d'autres manquants – pattes, bec, front – ce qui rend la description trop fragile).

Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* – Dordogne – Linard/Saint-Mesmin, 18 décembre (Description nettement insuffisante, en particulier au regard de la date et de la localité).

Gobemouche brun *Muscicapa dauurica* – Eure – Normanville, 31 août (La description est trop peu consistante pour asseoir ce qui serait une première française).

Pie-grièche grise sibérienne *Lanius excubitor homeyeri* – Var – Flassans-sur-Issole: Rouvède, ad., du 30 novembre au 17 janvier 2009 (La description ne permet d'exclure une Pie-grièche grise de la sous-espèce nominale, sachant de plus que la coloration de l'aile n'a pas été détaillée suffisamment pour certifier l'identification d'une sous-espèce dont la dernière mention française remonte à 1879...).

Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* – Bouches-du-Rhône – Istres: Crau, Mas Chauvet, mâle ad., 3 février (Les conditions

d'observation n'ont malheureusement pas permis de noter la calotte blanche. L'absence de description des franges des rémiges ne permet pas d'éliminer un hybride, comme il en existe beaucoup dans l'aire de sympatrie avec le Bruant jaune *E. citrinella*).

Bruant nain *Emberiza pusilla* – Seine-et-Marne – Arbonne-la-Forêt: plaine de Chanfroy, audio, 15 septembre (Le CHN s'est longuement interrogé sur la pertinence d'un sonogramme d'un cri de contact, pièce majeure de la description, pour certifier cette identification. La date serait un nouveau record français de précocité et la localité intérieure atypique, ce qui ne peut qu'inciter à la prudence).

Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* – Haute-Vienne – Verneuil-sur-Vienne, mâle, du 5 au 7 mars (Description insuffisante, en particulier pour une localité très inhabituelle et à une date d'un bon mois plus précoce que le record français actuel).

2007

Busard pâle *Circus macrourus* – Haute-Corse – Biguglia, fem. ad., 23 avril (La description n'est malheureusement pas suffisante pour éliminer un Busard Saint-Martin *C. gyaneus*, les placards sombres des rémiges secondaires décrits pouvant être dus à l'imaturité de l'oiseau).

Buse féroce *Buteo rufinus* – Doubs – Lavans-Quingey, 2 ind., 16 décembre (La description ne contient pas suffisamment d'éléments pour certifier cette donnée, au demeurant extraordinaire par la localité, la date et le nombre d'oiseaux).

Buse pattue *Buteo lagopus* – Doubs – Scey-en-Varais, 2 ind., 13 octobre (La description donne des éléments contradictoires quant à l'âge des oiseaux et reste trop fragile pour étayer une donnée aussi précoce).

Tarier pâtre oriental *Saxicola torquatus maurus/stejnegeri* – Pyrénées-Orientales – Alénya, mâle ad., phot., 24 avril (L'oiseau présente effectivement une ressemblance frappante avec un Tarier pâtre oriental, mais les photographies montrent que la dernière rangée de sus-caudales n'est pas entièrement blanche et surtout que le manteau est brun clair strié de sombre, et non noirâtre comme chez les sous-espèces indiquées. Un « En direct du CHN » paraîtra bientôt sur le piège que constituent certains Tariers pâtres bien de chez nous!).

Hypolaïs obscure *Hippolaïs opaca* – Haute-Corse – Barcaggio, 6 mai (Il s'agit indéniablement d'une Hypolaïs pâle *H. pallida* ou d'une Hypolaïs obscure, plusieurs éléments plaident davantage pour la première, comme le bec décrit de petite taille. Il est malheureusement impossible de trancher entre les deux espèces, mais cette donnée sera conservée comme Hypolaïs pâle/obscur dans les archives du CHN).

Roselin cramois *Carpodacus erythrurus* – Seine-Maritime – La Poterie-Cap d'Antifer, mâle, du 20 au 27 mai (Trop peu d'éléments pour emporter la décision, d'autant que le risque d'oiseaux exotiques de diverses provenances est accru dans les parages du port d'Antifer).

2006

Faucon lanier *Falco biarmicus* – Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, Amphise, subad., 5 février (Beaucoup d'éléments vont dans le bon sens et la possibilité d'un Faucon pèlerin nordique *F. peregrinus calidus* est prise en compte par l'observateur. Vu les difficultés que posent ces grands faucons, en particulier dans les plumages immatures, le CHN ne peut néanmoins pas acquiescer la certitude qu'il ne s'agit pas d'un hybride).

Marouette de Baillon *Porzana pusilla* – Pas-de-Calais – Bazinghen, chant., 10 juin (Une observation uniquement sonore, à une distance indiquée de 200 mètres. Le risque de confusion avec le chant d'un amphibien ne peut être écarté).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg* appelée Bergeronnette des Balkans – Var – Hyères: vieux salins, mâle, phot., 2 avril (Il s'agit, comme proposé dans la fiche, d'un oiseau de la forme '*superciliaris*', qui est un intermédiaire entre *feldegg* et *flava* [et probablement *beema* plus à l'est]. Comme indiqué dans le texte des données homologuées, le CHN souhaite ne tenir compte que des *feldegg* « pures », incluant la forme '*melanogrisea*', tout en conservant trace des observations de tels intermédiaires).

2002

Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis* – Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, Baisse des Cinq-Cents-Francis, ad., phot., 12 septembre (Les photographies montrent un Bécasseau minute *C. minuta* effectivement bien coloré, mais avec une calotte de la même couleur que la poitrine, des stries au bas de celle-ci absentes ou presque, une silhouette de Bécasseau minute et un bec légèrement trop long. Certains oiseaux de ce type peuvent se montrer piégeux et méritent certainement la rédaction d'une fiche d'homologation!).

Chevalier grivelé *Actitis macularia* – Rhône – Miribel-Jonage, ad., phot., 25 septembre (Également un oiseau piège, puisque cet adulte de Chevalier guignette *A. hypoleucos* en mue montre des traces sombres sur le dessous, liées à des tectrices manquantes. Cette mue en cours devrait faire apparaître des plumes nuptiales ponctuées restantes. De plus, une photographie montre la queue dépassant nettement la pointe des ailes).

2001

Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* – Vendée – Les Sables-d'Olonne, ad., 7 avril (La description comprend de bons éléments, mais d'autres manquent qui auraient dû paraître évidents pour un oiseau en plumage nuptial: collier noir, longueur et forme

de la queue, silhouette et type de vol... La mention d'une espèce aussi rare en France, qui plus est dans ce plumage et en avril, devrait comprendre toute la suite des critères utiles à son identification).

1999

Paruline masquée *Geothlypis trichas* – Gironde – Lacanau, mâle cht., 19 octobre (Révision de cette fiche précédemment refusée, demandée par l'observateur en vue de confirmer qu'il s'agissait en fait d'un Léiothrix jaune *Leiothrix lutea*. Effectivement, nombre d'éléments vont dans ce sens).

1996

Aigle impérial *Aquila heliaca* – Charente-Maritime – Tonny-Charente, imm., 20 février (Description indiquant un grand rapace, mais bien insuffisante pour aller plus loin).

ANNEXE 3 – CATÉGORIE E

Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la liste française ni dans la catégorie D, mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour. À noter que des individus appartenant à des espèces classées en catégorie A peuvent également être inscrits dans cette liste lorsque des éléments indiquent une origine non naturelle ou qu'un doute subsiste sur celle-ci. Ces oiseaux ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du CHN.

• **Oie naine** *Anser erythropus* – Côtes-d'Armor – Langueux : baie de Saint-Brieuc, 2 ad., phot., du 5 décembre au 24 avril 2009 (A. Le Névé, M. Plestan, E. Briens *et al.*). Il est toujours délicat de connaître l'origine de tels oiseaux. L'Oie naine est fréquente en captivité et tous les oiseaux ne sont pas bagués, loin s'en faut. Il s'agit ici de la mention la plus occidentale connue en France et la durée du stationnement est sans précédent, atteignant par ailleurs une date fort tardive. Enfin, plusieurs observateurs ont rapporté des distances d'observation plutôt réduites pour des oies. Par précaution, ces deux individus ont donc été inscrits en catégorie E.

• **Sarcelle cannelle** *Anas cyanoptera* – Ain – Marlieux : étang de Vavres, mâle ad., phot., du 4 au 13 janvier (P. Crouzier, M. Crouzier, B. Sonnerat). L'espèce n'avait pas été contactée en 2006, ni en 2007. La localité ne plaide pas en faveur d'une origine naturelle.

• **Sarcelle marbrée** *Marmaronetta angustirostris* – Sarthe – Fillé-sur-Sarthe, couple, phot., du 1^{er} au 8 mai (C. Kerihuel *et al.*). Selon l'auteur de la fiche, les oiseaux n'étaient pas bagués et volaient parfaitement. En revanche, la distance d'observation (jusqu'à 15 mètres) et le fait qu'un éleveur installé à cinq kilomètres de là avait élevé des poussins qui se sont envolés sans avoir été bagués (source : P.-V. Vandenberghe) jettent évidemment le doute sur l'origine de ces oiseaux. Saône-et-Loire – Gergy, phot., du 8 au 13 août (B. Grand). Rien n'indique un oiseau échappé, mais la localité serait étonnante pour une arrivée naturelle et la description mentionne deux « canards à colliers noirs » dans les parages de cette sarcelle.

• **Fuligule à tête noire** *Aythya affinis* – Haut-Rhin – Huningue, mâle ad., phot., 22 décembre (A. Faure *et al.*), 24 décembre 2007 (A. Faure, L. Gouilloud), du 6 novembre 2003 au 9 février 2004 au moins (V. Palomarès, A. Torkler), du 14 janvier au 10 février 2001 (R. Aye).

REMERCIEMENTS

Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 2008, ont contribué à son bon fonctionnement :

- tout d'abord, l'ensemble des ornithologues et photographes ayant participé à la présente synthèse par la rédaction de fiches ou la transmission de photographies, sans qui le CHN ne fonctionnerait pas,
- tous les responsables de centrales ornithologiques, de comités d'homologation régionaux (CHR) ou départementaux (CHD) qui nous ont transmis des données,
- Antoine Arnaud, Aurélien Audevard, Johann Brouillard, Mikaël Champion, Anthony Faure, Yves Kayser, Arnaud Le Névé, Sébastien Mauvieux, Dominique Michelat, Julien Piette, Xavier Rozec et Urmas Sellis qui nous ont apporté informations complémentaires ou corrections,
- la revue *Ornithos*, éditée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), pour l'aide matérielle et financière attribuée au secrétariat du Comité pour son fonctionnement,
- Carl Zeiss Division Jumelles pour le soutien financier apporté à la publication du présent rapport,
- Philippe J. Dubois, Marc Duquet, Amine Flitti et Jean-Yves Frémont pour leur relecture avisée.

BIBLIOGRAPHIE

- BRAMBILLA M., VITULANO S., SPINA F., BACCETTI N., GARGALLO G., FABBRI E., GUIDALI F. & RANDI E. (2008). A molecular phylogeny of the *Sylvia cantillans* complex: cryptic species within the Mediterranean basin. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 48: 461-472.
- COMMISSION DE L'AVIFAUNE DE FRANCE (2007). En direct de la CAF. Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). *Ornithos* 14-4: 234-246.
- DAL MOLIN A. & L'ÉQUIPE DE LA RÉSERVE DE LA MAZIÈRE (2009). Capture d'une Locustelle de Pallas *Locustella certhiola* dans le Lot-et-Garonne en 2008. *Ornithos* 16-3: 207.
- DELAGE F. (2009). Élanion blanc. Les Cahiers 2008 de la surveillance. *Rapaces de France* n° 11 (Hors-série de *L'Oiseau magazine*): III.
- DE SEYNES A. & LES COORDINATEURS-ESPÈCES (2009). Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2008. *Ornithos* 16-3: 153-184.
- DRONNEAU C. (2006). L'Oie des moissons *Anser fabalis* : taxonomie, identification et statut actuel en France. *Ornithos* 13-1: 33-47.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P. (2008). *Nouvel Inventaire de la Faune de France*. Delachaux & Niestlé, Paris.
- RAITIÈRE W. & LE CORRE Y. (2008). Une Grive de Sibérie *Zoothera sibirica* sur l'île de Sein, Finistère, à l'automne 2008. *Ornithos* 15-6: 440-441.
- SLACK R. (2009). *Rare birds. Where and when. An Analysis of Status & Distribution in Britain and Ireland. Volume 1, sandgrouse to New World orioles*. Rare Bird Books, York.
- SMALL B.J. (2009). From the Rarities Committee's files: The identification of male "Ehrenberg's Redstart", with comments on British claims. *British Birds* 102: 84-97.



51. Étourneau roselin *Sturnus roseus*, juvénile, Finistère, octobre 2008 (Antoine Joris). Juvenile Rose-coloured Starling.

SUMMARY

Rare birds in France in 2008. A new species was added to the French List in 2008: White-throated Sparrow. North-American species were numerous that year with 12 species of waders and 4 species of passerines, including the second Northern Waterthrush and the fourth Grey-cheeked Thrush for France. A Green Heron (the second for France) wintered for the third consecutive year at Berre, Bouches-du-Rhône, in 2008/2009. In 2008, the second Masked Shrike, Red-necked Stint and Siberian Thrush (the second since 1900), and the third Fea's/Zino's Petrel for France were recorded. From a quantitative point of view, new records were obtained for Pallid Harrier (with 18 birds) and Iceland Gull (30 birds).

The first pair of numbers in parentheses following the scientific name of each species present the total numbers of French records and individuals (excluding 2008); the second pair relate to the same for the period 1981-2005; the last one relates to 2008.

Comité d'Homologation National c/o LPO, Fonderies Royales
BP 90263, 17305 Rochefort cedex (chn@lpo.fr)



Le rapport annuel du Comité d'Homologation National (CHN) est publié avec le soutien de Carl Zeiss Division Jumelles