



# Les oiseaux rares en France en 2011

29<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation National

Sébastien Reeber & le CHN

Ce 29<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation National (CHN) couvre l'année 2011. Le nombre de fiches examinées par le CHN cette année est de 630, soit environ 30% de plus qu'en 2010. Il faut y voir l'effet des afflux de Buses pattues *Buteo lagopus* et de Mésanges à longues queues nordiques *Aegithalos caudatus caudatus* au cours de l'hiver 2010-2011. D'année en année, le taux d'acceptation des fiches reste constant : il se situe aux alentours de 84% pour l'année 2011.

En 2011, la réunion plénière s'était tenue les 2 et 3 juillet en Loire-Atlantique. Cette réunion avait été l'occasion de renouveler le poste d'Amine Flitti, arrivé au terme de son mandat. Deux nouveaux membres avaient rejoint le Comité : Yves Kayser et Nidal Issa. À l'issue de cette réunion plénière, le CHN comptait donc neuf membres votants : Philippe J. Dubois, Nidal Issa, Frédéric Jiguet, Yves Kayser, Benoît Paepegaey (Président), Vincent Palomares, Sébastien Reeber (Secrétaire), Matthieu Vaslin et Alain Verneau. Tout au long de cette année, Amine Flitti est resté attaché au CHN en tant que l'un des deux vérificateurs du site « oiseaux-rares », portail national de la base de données en ligne *VisioNature*. En 2012, ce fut au tour de Vincent Palomares de voir son mandat prendre fin. Nous le remercions tous chaleureusement pour son travail sérieux et sa grande compétence, notamment dans l'identification des rapaces. Deux nouveaux membres ont fait leur entrée au CHN en 2012 : Jean-Pierre Jordan et Julien Piette. Benoît Paepegaey et Sébastien Reeber ont pour leur part été reconduits dans leurs fonctions respectives de Président et de Secrétaire.

Pour 2013, deux nouveaux postes seront à pourvoir. Les candidats désirant s'investir dans les tâches du CHN sont priés de faire parvenir leur candidature au Secrétariat avant le 1<sup>er</sup> juin 2013 ([chn@lpo.fr](mailto:chn@lpo.fr)).




fig. 1. Nombre annuel de données homologuées par le CHN depuis sa création en 1981, pour les taxons actuellement soumis à homologation nationale et hors données issues de programmes de suivi par satellite. Annual number of records accepted by the French Rarities Committee (CHN) from its inception (1981). Data refer only to taxa currently considered by CHN, except data of birds tracked by satellite telemetry.

## SITE WEB DU CHN

Mis en ligne en avril 2011, le site web ([www.chn-france.org](http://www.chn-france.org)) remplit depuis ses fonctions, en mettant la base de données CHN à la disposition de tous. Ce site fournit aussi l'ensemble des informations nécessaires sur le CHN, ses objectifs, son fonctionnement, ses travaux et la façon d'y contribuer. S'y trouvent également tous les documents téléchargeables utiles (fiches vierges, liste des taxons soumis à homologation nationale, rapports annuels parus dans *Ornithos*, etc.).

Afin de rendre la base de données la plus juste possible, nous appelons chacun à nous signaler par mail ([chn@lpo.fr](mailto:chn@lpo.fr)) les éventuelles erreurs qui y seraient détectées, par exemple sur les lieux ou les dates.

## FONCTIONNEMENT DU CHN

Quelques points de fonctionnement du CHN ont été modifiés au cours de la réunion plénière de 2011 et sont rappelés ci-après.

### Composition du CHN et renouvellement des membres

Afin de rendre la composition du CHN plus fluide et de raccourcir la durée des mandats, il a été décidé de procéder chaque année à deux renouvellements au lieu d'un seul. Deux membres sortiront et deux autres entreront donc chaque année au CHN. Au total, le CHN comportera 10 membres, qui effectueront chacun un mandat de 5 ans.

### Modification de la liste des espèces soumises à homologation nationale

Deux taxons ont été intégrés à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2012 : la Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris* et le Goéland de la Baltique *Larus fuscus fuscus*. Cette sous-espèce étant d'identification très délicate, le CHN s'en tiendra aux oiseaux bagués originaires de colonies où seule cette sous-espèce est nicheuse, et aux oiseaux de 2<sup>e</sup> année entre avril et juin, suivant en cela les recommandations de Altenburg *et al.* (2011). À signaler que quatre espèces ne sont plus soumises à homologation à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013 : le Busard pâle *Circus macrourus*, la Buse pattue *Buteo lagopus*, le Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* (à l'exception des individus de la sous-espèce *kumlieni*) et l'Étourneau rosé *Sturnus roseus*. Les données de ces espèces restent évidemment les bienvenues pour l'année 2012 !

### Catégorisation des données

Le placement des individus d'espèces occasionnelles déjà observées en France dans les différentes catégories (A, B, C, D ou E) est effectué par la CAF (Commission de l'Avifaune de France) depuis 2011. Les données présentées dans les différentes catégories A, D et E dans ce rapport le sont donc en fonction des décisions de la CAF. Un travail rétrospectif est déjà engagé afin de revoir un certain nombre de données plus anciennes ; il sera répercuté sur la base de données du CHN.

### Traitement des observations publiées avec photos

Pour rappel, le CHN traite désormais des photos publiées via internet et ne faisant pas l'objet de fiches descriptives. Le CHN tient toutefois à rappeler que la saisie d'observations sur les différentes bases de données en ligne *VisioNature*, même avec photographie, n'équivaut pas à l'envoi d'une fiche au CHN. Si aucune fiche n'est envoyée, la donnée est examinée avec un an de retard sur le rapport annuel courant. Dans ce cas, les données rejetées ne sont pas publiées, et les données acceptées le sont en précisant la source électronique (lien vers le site web) en lieu et place du nom des observateurs.

### Publication des données issues de suivis par satellite

En accord avec la revue *Ornithos* qui publie le rapport annuel du CHN, il paraît préférable de publier les données issues de programmes de suivi par satellite par une voie différente que celle du rapport

annuel. En effet, ces données, souvent très nombreuses de par la nature même du procédé, risquent de se multiplier encore avec l'amélioration technique du matériel, la diminution de son coût et la multiplication des programmes. Ces données seront donc publiées en ligne sur le site web du CHN, et un rappel sera systématiquement fait dans le rapport annuel.

## TRAVAUX DU CHN

Plusieurs travaux de révision sont actuellement en cours, et ont été repoussés en raison de l'augmentation de la charge de travail générée par les afflux de Buses pattues *Buteo lagopus*, Mésanges à longues queues nordiques *Aegithalos caudatus caudatus* et autre Goélands à ailes blanches *Larus glaucoides* depuis deux ans. Parmi les travaux en cours, la révision des données de Faucon lanier *Falco biarmicus* et celle des mentions hivernales de l'Aigle pomarin *Aquila pomarina*, suivent leur cours et devraient être détaillées dans le prochain rapport du CHN.

Profitant d'une mise à jour très précise des connaissances sur l'identification de la Buse des steppes *Buteo buteo vulpinus* (Van Duivendijk 2011), le CHN a entrepris la révision des données françaises, ce qui, comme prévu, a largement réduit le nombre de ces données... Selon ces nouvelles connaissances, et suivant ce qui était déjà pressenti depuis plusieurs années, il est recommandé de n'accepter que les données appuyées par de très bonnes photos, vidéos ou, préférablement, par des données biométriques. Autre sujet d'actualité, la révision des données de Fauvette sarde *Sylvia sarda*, rendue nécessaire par l'élévation au rang d'espèce du taxon des Baléares, devenu Fauvette des Baléares *Sylvia balearica* (V. *Ornithos* 11-5 : 234). Cette nouvelle espèce, jumelle de la Fauvette sarde, n'a pas été mentionnée à ce jour en France. Les résultats des travaux menés sur la révision des données de Buse des steppes et de Fauvette sarde seront présentés sous la forme d'un « En direct du CHN » courant 2013.

### Envoi des fiches d'homologation

Le CHN tient à rappeler qu'il est préférable de rédiger la fiche, disponible auprès du secrétariat ([chn@lpo.fr](mailto:chn@lpo.fr)) et sur le site web du CHN ([www.chn-france.org](http://www.chn-france.org)), dès que possible après l'observation, y compris si vous n'êtes pas le découvreur de l'oiseau. Cela évite une publication tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues. La transmission rapide des fiches permet également de tenir le rythme de parution du rapport et de rester ainsi au plus près de l'actualité ornithologique. À noter aussi que les documents photographiques obtenus par les observateurs non découvreurs peuvent être des compléments précieux aux fiches déjà reçues. Ils sont toujours les bienvenus !

Le travail du CHN est d'autant plus appréciable et utile à tous que le nombre de fiches qui lui parviennent est important. N'hésitez donc pas à nous faire parvenir des fiches descriptives ou des photographies d'oiseaux que vous avez observés et dont vous ne verriez pas mention dans les rapports du CHN. Paradoxalement, les oiseaux vus par de nombreux observateurs sur des sites très visités (Camargue et Ouessant par exemple) sont souvent oubliés... Enfin, le secrétariat du CHN étant désormais informatisé, il est demandé à chacun d'envoyer ses documents de préférence par Internet à l'adresse du CHN ([chn@lpo.fr](mailto:chn@lpo.fr)). Ceci permet de gagner du temps dans leur traitement et leur publication. Le format Word est préféré, en joignant les éventuelles images (en JPEG) séparément, si possible.

### Fiches et photos

Il est également important de souligner une nouvelle fois qu'en dépit du développement rapide de la digiscopie et de la photo numérique en général, et donc des nombreuses photos d'oiseaux occasionnels qu'elles génèrent, rien ne peut remplacer une bonne description écrite, incluant aussi des détails sur le comportement de l'oiseau. Les films et les photographies, numériques ou non, enrichissent réellement les fiches et s'avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever par-

fois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Ce point est fondamental dans la détermination d'espèces ou de sous-espèces délicates. Le CHN conseille donc aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, fondées seulement sur une ou plusieurs images, aussi bonnes soient-elles.

### LES FAITS MARQUANTS

Le début de l'année 2011 a été marqué par les suites d'afflux commencés quelques mois plus tôt, et ayant impliqué des nombres sans précédents de Buses pattues *Buteo lagopus* et de Mésanges à longue queue de la sous-espèce nordique *Aegithalos caudatus caudatus*. Ces phénomènes ont tous deux connu une timide réplique au cours de l'hiver 2011-2012. La fin de l'été 2011 a, quant à lui, vu arriver un nombre inédit de limicoles nord-américains, avec des records d'affluence pour le Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* et le Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla*. Les limicoles asiatiques ne sont d'ailleurs pas en reste, avec deux mentions de Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* et une de Bécasseau à longs doigts *Calidris subminuta*, qui constitue par ailleurs la première mention française de l'espèce. Plusieurs autres espèces se sont distinguées par un nombre de données élevé : l'Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* (61 individus), le Cormoran pygmée *Phalacrocorax pygmeus* (4 ind. alors que 7 seulement étaient homologués en France jusqu'ici), le Vanneau sociable *Vanellus gregarius* (7 ind.), la Bécassine double *Gallinago media* (9 ind.), le Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* (3 ind.), le Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* (3 ind.), le Traquet du désert *Oenanthe deserti* (5 ind.), le Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* (8 ind.) et l'Étourneau roselin *Sturnus roseus* (20 ind.). Le Héron vert *Butorides virescens* fournit sa seconde

1. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, Gatteville, Manche, novembre 2011 (Antoine Rougeron). *First-winter male Desert Wheatear*.



mention en catégorie A pour le France en 2011, alors que quatre autres taxons sont contactés pour la première fois en France : le Fou à pieds rouges *Sula sula*, le Martinet cafre *Apus caffer*, le Rougequeue noir oriental *Phoenicurus ochruros phoenicuroides* et la Paruline jaune *Dendroica petechia*. Deux autres nouvelles espèces ont par ailleurs été inscrites sur la liste des oiseaux de France (catégorie A) sur la base de données homologuées en 2010 : le Pétrel gongon *Pterodroma feae* et la Grue demoiselle *Grus virgo*. Enfin, un réexamen des données françaises du Gobe-mouche de la taïga *Ficedula albicilla* a conduit à leurs rejets, l'espèce étant donc retirée de la liste des oiseaux de France.

### LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A ET C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, représentant respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants à l'exclusion de l'année 2011, les deux suivants désignant les données homologuées depuis 1981 (2011 exclue) et celui des individus correspondants; les deux derniers représentent la même chose pour 2011. Les données issues des programmes de radio-tracking sont comptabilisées à part, sous la forme d'une parenthèse supplémentaire pour les espèces concernées.<sup>1</sup>
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité (commune puis lieu-dit éventuel, parfois suivi des coordonnées géographiques en degrés décimaux sous le système WGS84), effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention *et al.* indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseaux en question; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné dans le rapport du CHN est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou transmis une photo). Les photographies publiées sur Internet pour lesquelles aucune fiche n'a été adressée au CHN sont analysées avec une année de retard sur le rapport annuel. Dans ce cas, les références webographiques sont indiquées en lieu et place du nom de l'observateur.
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste officielle des Oiseaux de France (CAF 2007), complétée par les mises à jour publiées par la CAF (Jiguet *et al.* 2009).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs indiqués. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Oie de taïga, 1 ind., Birieux, Ain, 5 février 2011 (P. Crouzier).

#### OIE DE TAÏGA *Anser fabalis fabalis* (2/3) (2/3 – 3/3)

**Ain** – Birieux : Grand Étang, phot., 5 février (P. Crouzier).

**Marne** – Giffaumont-Champaubert : lac du Der-Chantecoq, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 30 octobre (Y. Brouillard, A. Brouillard, J.-P. Couasné *et al.*).

**Vendée** – Saint-Denis-du-Payré : Réserve Naturelle, ad., phot., du 22 au 30 novembre (P. Trotignon, J.-C. Croisé).

(Taïga entre le nord de la Scandinavie et l'Oural, hiverne principalement en Suède, au Danemark et en Allemagne). Depuis l'intégration de l'Oie de taïga à la liste des taxons soumis à homologation nationale le 1<sup>er</sup> janvier 2006, il n'existait qu'une donnée du 15 février 2008 dans le Nord (V. *Ornithos* 16-5: 275) et une autre du 5 décembre 2010 au 12 février 2011 en Mayenne (V. *Ornithos* 18-6: 331). Trois données en 2011, c'est donc bien, et en des localités remarquablement disparates...

<sup>1</sup> Les statistiques ont été entièrement révisées et mises à jour à l'occasion de la construction de la base de données du CHN.

**OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (196/1152) (127/383 – 13/61)**

**Finistère** – Guissény: Anse et étang du Curnic, ad., phot., du 3 février au 19 mars (W. Guillet *et al.*).

**Gironde** – Biganos: Malprat et le Teich: Boucolle, 3 ind., phot., du 17 janvier au 27 mars (L. Barbaro *et al.*); Lège-Cap-Ferret: pointe du Cap Ferret, 2 ind., phot., 8 novembre (N. Legroux *et al.*).

**Marne** – Scrapt: les Longues Raies, phot., 12 janvier (R. Riols *et al.*).

**Meuse** – Senon, 15 février (P. Moreau).

**Moselle** – Cattenom, 4 ind., phot., 17 janvier, puis 3 jusqu'au 22 janvier (J. François *et al.*).

**Nord** – Grand-Fort-Philippe, 7 ind., phot., 13 octobre (D. Haubreux); Dunkerque: digue du Braek, 15 ind., 5 novembre (C. Capelle); Loon-Plage, 3 ind., 5 novembre (C. Capelle); Ghyvelde, 3 ind., phot., 27 novembre (C. Capelle).

**Somme** – Cayeux-sur-Mer, 14 novembre (O. Gore *et al.*); Saint-Quentin-en-Toumont, 19 ind., 22 novembre (A. Leprêtre *et al.*).

**Vendée** – Saint-Denis-du-Payré: Réserve Naturelle, 28 et 29 novembre (P. Trotignon).

**2010 Hautes-Pyrénées** – Puydarrieux, phot., du 11 décembre au 4 février 2011 (V. Ducasse, P. Navarre *et al.*).

**2010 Somme** – Saint-Quentin-en-Tourmont: parc du Marquenterre, 3 janvier (P. Dufour *et al.*).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). À nouveau un très bon cru pour cette espèce après les 56 oiseaux de l'année 2010. Les localités sont classiques, puisque les seuls groupes importants sont notés le long des côtes de la Manche, avec quelques données en provenance de la façade atlantique (sites d'hivernage et voie migratoire de l'Oie cendrée *Anser anser*) et des hauts-lieux d'hivernage des oies grises du nord-est de la France. La mention finistérienne est plus originale, dans la mesure où neuf des onze données départementales sont du mois d'octobre. À noter aussi la première apparition de l'espèce dans les Hautes-Pyrénées en 2010, ainsi que deux données non encore soumises pour 2011 en Seine-et-Marne et en Ille-et-Vilaine.

**BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis* (45/46) (29/28 – 2/1)**

**Charente-Maritime** – Boyardville, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 11 novembre (P. Devoucoux *et al.*).

**Manche** – Sainte-Marie-du-Mont: Réserve Naturelle de Beauguillot, ad., phot., du 9 au 6 mars 2011 (A. Verneau *et al.*), le même oiseau que celui de Régnéville-sur-Mer, Manche (V. *Ornithos* 18-6: 333).

**2010 Indre-et-Loire** – Rillé: lac de Rillé, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 12 au 24 décembre (N. Issa, S. Reverdiau *et al.*).

**2010 Pas-de-Calais** – Oye-Plage, ad., phot., 23 décembre (E. Dansette *et al.*).

(Sibérie). Avec les trois dernières fiches attendues pour l'année 2010, celle-ci compte désormais neuf oiseaux, soit près d'un tiers des Bernaches à cou roux homologuées depuis 1981... L'intensité de cet afflux (six données pour la fin de l'année 2010), les localités avant tout littorales et les dates d'arrivées en fin d'automne et début d'hiver plaident évidemment pour une arrivée naturelle de la majorité au moins des oiseaux. Une seule nouvelle arrivée en 2011, en plus d'une autre donnée de la Drôme, placée en catégorie E par la CAF.

**CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (56/51) (53/48 – 2/2)**

**Ain** – Condeissiat: la Dombes, Étang Moulin, fem. ad., phot., du 23 au 30 avril (P. Crouzier *et al.*).

**Gironde** – Le Teich: Parc du Teich, mâle, phot., du 20 mars au 5 avril (A. Noël, S. Bonifait, C. Feigné *et al.*).

(Amérique du Nord). Deux données qui correspondent à la remontée pré-nuptiale de ce canard nord-américain. La donnée de Dombes constitue une première régionale, à une date un peu plus tardive qu'à l'accoutumée.

**SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (67/54) (66/53 – 3/3)**

**Calvados** – Merville-Franceville, mâle, phot., 12 et 13 mars (J.-P. Marie).

**Manche** – Sainte-Marie-du-Mont: Réserve Naturelle de Beauguillot, mâle, vidéo, phot., 1<sup>er</sup> et 2 avril (N. Hull *et al.*).

**Nord** – Hondschoote, mâle, phot., du 16 au 24 mars (J. Piette *et al.*).

(Amérique du Nord). On ne peut complètement exclure que le mâle observé dans le Calvados soit le même que celui vu une vingtaine de jours plus tard à 70 kilomètres à l'ouest, dans la Manche... Quoi qu'il en soit, ces trois nouvelles données s'inscrivent dans le cadre classique de la remontée printanière des anatidés, et apportent des premières départementales pour le Calvados et le Nord.



2. Oie à bec court *Anser brachyrhynchus*, Ghyvelde, Nord, novembre 2011 (Christophe Capelle). *Pink-footed Geese*.



3. Érismaure à tête blanche *Oxyura leucocephala*, mâle, Erbrée, Ille-et-Vilaine, novembre 2011 (Yves Blat). *White-headed Duck*.

**SARCELLE MARBRÉE *Marmaronetta angustirostris* (39/95) (20/23 – 2/2)**

**Ain** – Sandrans: Étang Moissonnet, fem. ad., phot., du 13 au 18 mai (P. Crouzier, H. Pottiau *et al.*).

**Marne** – Larzicourt: lac du Der-Chantecoq et Outines: Étang du Grand Coulon, phot., 16 et 17 janvier (C. Legeay, R. Riols *et al.*); Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 14 février (C. Pochelon *et al.*), le même oiseau.

**2010 Eure** – Val-de-Reuil: lac des Deux-Amants, ad., phot., 29 et 30 septembre (D. Basley).

(Méditerranée, Moyen-Orient, nord de l'Inde). Deux données en 2011, à des dates plutôt hors norme dans la mesure où la majorité des données récentes ont été obtenues durant la dispersion postnuptiale entre août et novembre.

**MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (56/60) (41/45 – 4/4)**

**Vendée** – La Tranche-sur-Mer: Plage de la Terrière, mâle 1<sup>er</sup> hiver, 9 avril (P. Trotignon *et al.*), mâle ad., du 24 au 29 décembre (P. Trotignon *et al.*), fem., du 24 décembre au 8 janvier 2012 (P. Trotignon *et al.*); L'Épine: Pointe du Devin et L'Herbaudière: Pointe de l'Herbaudière, fem. juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 9 novembre (P. Trotignon *et al.*).

(Amérique du Nord). Après une absence apparente au cours de l'hiver 2010-2011, le site français le plus régulièrement fréquenté et suivi apporte une donnée au printemps et deux oiseaux au début de l'hiver suivant. Le même observateur a également détecté l'espèce depuis l'île de Noirmoutier, en Vendée toujours...

**ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (33/42) (31/40 – 2/0)**

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu: Lac de Grand-Lieu, mâle ad., phot., 15 septembre, 12 octobre puis du 22 décembre au 20 février 2012 (S. Reeber *et al.*).

**Ille-et-Vilaine** – Erbrée: Étang de Paintourteau, mâle, phot., du 26 septembre au 4 octobre (S. Provost *et al.*), puis du 3 au 11 novembre (B. Duchenne, F. Duchenne, S. Nedellec *et al.*).

(Circum-méditerranéenne: Espagne, Tunisie, Turquie, Balkans, également au nord de la Caspienne). Un mâle avait estivé en 2003 au Lac de Grand-Lieu, et y était retourné l'hiver suivant après avoir séjourné en octobre 2003 en Vendée. Ce nouvel oiseau a stationné à Grand-Lieu du 18 novembre 2010 au 4 mars 2011 (V. *Ornithos* 18-6: 334), a estivé en Ille-et-Vilaine (fide ONCFS), puis a effectué quelques allers-et-retours entre les deux sites à l'automne 2011 avant d'hiverner à nouveau à Grand-Lieu. Il sera ensuite revu à Juvigné, Mayenne, au printemps 2012... Cela illustre bien à quel point les différents sites fréquentés par l'Érismaure rousse *O. jamaicensis* dans les Pays-de-la-Loire et l'Ille-et-Vilaine sont connectés entre eux par les mouvements de cette espèce, que l'Érismaure à tête blanche accompagne volontiers.

**PLONGEON À BEC BLANC *Gavia adamsii* (18/16) (14/12 – 2/2)**

**Morbihan** – En mer : 47,0259735°N/5,3963253°W, 4 novembre (J. Gonin).

**Pas-de-Calais** – Audinghen : Cap Gris-Nez, ad., 27 avril (M. Jaffré *et al.*).

(Sibérie, Alaska). Le Cap Gris-Nez avait déjà fourni une mention de cette espèce, en date du 11 novembre 2007 (V. *Ornithos* 15-5: 319). La seconde donnée confirme que des oiseaux stationnent également au large...

**ALBATROS À SOURCILS NOIRS *Thalassarche melanophris* (9/9) (9/9 – 1/1)**

**Eaux territoriales** – En mer : Rochebonne 46,1057646°N/3,8951669°W, 4<sup>e</sup> année, sous-espèce *melanophris*, phot., 20 octobre (F. Mercier *et al.*).

(Mers australes). Six des neuf mentions précédentes avaient déjà été obtenues entre septembre et novembre... Voici donc la septième, accompagnée des premières photographies de l'espèce en France !

**PÉTREL GONGON *Pterodroma feae* (2/2) (2/2 – 0/0)**

**2010 Eaux territoriales** – En mer : Sole 48,7000°N/6,3833°W, phot., 6 août (V. Bretille).

**2010 Eaux territoriales** – En mer : Ouessant 48,7833°N/6,2333°W, phot., 11 août (V. Bretille).

(Îles du Cap Vert, Madère). Il existait trois mentions de Pétrel gongon/de Madère *P. feae/madeira* en France, sachant que ces deux espèces proches sont très difficile à distinguer sur le terrain. Vu la faiblesse des effectifs globaux du second (moins de 100 couples), il paraît probable que la majorité des oiseaux vus en Europe de l'Ouest sont des Pétrels gongons, mais un doute peut toujours subsister. Ce n'est pas le cas pour ces deux nouvelles données, qui feront l'objet d'une note à venir dans *Ornithos*. L'espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la CAF.


4. Albatros à sourcils noirs *Thalassarche melanophris*, Rochebonne, octobre 2011 (Fabien Mercier). *Black-browed Albatross*.



5. Héron vert *Butorides virescens*, 1<sup>er</sup> hiver, Iteuil, Vienne, décembre 2011 (Aurélien Audevard). *First-winter Green Heron*.



6. Cormoran pygmée *Phalacrocorax pygmeus*, 1<sup>er</sup> année, Mauves, Ardèche, décembre 2011 (Maxime Zucca). *1st-yr Pygmy Cormorant*.

**OCÉANITE DE WILSON *Oceanites oceanicus* (26/27) (23/23 – 1/1)**

**Finistère** – Penmarc'h, 18 septembre (G. Guyot, C. Morvan, A. Rougeron *et al.*).

**2010 Finistère** – En mer, au large d'Ouessant, phot., 28 août (D. Mauras *et al.*).

**2009 Bouches-du-Rhône** – Arles : Camargue, Vaccarès vers la Capelière, trouvé mort, phot., 3 février (A. Le Nevé, Y. Kayser).

(Îles de l'Antarctique. En période internuptiale, tous les océans, y compris l'Atlantique). Une nouvelle donnée pour 2010 et une autre en 2011, entre fin août et septembre et au large du Finistère : c'est classique. En revanche, celle de 2009 apporte la première mention méditerranéenne en France, et fait suite aux passages des tempêtes *Klaus* et *Joris* (Dubois & Duquet 2009), dont les effets resteront dans les mémoires...

**CORMORAN PYGMÉE *Phalacrocorax pygmeus* (8/7) (7/6 – 5/4)**

**Ardèche** – Mauves et Drôme – La Roche-de-Glun, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 16 novembre au 15 janvier 2012 (R. Métais, H. Pottiau, P. Labour, V. Palomares, G. Jacob, A. Jacob, P. Bessède *et al.*).

**Gard** – Vauvert, ad., phot., 21 avril (M. Gauthier-Clerc).

**Hérault** – Agde, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 28 mars au 7 avril (A. Labouille, M. Lognos *et al.*).

**Pyrénées-Orientales** – Saint-Cyprien, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 28 décembre au 24 mars 2012 (A. Pataud *et al.*).

(Europe de l'Est, Asie centrale). Quatre oiseaux différents en 2011, alors qu'il n'y en avait eu que sept auparavant en France ! Toutes ces données sont situées dans le quart sud-est du pays. Ce phénomène s'inscrit évidemment dans un contexte d'expansion plus large ressenti depuis plusieurs années déjà en Europe (Ławicki *et al.* 2012). Cette expansion touche aussi bien le bassin méditerranéen que l'intérieur de l'Europe centrale. Il faut donc s'attendre à contacter l'espèce de plus en plus souvent, y compris dans le nord-est de la France.

**FOU À PIEDS ROUGES *Sula sula* (0/0) (0/0 – 1/1)**

**Var** – Aiguine : lac de Sainte-Croix, ad., phot., du 2 au 14 juillet (E. Rocha *et al.*).

(Zone intertropicale de tous les océans). Première mention française de cette espèce qui n'avait été notée que deux fois en Europe, en août puis en décembre 2010 en Espagne. Le fait que cette découverte ait été réalisée à l'intérieur des terres ajoute évidemment au caractère extraordinaire de cette observation ! Le Fou à pieds rouges a été admis en catégorie A de la liste des Oiseaux de France par la CAF, et une note paraîtra prochainement dans *Ornithos* au sujet de cette découverte.

**HÉRON VERT *Butorides virescens* (1/1) (1/1 – 1/1)**

**Vienne** – Iteuil : Les Varennes, juv., phot., du 24 novembre au 4 janvier 2012 (T. Williamson *et al.*).

(Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes). Troisième mention française de cette espèce, la seconde en catégorie A, en une localité extraordinaire, après celle du 1<sup>er</sup> avril 1994 sur Hoëdic, Morbihan (V. *Ornithos* 2-4: 147). Pour rappel, l'oiseau ayant passé trois hivers consécutifs à Berre, Bouches-du-Rhône a été placé en catégorie E par la CAF.

**AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (45/32) (39/26 – 1/1)**

**Gironde** – La Teste-de-Buch: Banc d'Arguin, ad., sous-espèce gularis, phot., 21 mai (M. Grandpierre *et al.*).  
**2010 Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, la Palunette, sous-espèce gularis, du 21 au 30 mai (J. Alchimowicz, Y. Kayser).

(Afrique, Asie). L'oiseau de 2010 peut raisonnablement être considéré comme l'un des quatre présents en Camargue en 2009, de retour au printemps suivant. La donnée girondine est nettement plus originale, puisqu'il ne s'agit que de la quatrième mention atlantique de l'espèce, après celles de Loire-Atlantique en 1984 et de Charente-Maritime en 1998 et 2004. Les deux dernières avaient elles aussi été obtenues au printemps (fin du mois d'avril et mai).

**ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (130/532) (122/532 – 0/0)**

**2008 Ariège** – Saverdun, 2 ad., 15 août et 1<sup>er</sup> septembre, 4 ad., 18 octobre, 5 ad., 22 octobre, 6 ad., 24 octobre, 7 ad. 4 novembre et 25 décembre (T. Guillosson *et al.*).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). Donnée tardive, mais remarquable par le nombre d'oiseaux impliqués. Pour rappel, les observations de cette espèce ne sont plus soumises à homologation nationale depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010.

**BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (183/184) (164/165 – 17/17)**

**Ain** – Mourex, mâle 3<sup>e</sup> année, phot., 29 septembre (P. Grassot).  
**Aisne** – Mont-d'Origny, mâle 2<sup>e</sup> année, du 5 au 7 octobre (F. Cochon).  
**Allier** – Saint-Plaisir: Croix rouge, mâle ad., 9 avril (J.-C. Sautour *et al.*).  
**Ardèche** – Andance, juv., phot., 18 septembre (V. Palomares *et al.*).  
**Ardennes** – Perthes, mâle ad., 29 septembre (L. Gizart).  
**Aube** – Laubressel: le Coffre, mâle ad., 12 avril (B. Vacheret).  
**Charente-Maritime** – Les Portes-en-Ré: Île de Ré, Maison du Fier, juv., phot., 17 septembre (A. Pajot *et al.*).  
**Côte-d'Or** – Vandenesse-en-Auxois, mâle juv., phot., 14 septembre (G. Bedrines); Pasques, mâle 3<sup>e</sup> année, 15 octobre (G. Bedrines).  
**Essonne** – Mespuits: Les Arpents blancs et les Boucheteaux, mâle 3<sup>e</sup> année, phot., du 27 septembre au 5 octobre (J. Daubignard, L. Albesa *et al.*).  
**Gard** – Marguerittes: Rastégues, mâle ad., 11 septembre (M. Bernard).  
**Jura** – Grange-de-Ladoye/le Fied, mâle subad./ad., phot., 19 mars (*vide* J.-P. Paul).  
**Nièvre** – La Charité-sur-Loire, mâle subad./ad., 16 avril (J. Pitois).  
**Nord** – Gruson, juv., phot., 28 août (E. Berthollon, J. Piette *et al.*).  
**Seine-et-Marne** – Chanconin-Neufmontiers, juv., phot., du 11 au 18 septembre (R. Provost, D. Thorns *et al.*).





fig. 2. Nombre annuel de Busards pâles *Circus macrourus* homologués en France depuis 1981. Annual number of accepted records (individuals) of Pallid Harrier in France, 1981-2011.

fig. 3. Répartition des données de Busard pâle *Circus macrourus* homologuées de 1981 à 2011 inclus (n=181). Distribution of accepted records of Pallid Harrier in France, 1981-2011.



**Var** – La Seyne-sur-Mer, mâle ad., phot., 17 septembre (J.-F. Bach *et al.*); Vinon-sur-Verdon, juv., phot., du 10 au 13 octobre (N. Vissyrias *et al.*).

**2010 Jura** – Champagne-sur-Loue, juv., 4 octobre (J.-P. Paul).

**2009 Aude** – Espezel, mâle ad., du 4 au 16 avril (C. Riols).

**2008 Maine-et-Loire** – Saulgé-l'Hôpital: Barbansinet, mâle ad., 22 avril (A. Liger).

**2002 Aude** – Armissan, mâle ad., 3 avril (A. Liger).

(Asie centrale, à l'Ouest jusqu'en Roumanie). Avec un nouvel oiseau, l'année 2008 en compte désormais 22, ce qui reste le record annuel. Avec 17 oiseaux homologués, 2011 est cependant dans la moyenne de ces six dernières années, d'autant qu'il manque encore plusieurs fiches à l'appel. Peu de choses remarquables à évoquer, si ce n'est que ce lot de données est largement déséquilibré en faveur du passage postnuptial (13 données contre quatre pour le printemps), alors que la situation est habituellement plutôt inverse. La carte 1 montre la répartition des données récentes de l'espèce en France, avec une prépondérance de la frange méditerranéenne, de la vallée du Rhône et du Doubs. Un axe secondaire semble se dessiner entre le Centre et les côtes atlantiques à partir de la Vendée et plus au Sud, qui pourrait être emprunté par des oiseaux contournant les Pyrénées par l'Ouest. L'espèce continue à être très rare en Loire-Atlantique, en Bretagne et le long des côtes de la Manche, et plus étonnamment, elle n'a jamais été contactée en Alsace et dans les trois départements de l'est de la Lorraine.

**BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (436/458) (367/385 – 83/85)**

**Ain** – Frans, 1<sup>er</sup> hiver, trouvée morte, percutée par un véhicule, phot., du 9 janvier au 7 février (B. Sonnerat, P. Crouzier *et al.*).

**Aisne** – La Bouteille: la Hourbe, 1<sup>er</sup> hiver, 30 novembre (V. Varoquaux).

**Ardennes** – Attigny, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 3 janvier (N. Harter *et al.*); La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 5 au 12 janvier, libérée d'une cage-piège le 12 janvier (E. Leguay *et al.*), 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 6 au 21 novembre (L. Gizart *et al.*); Charbogne, fem. ad., trouvée morte, percutée par un véhicule, phot., 21 janvier (N. Harter);

Pauvres, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 6 février (L. Gizart *et al.*); Leffincourt, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 5 novembre (L. Gizart).

**Aube** – Feuges et Saint-Benoît-sur-Seine, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 5 au 19 janvier (Y. Brouillard, J.-P. Couasné, P. Laur-Fournié, R. Riols *et al.*), 1<sup>er</sup> hiver, phot., 5 janvier (Y. Brouillard, J.-P. Couasné *et al.*); Buxières-sur-Arce, Beurey et Magnant, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 21 et 22 janvier (J.-M. Dubois, P. Millioz, V. Ternois *et al.*); Montmorency-Beaufort: les Blancs Fossés, 1<sup>er</sup> hiver, 4 mars (Y. Brouillard); Laubressel: le Coffre, 14 novembre (B. Vacheret).

**Aveyron** – Salles-Curan, 21 mars (S. Talhoet, P. Dreno).

**Bas-Rhin** – Munchhausen: route de Seltz, 1<sup>er</sup> hiver, 12 février (H. Yésou), 1<sup>er</sup> hiver, 11 novembre (V. Heuacker *et al.*); Saales: col de Saales, 26 mars (G. Haas).

**Bouches-du-Rhône** – Eyguières, 1<sup>er</sup> hiver, 10 janvier (A. Flitti); Arles: Camargue, le Sambuc, Esquineau, Fanguise et Tour-du-Valat, 1<sup>er</sup> hiver, 13 janvier (Y. Kayser).

**Cantal** – Celles, Ussel et Coltines, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 8 janvier au 20 mars (H. Verne, R. Riols *et al.*); Ussel et Coltines, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 8 janvier au 6 mars (H. Verne, R. Riols *et al.*); Ussel et Celles, fem. ad., phot., du 16 janvier au 6 mars (H. Verne, R. Riols *et al.*); Saint-Georges, Mentières et Coren: Puy de la Balle, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 3 au 27 avril (H. Verne *et al.*).

**Côte-d'Or** – Combertault, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 2 janvier (B. Fontaine *et al.*); Meilly-sous-Rouvres, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 6 au 16 mars (A. Rougeron *et al.*); Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 25 au 31 mars (P. Durlet, H. Gauche *et al.*).

**Creuse** – Ajain: Feuyas, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 20 février (P. Duboc).

**Doubs** – Avoudrey, mâle ad., phot., 3 janvier (D. Michelat); Bouclans, Osse et Nancray, du 8 janvier au 2 février (A. Maradan *et al.*); Pontarlier, 1<sup>er</sup> hiver, 11 janvier (D. Michelat); Bulle, Chaffois et Sainte-Colombe, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 12 janvier au 6 mars (D. Michelat, M. Sauret); Bannans, mâle 2<sup>e</sup> hiver, phot., 15 et 16 février (D. Michelat *et al.*), 1<sup>er</sup> hiver, 7 février (E. Renaud), 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 9 au 23 février (D. Michelat *et al.*); Bannans, Chaffois et Sainte-Colombe, fem. ad., phot., du 21 janvier au 12 février (D. Michelat *et al.*); Pierrefontaine-les-Varans, 1<sup>er</sup> hiver, 26 février (S. Maas *et al.*); Pont-de-Roide, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 20 octobre (J.-P. Paul *et al.*); Quingey, mâle 2<sup>e</sup> hiver, phot., 22 décembre (J.-P. Paul).

**Eure** – Farceaux, 1<sup>er</sup> hiver, 31 octobre (S. Nedellec).

**Gard** – Vauvert: Mas des Iscles, 1<sup>er</sup> hiver, 12 février (J.-P. Trouillas *et al.*).

**Haute-Savoie** – Thollon-les-Mémises: le Hucel, 1<sup>er</sup> hiver, 6 mars (H. Dupuich *et al.*); Saint-Paul-en-Chablais: le Maravant et Thollon-les-Mémises: le Hucel, 1<sup>er</sup> hiver, 1<sup>er</sup> et 2 avril (H. Dupuich *et al.*); Chevrier, 27 novembre (J.-P. Matérac).

**Haut-Rhin** – Réguisheim: gravière sèche, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 2 et 3 janvier (D. Holtz, G. Dietrich); Chalampé, 1<sup>er</sup> hiver, 5 janvier (M. Heyberger); Bennwihr, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 17 janvier au 2 mars (J. Guhring, V. Palomares *et al.*); Bennwihr et Sigolsheim, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 26 février au 2 mars (V. Palomares *et al.*); Colmar: Herten Matten, 3 ind. de 1<sup>er</sup> hiver, phot., 24 octobre (V. Palomares).

**Jura** – Les Rousses, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 19 au 21 janvier (T. Petit); Barretaine, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 29 janvier (T. Petit); Champagne-sur-Loue, 1<sup>er</sup> hiver, 31 octobre (J.-P. Paul).

**Marne** – Goncourt: Dôme, 1<sup>er</sup> hiver, 31 janvier (B. Théveny).

**Meuse** – Eton, 1<sup>er</sup> hiver, 12 janvier (P. Moreau).

**Nord** – Avelin, 1<sup>er</sup> hiver, du 10 au 12 janvier (Q. Dupriez *et al.*), 1<sup>er</sup> hiver, 6 mars (C. Capelle); Cappelle-en-Pévèle, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 5 février (C. Capelle *et al.*); Hondschoote, Uxem et Tétégem, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 6 février au 11 avril (C. Capelle *et al.*); Tétégem, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 4 mars (C. Capelle *et al.*); Troisville, phot., 27 mars (O. Fontaine); Mons-en-Pévèle, 1<sup>er</sup> hiver, 16 octobre (C. Capelle); Dunkerque, 2<sup>e</sup> hiver, phot., 14 novembre (Q. Dupriez).

**Oise** – Montagne-de-la-Garenne, 4 janvier (W. Mathot); Remérangles, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 15 mars (T. Daumal); Grandvilliers, 2<sup>e</sup> hiver, phot., du 25 au 27 décembre (H. de Lesterville).

**Pas-de-Calais** – Audinghen: Cap Gris-Nez, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 3 janvier (P.-R. Legrand *et al.*); Brebières, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 6 janvier (N. Valet *et al.*); Audembert: Mont de Couple, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 16 janvier (G. Flohart), fem. 2<sup>e</sup> année, phot., 31 octobre (C. Capelle); Wissant, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 30 janvier (G. Flohart, L. Vièque); Peuplingues, 16 février (G. Flohart); Escalles: Mont à Crapauds, mâle ad., phot., du 21 février au 4 mars (G. Flohart, L. Vièque), 1<sup>er</sup> hiver, 6 mars (G. Flohart), 1<sup>er</sup> hiver, 16 octobre (M. Dehaye *et al.*); Hermelinghen, 8 mars (G. Flohart); Sangatte, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 31 octobre (C. Capelle); Camiers: Baie de Canche, 1<sup>er</sup> hiver, 19 novembre (B. Paepgaey *et al.*); Escalles: Mont d'Hubert, mâle ad., phot., 11 décembre (F. Gabillard).

**Puy-de-Dôme** – Saint-Nectaire: Trioervas, 23 janvier (M. Bernard); Aurières/Saulzet-le-Froid, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 31 janvier au 2 février (S. Heinerich *et al.*).

**Seine-Maritime** – Criquetot-l'Esneval, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 4 et 5 janvier (D. Guédon *et al.*).

**Somme** – Saint-Quentin-en-Toumont: parc du Marquenterre, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 23 octobre (J. Buissart, L. Ayache *et al.*), phot., 24 octobre (J. Buissart, A. Leprêtre); Port-le-Grand, mâle 2<sup>e</sup> hiver/ad., 28 novembre (A. Leprêtre).

**2010 Aisne** – Mont-d'Origny, imm., phot., du 31 octobre au 13 décembre (A. Mauss *et al.*).

**2010 Ardennes** – Juniville, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 26 et 27 décembre (L. Gizart *et al.*).

**2010 Calvados** – Saint-Etienne-la-Thillaye: marais de la Touques, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 27 décembre (E. Schmitt).

**2010 Côte-d'Or** – Magny-sur-Tille, phot., 30 décembre (B. Fontaine *et al.*).

**2010 Haute-Saône** – Pierre-de-Bresse, 1<sup>er</sup> hiver, 2 décembre (P. Gayet).

**2010 Haut-Rhin** – Bennwihr, phot., du 26 décembre au 11 février 2011 (G. Dietrich, J.-M. Frenoux *et al.*), et non jusqu'au 9 janvier seulement (V. *Ornithos* 18-6: 336-337); Wittelsheim, 1<sup>er</sup> hiver, 21 novembre (N. Minéry).

**2010 Isère** – Beaurepaire, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 31 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Jura** – Besançon, fem. ad., 30 novembre (J.-P. Paul).

**2010 Marne** – Moncetz-Longevas, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 4 décembre au 13 février 2011 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Sarry, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 12 décembre au 16 janvier 2011 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Meuse** – Seuil-d'Argonne, mâle ad., 2 décembre (D. Demange).

**2010 Moselle** – Rochonvillers, mâle 2<sup>e</sup> hiver, phot., du 3 au 15 janvier (O. Matgen, M. Cordella *et al.*).

**2010 Pas-de-Calais** – Audinghen, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 28 novembre (G. Flohart); Escalles, 2<sup>e</sup> hiver, phot., 13 décembre (G. Flohart); Sangatte: Fond Pignon, ad. et 1<sup>er</sup> hiver, phot., 13 décembre (G. Flohart), 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 31 décembre au 16 février 2011 (G. Flohart, L. Vièque).

**2010 Puy-de-Dôme** – Mont-Dore, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 28 octobre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Un afflux sans précédent a eu lieu au cours de l'hiver 2010-2011, pour lequel une partie des données a été publiée dans le rapport précédent (V. *Ornithos* 18-6: 336-339). En comptabilisant l'ensemble des données parvenues au CHN à ce jour et homologuées, un total de 126 oiseaux a été noté en France au cours de cet hiver, qui doit évidemment être interprété avec la prudence qui s'impose... Il est bien évident qu'un certain nombre d'oiseaux ont changé de site au cours de l'hiver, et ont pu être comptabilisés plusieurs fois. Dans la mesure où ce chiffre est proposé avec une approche à peu près constante d'année en année, et bien qu'il soit encore incomplet, il est plus de deux fois supérieur à l'effectif relevé lors du précédent afflux, au début de l'année 1997. Ce dernier avait fait l'objet d'une note détaillée (Michelat *et al.* 1998), ce qui permet une intéressante comparaison entre les deux épisodes. Tout d'abord, la chronologie des événements a été sensiblement différente, puisqu'en 1997, les premiers oiseaux ont été vus au tout début de janvier, avec un pic entre le 20 de ce mois et le 5 février. En 2010, les premiers oiseaux sont arrivés nettement plus tôt: dès le 28 octobre dans le Puy-de-Dôme puis le 31 octobre dans l'Aisne et le Pas-de-Calais. Les arrivées ont atteint leur maximum entre fin novembre et fin janvier avec un pic centré sur la dernière décade de décembre. Le nombre d'oiseaux présents (cumul par décade) culmine lui-aussi au cours de la dernière décade de décembre et la première de janvier 2011 avec respectivement 33 et 34 Buses pattues présentes (jusqu'à 27 présentes simultanément au cours de la dernière pentade de janvier 1997). À la mi-mars, il ne reste que cinq oiseaux, comme en 1997, mais en revanche les dernières dates sont un peu plus tardives: un oiseau se trouvait encore le 11 avril dans le Nord, et un autre a stationné dans le Cantal jusqu'au 27 avril, valant à l'Auvergne d'avoir accueilli le premier et le dernier oiseau connu de cet afflux! Pour rappel, en 1997, les deux derniers oiseaux avaient été notés en Franche-Comté les 2 et 4 avril.

7. Buse pattue *Buteo lagopus*, 1<sup>er</sup> hiver, Hondschoote, Nord, février 2011 (Christophe Capelle). *First-winter Rough-legged Buzzard*.





**MARQUETTE DE BAILLON** *Porzana pusilla* (107/148) (61/75 – 1/1)

**Alpes-Maritimes** – Saint-Laurent-du-Var, ad., phot., 3 avril (P. Robaut *et al.*).

**2007 Pyrénées-Atlantiques** – Anglet, juv., phot., 24 août, blessé par un chat, amené en centre de soins, mort par la suite (*vide* L. Goyeneche).

(Europe, Asie centrale, Japon). Le « blanc » de l'année 2007 est désormais comblé, même si la fin de cet oiseau n'est pas réjouissante ! Une seule donnée en 2011, à une date et en un lieu des plus classiques pour la migration pré-nuptiale de cette marouette.

**GRUE DEMOISELLE** *Grus virgo* (2/1) (2/1 – 0/0)

**2010 Manche** – Beauvoir, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 24 octobre au 11 novembre (S. Provost *et al.*), publiée en catégorie D dans le précédent rapport (V. *Ornithos* 18-6 : 360), placée désormais en catégorie A par la CAF.

**2010 Pas-de-Calais** – Saint-Josse, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 13 octobre (photos sur [nordpasdecalsais.observado.org](http://nordpasdecalsais.observado.org)), le même oiseau que dans la Manche.

(De la Turquie au nord de la Chine, Maroc). Deux observations de cette jeune Grue demoiselle, qui après examen a permis à la CAF d'inscrire l'espèce en catégorie A de la liste des oiseaux de France. Les autres mentions françaises de l'espèce ont été examinées en détail par la CAF mais aucune n'a présenté d'arguments suffisants pour considérer qu'elles concernaient des oiseaux d'origine potentiellement sauvage. Elles sont donc désormais placées en catégorie E.

**OUTARDE BARBUE** *Otis tarda* (77/211) (10/16 – 1/1)

**Pyrénées-Atlantiques** – Escout : Moulin de Claverie, mâle, phot., 1<sup>er</sup> et 2 juillet (F. Cazaban *et al.*).

(Europe centrale, Espagne, Turquie et Asie centrale). Une nouvelle mention de l'espèce après les quatre oiseaux de 2009. Ils avaient également stationné entre juin et août dans les Pyrénées-Atlantiques. Bien entendu, une origine ibérique paraît évidente, d'autant qu'après plusieurs décennies de régression, l'espèce semble s'y porter mieux depuis peu.

**COURVITE ISABELLE** *Cursorius cursor* (24/24) (5/5 – 1/1)

**Bouches-du-Rhône** – Saint-Rémy-de-Provence : Mourre de la Justice, juv., phot., du 1<sup>er</sup> au 5 septembre (A. Flitti, M. Battais *et al.*).

(Afrique, Asie du Sud-Ouest). Il n'existait que cinq mentions de cette espèce depuis la création du CHN en 1981. Trois d'entre elles sont de septembre, et deux d'entre elles proviennent des Bouches-du-Rhône...



8. Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 2011 (Christian Kerihuel). Juvenile American Golden Plover.

9. Pluvier fauve *Pluvialis fulva*, adulte, Tréogat, Finistère, juin 2011 (Corentin Morvan). Adult Pacific Golden Plover.

**PLUVIER BRONZÉ** *Pluvialis dominica* (51/53) (49/51 – 3/3)

**Charente-Maritime** – Les Portes-en-Ré : Réserve Naturelle de Lilleau des Niges, ad., phot., du 13 septembre au 21 novembre (J. Gernigon *et al.*).

**Finistère** – Ouessant : Yusin, juv., phot., du 21 septembre au 11 octobre (B. Delahaie, J. Gonin *et al.*) ; île de Sein, juv., phot., du 29 septembre au 2 octobre (J.-P. Jordan *et al.*).

(Amérique du Nord). Il manque encore deux données du Finistère et de Gironde à l'appel, mais malgré cela, 2011 se situe déjà au-dessus de la moyenne, qui est de l'ordre de 2,6 oiseaux par an sur la dernière décennie. Rien de neuf, en revanche, côté lieux et dates ...

**PLUVIER FAUVE** *Pluvialis fulva* (21/21) (21/21 – 1/1)

**Finistère** – Tréogat : Plage de Kermabec, ad., phot., 29 juin (C. Morvan, G. Guyot).

(Sibérie, Alaska). Il s'agit de la troisième donnée pour le Finistère, à une date de début d'été qui correspond bien au pic d'occurrence pour cette espèce notée tout juste une fois par an en moyenne en France.

**VANNEAU SOCIABLE** *Vanellus gregarius* (110/109) (101/100 – 8/7)

**Charente-Maritime** – Moëze : Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, 1<sup>er</sup> hiver, 23 décembre (L. Jomat).

**Gironde** – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, phot., 28 septembre (F. Jouandoudet *et al.*).

**Loiret** – Guilly : Courpain, 27 novembre (M. Lacroix).

**Mayenne** – Chammes, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 4 novembre (D. Madiot).

**Oise** – Localité tenue secrète, ad., phot., 8 novembre (T. Daumal).

**Val-d'Oise** – Frémainville, juv., phot., 19 octobre (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)), le même que celui vu précédemment dans les Yvelines (voir ci-dessous).

**Vendée** – Noirmoutier-en-l'Île : Île de Noirmoutier, la Salaisière, phot., 26 et 27 mars (J.-C. Croisé *et al.*).

**Yvelines** – Gaillon-sur-Montcient, juv., phot., 17 et 18 octobre (J.-M. Fénérole *et al.*).

**2010 Aude** – Roquefeuil, 11 novembre (C. Riols *et al.*).

**2010 Loir-et-Cher** – Blois : la Saulas, phot., 26 septembre (J. Vion *et al.*).

**2010 Seine-et-Marne** – Varennes-sur-Seine, phot., 2 octobre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Il manque encore trois données de l'Aube, de l'Ain et de l'Indre, ce qui avec les sept oiseaux homologués constituerait un nouveau record annuel. Avec trois nouvelles mentions, l'année 2010 égale quant à elle le précédent record de huit oiseaux, déjà atteint en 2000 et 2009. À noter également le fort déséquilibre entre passage postnuptial et passage pré-nuptial, puisqu'une seule donnée concerne ce dernier, alors que le nombre de mentions est habituellement plutôt équilibré entre les deux passages.



10. Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla*, juvénile, Sein, Finistère, septembre 2011 (Cyril Maurer). Juvenile Semipalmated Sandpiper.

**BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (22/22) (21/21 – 6/6)**

**Finistère** – Ouessant : Porz Doun, juv., phot., 8 et 9 septembre (B. Delahaie, C. Caïn *et al.*); île de Sein, juv., phot., du 24 au 26 septembre (J.-P. Jordan *et al.*), juv., phot., 18 octobre (B. Segerer, F. Garcia, S. Reeber *et al.*); Plonéour-Trez, juv., phot., 23 septembre (A. Mauss).

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert de Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, juv., phot., du 22 au 30 septembre (S. Reeber *et al.*), juv., du 28 au 30 septembre (S. Reeber *et al.*).

(Amérique du Nord). Il manque encore au moins une donnée du Finistère, mais malgré cela, l'année 2011 se situe déjà bien au-delà du précédent record annuel de trois oiseaux, atteint en 1999 et 2005... C'est également la première fois que deux oiseaux sont observés ensemble. Les dates et localités sont en revanche moins étonnantes.

**BÉCASSEAU À COU ROUX *Calidris ruficollis* (3/3) (3/3 – 0/0)**

**2010 Gironde** – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, 20 mai (C. Feigné).

(Est de la Sibérie, Asie du Sud-Est). Il s'agit là de la troisième mention française de l'espèce, après celles de juillet 1994 dans le Pas-de-Calais (V. *Ornithos* 2-4 : 154) et d'août 2008 dans le Finistère (V. *Ornithos* 16-5 : 288). En Europe de l'Ouest, l'espèce est plus rare au printemps qu'en début d'été, d'où le caractère doublement remarquable de cette nouvelle mention.

**BÉCASSEAU À LONGS DOIGTS *Calidris subminuta* (0/0) (0/0 – 1/1)**

**Loire-Atlantique** – La Turballe : saline Gau, juv., phot., du 1<sup>er</sup> novembre au 26 janvier 2012 (O. Vanucci, W. Raitière, J. Mérot, A. Mousseau, A. Joris *et al.*).

(Est de la Sibérie, Asie du Sud-Est). Première mention française attendue pour ce bécasseau est-asiatique, d'apparition rarissime en Europe de l'Ouest... Malgré la longueur remarquable de son séjour, il a su se montrer très discret certains jours !

**BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (51/52) (47/48 – 2/2)**

**Indre-et-Loire** – Rillé : lac de Rillé, ad., phot., 2 et 3 octobre (O. Vanucci *et al.*).

**Pyrénées-Atlantiques** – Momas : lac de l'Ayguelongue, ad., phot., du 13 au 21 septembre (P. Legay, F. Cazanban *et al.*).

(Amérique du Nord). Dans un contexte aussi favorable aux arrivées de limicoles nord-américains, il est étonnant de ne pas avoir contacté davantage cette espèce... Deux données en 2011, c'est inférieur à la moyenne sur la dernière décennie, qui est de 2,6 oiseaux par an. Fait notable en revanche, l'Indre-et-Loire accueille là son second Bécasseau de Bonaparte, moins d'un an après le premier, du 4 au 7 novembre 2010 (V. *Ornithos* 18-6 : 342) !

**BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (50/51) (46/47 – 3/3)**

**Loiret** – Ruan : bassins de décantation, juv., phot., du 20 au 25 septembre (M. Lacroix *et al.*).

**Somme** – Cayeux-sur-Mer : Hâble d'Ault, juv., phot., du 2 au 4 octobre (Y. Dubois, A. Dorie, A. Boussemart, L. Gavory *et al.*).

**Vendée** – Saint-Denis-du-Payré : Réserve Naturelle, ad., 22 et 23 août (P. Trotignon).

**2010 Indre-et-Loire** – Le Louroux, juv., phot., 16 et 17 octobre (J. Présent, P. Cabard *et al.*).

**2009 Charente-Maritime** – Moëze : Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, ad., du 23 au 27 août (J. Gonin *et al.*).

(Amérique du Nord). Les années 2009 et 2010 comptent désormais deux mentions chacune, ce qui est proche de la moyenne annuelle de la dernière décennie, et constituent chacune des premières départementales. Les départements visités en 2011 sont en revanche plus classiques, et c'est même la troisième donnée pour le Loiret après celles de 1996 et de 2010 (V. *Ornithos* 7-4 : 156 et 18-6 : 342) !

**BÉCASSEAU À QUEUE POINTUE *Calidris acuminata* (5/5) (4/4 – 2/2)**

**Charente-Maritime** – Moëze : les Tannes, juv., phot., du 1<sup>er</sup> au 27 octobre (Y. Pichon, L. Jomat *et al.*).

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert de Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., phot., du 22 au 27 septembre (S. Reeber *et al.*).

(Est de la Sibérie, Asie du Sud-Est). Il s'agit là des sixième et septième mentions françaises de ce bécasseau est-asiatique, dans un contexte qui aura également amené le premier Bécasseau à longs doigts français, originaire des mêmes contrées... Après la première mention française de 1972, les quatre mentions suivantes remontent aux années 1999 à 2001, avec deux données au cours de cette dernière année. L'année 2011 fut également riche en Europe pour cette espèce, avec deux mentions en Irlande, deux en Angleterre, une en Allemagne, une au Danemark et une en Hongrie.

**BÉCASSEAU À ÉCHASSES *Calidris himantopus* (8/8) (8/8 – 1/1)**

**Bouches-du-Rhône** – Arles : Camargue, They de Sainte-Ursule et Baisse de Cinq Cents Francs, ad., phot., du 15 au 17 août (J.-P. Paul, P. Bessède, B. Lebrun *et al.*).

(Amérique du Nord). Neuvième mention française de ce bécasseau, à une époque classique, puisque cinq des observations datent de juillet ou d'août. La localité est en revanche nettement plus originale, puisque c'est la première fois que l'espèce est notée en dehors de la façade atlantique...



11. Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata*, adulte, lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique, septembre 2011 (Sébastien Reeber). Juvenile Sharp-tailed Sandpiper.

**BÉCASSEAU FALCINELLE *Limicola falcinellus* (205/284) (169/232 – 9/8)**

**Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, Rascaillan, juv., phot., 12 août (V. Palomares *et al.*), They de Sainte-Ursule, ad., phot., du 14 au 17 août (B. Lebrun *et al.*).

**Charente-Maritime** – Saint-Pierre-d'Oléron: Île d'Oléron, pont de la Grande Planche, 16 mai (L. Jomat); Moëze: Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, ad., 15 août (L. Jomat).

**Gironde** – Le Teich: Parc ornithologique du Teich, ad., 18 avril (A. Liger *et al.*).

**Haute-Saône** – Marnay, juv., phot., du 7 au 11 août (S. Maas *et al.*).

**Jura** – Pagny, juv., 8 août (S. Clément *et al.*), le même oiseau qu'en Haute-Saône.

**Pas-de-Calais** – Grand-Fort-Philippe: plage, ad., phot., du 15 au 20 juillet (D. Haubreux *et al.*).

**Vendée** – Bouin: Lagune du Dain, ad., 17 mai (J.-C. Delattre).

(Europe septentrionale). Sachant qu'il manque encore deux fiches de Camargue et une autre du Var, 2011 s'affirme comme une très bonne année pour l'espèce, tout comme l'était déjà 2010 et ses douze oiseaux... La répartition est plus éclatée que d'habitude, avec quatre données atlantiques, une du Pas-de-Calais, et la première mention franc-comtoise. Les dates sont plus habituelles, à l'exception de celle du 18 avril en Gironde, puisqu'il s'agit de la seconde mention la plus précoce en France à ce jour, après celle du 11 avril 1996, exactement au même endroit (V. *Ornithos* 4-4: 151)!

**BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis* (190/227) (160/165 – 21/29)**

**Ain** – Villars-les-Dombes: Étang Orcet, 9 octobre (P. Cruzier).

**Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, Grand Rascaillan et Enfores de la Vignolle, 2 juv., phot., du 16 septembre au 1<sup>er</sup> octobre (P. Knaus *et al.*), 3 juv., phot., du 2 au 4 octobre, puis un seul, 7 octobre (P. Knaus, P. Bessède, V. Cazalis, P. Foulquier *et al.*).

**Charente-Maritime** – Moëze: les Tannes, juv., phot., du 25 au 30 septembre (X. Rebeyrat *et al.*).

**Côtes-d'Armor** – Pleubian, juv., phot., 1<sup>er</sup> octobre (Q. Ngo-Dinh-Phu).

**Dordogne** – Eymet: Étang de l'Escourrou, juv., phot., 15 septembre (J.-C. Bonnet).

**Finistère** – Plovan: Nérizellec, juv., phot., du 8 au 12 septembre (C. Morvan *et al.*); Ouessant: Ru Niou, 2 juv., phot., du 11 au 14 septembre (B. Delahaie *et al.*), Kadoran, 3 juv., phot., 14 septembre, puis 2 jusqu'au 18 septembre (B. Delahaie, J.-C. Delattre, F. Thal *et al.*); île de Sein, juv., phot., du 24 septembre au 1<sup>er</sup> octobre (J.-P. Jordan *et al.*).

**Gironde** – Le Teich: Parc ornithologique du Teich, juv., phot., du 7 au 18 septembre (N. Mokuenko *et al.*).

**Loire-Atlantique** – Saint-Joachim: Grande Brière, phot., 22 mai (J.-L. Dourin, A. Troffigué).

**Loir-et-Cher** – Chémery: Étang de l'Arche, juv., phot., du 24 au 29 octobre (F. Pelsy *et al.*).

12. Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*, juvéniles, Camargue, octobre 2011 (Pierre Foulquier). *Juvenile Buff-breasted Sandpiper.*



13. Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis*, juvénile, Hyères, Var, septembre 2011 (Aurélien Audevard). *Juvenile Buff-breasted Sandpiper.*



**Lot-et-Garonne** – Soumensac, juv., phot., du 15 au 25 septembre (J.-C. Bonnet), le même oiseau que celui de Dordogne.

**Manche** – Vrasville, juv., 9 septembre (A. Guérard), 2 juv., phot., 11 septembre (A. Verneau, D. Mauras, M. Mauras *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Les Hemmes-de-Marck, 3 juv., phot., 10 septembre, puis un seul le 11 septembre (F. Gabillard, B. Paepegaey *et al.*), juv., phot., 18 septembre (P.J. Dubois, G. Flohart *et al.*).

**Pyrénées-Atlantiques** – Larrau: Col d'Organbidexka, juv., phot., 13 septembre (G. Foilleret *et al.*); Ciboure: vasière de l'Untxin, 2 juv., 18 septembre (B. Lamothe *et al.*).

**Vendée** – Île-d'Yeu: plage de la Grande Conche, phot., 5 septembre (S. Demarest); Saint-Denis-du-Payré: Réserve Naturelle, 14 et 15 septembre (J. Gonin *et al.*).

**2010 Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, Tour-du-Valat, juv., phot., 13 et 14 septembre (T. Blanchon, A. Arnaud *et al.*).

**2010 Charente-Maritime** – Charron: les Grandes Mizottes, phot., du 10 au 13 août (J. Gonin *et al.*).

**2009 Manche** – Merville-Franceville-Plage, ad., phot., 20 mai (J. Jean-Baptiste *et al.*).

(Amérique du Nord). Cette année 2011 aura vu arriver un nombre impressionnant de Bécasseaux rousses en France, deux fois supérieur au précédent record de 2000, malgré quelques fiches encore manquantes. Les arrivées se concentrent principalement du 5 au 20 septembre, avec un pic au cours de la troisième pentade du mois, ce qui est d'ailleurs parfaitement conforme à la normale. On notera également une observation printannière en Brière, Loire-Atlantique. La distribution de ces données est nettement plus originale, puisque la Bretagne et la façade atlantique ne cumulent « que » la moitié d'entre elles, le reste se répartissant entre les côtes de la Mer du Nord et de la Manche, l'intérieur des terres et la Méditerranée. Cinq des 14 départements visités en 2011 l'ont même été pour la première fois: l'Ain, les Côtes-d'Armor, la Dordogne, le Loir-et-Cher et le Lot-et-Garonne... Cette configuration géographique ne suggère évidemment pas une arrivée directe par l'Atlantique, mais plutôt une redistribution d'oiseaux arrivés préalablement en Europe du Nord ou du Nord-Ouest, vers le sud. Le groupe le plus important jamais noté en Europe a d'ailleurs été relevé à l'occasion de cet afflux, avec 23 oiseaux le 25 septembre à Tacumshin, Irlande.



14. Bécassine double *Gallinago media*, Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, avril 2010 (Éric Sansault). *Great Snipe*.

**BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (298/340) (55/59 – 9/9)**

**Alpes-Maritimes** – Le Beuil : Les Launes, phot., 12 avril (C. Jallais-Aymar).

**Bouches-du-Rhône** – Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, Fiérouse, 15 avril (Y. Kayser).

**Côte-d'Or** – Lux : Perte de la Venelle, 23 mai (G. Bedrines, A. Rougeron *et al.*); localité tenue secrète, 31 mai (H. Gauche).

**Gironde** – Léognan : Aérodrôme de Saucats, 6 mai (L. Barbaro).

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert de Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 28 avril (S. Reeber).

**Manche** – Sainte-Marie-du-Mont, 19 avril (D. Davignon).

**Pyrénées-Orientales** – Saint-Cyprien : Étang de Canet, phot., 17 et 18 avril (Y. Dubois, P.J. Dubois, B. Delahaie *et al.*).

**Var** – Hyères : Salins des Pesquiers, 31 mars (A. Audevard *et al.*).

**2010 Pyrénées-Orientales** – Canet-en-Roussillon : Prés de la Ville, phot., 27 et 28 avril (J.-C. Delattre, R. Baeta, C. Lelaure, E. Sansault, L. Sallé *et al.*).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). À nouveau une excellente année pour cette bécassine, avec neuf données, comme en 2007, sachant qu'aucune autre année n'a collecté plus de quatre mentions depuis 1981. Toutes les données s'inscrivent dans ce qui est connu du passage pré-nuptial en France, avec même une mention spéciale pour l'oiseau des Pyrénées-Orientales entamant des parades nuptiales !

**BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (44/42) (35/34 – 2/2)**

**Ille-et-Vilaine** – Montreuil-sous-Pérouse : barrage de la Cantache, juv., phot., du 1<sup>er</sup> au 18 novembre (M. Letue, Y. Blat *et al.*).

**Vendée** – Noirmoutier-en-l'Île : Île de Noirmoutier, phot., 1<sup>er</sup> mai (D. Robard).

(Amérique du Nord). Il n'existait jusqu'ici que six mentions pré-nuptiales de cette espèce en France, dont cinq entre le 20 avril et le 10 mai. Voici donc la septième, à une date classique... La donnée automnale constitue une première pour l'Ille-et-Vilaine. À noter également qu'il manque encore une donnée finistérienne à l'appel, et qu'un bécassin a priori non identifié spécifiquement a été signalé à Moëze, Charente-Maritime, le 29 septembre 2011.

**CHEVALIER BARGETTE *Xenus cinereus* (126/110) (102/88 – 3/3)**


**Bouches-du-Rhône** – Arles : Marais du Vigéirat, ad., phot., 13 août (V. Palomares *et al.*).

**Charente-Maritime** – Loix-en-Ré : île de Ré, Basse Lasse, phot., du 27 mai au 5 juin (J. Gernigon).

**Gironde** – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, phot., 6 août (S. Bonifait).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Trois données en 2011, c'est conforme à la moyenne, sachant qu'il manque deux données. Les dates et localités sont classiques.

fig. 6. Les limicoles néarctiques en France : nombre d'espèces (en rouge) et nombre d'oiseaux (en vert) homologués depuis 1981 (sauf Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*). Le nombre d'espèces impliqué dans cet épisode avait déjà été atteint en 1995, 1998 et 2008, mais le nombre d'individus est près de deux fois supérieur au précédent record. *Annual number of species (red) and records (green) of nearctic waders in France, 1981-2011.*



**CHEVALIER GRIVELÉ *Actitis macularius* (15/17) (15/17 – 2/2)**

**Essonne** – Grigny, phot., du 16 au 18 mai (C. Fraigneau, J. Sannier *et al.*).

**Finistère** – Plovan : Nérizellec, juv., phot., du 13 au 27 septembre (M. Canévet *et al.*).

(Amérique du Nord). Après la mention du Puy-de-Dôme en mai 2010 (V. *Ornithos* 18-6 : 345), voici la troisième observation printanière de cette espèce, qui est également la troisième pour l'intérieur des terres... La présence dans le Finistère en septembre est évidemment plus attendue, même si cette espèce reste d'apparition rare en France. À noter que deux fiches reçues tardivement, en provenance du Finistère et de Charente-Maritime n'ont pas encore été examinées.

**PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor* (77/78) (58/60 – 2/2)**

**Gironde** – Braud-et-Saint-Louis : Parc ornithologique Terre d'Oiseaux, fem., phot., 1<sup>er</sup> mai (M. Sannier *et al.*); Le Teich : Parc ornithologique du Teich, phot., du 15 au 22 août (F. Jouandoudet, S. Tardy *et al.*).

**2010 Ille-et-Vilaine** – Saint-Suliac, juv., phot., du 13 au 15 septembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Amérique du Nord). Il semble y avoir une légère recrudescence des données de cette espèce depuis 2009, puisque sur les 14 mentions de la décennie 2002-2011, dix ont été obtenues au cours des trois dernières années (aucun oiseau en 2004, 2005, 2007 et 2008). Reste que la moyenne des années 1970 et 1980 était de trois oiseaux par an... Les deux mentions de 2011 proviennent de Gironde qui, d'année en année, prend des airs d'Eldorado des limicoles rares en France !



15. Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor*, 1<sup>er</sup> hiver, Le Teich, Gironde, août 2011 (Aymeric Le Calvez). *First-winter Wilson's Phalarope.*




fig. 7. Nombre annuel de Mouettes de Bonaparte *Chroicocephalus philadelphia* homologuées en France depuis 1981. Annual number of accepted records (individuals) of Bonaparte's Gull in France, 1981-2011.

#### MOUETTE DE BONAPARTE *Chroicocephalus philadelphia* (27/26) (26/25 – 1/1)

**Gironde** – Le Teich : Parc ornithologique du Teich, 2<sup>e</sup> année, phot., 1<sup>er</sup> et 2 mai (L. Barbaro, C. Feigné, F. Jouandoudet *et al.*).

**2008 Vendée** – Saint-Hilaire-de-Riez : Plage de Sion, ad., phot., du 11 août au 14 septembre puis 5 décembre (G. Besseau).

(Amérique du Nord). Voici la première mention de cette espèce pour l'Aquitaine, à une date parfaitement conforme à ce qui est noté depuis quelques années. 2011 est la neuvième année consécutive lors de laquelle la Mouette de Bonaparte est vue en France, alors qu'il n'existe que quatre mentions antérieures à l'année 2000 !

#### MOUETTE ATRICILLE *Larus atricilla* (41/40) (36/35 – 2/1)

**Hérault** – Étang de Pierreblanche, ad., 3 mai (X. Rufay).

**Pyrénées-Orientales** – Port-Vendre, ad., phot., 4 mai (M. Narcy).

(Amérique du Nord). Il n'existait que trois mentions de cette espèce le long des côtes méditerranéennes, et deux pour le mois de mai. Ces deux nouvelles données concernent à l'évidence le même oiseau.

#### MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (32/31) (31/30 – 3/2)

**Manche** – Saint-Pair-sur-Mer : plage du Thar, 2<sup>e</sup> hiver, vidéo, phot., 15 octobre (A. Corbeau).

**Morbihan** – Erdeven : Étang de Keravéon, ad., phot., 25 octobre (Y. Blat) ; Gâvres, ad., 3 décembre (T. Zgirski), probablement le même oiseau que celui d'Erdeven.

**2007 Vendée** – Saint-Hilaire-de-Riez : le Grand Marais, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 22 avril (G. Besseau *et al.*).

(Amérique du Nord). Un petit afflux a eu lieu dans le nord-ouest européen à l'automne 2011, qui s'est également manifesté dans l'ouest de la France. Une donnée s'ajoute par ailleurs pour 2007, qui en compte désormais quatre.

#### GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides* (337/371) (329/362 – 8/8)

**Charente-Maritime** – La Brée-les-Bains : le Port du Douhet, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 17 décembre (L. Jomat).

**Finistère** – Concarneau, 2<sup>e</sup> hiver, phot., du 19 décembre au 8 février 2012 (S. Nedellec *et al.*) ; Saint-Guénolé : port, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 20 au 26 décembre (C. Morvan, M. Canévet *et al.*).

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert de Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 22 décembre (S. Reeber).

**Maine-et-Loire** – La Séguinière, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 20 décembre au 13 janvier 2012 (A. Fossé *et al.*).

**Morbihan** – Gâvres, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 17 décembre (Y. Blat) ; Gâvres, 1<sup>er</sup> hiver, 24 décembre (A. Stoquert, T. Zgirski).

**2009 Nord** – Cantin : carrière, 1<sup>er</sup> hiver, 22 février (A. Liger).

**2009 Vendée** – Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Givrand, 1<sup>er</sup> hiver, du 16 janvier au 29 avril (G. Besseau) ; Saint-Gilles-Croix-de-Vie : Port de pêche, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 26 janvier (G. Besseau) ; Saint-Hilaire-de-Riez : Plage de Sion, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 8 février (G. Besseau).

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *kumlieni* (15/14) (15/14 – 1/1)

**Maine-et-Loire** – La Séguinière, la Tessoualle : lac du Verdon, Angers : lac du Maine et Champteussé-sur-Baconne, ad., phot., du 10 au 23 février (A. Fossé *et al.*).

(Arctique canadien, Groenland). Un Goéland de Kumlien adulte dans le Maine-et-Loire constituait certainement une surprise pour ce début d'année 2011, d'autant qu'aucun Goéland à ailes blanches n'était signalé par ailleurs en France... Sept autres observations pour cette année, toutes en provenance du centre-ouest de la France, et toutes obtenues entre le 17 et le 24 décembre. Il s'agit en fait des prémices d'un afflux majeur, le second par ordre d'importance après celui de début 2009, qui se déroulera jusqu'au début du printemps 2012.

#### STERNE BRIDÉE *Onychoprion fuscata* (12/12) (8/8 – 1/1)

**Gironde** – La Teste-de-Buch : Banc d'Arguin, ad., 22 juin (M. Grandpierre *et al.*).

(Mers tropicales). Cette sterne reste d'apparition très rare en France, puisque les trois dernières mentions remontent à 2003, 1997 et 1988... La date est classique, puisque la moitié des 12 données françaises ont été obtenues en juin, tout comme l'est la localité, qui en est à sa cinquième Sterne fuligineuse !

#### STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (44/9) (41/8 – 1/0)

Individus présentant les caractéristiques de la Sterne élégante.

**Vendée** – Île de Noirmoutier : Barbâtre, polder de Sébastopol, ad., phot., du 11 avril au 25 mai (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). L'individu habituel, bague blanc/rouge à la patte gauche, et métal/blanc à la patte droite est revu sur son site de prédilection, sans qu'il y ait eu production de poussin cette année semble-t-il... Les résultats définitifs des analyses génétiques sont toujours attendus, mais il s'agit très certainement là d'un hybride, présentant néanmoins des caractéristiques phénotypiques qui entrent dans la variation normale de la Sterne élégante. Un autre oiseau bague vert/jaune à la patte gauche et métal/blanc à la patte droite a d'abord été vu le 10 avril à Saint-Trojan-les-Bains, Charente-Maritime, puis a lui-aussi niché sur Noirmoutier. Il y a été vu du 15 mai au 13 juillet au moins, accompagné d'un poussin volant en fin de période. Ce second oiseau présente des caractères plus nettement hybrides.

#### STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (46/38) (39/23 – 2/2)

**Bouches-du-Rhône** – Arles : Camargue, Étang de Beauduc, ad., 15 juillet (Y. Kayser).

**Rhône** – Arnas : Gravière du Pré de Joux, ad., phot., 2 juillet (F. Le Gouis *et al.*).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Deux nouvelles données en 2011, à des dates similaires et conformes au pic d'occurrence habituel, qui a lieu en juillet-août. Si les Bouches-du-Rhône sont le département le plus visité, la mention du Rhône est nettement plus originale : il s'agit du premier contact avec cette espèce dans l'intérieur des terres, mais l'espèce a déjà été contactée plusieurs fois sur le lac Léman !

#### GUILLEMOT À MIROIR *Cephus grylle* (59/70) (37/42 – 1/1)

**Nord** – Loon-Plage : le Clipon, juv., 17 septembre (B. Paepegaey *et al.*).

(Arctique, Atlantique Nord). Une seule donnée en 2011, à une date relativement précoce, mais en un lieu classique...

#### MARTINET CAFRE *Apus caffer* (0/0) (0/0 – 1/1)

**Hérault** – Lespignan : Étang de la Matte, 26 juin (Y. Kayser, D. Clément).

(Afrique subsaharienne, Maroc et localement péninsule Ibérique). Première mention française de ce martinet qui fera prochainement l'objet d'une note dans *Ornithos*.

**PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewski* (10/10) (10/10 – 1/1)**

**Manche** – Courtils, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 30 novembre au 9 janvier 2012 (S. Provost, A. Rougeron *et al.*).

(Sud de la Sibérie, Chine et Nord-Est de l'Inde). Si ce pipit n'a été ajouté à la liste des oiseaux de France qu'en 1998, il y a été contacté au cours de huit années lors de la dernière décennie... Un Pipit de Godlewski avait d'ailleurs déjà stationné du 22 janvier au 17 février 2008 tout près de là, à Genêts (V. *Ornithos* 16-5 : 300).

**PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (15/15) (15/15 – 3/3)**

**Finistère** – Ouessant : Ti Uhella, phot., du 27 au 31 octobre (B. Louboutin, F. Jiguet *et al.*).

**Manche** – Courtils : la Roche Torin, phot., du 26 décembre au 6 janvier 2012 (W. Raitière, A. Mousseau, P.-P. Evrard *et al.*).

**Somme** – Saint-Quentin-en-Toumont : parc du Marquenterre, phot., 14 octobre (A. Leprêtre, J. Buissart *et al.*).

(Sibérie, Extrême-Orient). Année tout à fait remarquable, puisque c'est la première fois que trois Pipits à dos olive sont signalés au cours de la même saison... À noter aussi une première mention picarde et une seconde pour la Manche, à peine deux ans après celle du 15 octobre 2009 à Carolles (V. *Ornithos* 17-6 : 390). Cette dernière donnée constitue également la première mention hivernale en France. Cet oiseau a été découvert par des observateurs venus voir le Pipit de Godlewski hivernant sur le site et ayant fait coup double ! La mention ouessantine, enfin, est plus classique puisqu'il s'agit de la douzième pour l'île...

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (88/108) (77/95 – 4/4)**

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans ».

**Haute-Corse** – Rogliano : Macinaggio, mâle ad., 28 avril (F. Portier).

**Hautes-Alpes** – Saint-Bonnet-en-Champsaur : L'Estiquère-Poligny, mâle, enr., phot., du 9 avril au 10 juillet (T. Joubert, H. Pottiau).

**Haute-Saône** – Marnay, mâle, phot., 14 avril (S. Maas *et al.*).

**Haute-Savoie** – Passy, mâle, phot., 13 et 23 avril (M. Bethmont, M. Robert, J. Guilberteau, F. Bultel).

**2005 Ain** – Crozet, mâle ad., 7 mai (B. Piot *et al.*).

(Balkans jusqu'en Iran et en Afghanistan). Retour à la normale après les 21 oiseaux de 2010, avec quatre arrivées typiques du mois d'avril et de départements de l'est de la France... Le stationnement de l'oiseau des Hautes-Alpes est en revanche nettement plus original par sa durée, puisqu'il s'agit d'un nouveau record en la matière, dépassant celui d'un mâle du 23 mai au 27 juin 1982 dans le Loiret...



16. Pipit à dos olive  
*Anthus hodgsoni*, Ouessant,  
Finistère, octobre 2011  
(Frédéric Jiguet).  
Olive-backed Pipit

17. Robin à flancs roux  
*Tarsiger cyanurus*, Var,  
décembre 2011 (Hubert  
Pottiau). First-winter  
Red-flanked Bluetail.

**BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (31/32) (31/32 – 2/2)**

**Ariège** – Mazères, mâle, phot., 29 avril (M. Vié).

**Vendée** – Île d'Yeu : Pointe de la Gournaise, 1<sup>er</sup> hiver, 28 août (X. Hindermeier, M.-P. Hindermeier).

**2009 Pyrénées-Orientales** – Canet-en-Roussillon : Cabane de Pêcheurs, 1<sup>er</sup> hiver, 11 septembre (Y. Dubois).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). Une « petite » année après les cinq oiseaux de 2010 et les (désormais) six de 2009, qui apporte néanmoins une première donnée pour l'Ariège et la région Midi-Pyrénées...

**AGROBATE ROUX *Cercotrichas galactotes* (14/14) (9/9 – 1/1)**

**Bouches-du-Rhône** – Arles : Camargue, Phare de la Gacholle, sous-espèce *galactotes*, phot., 17 juin (T. Blanchon, T. Galewski *et al.*).

(Circum-Méditerranéen). Apparition remarquable de cette espèce, qui ne s'était pas montrée en France depuis 2003 dans l'Ariège (V. *Ornithos* 12-1 : 26). Date et lieu ne sont pas étonnants, et il s'agit même de la quatrième mention camarguaise.

**ROBIN À FLANCS ROUX *Tarsiger cyanurus* (9/9) (9/9 – 3/3)**

**Aude** – Leucate : la Franqui, mâle ad., phot., 31 octobre (T. Guillosson *et al.*).

**Manche** – Granville : Île de Chausey, fem./1<sup>er</sup> hiver, phot., 15 octobre (S. Provost).

**Var** – Draguignan, phot., fem./1<sup>er</sup> hiver, du 18 au 23 décembre (P. Gaillard, H. Pottiau *et al.*).

(De la Finlande à la Sibérie orientale et au Japon). L'année 2011 confirme une nouvelle fois la fréquence d'apparition croissante de cette espèce en France... Depuis la première mention en 1993, il existe quatre données entre 2002 et 2008, deux en 2009, deux en 2010 et donc trois en 2011... La répartition des observations est également remarquable, puisqu'elles constituent trois premières régionales, dont deux en dehors du littoral Manche-Atlantique. Deux autres faits marquants enfin, l'oiseau de l'Aude était un mâle adulte, plumage jusque là jamais observé en France, et la date de stationnement de l'oiseau du Var est hivernale. Toutes les autres mentions françaises sont comprises entre un 9 octobre et un 16 novembre.

**ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros* (0/0) (0/0 – 1/1)**

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *phoenicuroides*.

**Vendée** – Île d'Yeu : la Bergerie, mâle, phot., 12 novembre (B. Isaac, O. Penard, J.-M. Guilpain).

(Asie centrale, du Tien Shan à la Mongolie). Première mention française de cette sous-espèce géographiquement éloignée, et bien distincte, du Rougequeue noir. Elle a été obtenue dans le cadre d'un afflux ressenti à l'échelle de l'Europe de l'Ouest.

**TARIER PÂTRE *Saxicola torquatus* (35/36) (31/32 – 1/1)**

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *maurus*, appelée « Tarier oriental ».

**Manche** – Carolles : Cabane Vauban, fem. 1<sup>er</sup> hiver, phot., 20 octobre (S. Provost *et al.*).

(Mer Blanche, Sibérie). Une seule donnée, tout à fait classique quant au lieu et à la date.

**TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (29/30) (28/28 – 5/5)**

**Aude** – Gruissan : salins, mâle 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 8 au 12 novembre (T. Guillosson, M. Boch *et al.*).

**Côtes-d'Armor** – Pleubian, mâle 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 19 au 23 novembre (F. Herrmann, C. Morvan *et al.*).

**Finistère** – Ouessant : Créac'h, mâle 1<sup>er</sup> hiver, phot., 13 et 14 novembre (F. Roche).

**Manche** – Chausey : Grande Île, fem. 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 17 au 19 novembre (S. Provost *et al.*); Gatteville-le-Phare, mâle 1<sup>er</sup> hiver, phot., 19 et 20 novembre (A. Verneau, V. Verneau *et al.*).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). Bel afflux pour ce traquet avec cinq mentions, puisqu'il s'agit de la seconde meilleure année après 1997 et ses dix oiseaux. Les arrivées sont groupées, entre le 8 et le 19 novembre. Il s'agit de la quatrième mention pour le Finistère (et la troisième pour Ouessant), de la seconde pour l'Aude, mais la Manche et les Côtes-d'Armor sont visitées pour la première fois.

**GRIVE À DOS OLIVE *Catharus ustulatus* (7/7) (5/5 – 1/1)**

**Finistère** – Ouessant : Pount Kam, phot., du 15 au 18 octobre (N. Issa *et al.*).

(Amérique du Nord). Huitième mention française de cette grive nord-américaine. Après une observation sur l'île de Sein en 2010 (V. *Ornithos* 18-6 : 352), Ouessant accueille l'espèce pour la cinquième fois...

18. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, Ouessant, Finistère, novembre 2011 (François Roche). *First-winter Desert Wheatear*.



19. Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus*, Pas-de-Calais, octobre 2011 (Christophe Capelle). *Pallas's Warbler*.

**GRIVE DE SIBÉRIE *Zoothera sibirica* (6/6) (2/2 – 1/1)**

**Morbihan** – Hoëdic, fem. 1<sup>er</sup> hiver, sous-espèce *sibirica*, capt., phot., 20 octobre (F. Hémerly *et al.*).

(Sibérie). Étonnante découverte que cette Grive de Sibérie, à peine trois ans après la précédente, du 15 octobre 2008 sur l'île de Sein, Finistère (V. *Ornithos* 16-5 : 303). Les critères relevés ont permis de confirmer qu'elle appartenait à la sous-espèce nominale, la plus probable en Europe de l'Ouest.

**ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (39/39) (39/39 – 2/2)**

**Bouches-du-Rhône** – Arles : Réserve Naturelle de Camargue, 1<sup>er</sup> hiver, capt., phot., 21 septembre (J. Paoli *et al.*).

**Vendée** – Île d'Yeu : dune de la Grande Conche, 1<sup>er</sup> hiver, 16 et 17 octobre (X. Hindermeier, C. Rideau *et al.*).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Deux données comme en 2010, ce qui est d'ailleurs conforme à l'occurrence moyenne de l'espèce depuis sa première apparition en France en 1990. Les deux départements avaient déjà été visités, et les dates sont elles aussi normales.

**FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (76/78) (49/50 – 2/2)**

**Doubs** – Bannans, 1<sup>er</sup> hiver, 10 septembre (D. Michelat).

**Finistère** – Île de Sein, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 10 et 11 octobre (F. Garcia, R. Mulder *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). La donnée du Doubs constitue une première pour la Franche-Comté, tout comme celle de Sein est une première pour l'île ! Les dates s'inscrivent bien dans ce qui est connu du passage postnuptial de l'espèce en France.

**FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans* (22/22) (21/21 – 2/2)**

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *albistriata*.

**Bouches-du-Rhône** – Eyguières : les Opies, mâle, phot., 22 avril (A. Vernet, P. Vernet).

**Haute-Corse** – Macinaggio : Baie de Tamarone, mâle, 1<sup>er</sup> mai (P. Crouzier).

**2008 Yvelines** – Beynes : Camp de Frileuse, mâle ad., capt., phot., 7 mai (*vide* P. Le Maréchal).

(De la Slovénie à l'ouest de la Turquie). Deux nouvelles mentions en 2011, à des dates et en des localités méditerranéennes classiques. La donnée des Yvelines est évidemment plus originale, même si bien d'autres Fauvettes passerinettes contactées dans le Nord de la France doivent appartenir à cette sous-espèce.

**POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (25/25) (23/23 – 2/2)**

**Ain** – Ceyzeriat : les Conches, 25 août (P. Crouzier).

**Finistère** – Ouessant : Ty Crenn, 23 et 24 septembre (B. Delahaie, J.-C. Delattre, D. Davignon *et al.*).

(De la Baltique à la Sibérie centrale et l'Afghanistan). Deux données en 2011 comme en 2010. La mention ouessantine est la dixième pour l'île, à une date qui correspond au pic d'occurrence de l'espèce en France. La mention de l'Ain est plus extraordinaire, car obtenue au même endroit (et par le même observateur...) que la première mention régionale, du 20 octobre 1986 !

**POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (97/99) (95/97 – 8/8)**

**Charente-Maritime** – La Brée-les-Bains : les Alliécelles, 3 octobre (L. Jomat).

**Finistère** – Ouessant : Kerlann, 9 octobre (B. Couronne *et al.*); Cost ar Reun et Kun, phot., 20 octobre (D. Godreau, T. Guillosson *et al.*).

**Morbihan** – Bangor : Vazen, phot., 29 octobre (M. Giroud *et al.*).

**Nord** – Dunkerque : Musée des Arts contemporains, phot., 12 et 13 novembre (C. Capelle, J. Piette *et al.*); Loon-Plage : Capitainerie, phot., 13 novembre (F. Gabillard, J. Piette *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Audinghen : Floringzelle, phot., 30 et 31 octobre (C. Capelle *et al.*).

**Vosges** – Charmes, phot., 14 octobre (E. Lebois).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Après les sept oiseaux de 2010, à nouveau une très bonne année, ex-aequo avec 1997 et 2005, et surpassée seulement par 2003 et ses neuf Pouillots de Pallas. Les dates s'étalent classiquement entre début octobre et mi-novembre, et les départements visités l'avaient déjà été, à l'exception de la Charente-Maritime, et surtout des Vosges. Il ne s'agit là que de la sixième mention française venue d'un département intérieur.

**POUILLOT BRUN** *Phylloscopus fuscatus* (50/51) (50/51 – 2/2)

**Finistère** – Ouessant: Ar Reun et Park Raden, phot., du 25 au 31 octobre (J.-Y. Barnagaud *et al.*), Arland, phot., 29 et 30 octobre (F. Jiguet *et al.*).

**2010 Finistère** – Ouessant, phot., 2 novembre (photo sur [ouessant.observado.org](http://ouessant.observado.org)).

(Sibérie, Mongolie, Chine). Deux nouvelles apparitions de l'espèce en 2011, au cours de la dernière décade d'octobre, pic d'occurrence de l'espèce en France. Ouessant totalise un peu plus de la moitié des mentions françaises de ce pouillot.

**POUILLOT DE SCHWARZ** *Phylloscopus schwarzi* (12/12) (12/12 – 0/0)

**1996 Morbihan** – Hoëdic, phot., du 21 au 26 octobre (P.J. Dubois, P. Crouzier *et al.*).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Une ancienne donnée, précédemment acceptée comme Pouillot brun *P. fuscatus*, a été révisée sur la base des photos qui avaient été prises alors, et a conduit à considérer qu'il s'agissait en fait de l'un des deux Pouillots de Schwarz présents sur Hoëdic cet automne-là.

**GOBEMOUCHE DE LA TAÏGA** *Ficedula albicilla* (0/0) (0/0 – 0/0)

(Sibérie, Asie centrale et de l'Est). Les connaissances sur l'identification de cette espèce s'affinent et il apparaît que certains Gobemouches nains observés en Europe de l'Ouest présentent des caractéristiques pouvant évoquer le Gobemouche de la taïga, les deux taxons ayant d'ailleurs été considérées comme conspécifiques il y a peu. Pour cette raison, l'acceptation de données de cette espèce doit être basée sur une description très solide, accompagnée de photographies et si possible d'un enregistrement du cri (diagnostique). Cela a conduit le CHN à réviser les trois données françaises précédemment acceptées, ainsi qu'une nouvelle fiche descriptive, à l'aune de cette nouvelle exigence. L'ensemble des données a été refusé suite à ce réexamen. Il n'existe donc plus de mention homologuée de cette espèce en France.

**MESANGE À LONGUE QUEUE** *Aegithalos caudatus*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *caudatus* (74/468) (74/468 – 37/192)

**Ardennes** – Ville-sur-Lumes: Fontaine du Robin des Loups, appariée avec une Mésange à longue queue locale, phot., du 20 au 24 mars (Q. Revel).

**Aube** – Ormes: les Rayons, 9 ind., 2 janvier (D. Petit); Troyes, 15 ind., 2 janvier (S. Pinget), le Bas Trévois, 17 ind., 10 février (Y. Brouillard, J.-P. Couasné).

**Aveyron** – Le Clapier, 3 ind., phot., 10 mars (F. Legendre).

**Calvados** – Hérouville-Saint-Clair, 8 ind., phot., 19 janvier (E. Robbe).

**Côte-d'Or** – Dijon, phot., 4 février (R. Petit); Trugny, 19 mars (A. Rougeron).

**Doubs** – Fournet-Blancheroche: Biaufond, 4 ind., 7 janvier (S. Jacquin); Besançon, 4 ind., 21 mars (M. Giroud *et al.*).

**Eure** – Val-de-Reuil: la Grande Noë, phot., 11 février (D. Basley).

**Haute-Savoie** – Vallorcine: le Chanté, 2 ind., phot., 10 mars (D. Rodrigues *et al.*).

**Haut-Rhin** – Westhalten, 6 ind., phot., 8 janvier (J. Guhring).

**Hauts-de-Seine** – Bagneux: Cimetière Parisien, 2 ind., du 14 janvier au 11 février (A. Pataud).

**Isère** – Beauvoir-en-Royans: centrale hydroélectrique sur l'Isère, 2 ind., 1<sup>er</sup> janvier (S. Laurencin).

**Loir-et-Cher** – Couffy, 6 ind., phot., 16 janvier (C. Picoux).

**Maine-et-Loire** – Beaufort-en-Vallée, 17 janvier (M. Gys).

**Marne** – Bayard-sur-Marne, 4 ind., phot., du 5 janvier au 19 février (L. Parisel *et al.*); Arrigny: lac de Der-Chantecoq, digue nord, 6 ind., phot., 16 janvier (F. Leviez); Reims: Parc de Champagne, 4 ind., 16 février (A. Redont *et al.*).

**Meurthe-et-Moselle** – Lenoncourt: Bois du Four, 5 ind., 9 janvier (R. Lécaille); Nancy, environ 50 ind. en plusieurs bandes, 15 janvier (J. François), parc de la Pépinière, 7 ind., phot., du 18 au 31 janvier (G. Caucanas *et al.*), comptabilisés parmi les précédents; Tomblaine: Île du Foulon, 4 ind., phot., 6 mars (G. Caucanas).

**Meuse** – Lachaussée, 4 ind., phot., 2 mars (A. Sponga).

**Moselle** – Courcelles-sur-Nied, 2 ind., 21 février (A. Sponga *et al.*); Créhange, 2 ind., 8 mars (A. Sponga).

**Nord** – Fretin, 3 ind., phot., du 5 janvier au 12 février (C. Capelle); Zuydcoote, 3 ind., phot., du 20 au 25 février (S. Pézeril et S. Libessart *fade* J. Piette).

**Oise** – Beauvais, 8 ind., du 20 janvier au 10 mars (V. Condal).

**20.** Pouillot brun  
*Phylloscopus fuscatus*,  
Ouessant, Finistère,  
octobre 2011 (Frédéric  
Jiguet). Dusky Warbler.



**Pas-de-Calais** – Boulogne-sur-Mer, 4 ind., phot., 16 janvier (P.J. Dubois *et al.*).

**Rhône** – Vaux-en-Valin: parc de Miribel-Jonage, 5 ind., phot., 3 janvier (G. Brouard).

**Saône-et-Loire** – Bragny-sur-Saône, 2 ind., 5 février (J.-M. Frolet).

**Savoie** – Le Bourget-du-Lac: Domaine de Buttet, 2 ind., phot., 8 janvier (J.-C. Delattre).

**Seine-et-Marne** – Congis-sur-Théroutte, phot., 18 mars (J. Bottinelli).

**Var** – Les Salles-sur-Verdon, 8 ind., 26 janvier (C. Xhardez).

**Vosges** – Charmes, 5 ind., phot., 3 février (B. Kernel).

**2010 Alpes-Maritimes** – Villeneuve-Loubet, 15 ind., phot., 4 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Aube** – Soulaines-Dhuys: Domaine de Saint-Victor, phot., 1<sup>er</sup> décembre (P. Millioz *et al.*).

**2010 Bas-Rhin** – Strasbourg, 5 ind., phot., 12 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Erstein, 5 ind., phot., du 14 au 18 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Plobsheim, 4 ind., 14 novembre (Y. Carasco), et non 4 novembre comme publié précédemment (V. *Ornithos* 186: 357).

**2010 Charente-Maritime** – Saint-Denis-d'Oléron: Île d'Oléron, Prise des Russons, phot., du 4 au 11 décembre (O. Lалуque *et al.*).

**2010 Côte-d'Or** – Til-Châtel, 15 ind., phot., 29 octobre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Drôme** – Saint-Marcel-lès-Valence, 3 ind., phot., du 30 novembre au 10 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Haute-Marne** – Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, 6 ind., phot., du 12 au 25 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Hautes-Alpes** – Le Monétier-les-Bains, phot., 3 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Loire** – Feurs: Étang de la Dame, 2 ind., phot., 31 décembre et 1<sup>er</sup> janvier 2011 (B. Raffin, A. Faure *et al.*), et non 31 décembre seulement (V. *Ornithos* 186-6: 356).

**2010 Loiret** – Cerdon, 4 ind., phot., 6 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Loir-et-Cher** – La Chaussée-Saint-Victor, phot., 9 décembre (G. Fauvet).

**2010 Marne** – Châlons-en-Champagne, 14 ind., phot., du 1<sup>er</sup> au 12 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Nièvre** – Mars-sur-Allier et Saint-Pierre-le-Moutier, 2 ind., 27 novembre, 1 ind., 11 décembre, 3 ind., 12 décembre, 2 ind., 15 décembre, 11 ind., 17 décembre, 1 ind., 22 décembre, 6 ind., 27 décembre, 1 ind., 6 janvier 2011 (S. Coquery *et al.*).

**2010 Nord** – Gravelines: Haie de Rexam, 3 ind., 26 octobre (P. Dufour, J. Dumont *et al.*).

**2010 Vaucluse** – Aubignan, 2 ind., 30 et 31 décembre (T. Chatel).

**2010 Vosges** – Anould: Col du Plafond, 7 ind., phot., 28 octobre (V. Palomares), 10 ind., 29 octobre (V. Palomares), 2 ind., 31 octobre (V. Palomares).

Individus acceptés comme Mésange à longue queue « à tête blanche » (36/94) (36/94 – 22/42)

**Aisne** – Barzy-sur-Marne, phot., du 19 mars au 17 avril (A. Boussemart, L. Gavory).

**Allier** – Saint-Plaisir, 7 mars (A. Trompat).

**Ardennes** – Les Ayvelles, 15 janvier (J. Winne); Gespunsart, 19 février (Q. Hallet); Grandchamps, phot., apparée avec une Mésange à longue queue locale, construction d'un nid, 27 mars (J. Winne).

**Doubs** – Morre: Marais de Saône, 27 janvier (J. Langlade).

**Gard** – Arre: Rieusset, 5 ind., 7 janvier (A. Laurent); Aumessas: Ruisseau d'Albagne, 3 ind., 10 et 11 février (A. Laurent).

**Haute-Savoie** – Chamonix-Mont-Blanc: Centre sportif, 2 ind., 5 janvier (C. Giacomo).

**Isère** – Allevard, 9 et 10 février (M.-H. Espada).

**Loire** – Arthun: les Varennes, 2 ind., 8 janvier (B. Raffin *et al.*).

**Meurthe-et-Moselle** – Villers-lès-Nancy: Avenue Malraux, 4 ind., du 2 janvier au 9 février (R. Lécaille); Vandoeuvre-lès-Nancy, 2 ind., 29 et 30 janvier (P. Behr); Malzéville: bords de la Meurthe, 4 ind., phot., 16 et 17 février (J. Lede).

**Meuse** – Heudicourt-sous-les-Côtes: lac de Madine, 2 ind., 6 février (J. François).

**Moselle** – Ban-Saint-Martin, 28 janvier (J.-L. Calthala); Illange: Port, 3 ind., 17 février (J.-L. Calthala); Coigny: Bois d'Aubigny, 7 mars (J.-L. Calthala).

**Nord** – Warneton, phot., 29 décembre (O. Fontaine).

**Pas-de-Calais** – Hinges, phot., du 20 janvier au 17 février (B. Compagnon *et al.*).

**Puy-de-Dôme** – Saint-Pierre-le-Chastel: Ruisseau de Mazayes, 25 février (S. Heinerich).

**Ville-de-Paris** – Paris: Bois de Boulogne, lac inférieur, 19 janvier (L. Moussiegt).

**2010 Alpes-Maritimes** – Saint-Étienne-de-Tinée, phot., 12 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Aube** – Rosières-près-Troyes, phot., 20 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Haute-Loire** – Retournac, 2 ind., phot., 8 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Hautes-Alpes** – La Motte-en-Champsaur, phot., 14 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Haut-Rhin** – Saint-Louis: Petite Camargue Alsacienne, 2 ind., 21 décembre (C. Pinçon).

**2010 Moselle** – Woippy: le Louvière, 17 novembre (J.-L. Calthala), 12 décembre (J.-L. Calthala); Maizières-lès-Metz: Parc de Brioux, 3 ind., phot., 30 novembre (J.-L. Calthala); Moulins-lès-Metz: Étang de Scy, 3 décembre (J.-L. Calthala).

**2010 Rhône** – Décines-Charpieu, 4 ind., phot., 11 et 12 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Somme** – Le Crotoy, 24 octobre (A. Boussemart *et al.*).

**2010 Territoire-de-Belfort** – Faverois, 3 ind., 20 novembre (E. Vadam *et al.*).

**2010 Vosges** – Chamagne, 12 décembre (B. Kernel *et al.*).

**2009 Moselle** – Woippy: les Petites Trappes, phot., 2 août (J.-L. Calthala).

**2008 Moselle** – Woippy: Leschire, 2 ind., 13 janvier (J.-L. Calthala), 3 août (J.-L. Calthala).

**2004 Moselle** – Woippy: Leschire, du 14 février au 13 mars (J.-L. Calthala).

**2004 Moselle** – Woippy: Leschire, 5 ind., 10 janvier (J.-L. Calthala).

(Sous-espèce *caudatus*: Fennoscandie, Pologne et Russie). L'un des événements de l'hiver 2010-2011 fut cet afflux de Mésanges à longues queues de la sous-espèce nominale, dont rappelons-le, aucune mention n'était authentifiée pour la France jusque là (Dubois *et al.* 2008). L'identification de ce taxon est compliquée par l'existence de nombreux intermédiaires en provenance des zones de sympatrie avec d'autres taxons, dont certains montrent une tête blanche. Afin de ne pas rejeter les nombreuses descriptions ne donnant pas suffisamment d'éléments pour éliminer la possibilité de tels intermédiaires (pattern de la nuque, des tertiaires, parties inférieures, etc.), le CHN a décidé d'accepter les individus sous une catégorie distincte, les Mésanges à longue queue « à tête blanche ». Bien entendu, la grande majorité des oiseaux acceptés comme tels sont en fait des *caudatus*, mais des éléments ont manqué pour en être sûrs (Paepegaey & le CHN 2011). Cet afflux a fait l'objet d'un article (Oliosio 2011), auquel on pourra se référer pour une analyse détaillée. Celui-ci se base sur des données dont l'immense majorité a été homologuée désormais, pour un total de 700 oiseaux. Les données présentées ici et dans le rapport précédent totalisent 660 oiseaux acceptés comme *caudatus* et 136 acceptés comme « à tête blanche », soit 796 oiseaux. Ces différences sont liées à des fiches reçues entre temps, mais également à quelques différences d'ordre

comptable. Quoi qu'il en soit, ces différences n'affectent pas la perception de cet afflux telle que proposée dans cet article. Quelques mentions d'oiseaux présentant une tête blanche ont été homologués antérieurement à cet afflux, mais les éléments disponibles ne permettent pas de s'assurer qu'il ne s'agissait pas là d'oiseaux intermédiaires également. Il n'existe donc toujours pas de mention authentifiée de cette sous-espèce en France avant l'afflux de l'hiver 2010-2011.

**PIE-GRIÈCHE ISABELLE** *Lanius isabellinus* (15/15) (15/15 – 1/1)

**Charente-Maritime** – Saint-Denis-d'Oléron: Pointe de Chassiron, juv./1<sup>er</sup> hiver, sous-espèce *isabellinus*, phot., 11 novembre (S. Thomin *et al.*).

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). Cinquième mention française de cette sous-espèce, moins d'un an après la précédente en Camargue (V. *Ornithos* 18-6: 357) et première pour la Charente-Maritime. Parmi les 15 mentions précédentes, le mois de novembre est celui qui en recueille le plus.

**ÉTOURNEAU ROSELIN** *Sturnus roseus* (191/370) (169/321 – 20/20)

**Aude** – Carcassonne, ad., 18 février (F. Fournié).

**Charente-Maritime** – Saint-Denis-d'Oléron: Pointe de Chassiron, juv./1<sup>er</sup> hiver, du 12 septembre au 8 décembre (L. Jomat *et al.*), la Perrotine, juv./1<sup>er</sup> hiver, 16 septembre (L. Jomat).

**Finistère** – Ouessant: Ar Godec, mâle 2<sup>e</sup> année, phot., 3 septembre (B. Delahaie), Lampaul, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 1<sup>er</sup> au 18 octobre (L. Sallé, F. Communier, J.-C. Delattre, D. Davignon *et al.*), Frugullou, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 2 octobre (L. Sallé), Kéridreux et Aod Meur, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 17 au 27 octobre (T. Guillosson, P. Fosty, F. Duchenne *et al.*); île de Sein, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 29 septembre au 2 octobre (Y. Kayser *et al.*).

**Morbihan** – Saint-Pierre-Quiberon, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 26 octobre (T. Zgirski, M. Diraison).

**Sarthe** – Parc-sur-Sarthe, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 13 au 15 octobre (J.-F. Darras *et al.*).

**Var** – Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 26 janvier (O. Soldi *et al.*), 2<sup>e</sup> année, phot., 5 avril (N. Gouran); Saint-Laurent-du-Var, ad., phot., 30 mai (M. Pélissier *et al.*).

**Vendée** – Île d'Yeu: plages des Bossilles et de la Borgne, juv./1<sup>er</sup> hiver, 25 août (X. Hindermeier, M.-P. Hindermeier), Plage du Cours du Moulin et Impasse de la Borgne, 2 juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 30 septembre au 2 octobre (F. Portier *et al.*), Plage de la Tourette et Cours du Moulin, 2 juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 18 au 21 octobre (X. Hindermeier *et al.*), considérés comme les mêmes que les précédents; Barbâtre: Île de Noirmoutier, la Borderie, juv./1<sup>er</sup> hiver, 16 septembre (F. Portier); Noirmoutier-en-l'Île: Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 19 septembre (D. Desmots); Saint-Hilaire-de-Riez: Pointe de la Grosse Terre, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 28 au 30 octobre (G. Besseau *et al.*).

**Vienne** – Saint-Cyr, phot., 2 mai (A. Boullah, C. Boullah).

**2010 Charente-Maritime** – Saint-Denis-d'Oléron, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., du 27 septembre au 6 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Année très supérieure à la normale en termes de fréquentation, avec un nombre de données dépassé seulement par 2001 (21 données pour 50 oiseaux) et 2002 (27 données pour 122 oiseaux). Ces deux années avaient été le théâtre d'afflux printanniers ressentis surtout le long de la frange méditerranéenne, ce qui n'a pas été le cas en 2011. Plusieurs sites traditionnels regroupent la majorité des données (îles d'Ouessant, de Sein, d'Yeu, de Noirmoutier et d'Oléron). Les mentions de la Sarthe, de l'Aude et de la Vienne, qui avait accueilli son premier Étourneau roselin l'année passée, sont évidemment plus inhabituelles.

**MOINEAU ESPAGNOL** *Passer hispaniolensis* (32/49) (29/45 – 2/2)

**Corse-du-Sud** – Bonifacio, mâle, phot., 16 août (P. Dufour).

**Haute-Corse** – Rogliano: Macinaggio, mâle, 25 avril (F. Portier).

**2010 Alpes-de-Haute-Provence** – Valensole, mâle, phot., du 19 au 22 juillet (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Après les données continentales méditerranéennes de 2008 dans les Bouches-du-Rhône, de 2009 dans les Alpes-Maritimes et de 2010 dans l'Hérault, une nouvelle mention s'ajoute pour cette année, dans les Alpes-de-Haute-Provence cette fois. Dans tous les cas, il s'agissait de mâles isolés, la plupart du temps cantonnés. Les deux mentions de 2011 en provenance de l'île de Beauté sont plus classiques.



21. Roselin githagine *Bucanetes githagineus*, Oléron, Charente-Maritime, avril 2011 (Nathan Livartowski). *Trumpeter Finch*.



22. Roselin cramois *Carpodacus erythrinus*, Leffrinckoucke, Nord, mai 2011 (Julien Piette). *Common Rosefinch*.

**ROSELIN GITHAGINE *Bucanetes githagineus* (13/14) (13/14 – 1/1)**

**Charente-Maritime** – Île d'Oléron: Vert Bois, fem. ad., phot., 14 avril (N. Livartowski).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'en Inde). Nouvelle apparition de cette espèce en France, après celles de 2008 et 2010... Et une fois de plus au printemps et le long du littoral atlantique.

**ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (199/236) (184/221 – 7/6)**

**Allier** – Montluçon, mâle 1<sup>er</sup> hiver, phot., 8 janvier (P. Chevalier *vide* A. Trompat).

**Charente-Maritime** – Saint-Clément-des-Baleines: Marais du Batardeau, juv./1<sup>er</sup> hiver, capt., phot., 22 septembre (J. Gernigon).

**Doubs** – Villers-le-Lac, mâle ad., du 29 mai au 9 juin (D. Michelat, V. Martin *et al.*); Houtaud, mâle ad., cht., 7 et 14 juin (D. Michelat).

**Finistère** – Ouessant: Kerlann, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 8 octobre (A. Rougeron *et al.*).

**Haute-Savoie** – Saint-Gervais-les-Bains: Chalets de Miage, mâle ad., 3 juin (A. Delestrade).

**Nord** – Leffrinckoucke: Dunes Dewulf, mâle 1<sup>er</sup> été, phot., 30 mai (J. Piette *et al.*).

**2010 Isère** – Saint-Paul-de-Varces, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 17 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Seine-et-Marne** – Chanfroy, cht., 29 mai (*Bull. ANVL* 86-2: 60).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). Schéma habituel pour les données de 2011, avec trois mentions en provenance des zones de cantonnement printanier (Haute-Savoie, Doubs et Nord), sans toutefois qu'une quelconque présence de femelle y ait été constatée. S'y ajoutent deux données atlantiques d'automne et, nettement plus originale, une observation hivernale dans l'Allier. Il n'existe qu'une seule autre donnée française entre décembre et février, datée du 16 décembre 1960 dans la Marne.

**SIZERIN BLANCHÂTRE *Carduelis hornemanni* (11/11) (7/7 – 0/0)**

**2008 Finistère** – Ouessant: Porz Noan, 29 novembre (A. Audevard).

(Nord de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord). Troisième mention ouessantine, les deux précédentes datant des mois d'octobre 1985 et 1986. Cette espèce n'a été vue que deux fois au cours des années 1990 et autant au cours des années 2000.

**PARULINE JAUNE *Dendroica petechia* (0/0) (0/0 – 1/1)**

**Charente-Maritime** – Mortagne-sur-Gironde: Conchemarche, fem. juv./1<sup>er</sup> hiver, groupe *aestiva*, capt., phot., 30 août (R. Musseau *et al.*).

(Amérique du Nord). Remarquable capture que celle de cette Paruline jaune, sans doute arrivée suite à l'ouragan *Irène*. Il s'agit de la première mention française de l'espèce, et de l'une des rares mentions européennes. L'espèce a été inscrite en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France par la CAF.

**BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (128/135) (115/119 – 3/4)**

**Charente-Maritime** – Moëze: Réserve Naturelle de Moëze-Oléron, du 27 janvier au 7 mars (L. Jomat *et al.*).

**Finistère** – Île de Sein, phot., 1<sup>er</sup> octobre (Y. Kayser, C. Maurer *et al.*); Ouessant: Keranchas, 2 ind., phot., du 3 au 5 octobre (L. Sallé, F. Communier *et al.*).

**2007 Finistère** – Ouessant: Ru Niou, 1<sup>er</sup> et 2 novembre (A. Liger *et al.*).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Année un peu inférieure à la moyenne avec quatre oiseaux, dont trois sur les îles bretonnes en octobre... La donnée de Charente-Maritime est intéressante dans la mesure où les cas d'hivernage restent rares en France. La durée du stationnement est aussi remarquable, et est la seconde par ordre d'importance après celle du 29 novembre 2008 au 15 mars 2009, à Ouessant.

**BRUANT MELANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (101/119) (81/96 – 3/7)**

**Alpes-de-Haute-Provence** – Saint-Geniez: l'Estachon, 4 mâles, 1 fem., 2 juv. volants, enr., phot., du 24 mai au 26 juillet (H. Pottiau, Y. Massin, L. Rose, Y. Kayser *et al.*).

**Alpes-Maritimes** – Cipières, mâle ad., phot., 26 mai (C. Lemarchand).

**Bouches-du-Rhône** – Marseille: Archipel du Frioul, mâle, 19 mai (L. Anselme *et al.*).

(Europe du Sud-Est, Asie du Sud-Ouest). Le site des Alpes-de-Haute-Provence avait déjà accueilli deux mâles du 17 juin au 3 juillet 2009, et deux mâles du 2 juin au 10 juillet 2010. Ils étaient donc quatre mâles et une femelle au moins en 2011, avec envol d'au moins deux jeunes. La donnée de Cipières pourrait également concerner une éventuelle nidification, alors que celle du Frioul s'inscrit bien dans les mouvements migratoires littoraux décelés au cours de la dernière décennie de mai.



23. Bruant nain *Emberiza pusilla*, Ouessant, Finistère, octobre 2011 (Fabrice Jallu). *Little Bunting*.



24. Vautour de Rüppell  
*Gyps rueppellii*, Rougon,  
Alpes-de-Haute-Provence,  
février 2011 (Maxime  
Gouyou Beauchamps).  
*Rüppell's Vulture.*

## ANNEXE 1 – DONNÉES EN COURS DE CATÉGORISATION PAR LA CAF

### VAUTOUR DE RÜPPELL *Gyps rueppellii* (2/1) (2/1 – 2/1)

**Alpes-de-Haute-Provence** – Rougon, ad., phot., du 22 février au 31 mars (A. Lacoste, M. Gouyou-Beauchamps *et al.*).

**Drôme** – Saint-May, ad., phot., du 20 au 29 mars, puis 9 et 10 juin (J. Traversier, C. Tessier).

(Afrique subsaharienne). Il existait déjà deux mentions de cette espèce, pour un oiseau dans la Drôme en 2003 et 2004, qui a été placé en catégorie E par la CAF. Ces nouvelles mentions pourraient concerner un seul et même oiseau erratique. La CAF travaille actuellement sur le statut de ces observations.

### PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus*

**Lot-et-Garonne** – Sérignac-sur-Garonne, ad., 17 octobre (F. Roussel).

**Yvelines** – Sandrancourt: Port-l'Ilon, ad., phot., du 11 au 19 janvier (L. Boiteux *et al.*); Méricourt, ad., phot., 5 et 6 février (P.J. Dubois *et al.*); Richebourg, ad., 26 décembre (P. François).

(Sud-est de l'Europe, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Les données franciliennes se rapportent sans doute à un seul et même oiseau, hivernant et effectuant un long séjour en France à une période où ses congénères sont en Afrique.

## ANNEXE 2 – ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)

### FLAMANT NAIN *Phoenicopterus minor* (37/17) (37/17 – 4/1)

**Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, Fangassier, 2 ad., du 24 avril au 17 juin (A. Arnaud *et al.*), Enfores de la Vignolle, ad., phot., 28 avril (P. Foulquier); Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, parking de la Comtesse, 3 ad., phot., du 17 au 20 août (V. Palomares *et al.*).

**Var** – Hyères: Salins des Pesquiers, ad., 3 mai (A. Audevard).

(Afrique tropicale). Au moins un couple a tenté de nicher deux fois en compagnie des Flamants roses *P. ruber*, avec une première tentative du 26 au 29 avril, puis une autre du 13 mai au 13 juin. Les deux essais se sont montrés infructueux, l'ensemble de la colonie de flamants ayant été perturbée par des dérangements aériens, puis partiellement détruite par de fortes pluies, et enfin soumise à la prédation par les goélands une fois la densité de la colonie réduite (A. Arnaud, Tour-du-Valat, comm. pers.). La donnée varoise est une première pour le département.

## ANNEXE 3 – LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN tient à rappeler que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée. La non-homologation d'une donnée ne préjuge évidemment pas de l'identité de l'oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité du ou des observateur(s), mais du manque de robustesse de la description, notamment au regard des archives du CHN et de l'inventaire des oiseaux de France. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non-homologation sont succinctement indiquées entre parenthèses.

### 2011

**Oie naine *Anser erythropus*** – Côte-d'Or – Pouilly-sur-Saône, phot., 7 janvier (Description avant tout axée sur un contraste de taille avec une Oie cendrée *Anser anser*, mais les conditions d'observation n'ont pas permis de noter les détails de structure de bec, de cercle orbitaire ou d'étendue du blanc autour du bec. Une incertitude plane également quant à l'âge de l'oiseau); **Meuse** – Troussay, ad., phot., 2 janvier (Les photographies montrent un oiseau globalement trop proche des Oies rieuses *Anser albifrons* à proximité pour pouvoir être une Oie naine. Les critères ayant conduit à cette identification sont l'étendue du blanc sur le front et la présence d'un cercle orbitaire jaune. Rappelons que l'Oie rieuse montre parfois un tel cercle orbitaire jaune, même si c'est moins souvent le cas chez les hivernants d'Europe continentale (*A. a. albifrons*) que chez d'autres sous-espèces. Enfin, et cela reste généralement le principal piège pour l'identification de cette espèce, il faut rappeler la présence régulière d'hybrides entre ces deux espèces, y compris en nature).

**Canard à front blanc *Anas americana*** – Creuse – Lussat: Étang des Landes, 2 mâles, phot., 29 novembre (Ces deux mâles ressemblent très fortement à des Canards à front blanc, mais quelques subtiles différences sont à noter, qui pourraient fort bien être mises sur le compte d'une hybridation, pas forcément de première génération. Parmi ceux-ci, des flancs orangés contrastant avec des parties supérieures plus grises, alors que celles-ci devraient être rosées. Par ailleurs, le front blanc est très réduit et n'atteint pas le milieu de la calotte. Le reste de la tête montre que ces oiseaux ne sont pas en plumage d'éclipse, et devraient donc présenter un front plus étendu. Quoi qu'il en soit, et en l'absence de précision sur l'âge, des détails sur les aillères, la base du bec, etc., il est préférable de se montrer prudent).

**Busard pâle *Circus macrourus*** – Alpes-Maritimes – Èze: Parc naturel de la Grande Corniche, mâle ad., 17 mai (Bien trop peu d'éléments dans la description pour savoir ce que cela pouvait être...); **Aube** – Champignol-lez-Mondeville, fem., phot., 15 mars (Il s'agit probablement d'une femelle de Busard Saint-Martin *C. cyaneus* en raison de la formule alaire visible sur les photos, le collier pâle peu marqué et le type de marques sur les primaires. À noter aussi que les secondaires ne sont pas suffisamment sombre, laissant voir un net bord de fuite noirâtre); **Gironde** – Lège-Cap-Ferret: pointe du Cap Ferret, mâle ad., 24 octobre (De bons éléments figurent dans la description, mais celle-ci reste malheureusement trop vague pour être certain de l'identité de l'oiseau); **Haute-Corse** – Ersa: Calla Genovese, mâle 1<sup>er</sup> été, phot., 27 avril (Les photographies montrent plus probablement un mâle 1<sup>er</sup> été de Busard cendré *C. pygargus*, avec une main très longue, une silhouette fine et une formule alaire plus typique de l'espèce); **Haute-Savoie** – Challonges: Sur les Crets, juv., 6 septembre (Il s'agit plus vraisemblablement d'un Busard cendré *C. pygargus* en raison de la face qui est peu contrastée, de l'étendue du blanc sous les yeux, du collier insuffisamment tranchant, du noir étendu à la pointe des rémiges externes et du bord de fuite noir sur les primaires internes), Thollon-les-Mémises: le Hucel, 1<sup>er</sup> été, 2 avril (La description est axée avant tout sur la présence d'un collier pâle, ce qui est intéressant mais reste insuffisant pour s'assurer de l'identité de l'oiseau à cet âge); **Hérault** – Lespignan: Étang de la Matte, 1<sup>er</sup> été, 17 avril (Il manque une description fine du dessous de l'aile – barres sur les primaires externes, bord de fuite des primaires internes, secondaires et axillaires – pour éliminer la possibilité d'un hybride par exemple).

**Buse féroce *Buteo rufinus*** – Bouches-du-Rhône – Cassis: Bau de la Saoupe, ad., 11 septembre (Une description trop brève, qui pourrait effectivement convenir à la Buse féroce, mais difficile d'en avoir la certitude...); **Lozère** – Le Collet-de-Dèze, 20 août (La description indique principalement une queue et un croupion roussâtre, ce qui est malheureusement insuffisant pour trancher en faveur de cette espèce).

**Buse pattue *Buteo lagopus*** – Aisne – Trefcon, 3 novembre (Observation faite depuis une voiture circulant sur autoroute, ce que le CHN rejette généralement au nom de la sécurité routière!); **Allier** – Toulon-sur-Allier, juv., 1<sup>er</sup> décembre (La description est basée avant tout sur la queue blanche à barre sombre, et le dessus de la main pâle, mais l'oiseau n'a pu être observé de dessous. Même si l'identification est très probablement correcte, les éléments indiqués restent fragiles aux yeux des archives du CHN...); **Ardennes** – Tilly: les Taillettes, 21 novembre (La description est basée uniquement ou presque sur la queue, ce qui est insuffisant); **Aube** – Piney: Forêt du Petit Orient, mâle ad., 18 février (Les critères donnés pourraient correspondre à un mâle adulte, très minoritaire dans l'afflux qui a touché la France cet hiver, mais malheureusement, ils peuvent également convenir à une Buse variable pâle avec un croupion blanc, comme il en existe aussi...); **Aveyron** – Sainte-Radegonde/La Loubière: Sansac, 1<sup>er</sup> hiver, 26 janvier (À nouveau un oiseau vu en marge de l'aire touchée par cet afflux, et pour lequel quelques critères sèment le doute, notamment un ventre clair pour un oiseau donné comme de 1<sup>er</sup> hiver par ailleurs. La tête décrite

blanche ne convient pas forcément pour un adulte non plus, et peu d'éléments au final éliminent une Buse variable *B. buteo* pâle avec poignets marqués et base de la queue blanche). Laguiole: Roc des Cabres, 1<sup>er</sup> hiver, 27 décembre (La description manque de précision, et il y manque des éléments comme le dessous de l'aile et les tarses. Les culottes décrites blanches sont par ailleurs étonnantes. Enfin, s'agissant d'une mention très méridionale, le CHN s'en est tenu à une certaine prudence); **Bas-Rhin** – Hesseheim, mâle ad., phot., 12 novembre (Description incomplète accompagnée de photographies où la queue de l'oiseau évoque d'avantage une Buse variable *B. buteo* à croupion pâle qu'un mâle adulte de Buse pattue), Bolsenheim, 3 décembre (La coloration générale pourrait effectivement convenir, mais il manque d'éléments précis par ailleurs...); **Côte-d'Or** – Vauchignon, 6 novembre (Trop peu d'éléments, un croupion décrit pâle mais pas de précision sur la queue, et une confusion manifeste entre tarses emplumés et «culottes»...); **Dordogne** – Château-de-Montréal, 26 avril (La description de la queue et des taches carpales pourrait convenir, mais la description est par ailleurs bien fragile pour supporter une observation en Aquitaine et un 26 avril); **Doubs** – Loray, 31 mars (La courte description ne comporte pas réellement de critères permettant de pencher pour l'une ou l'autre des buses...); **Drôme** – Parnans, 28 janvier (Trop peu d'éléments, un croupion décrit pâle mais pas de précision sur la queue, et une confusion manifeste entre tarses emplumés et «culottes»...); **Haute-Loire** – Venteuges: Bouyol, mâle ad., 10 février (Un plumage de mâle adulte, identifié au ventre blanc, mais il manque du coup d'autres détails, comme une description précise de la queue, pour s'assurer de cette observation); **Haut-Rhin** – Ensisheim: sablière Hartacker, imm., phot., 8 janvier (Identification appuyée par l'observation de tarses emplumés en vol, ce qui suggère là-aussi une confusion), Colmar: Daschbuehl, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 23 janvier (Description trop sommaire avec des «pattes emplumées», alors que ce sont les tarses qui le sont chez la Buse pattue), Colmar: Herten Matten, fem. ad., 6 novembre (Description du dessous de l'aile, de la queue et du dessus imprécise ou absente, ce qui rend l'identification délicate sur la base de ces éléments); **Nièvre** – La Marche: aire de repos sur l'A77, 1<sup>er</sup> hiver, 1<sup>er</sup> novembre (Il s'agissait sans doute de cette espèce, mais la description est trop imprécise pour en être certain); **Seine-et-Marne** – Chanconin-Neufmontiers: l'Orme André, phot., 12 septembre (Les photographies montrent une jeune Buse variable *B. buteo* avec la base de la queue blanche); **Seine-Maritime** – Argueil, 25 mars (La courte description, et notamment le ventre blanchâtre, fait d'avantage penser à une Buse variable *B. buteo* pâle); **Vienne** – Chalandray, 1<sup>er</sup> hiver, 2 janvier (Description principalement axée sur la silhouette et la queue terminée de noir, ce qui est malheureusement un peu léger pour soutenir une observation aussi occidentale).

**Aigle criard** *Aquila clanga* – Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, Mas d'Agon, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 5 mars (Bien entendu, cette espèce est la plus probable en Camargue à cette époque, mais la description et les photos ne permettent pas d'éliminer d'autres espèces et a fortiori un hybride).

**Aigle pomarin** *Aquila pomarina* – Meurthe-et-Moselle – Vaudémont, ad., 1<sup>er</sup> septembre (La date et le lieu sont tout-à-fait favorables à l'observation de cette espèce, et l'identification est très probablement la bonne. Mais la description proposée comporte vraiment trop peu d'éléments probants).

**Faucon sacre** *Falco cherrug* – Morbihan – Brech, ad., 22 mars (Plusieurs éléments vont dans le bon sens, mais la description des parties inférieures – assez pâle avec de fines stries – ne peut correspondre à l'espèce proposée. Comme cela a souvent été rappelé, l'existence d'hybrides ressemblant fortement au Faucon sacre doit pousser le CHN à une grande prudence quant aux «grands faucons»); **Morbihan** – Île de Hoëdic, ad., 9 avril (Les couvertures sous-alaires décrites comme étant pâles, ainsi que la rousseur du plumage, incitent à penser qu'il s'agirait peut-être d'un hybride).

**Faucon gerfaut** *Falco rusticolus* – Morbihan – Plouharnel: Plage de Sainte-Barbe, ad., 5 mars (Il s'agit d'un faucon décrit comme étant blanc, ce qui reste rare y compris chez le Faucon gerfaut, mais la description ne comprend par ailleurs que peu d'éléments pour éliminer la possibilité d'oiseaux hybrides ou leuciques); **Nord** – Deulémont, juv., 31 octobre (Description nettement trop sommaire pour s'assurer de l'identité de l'oiseau, avec par ailleurs certaines incompatibilités avec l'espèce proposée).

**Courvite isabelle** *Cursorius cursor* – Finistère – Plomeur: Pointe de la Torche, 13 novembre (Description vraiment succincte pour une observation aussi remarquable).

**Glaréole à ailes noires** *Glareola nordmanni* – Haute-Corse – Ersa: Lagune de Barcaggio, phot., 2 mai (Des photos assez lointaines ne montrent effectivement pas de bord de fuite blanc, mais il est difficile d'en être certain, et plus encore d'accepter cette espèce sur cette base); **Landes** – Pontonx-sur-l'Adour, phot., 25 juin (Trop peu d'éléments diagnostiques et quelques éléments sur les photos laissent même penser d'avantage à une Glaréole à collier *G. pratincola*: pattes plutôt courtes, rouge à la base du bec, teinte générale).

**Pluvier bronzé** *Pluvialis dominica* – Morbihan – Etel, 17 décembre (Un pluvier à axillaires grises vu en vol, en ce lieu et à cette date a effectivement toutes les chances d'être un Pluvier bronzé, mais ce qui est dit du cri ne suffit malheureusement pas à trancher. Il faut également être conscient qu'au-delà de ce qui est souvent donné comme cri typique de chaque espèce, il y a des variations individuelles et cris atypiques qui rendent inconfortable l'homologation d'un tel pluvier en vol...).

**Vanneau sociable** *Vanellus gregarius* – Ain – Charnoz: les Rises, 10 mars (Observation faite depuis une voiture circulant sur autoroute, qui comme souvent dans ce cas, est plus basée sur des impressions que sur des critères objectifs permettant d'être certain de l'identification. Ce qui n'empêche pas que le Vanneau sociable soit la solution la plus probable!).

**Bécasseau semipalmé** *Calidris pusilla* – Loire-Atlantique – Guérande: Sissable, juv., 11 novembre (La distance d'observation signalée était trop importante pour noter avec la précision nécessaire le détail de coloration des scapulaires, la présence de

palmures ou le cri par exemple. Cela est évidemment nécessaire à une époque de l'année où nombre de Bécasseaux minutes *C. minuta* ont mué et ressemblent fortement au Bécasseau semipalmé juvénile); **Manche** – Huisnes-sur-Mer, juv., phot., 12 septembre (Là-encore, une distance d'observation importante pour cette espèce rend difficile l'appréciation de critères qui ne peuvent être jugés à plus d'une trentaine de mètres. Le risque à cette époque réside dans certains Bécasseaux minutes *C. minuta* de 1<sup>er</sup> été ayant entièrement mué ou presque, au plumage neuf, gonflé et qui affecte donc la silhouette en comparaison avec ses congénères. De plus, leur teinte grise est alors remarquable. Les photos présentées ici semblent montrer des centres sombres en forme de flèche épaisse sur les scapulaires, et aucun critère proprement juvénile ne permet d'être certain de l'âge).

**Bécasseau de Bonaparte** *Calidris fuscicollis* – Gironde – Le Teich: Parc ornithologique du Teich, phot., du 17 juillet au 19 août (Quelques éléments dans la description amènent un doute: hauteur des pattes, forme du bec et sourcil discret visible seulement dans certains conditions de lumière. Si on y ajoute que des photos jointes à la fiche montrent très probablement un 1<sup>er</sup> été de Bécasseau variable *Calidris alpina* plutôt que cette espèce, il y a trop peu de certitude).

**Bécassine de Wilson** *Gallinago delicata* – Finistère – Ouessant: Niou, phot., 11 octobre (Les photos en vol de cette bécassine, même si de qualité moyenne, montrent manifestement un oiseau dénué du large bord de fuite blanc des secondaires, ayant un dessous d'aile sombre et des parties inférieures bien barrées. Ces critères évoquent évidemment la Bécassine de Wilson, mais non seulement d'autres taxons montrent les mêmes, mais il convient également de se méfier de la sous-espèce *faeroensis* de la Bécassine des marais *G. gallinago* réputée pour être piègeuse à plusieurs égards. Une seconde mention française nécessiterait de pouvoir détailler les largeurs respectives des barres blanches et noires sous les ailes, la forme de la pointe blanche des secondaires et une vue détaillée des rectrices).

**Chevalier bargette** *Xenus cinereus* – Vendée – Bouin: Port du Bec, 3 ind., 17 septembre (Il manque quelques précisions qui auraient été indispensables pour l'acceptation d'une donnée de trois bargettes ensemble, fait rare y compris sur les sites où elle passe régulièrement, et jamais noté en France à ce jour).

**Chevalier à pattes jaunes** *Tringa flavipes* – Morbihan – Île de Groix: Porh Morvil, 14 juillet (Les éléments fournis dans cette description sont malheureusement trop confus pour savoir à quelle espèce elle se réfère).

**Mouette de Ross** *Rhodostethia rosea* – Tarn-et-Garonne – Saint-Nicolas-de-la-Grave, 1<sup>er</sup> été, 17 mai (Les détails de plumage ainsi que la queue cunéiforme correspondent bien à une Mouette pygmée *Hydrocoleus minutus*, qui à cet âge et à cette époque présente souvent des rectrices externes en pousse).

**Mouette atricille** *Larus atricilla* – Morbihan – Île d'Hoëdic, ad., 10 avril (L'identification peut être faite par élimination, mais il manque des éléments pour être certain de l'espèce: structure et silhouette, coloration du bec et du bout de l'aile...).

**Mouette de Franklin** *Larus pipixcan* – Finistère – Le Conquet: Banneg, ad., 27 octobre (L'identification est probablement la bonne, mais quelques détails manquent pour en être certain, dans le contexte d'une observation faite depuis un bateau...).

**Goéland à ailes blanches** *Larus glaucooides* – Nord – Cantin, 20 janvier (La description pourrait fort bien correspondre, mais n'élimine pas la possibilité d'un goéland leucique d'une espèce plus commune).

**Sterne élégante** *Sterna elegans* – Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer: bassins de décantation, ad., phot., 10 septembre (La forme et la coloration du bec ainsi que le teint foncé du dos ne conviennent pas pour une Sterne élégante. De même, la taille nettement supérieure à celle des Sternes caugek *S. sandvicensis* à proximité laisse envisager un hybride incluant une Sterne royale *S. maxima* dans sa parenté...); **Charente-Maritime** – Saint-Trojan-les-Bains: Pointe de Gatsseau, ad., phot., 10 avril (Oiseau bagué et connu de longue date comme l'un des hybrides à bec jaune-orange qui fréquentent la côte atlantique française).

**Pic à dos blanc** *Dendrocopos leucotos* – Côte-d'Or – Dijon: Parc de l'Hôpital de la Chartreuse, 8 et 9 janvier (Observation relativement furtive, surtout en vol, qui n'a manifestement pas permis d'obtenir une description de qualité suffisante pour une seconde mention française contemporaine de la sous-espèce nominale de ce pic).

**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus samamiscus* – Haute-Corse – Macinaggio, mâle 2<sup>e</sup> année, phot., 5 mai (Un oiseau présentant manifestement un panel pâle sur l'aile, mais pas suffisamment pour correspondre à un individu typique de *samamiscus*, ni pour éliminer un intermédiaire comme il en existe... Pour mémoire, il n'y a plus de mention homologuée de cette sous-espèce en France).

**Hypolaïs bottée** *Hippolais caligata* – Vendée – Île d'Yeu, 20 octobre (Description étonnante d'un oiseau présentant en effet des caractères de cette espèce, qui émettait par ailleurs un chant en sourdine. Il manque malheureusement des critères objectifs pour s'assurer de son identité au sein d'un groupe qui reste complexe: sur-sourcil sombre, couleur des franges sur l'aile pliée, type de hochements de queue, projection primaire...).

**Fauvette épervière** *Sylvia nisoria* – Finistère – Ouessant: Porz Doun, 1<sup>er</sup> hiver, 23 octobre (Trop peu d'éléments en dehors de la taille et la coloration générale, et une identification menée avant tout par élimination. Même s'il s'agissait probablement là de l'espèce indiquée, il est difficile d'en acquiescer la certitude); **Morbihan** – Gâvres: marais de Kersahu, 1<sup>er</sup> hiver, 27 septembre (Trop d'éléments manquent pour certifier cette identification, tels que coloration de l'iris, des sous-caudales ou encore la présence de franges pâles sur l'aile pliée et les rectrices); **Nord** – Dunkerque: coopérative maritime, 1<sup>er</sup> hiver, 2 octobre (Observation malheureusement très courte et effectuée dans des conditions difficiles, qui n'a pas permis de noter par exemple la coloration de l'iris, de la base du bec, ou la présence de franges pâles sur l'aile).

**Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans albistriata* – Alpes-de-Haute-Provence – La Palud-sur-Verdon, mâle 1<sup>er</sup> été, phot., 14 avril (Un oiseau présentant une moustache plutôt large mais courte, un dessus nettement bleuté mais des parties inférieures plutôt délavées par rapport à ce qu'elles devraient être chez cette sous-espèce...); Alpes-Maritimes – Saint-Vallier-de-Thiery: le Doublier, mâle, du 10 au 16 avril (Identification basée notamment sur des différences de chant et de cri, ce qui est loin d'être évident une fois prise en compte la variabilité interindividuelle).

**Pouillot brun** *Phylloscopus fuscatus* – Seine-Maritime – Sainte-Adresse: Cap de la Hève, 29 octobre (Description vraiment succincte d'une identification semblant basée avant tout sur le cri, qui en effet correspond à cette espèce. Quelques détails supplémentaires, notamment sur les détails de coloration de la tête, auraient été les bienvenus).

**Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus caudatus* – Ain – Ceyzerieu: marais de Lavours, phot., 8 avril (Individu présentant une trace de bandeau sombre, donc intermédiaire); Haut-Rhin – Bartenheim, 2 ind., 31 décembre (Observation brève au sein un grand groupe de Mésanges à longues queues locales, qui n'a pas permis de noter autre chose qu'une tête paraissant blanche. Cela n'exclut donc pas des oiseaux intermédiaires); Marne – Châlons-en-Champagne: le Jard Anglais, phot., 22 décembre (L'oiseau semble présenter du gris en arrière de l'œil, et les éléments présents dans la description ne permettent pas d'abonder dans le sens de la sous-espèce nominale).

**Pie-grièche masquée** *Lanius nubicus* – Aveyron – Ols et Rhinodes, phot., 16 mai (Cet oiseau, bien décrit et photographié, présente des caractéristiques évoquant effectivement la Pie-grièche masquée. Plusieurs critères ne correspondent pas et indiquent plutôt un hybride de parenté inconnue, bien que la possibilité d'un croisement Pie-grièche à tête rousse *L. senator* x Pie-grièche méridionale *L. meridionalis* ait été évoquée).

**Étourneau rosein** *Sturnus roseus* – Charente-Maritime – Saint-Denis-d'Oléron: Pointe de Chassiron, juv., 8 novembre (Les données d'oiseaux à cet âge ne peuvent être acceptées sans élément de description des parties nues, en raison des risques de confusion avec des Étourneaux sansonnet *S. vulgaris* leuciques lorsque l'identification est basée uniquement sur le plumage, particulièrement en vol).

**Bec-croisé perroquet** *Loxia pytyopsittacus* – Haut-Rhin – Orbey: col du Calvaire, mâle ad., 4 août (La description de la corne est faite sans comparaison avec d'autres becs-croisés, et les détails quant à la forme du bec ne permettent pas de trancher sur cette identification).

**Bruant nain** *Emberiza pusilla* – Gironde – Andernos-les-Bains, 29 janvier (Même si l'identification était probablement correcte, il manque quelques éléments pour distinguer à coup sûr cet oiseau d'un Bruant des roseaux *E. schoeniclus*, tels que le cri, la coloration des retrices ou des détails de la face).

## 2010

**Buse pattue** *Buteo lagopus* – Eure – Lyons-la-Forêt, 1<sup>er</sup> décembre (Description qui ne comprend malheureusement que des éléments sur la coloration de la queue, qui ne suffisent pas à éliminer une Buse variable *B. buteo*).

**Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica svecica* – Meurthe-et-Moselle – Art-sur-Meurthe, mâle ad., phot., 11 avril (Courte description et photos lointaines ne permettent pas d'étayer cette observation, d'un taxon souvent plus difficile à diagnostiquer que ce qu'il semble... Il est en effet préférable, lors d'une observation en nature, de voir le mâle chanter et ébouriffer son plastron pour être sûr de sa couleur).

**Grive de Naumann** *Turdus naumanni* – Rhône – Villeurbanne, 16 et 17 novembre (Observation brève d'un oiseau vu uniquement de face, qui pourrait fort bien concerner cette espèce en effet, mais ne permet malheureusement pas d'éliminer avec certitude un plumage atypique d'une autre espèce ou un hybride avec la Grive à ailes rousses *T. eunomus*).

**Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis* – Corse-du-Sud – Bonifacio, mâle, 27 mai (Difficile d'éliminer la possibilité d'un hybride, comme il y en a beaucoup dans ce secteur...).

## 2009

**Pétrel de Bulwer** *Bulweria bulweri* – Landes – Tarnos: digue de Tarnos, 29 novembre (Il s'agit certainement d'un oiseau de mer intéressant, mais il manque des informations précises sur la queue et le type de vol pour s'assurer de son identité spécifique).

**Vautour de Rüppell** *Gyps rueppellii* – Lozère – Florac: Causse Méjean, le Pradal, imm., 12 septembre (Donnée rejetée uniquement pour des raisons de forme, à savoir l'application des recommandations de l'AERC en matière de premières mentions nationales. Il a en effet été décidé de n'accepter des premières que lorsque des descriptions sont fournies par plusieurs observateurs ou lorsque des photographies ont pu être prises).

**Faucon concolore** *Falco concolor* – Bouches-du-Rhône – Arles: Camargue, Marais du Verdier, ad., 4 septembre (Observation aux conditions difficiles, qui a néanmoins permis de noter des critères intéressants. D'autres éléments sont malheureusement manquants et s'ajoutent à une description de la silhouette peu concluante, pour rendre difficile l'acceptation d'une espèce aussi rare en Europe de l'Ouest).

**Bécassine double** *Gallinago media* – Calvados – Tourgéville: marais de la Touques, 20 septembre (Description un peu maladroite qui concerne vraisemblablement cette espèce, mais difficile d'en acquiescer la certitude sur la base des éléments fournis).

## 2008

**Oie des neiges** *Anser caerulescens* – Calvados – Saint-Arnould/Tourgéville: Marais de la Touques, 20 ind., octobre (Des oies blanches sont bien décrites, mais difficile d'être sûr de l'espèce).

**Bécassin à long bec** *Limnodromus scolopaceus* – Landes – Saint-Martin-de-Seignanx: réserve de Bergusté, phot., 10 octobre (C'est bien un bécassin, la longueur du bec, un soupçon de cri et la coloration de la queue faisant effectivement penser à cette espèce. Il est néanmoins impossible d'écarter objectivement le Bécassin à bec court *L. griseus* sur la base des éléments fournis).

**Pouillot à pattes sombres** *Phylloscopus plumbeitarsus* – Pyrénées-Atlantiques – Aste-Béon, 10 et 11 octobre (Il s'agit très probablement d'un oiseau du complexe des Pouillots «verdâtres», mais l'acceptation d'une seconde mention française doit évidemment être basée sur une description complète. Ici, il manque une description fine de la tête, incluant la zone des lores, de l'avant du sourcil et du front).

## 2007

**Bécassine double** *Gallinago media* – Calvados – Tourgéville: marais de la Touques, 5 août (Description trop succincte pour accepter cette espèce, même si l'identification était probablement la bonne).

**Chevalier grivelé** *Actitis macularia* – Finistère – Ouessant: Aod Meur, juv., phot., 7 octobre (Une fiche compliquée comportant des photos de deux oiseaux différents, un Chevalier guignette *A. hypoleucos* adulte et un juvénile indéterminé. Celui-ci présente bien des critères indiquant le Chevalier grivelé, mais d'autres sont trop intermédiaires et semblent en dehors de la variation de ce dernier. La possibilité d'un hybride entre les deux espèces reste une éventualité crédible...).

## 2004

**Buse pattue** *Buteo lagopus* – Haute-Savoie – Andilly, 1<sup>er</sup> hiver, 26 avril (De bons éléments figurent dans cette description, qui est malheureusement incomplète pour soutenir une observation aussi remarquable par sa date, en dehors de tout contexte d'afflux).

**Bécassine double** *Gallinago media* – Loire – Saint-Just et Saint-Rambert, 14 septembre (Quelques éléments manquent pour valider l'identification de cette bécassine vue posée et à relativement grande distance).

**Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus* – Var – Massif des Maures, phot., 23 avril (Un oiseau intermédiaire, qui peut également présenter une tête largement blanche, est difficile à écarter ici).

## ANNEXE 4 – ESPÈCES DONT L'ORIGINE EST PROBABLEMENT CAPTIVE (CATÉGORIE E)

Figurent ici les espèces qui ne peuvent entrer ni dans la liste française ni dans la catégorie D, mais pour lesquelles le CHN estime qu'il est nécessaire de garder une trace dans le cas où des éléments nouveaux concernant leur statut se feraient jour. À noter que des individus appartenant à des espèces classées en catégorie A ou D peuvent également être inscrits dans cette liste lorsque des éléments indiquent une origine non naturelle ou qu'un doute subsiste quant à celle-ci. Ces oiseaux ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du CHN. Afin de clarifier la position du CHN sur ces espèces, une liste mise à jour des espèces dont les observations sont soumises à homologation est disponible auprès du secrétariat du CHN ou sur le site web ([www.chn-france.org](http://www.chn-france.org)). Rappelons enfin que le travail de catégorisation des données acceptées par le CHN est effectué par la Commission de l'Avifaune Française (CAF).

- **Oie des neiges** *Anser caerulescens* – Allier – Château-sur-Allier, 2 ad., phot., 16 juin (A. Trompat).
- **Bernache à cou roux** *Branta ruficollis* – Drôme – Étoile-sur-Rhône, 19 novembre (F. Lloret, N. Gauthier); Somme – Saint-Valéry-sur-Somme, juv./1<sup>er</sup> hiver, phot., 12 décembre 2010 au 23 janvier 2011 (L. Gavory, E. Dansette, P.J. Dubois *et al.*), Saint-Quentin-en-Tourmont: parc du Marquenterre, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 30 janvier au 24 mai (J. Ragot, M. Ragot *fade* P.J. Dubois), le même oiseau.
- **Sarcelle à ailes vertes** *Anas carolinensis* – Gard – Vauvert, mâle, phot., 18 et 19 décembre (P. Devoucoux). L'oiseau était porteur d'une bague plastique.
- **Fuligine à tête noire** *Aythya affinis* – Haut-Rhin – Huningue, mâle ad., phot., du 19 décembre au 2 mars 2011 (V. Palomares *et al.*). Toujours le même mâle de retour sur son site d'hivernage.
- **Garrot albéole** *Bucephala albeola* – Moselle – Bistroff: étang de Bischwald, fem. ad., phot., du 29 mars au 7 avril (S. Kmiecik). L'oiseau était porteur d'une bague plastique.
- **Pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus* – Ain – Villars-les-Dombes: étang Turlet, ad., phot., 16 janvier (P. Crouzier *et al.*). Oiseau porteur d'une puce électronique du Parc aux Oiseaux de Villars-les-Dombes. Deux données de 2010 se rapportent au pélican *Quaks*: Bas-Rhin – Seltz, ad., phot., 13 septembre 2010 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)). Moselle – Lindre-Basse, ad., phot., 27 février 2010 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

- **Ibis chauve** *Geronticus eremita* – Ardèche – Saint-Cyr: Coin Bargieux, juv., phot., 24 et 25 septembre (V. Palomares *et al.*), mort des suites d'une électrocution. Cet oiseau né à Burghausen, Allemagne, est issu du programme de réintroduction de l'espèce en Bavière, et avait été observé également le 30 septembre en Ariège (V. Palomares, comm. pers.).
- **Marabout d'Afrique** *Leptoptilos crumenifer* – Gard – Poullx: Camp militaire du Grand Chêne, ad., phot., 13 et 14 octobre 2010 (C. Sabran *et al.*), Beaucaire: Île du Pilet, ad., 7 septembre 2009 (C. Sabran *et al.*).
- **Outarde barbue** *Otis tarda* – Manche – Montchaton: la Besnardière, fem. 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 18 décembre au 24 mars 2012 (B. Chevalier *et al.*). Oiseau issu du programme de réintroduction de l'espèce en Angleterre.

#### REMERCIEMENTS

- Le CHN tient à remercier chaleureusement ceux qui, au cours de l'année 2011, ont contribué à son bon fonctionnement :
- tout d'abord, l'ensemble des ornithologues et photographes ayant contribué à la présente synthèse par la rédaction de fiches ou la transmission de photographies, sans qui le CHN ne fonctionnerait pas,
  - les responsables de comités d'homologation ou d'associations et organismes régionaux ou locaux collectant des données: Cyrille Deliry, Christian Dronneau, Alain Fossé, Jean François, Xavier Hindermeyer, Grégory Juppet, Yves Kayser, Arnaud Le Nevé, Dominique Michelat, Jean-Philippe Paul et Cédric Peignot.
  - Antoine Arnaud, Yohann Brouillard, Pierre-André Crochet, Franck Jouandoudet, Adrien Leprêtre, Bernd Meyburg, Antoine Rougeron et Urmas Sellis qui nous ont apporté informations complémentaires et/ou des corrections,
  - Marc Duquet et Jean-Yves Frémont pour leur relecture avisée,
  - la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière attribuée au secrétariat du Comité, et nécessaire à son fonctionnement,
  - la revue *Ornithos* pour la prise en charge du coût des photos en couleurs qui illustrent ce rapport.

#### BIBLIOGRAPHIE

- ALTENBURG R.G.M., MEULMEESTER I., MUUSSE M.J.M., MUUSSE T.O.V. & WOLF P.A. (2011). Field identification criteria for second calendar-year Baltic Gull. *Dutch Birding* 33: 304-311.
- COMMISSION DE L'AVIFAUNE DE FRANCE (2007). En direct de la CAF. Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). *Ornithos* 14-4: 234-246.
- DE BROYER A. & VANDEVYRE X. (2011). Influx of Rough-legged Buzzard *Buteo lagopus* during the winter 2010-2011 in Wallonia. *Aves* 48-4: 213-222.
- DUBOIS P.J. & DUQUET M. (2009). Joris, Klaus et la mouette blanche. Les tempêtes de janvier 2009 en France. *Ornithos* 16-2: 81-89.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P. (2008). Nouvel Inventaire des



25. Chevalier grivelé *Actitis macularia*, Plovan, Finistère, septembre 2011 (Daniel Mauras). Spotted Sandpiper.



26. Fou à pieds rouges *Sula sula*, lac de Sainte-Croix, Aiguine, Var, juillet 2011 (Aurélien Audevard). Red-footed Booby.

Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris. • JIGUET F., CROCHET P.-A., DUBOIS P.J., PONS J.-M., YÉSOU P. & LE MARÉCHAL P. (2009). Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française en 2008-2009. 12<sup>e</sup> rapport de la CAF. *Ornithos* 16-6: 382-393. • ŁAWICKI Ł., KHIL L. & DE VRIES P.P. (2012). Expansion of Pygmy Cormorant in central and western Europe and increase of breeding population in southern Europe. *Dutch Birding* 34: 273-288. • MICHELAT D., RIOLS C. & DUQUET M. (1998). Important afflux de Buses pattues *Buteo lagopus* en France au début de l'année 1997. *Ornithos* 5-2: 82-85. • OLIOSO G. (2011). Important afflux de Mésanges à longues queues *Aegithalos caudatus* en France. *Ornithos* 18-5: 300-306. • PAEPEGAËY B. & LE CHN (2011). Eléments d'identification: La Mésange à longue queue nordique *Aegithalos c. caudatus*. *Ornithos* 18-1: 20-25. • VAN DUIVENDIJK N. (2011). Steppebuizerd in Nederland: herziening, status en determinatie [Steppe Buzzard in the Netherlands: revision, status and identification]. *Dutch Birding* 33: 283. • VAN STEELANT W., FAVEYTS W. & BUCKENS J. (2011). Opmerkelijke Ruigpootbuizerdinvasie in de winter 2010-2011: oorzaken in een historische en Europese context. *Natuur.oriolus* 77(3): 87-98.

#### SUMMARY [À VOIR PAR GW]

**Rare birds in France in 2011.** *The beginning of year 2011 was marked by the consequences of two influxes started a few months earlier, which involved unprecedented numbers of Rough-legged Buzzards and Long-tailed Tits of the northern subspecies in France. These phenomena have both experienced a timid replica during the winter 2011-2012. Unprecedented numbers of nearctic waders were seen in France at the end of summer 2011, involving highest-ever numbers of Buff-breasted Sandpiper and Semipalmated Sandpiper. Asian waders were not left out, with two records of Sharp-tailed Sandpiper and one of Long-toed Stint, a new species for France. Several other species have occurred in high numbers: Pink-footed Goose (61), Pygmy Cormorant (4, while only 7 previously accepted records in France), Sociable Lapwing (7), Great Snipe (9), Olive-backed Pipit (3), Red-flanked Bluteail (3) Desert Wheatear (5), Pallas's Warbler (8) and Rosy Starling (20). Green Heron provided its second mention in category A for France in 2011, while four other taxa were contacted for the first time in France: Red-footed Booby, White-rumped Swift, Eastern Black Redstart and Yellow Warbler. Two other species were also added to the French list of birds (category A) based on records accepted in 2010: Feas's Petrel and Demoiselle Crane. Finally, a review of the French records of Taiga Flycatcher has led to the removing of the species from the French list of birds.*

Comité d'Homologation National c/o LPO, Fonderies Royales, BP 90263, 17305 Rochefort cedex  
(site internet: [www.chn-france.org](http://www.chn-france.org); e-mail: [chn@lpo.fr](mailto:chn@lpo.fr))