



# Les oiseaux rares en France en 2013


31<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation National

Yves Kayser, Alain Verneau & le CHN

Ce 31<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation National couvre l'année 2013. Un peu plus de 550 fiches ont été examinées par le CHN, en incluant les révisions de données concernant le Faucon lanier *Falco biarmicus*, les Fauvettes sardes *Sylvia sarda* et les Fauvettes des Balkans *Sylvia cantillans ssp.* Le nombre de fiches traité reste inférieur au travail effectué les années précédentes (fig. 1), certaines espèces ayant été retirées de la liste des oiseaux soumis à homologation nationale en France, dans la mesure où leur statut est maintenant bien connu et où ils sont plutôt considérés comme des migrateurs ou hivernants rares. Les espèces en question sont: le Busard pâle *Circus macrourus*, la Buse pattue *Buteo lagopus*, le Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*, à l'exception des oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce *kumlieni*, et l'Étourneau roselin *Pastor roseus*. La Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* présentant les caractéristiques de la sous-espèce *caudatus* a quant à elle été retirée de la liste au 1<sup>er</sup> juillet 2013. Le taux d'acceptation des fiches est légèrement en baisse puisqu'il atteint 75% en 2013 contre 82% en 2012 et 84% en 2011 (415 données homologuées).

En 2013, les membres du CHN se sont réunis les 20 et 21 avril en Camargue. À l'issue de cette réunion, le CHN comptait 10 membres. En 2014, les mandats de Benoît Paepegaey et de Matthieu Vaslin ont pris fin. Nous les remercions tous les deux pour le travail effectué. Benoît a tenu la présidence du CHN quatre années. Alain Verneau a pris sa suite. Yves Kayser a été reconduit dans sa fonction de secrétaire. Deux nouvelles candidatures ont par ailleurs été acceptées: Pierre-André Crochet et Amine Flitti rejoignent donc le CHN. Suite à cette réunion plénière, le CHN comptait donc comme membres votants: Alain de Broyer, Pierre-André Crochet, Amine Flitti, Nidal Issa, Frédéric Jiguet, Jean-Pierre Jordan, Yves Kayser (secrétaire), Julien Piette, Sébastien Provost et Alain Verneau (président).

fig. 1. Nombre de données homologuées par le CHN depuis sa création en 1981, pour les taxons actuellement soumis à homologation nationale et hors données issues de programmes de suivi par satellite. Annual number of records accepted by the French Rarities Committee (CHN), 1981-2013. Data refer only to taxa currently considered by CHN, except data of birds tracked by satellite telemetry.



## SITE INTERNET DU CHN

La base de données du CHN est disponible depuis 2011 à l'adresse suivante : [www.chn-france.org](http://www.chn-france.org). Le site fournit l'essentiel des informations sur le comité d'homologation, ses membres, ses objectifs, son fonctionnement et ses travaux. On y trouve aussi tous les documents téléchargeables, c'est-à-dire la fiche d'homologation vierge, la liste des espèces soumises à homologation nationale, les rapports annuels, etc. Il est conseillé de nous signaler les éventuelles erreurs qui peuvent être trouvées sur le site à l'adresse suivante : [homologation.chn@gmail.com](mailto:homologation.chn@gmail.com).

## FONCTIONNEMENT DU CHN

### Traitement des observations publiées avec photos

Le CHN rappelle une nouvelle fois que les photos publiées par le biais d'Internet et ne faisant pas l'objet de fiches descriptives sont traitées. Cependant, la saisie d'observations sur les différentes bases de données en ligne VisioNature, même avec photographie, n'équivaut pas à l'envoi d'une fiche au CHN. Si aucune fiche n'est envoyée, la donnée est examinée avec un an de décalage par rapport au rapport annuel courant. Dans ce cas, les données rejetées ne sont pas publiées, et les données acceptées le sont en précisant la source électronique (lien vers le site web) en lieu et place du nom des observateurs.

### Publication des données issues de suivis par satellite

Comme cela a déjà été mentionné, les données issues de programmes de *radio-tracking* (aigles par exemple) ne figureront plus de façon détaillée dans le rapport annuel. En effet, ces données, souvent très nombreuses de par la nature même du procédé de collecte risquent de se multiplier encore avec l'amélioration technique du matériel et la diminution de son coût, et en conséquence la multiplication des programmes. Ces données seront donc publiées en ligne sur le site du CHN, et un rappel sera systématiquement fait dans le rapport annuel, en résumant le nombre de données et le parcours de l'oiseau.

## TRAVAUX DU CHN

### Homologation des passereaux en vol

Aucune fiche ne sera acceptée sans enregistrement ou photo en support.

### Critères d'acceptation du Goéland de la Baltique *Larus fuscus fuscus*

Seuls les oiseaux bagués et présentant toutes les caractéristiques de l'espèce pourront être homologués.

### Cas transfrontaliers

Trois cas ont été identifiés : le col de Bretolet (Suisse), le lac Léman (Suisse), Torgny (Belgique). En cas d'homologation dans les deux pays, un double comptage est susceptible de se produire si les données sont exploitées à une échelle supranationale. Le CHN décide de ne plus homologuer les oiseaux capturés au col de Bretolet, en Suisse. Ces oiseaux seront considérés comme ayant été observés en Suisse, sauf preuve qu'ils ont franchi la frontière et ont été observés en France. Pour tous les sites, il faut que la fiche mentionne que l'oiseau a été vu avec certitude en France. Les données acceptées au col de Bretolet seront supprimées de la base de données du CHN. Une liste de ces données sera publiée dans le prochain rapport du CHN.

### Révision des données de Fauvette sarde *Sylvia sarda*

Différents travaux réalisés ces dernières années sur la génétique ont montré que la Fauvette sarde *Sylvia s. sarda* et la Fauvette des Baléares *Sylvia s. balearica* méritaient des statuts spécifiques (BÖHNING-GAESE *et al.* 2003, VOELKER & LIGHT 2011). Il existe par ailleurs des différences de coloration des parties nues et du plumage tout comme pour les cris de contacts et les chants territoriaux (SHIRIHAI *et al.* 2001). De ce fait, les deux sous-espèces ont été séparées en deux espèces monotypiques (SANGSTER *et al.* 2012).

Sur les 21 individus détectés en France continentale, il y a 6 Fauvettes sardes certaines et 15 pour lesquelles il est impossible de trancher. Le CHN décide de faire circuler une nouvelle fois les fiches pour rechercher si elles n'incluent pas de Fauvette des Baléares. Les données françaises sont considérées par défaut comme des Fauvettes sardes, ce qui est suggéré non seulement par la présence d'oiseaux identifiés comme tels avec certitude, mais aussi par la distribution géographique des données, essentiellement provençale.

### Révision des données de Fauvette des Balkans *Sylvia cantillans ssp.*

Lars Svensson a récemment publié deux articles (SVENSSON 2013a, 2013b) sur la systématique, la nomenclature et l'identification du complexe *Sylvia cantillans*. Il propose de séparer ce complexe en trois espèces (une position systématique qui n'est pas encore acceptée largement en Europe, notamment pas encore par l'AERC donc la CAF) : *Sylvia inornata*, la Fauvette passerinette, qui niche dans l'ouest du bassin méditerranéen et inclut donc les nicheurs français ; *S. subalpina*, la Fauvette de Moltoni, qui niche en Corse, en Sardaigne, aux Baléares et dans le nord de l'Italie ; et *S. cantillans*, la Fauvette des Balkans, qui niche dans le sud de l'Italie, dans les Balkans et dans l'ouest de la Turquie. La Fauvette des Balkans comprend selon Svensson (*op. cit.*) deux sous-espèces : *S. c. cantillans* en Italie et *S. c. albistriata* dans les Balkans et en Turquie. Les critères utilisés jusqu'ici pour identifier la sous-espèce *albistriata* en France restent valables pour les deux sous-espèces de Fauvette des Balkans, qu'il est très difficile de distinguer sur le terrain, mais certains individus de la sous-espèce *cantillans* ressemblent un peu plus à la Fauvette passerinette que les individus de la sous-espèce *albistriata* (gorge davantage rouge orangé que rouge brique, flancs plus colorés, cris différents), rendant leur identification un peu plus compliquée. Le CHN continuera à travailler avec les experts concernés pour renforcer les critères utilisés pour identifier la Fauvette des Balkans en France.



1. Fauvette des Balkans *Sylvia cantillans*, mâle, Hyères, Var, mars 2015 (Aurélien Audevard). Male Eastern Subalpine Warbler.

## Envoi des fiches d'homologation

Le CHN tient à rappeler qu'il est préférable de rédiger la fiche d'homologation (disponible à l'adresse suivante : [homologation.chn@gmail.com](mailto:homologation.chn@gmail.com)) et sur le site web du CHN ([www.chn-france.org](http://www.chn-france.org)) dès que possible après l'observation, même si vous n'êtes pas le découvreur de l'oiseau. Cela évite une publication tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues, ce qui nuit à la limpidité du rapport. La transmission rapide des fiches permet également de tenir le rythme de parution du rapport et de rester ainsi au plus près de l'actualité ornithologique. À noter aussi que les documents photographiques obtenus par les observateurs non découvreurs peuvent être des compléments précieux aux fiches déjà reçues. Le travail du CHN est d'autant plus utile que le nombre de fiches qui lui parviennent est important. N'hésitez donc pas à nous faire parvenir des fiches descriptives ou des photographies d'oiseaux que vous avez vus et qui ne figurent pas dans les rapports. Paradoxalement, les oiseaux vus par de nombreux observateurs sur des sites très fréquentés comme les îles bretonnes ou la Camargue sont souvent ceux qui sont oubliés...

## Fiches et photos

Il est également utile de souligner qu'en dépit du développement de la photographie numérique, rien ne peut remplacer une bonne description écrite, associant aussi des détails sur le comportement de l'oiseau. Les films et les photographies numériques enrichissent bien sûr les fiches et s'avèrent tout à fait précieux. Cependant, ils peuvent aussi être trompeurs et soulever parfois des questions inutiles auxquelles une description permettrait de répondre facilement. Ce point est fondamental dans la détermination d'espèces ou de sous-espèces délicates. Le CHN conseille aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, fondées seulement sur une ou plusieurs images, aussi bonnes soient-elles.

## LES FAITS MARQUANTS

Le nombre de canards néarctiques a été particulièrement élevé en 2013. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a eu pas moins de 11 Canards à front blanc *Anas americana* dont 9 ensemble ce qui est un record. Il y a également eu 8 Sarcelles à ailes vertes *Anas carolinensis* et 4 Fuligules à tête noire *Aythya affinis*. Par ailleurs, l'Oie rieuse du Groenland *Anser albifrons flavirostris* fournit une cinquième mention. Un record de présence a été noté pour le Grèbe à bec bigarré *Podilymbus podiceps* qui a séjourné 211 jours en Crau. Il y a eu quatre données d'Albatros à sourcils noirs *Thalassarche melanophris* et 13 données de Bergeronnette des Balkans *Motacilla flava feldegg*. Une nouvelle preuve de reproduction de la Marouette de Baillon *Porzana pusilla* a été obtenue. Par ailleurs, les premières mentions de Coulicou à



2. Mouette de Ross  
*Rhodostethia rosea*, 1<sup>er</sup> hiver,  
Saint-Pierre-de-Bœuf,  
Loire, novembre 2013  
(Vincent Palomares).  
First-winter Ross's Gull.

bec noir *Coccyzus erythrophthalmus* et de Rougequeue de Moussier *Phoenicurus moussieri* ont été obtenues pour la France alors que le Martinet des maisons *Apus affinis* fournit sa seconde mention. La Fauvette babillarde orientale *Sylvia curruca minula/halimodendri* en est à sa troisième observation, le Traquet pie *Oenanthe pleschanka* obtient ses quatrième et cinquième citations et l'Aigle des steppes *Aquila nipalensis* sa cinquième. Signalons enfin une Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* découverte à l'intérieur des terres.

## LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A & C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, représentant respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants, à l'exclusion de l'année 2013 ; les deux suivants désignent les données homologuées depuis 1981 (2013 exclue) et celui des individus correspondants ; les deux derniers représentent la même chose pour 2013. NB : les statistiques ont été entièrement révisées et mises à jour à l'occasion de la construction de la base de données du CHN. NB2 : les données issues des programmes de radio-tracking sont comptabilisées à part, sous la forme d'une parenthèse supplémentaire pour les espèces concernées.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité (commune puis lieu-dit éventuel, parfois suivi des coordonnées géographiques en degrés décimaux sous le système WGS84), effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.) ou enregistré en vidéo (vidéo) ou en audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention *et al.* indique que d'autres observateurs ont vu le (ou les) oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné dans le rapport du CHN est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou transmis une photo). Les photographies publiées sur Internet pour lesquelles aucune fiche n'a été adressée au CHN sont analysées avec une année de retard sur le rapport annuel. Dans ce cas, les références webographiques sont indiquées en lieu et place du nom de l'observateur.
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la répartition mondiale de l'espèce est donnée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de la Liste officielle des Oiseaux de France (CAF 2007), complétée par les mises à jour publiées par la CAF (CROCHET *et al.* 2013).
11. Les données de sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs indiqués. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Oie à bec court, 1 ind., Lairoux, Vendée, du 16 février au 7 mars (P. Trotignon).

### OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (224/1229) (155/462 - 7/10)

**Finistère** – Plovan, 2 ind., phot., 23 et 24 février (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Landes** – Saint-Martin-de-Seignanx, phot., 22 décembre (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Loire-Atlantique** – Saint-Lumine-de-Coutais : port, 2 ind., 21 mai (W. Maillard, P. Ouvrard).

**Manche** – Sainte-Marie-du-Mont, 1<sup>re</sup> année, phot., 7, 9 et 14 décembre (S. Provost, B. Chevallier, G. Desmares *et al.*).

**Marne** – Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement : lac du Der-Chantecoq, du 21 février au 1<sup>er</sup> mars (A. Sponga).

**Somme** – Saint-Quentin-en-Tourmont : parc du Marquenterre, 5 janvier (A. Leprêtre, L. Zagni).

**Vendée** – Lairoux, phot., du 16 février au 7 mars (P. Trotignon).

**2012 Charente-Maritime** – Breuil-Magné, ad., phot., du 21 novembre au 19 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Landes** – Saint-Martin-de-Seignanx, ad., phot., du 20 au 22 décembre (L. Goyénèche, S. Duchateau *et al.*).

**2012 Loire-Atlantique** – Lavau-sur-Loire : prairies de l'estuaire de la Loire, ad., phot., 13 février (O. Penard, G. Gaudichon, P.-A. Cottrant).

**2011 Ille-et-Vilaine** – Rennes : étang d'Apigné, 2 ad., phot., du 18 au 24 décembre (O. Poisson, J.-L. Chataignier *et al.*).

(Est du Groenland, Islande, Spitzberg). Les trois mentions de 2012 portent à 14 oiseaux le total de cette année. La donnée de Saint-Martin-de-Seignanx est la seconde pour le département des Landes, la première ayant été obtenue le 7 décembre 1996. L'observation réalisée à Saint-Lumine-du-Coutais, Loire-Atlantique, est très tardive étant donné que la plupart des Oies à bec court quittent nos régions avant la mi-mars. Si l'origine est sans doute sauvage pour la plupart des oiseaux observés à des dates hivernales dans le nord du pays, on peut se poser la question pour les deux individus tardifs de Loire-Atlantique...



**OIE RIEUSE DU GROENLAND** *Anser albifrons flavirostris* (8/16) (6/14 - 0/0)

**2012 Vendée** – Triaize: les Mizottes, ad., 16 janvier (F. Portier).

(Sud-Ouest du Groenland). Il y avait jusqu'ici trois mentions de cette sous-espèce, datant de janvier 1963 et effectuées en Ille-et-Vilaine, dans le Pas-de-Calais et dans la Manche. Par la suite, une observation a été effectuée en décembre 2000 dans le Finistère, une en octobre 2003 également dans le Finistère, et enfin une en février 2006 en Vendée. Il s'agit donc de la seconde mention pour ce département.

**BERNACHE À COU ROUX** *Branta ruficollis* (50/51) (34/33 - 3/3)

**Manche** – Aumeville-Lestre: Bergerie et Polygone, ad., phot., du 21 au 26 octobre (A. Barrier *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Audinghen: cap Griz-Nez, phot., 1<sup>er</sup> novembre (N. Legroux).

**Vendée** – Saint-Denis-du-Payré: réserve naturelle, 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 1<sup>er</sup> janvier au 17 février puis du 28 février au 1<sup>er</sup> mars (P. Trotignon, F. Portier, J.-C. Croisé *et al.*).

(Sibérie). Avec trois oiseaux différents, 2013 est une bonne année puisque la moyenne annuelle depuis 1981 est d'un peu plus d'un individu. Les dates d'arrivée et les localités littorales plaident pour une origine naturelle de ces bernaches. Par ailleurs, l'oiseau observé au cap-Griz-Nez est une seconde mention pour le Pas-de-Calais. À noter que l'espèce est vue de plus en plus régulièrement aux Pays-Bas.

**CANARD À FRONT BLANC** *Anas americana* (58/53) (55/50 - 3/11)

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu: lac de Grand-Lieu, fem. ad., 20 mars, (S. Reeber).

**Pas-de-Calais** – Oye-Plage: Platier d'Oye, mâle ad., phot., 26 et 27 janvier (F. Gabillard *et al.*).

**Vendée** – Île d'Yeu: marais salé, 4 mâles et 5 fem., phot., du 10 au 12 novembre puis 1 fem., phot., 13 novembre (X. Hindermeyer, M.-P. Hindermeyer *et al.*).

(Amérique du Nord). Le département de la Vendée avait déjà vu l'espèce à quelques reprises mais il s'agit là d'une première donnée pour l'île d'Yeu (HINDERMEYER *et al.* 2014). Par ailleurs, le nombre de neuf individus est bien sûr un record pour la France sachant que 97% des données obtenues jusqu'ici concernent un seul individu et les 3% restant deux oiseaux. L'arrivée de ces Canards à front blanc est sans doute à relier avec les vents violents de secteur ouest (jusqu'à 147 km/h) qui ont sévi en France à la fin du mois d'octobre 2013. La donnée de Loire-Atlantique correspond à la remontée prénuptiale.

**SARCELLE À AILES VERTES** *Anas carolinensis* (74/58) (73/57 - 9/8)

**Aube** – Dienville: port, mâle ad., phot., 16 février (P. Dufour, V. Condal).

**Aude** – Fleury d'Aude: étang de Pissevaches, mâle, du 16 novembre au 3 décembre (F. Garcia, T. Guillosson, D. Clément).

**Marne** – Giffaumont-Champaubert: lac du Der-Chantecoq, mâle, phot., du 23 février au 4 mars (H. Touzé *et al.*).

**Morbihan** – Sarzeau: marais du Duer, mâle ad., 19 novembre (G. Riou, C. Morvan).

**Haute-Marne** – Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, mâle, phot., le même ind. que celui de la Marne, du 23 février au 4 mars (H. Touzé *et al.*).

**Gironde** – Bruges: réserve des marais de Bruges, mâle ad., phot., 1 et 2 mars (P. Grisser, S. Barberis, S. Builles).

**Landes** – Orx: marais d'Orx, casier sud, mâle, phot., du 16 au 20 novembre (N. Weissaupt *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Guines, mâle ad., phot., du 16 mars au 6 avril (G. Flohart, L. Vièque).

**Vendée** – Saint-Denis-du-Payré: réserve naturelle, 2 mâles, du 31 janvier au 25 mars (P. Trotignon).

**2012 Vendée** – Lairoux: le Gorgeais, mâle ad., phot., 11 mars (F. Veyrunes, K. Schmale, G. Welch *et al.*) et non 3 et 11 mars (G. Welch *et al.*) (V. *Ornithos* 21-2: 70).

**2011 Eure** – Léry-Poses: lac des Deux Amants, mâle ad., phot., 11 février (C. Goujon).

**2009 Gironde** – Lacaneau: étang de Cousseau, mâle ad., phot., 25 et 26 janvier (P. Grisser, F. Sargos) et non 25 et 26 septembre (V. *Ornithos* 21-2: 70).

**2006 Finistère** – Penmarc'h: marais de Lescors, ad., phot., 19 mars (M. Canévet, J. Canévet, P. Canévet).

(Amérique du Nord). Neuf données et huit oiseaux différents constituent un record pour la France. Le maximum avait été de six données concernant six individus en 1999. Les dates auxquelles les oiseaux ont été observés entrent dans le schéma classique d'apparition de l'espèce en France. Si les observations provenant de Vendée sont parmi les plus régulières, quatre départements – Aube, Gironde, Haute-Marne

et Landes – fournissent leurs premières données et trois autres départements – Marne, Morbihan et Pas-de-Calais – leurs secondes. L'oiseau de Léry-Poses observé en 2011 est un revenant et porte le nombre de données de cette année à cinq et celui noté dans le Finistère en 2006 à trois. Par ailleurs, après rectificatif, la donnée de 2009 initialement notée en septembre n'est donc pas une date précoce vu que cet individu a été observé en janvier.

**SARCELLE À AILES BLEUES** *Anas discors* (65/66) (55/56 - 1/1)

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu: lac de Grand-Lieu, fem.?, phot., 17 septembre (S. Reeber).

(Amérique du Nord). La dernière observation française remonte à 2010. La date d'observation est des plus classiques. Par ailleurs, avec cette dixième donnée, la Loire-Atlantique est le département français qui accueille le plus l'espèce après la Vendée, qui en totalise onze.

**SARCELLE MARBRÉE** *Marmaronetta angustirostris* (44/100) (25/28 - 3/3)

**Loire-Atlantique** – Saint-Lumine-de-Coutais: lac de Grand-Lieu, type femelle, 13 mai (S. Reeber).

**Hérault** – Agde, phot., 25 août (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Var** – Hyères: salins des Pesquiers, mâle ad., phot., du 20 au 30 août (A. Audevard, F. Veyrunes *et al.*).

(Méditerranée, Moyen-Orient, nord de l'Inde). Deux des trois observations en 2013 ont été effectuées à des dates classiques puisque la majorité des contacts est obtenue lors de la dispersion postnuptiale, d'août à novembre. La donnée du lac de Grand-Lieu est une première pour la Loire-Atlantique, tandis que les deux autres observations sont des secondes mentions pour chaque département.

**FULIGULE À TÊTE NOIRE** *Aythya affinis* (24/16) (24/16 - 4/4)

**Charente-Maritime** – Dolus d'Oléron, mâle 1<sup>re</sup> année, phot., du 7 décembre au 4 janvier 2014 (Q. Hallet, O. Lалуque, L. Deplaine *et al.*).

**Finistère** – Plovan, mâle 2<sup>e</sup> année, phot., du 12 janvier au 4 février (M. Canévet, A. Desnos *et al.*).

**Loiret** – Dry: Grand Maison, mâle 1<sup>re</sup> année, phot., du 1<sup>er</sup> au 22 décembre (G. Chevrier, S. Branchereau, C. Maurer *et al.*).

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu: lac de Grand-Lieu, fem., 11 janvier (S. Reeber); mâle 2<sup>e</sup> année, phot., 15 avril (S. Reeber).

(Amérique du Nord). Quatre données et quatre individus sont une bonne année puisque la moyenne annuelle est d'un oiseau depuis la première observation en 1993. La Charente-Maritime et le Loiret accueillent leur premier Fuligule à tête noire. Notons que l'individu observé au lac de Grand-Lieu n'est pas moins que la seizième donnée de femelle déterminée en France.



3. Sarcelle marbrée  
*Marmaronetta angustirostris*,  
mâle, Hyères, Var, août  
2013 (Aurélien Audevard).  
*Male Marbled Teal.*

**MACREUSE À BEC JAUNE** *Melanitta americana* (10/9) (10/9 - 1/1)

**Somme** – Woignarue: Le Hâble d'Ault, mâle, 30 mars (A. Leprêtre).

(Amérique du Nord, Sibérie de l'Est). Cette espèce, qui reste toujours très rare, n'avait plus été observée en France depuis 2009. Il s'agit de la première donnée pour le département de la Somme et la date d'observation est typique de ce qui est connu chez nous.

**MACREUSE À FRONT BLANC** *Melanitta perspicillata* (63/65) (48/50 - 4/3)

**Finistère** – Camaret-sur-Mer, fem. 1<sup>re</sup> année, phot., du 16 décembre au 2 février 2014 (D. Grandière).

**Pas-de-Calais** – Audinghen: cap Griz-Nez, mâle ad., 15 novembre (G. Flohart).

**Vendée** – Bretignolles-sur-Mer: Roche Biron, fem., phot., du 3 au 22 janvier (N. Biron *et al.*). Givrand, phot., 19 janvier (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Amérique du Nord). Il est fort probable que l'oiseau de Bretignolles-sur-Mer soit le même que celui de Givrand, car dix kilomètres seulement séparent les deux sites. Par contre, il y a peu de chances que cet individu ait un quelconque rapport avec celui séjournant à la Tranche-sur-Mer (V. *Ornithos* 21-2: 71) à la même période vu qu'une cinquantaine de kilomètres séparent ces deux sites. Les observations provenant du Finistère sont assez régulières alors que celle du Pas-de-Calais est une cinquième mention pour le département.

**ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE** *Oxyura leucocephala* (38/43) (36/41 - 2/2)

**Ain** – Marlieux: Dombes, étang de Vavres, mâle, phot., 22 et 23 août (P. Crouzier, C. Frégat).

**Aude** – Fleury-d'Aude: lagune de Pissevaches, mâle, du 6 au 15 avril (S. Rey, G. Oliosio, F. Garcia *et al.*).


**2012 Ain** – Marlieux: Dombes, étang de Vavres, Saint-Maurice-de-Beynost et Miribel puis Saint-André-le-Bouchoux: étang Grand Romans, fem., phot., du 15 décembre au 19 mars 2013 (J.-M. Béliard, H. Pottiau, M. Callejon *et al.*) et non Saint-Maurice-de-Benoît et non jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2013 seulement (V. *Ornithos* 21-2: 71).

(Espagne, Tunisie, Turquie, Balkans, également au nord de la Caspienne). À nouveau une Érismature à tête blanche dans la Dombes, au même endroit où une femelle avait en partie séjourné jusqu'en mars 2013. L'oiseau de Pissevaches est une première pour le département de l'Aude, à une date assez atypique vu qu'il y a très peu de mentions en avril.

**PLONGEON À BEC BLANC** *Gavia adamsii* (20/18) (16/14 - 1/1)

**Marne** – Écollemont, Giffaumont-Champaubert, Larzicourt, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement: lac du Der-Chantecoq, 1<sup>re</sup> année, phot., du 8 décembre au 9 mars 2014 (J. Potaufoux, A. Sponga, G. Schmitt, G. Keck *et al.*).

(Sibérie, Alaska). Il s'agit de la seconde donnée au lac du Der-Chantecoq pour ce plongeon qui a fait le bonheur d'un grand nombre d'ornithologues. Le premier avait été observé du 28 janvier au 7 mars 2001.



4. Plongeon à bec blanc  
*Gavia adamsii*, 1<sup>er</sup> hiver, lac  
du Der, Marne, décembre  
2013 (Frédéric Domenjou).  
*First-winter Yellow-billed Loon.*

**GRÈBE À BEC BIGARRÉ** *Podilymbus podiceps* (9/8) (9/8 - 2/1)

**Bouches-du-Rhône** – Saint-Martin-de-Crau: étang des Aulnes, ad., phot., du 13 janvier au 22 juillet, puis du 7 novembre au 13 décembre (G. Paulus *et al.*).

**Finistère** – Plonéour-Lanvern/Tréméoc: étang du Moulin Neuf, phot., du 16 février au 5 mars (M. Canévet, J. Canévet *et al.*).

(Amérique du Nord). L'oiseau de Crau dans les Bouches-du-Rhône, qui a été découvert le 5 juillet 2012, poursuit son séjour. Courant juin, les observateurs présents ont pu l'entendre chanter assidûment. Le grèbe du Finistère est une seconde mention pour le département puisqu'un oiseau y avait déjà séjourné durant l'hiver 1996-1997.

**ALBATROS À SOURCILS NOIRS** *Thalassarche melanophris* (10/10) (10/10 - 4/2)

**Calvados** – Langrune-sur-Mer, ad., 23 mai (I. Henry, C. Dufresnes, G. Dufresnes).

**Côtes-d'Armor** – Plougrescant, 2<sup>e</sup> année, 28 octobre (G. Lesaffre).

**Morbihan** – Hoëdic, ad., phot., 16 avril (S. Moisdon *fade* A. Le Nevé); Houat, ad., 26 octobre (A. Stoquert, B. Sinot).

(Mers australes). Quatre données une même année, c'est tout à fait exceptionnel, de surcroît concernant au moins deux individus différents. Il est en effet plus que probable que l'adulte observé à plusieurs reprises soit le même individu. Chacun des trois départements concernés fournit sa première mention. Jusqu'ici, la plupart des observations avaient été réalisées en septembre.

**CORMORAN PYGMÉE** *Phalacrocorax pygmeus* (19/16) (17/15 - 2/2)

**Bouches-du-Rhône** – Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, marais de Carapasse, 2 ind., 17 janvier (Y. Kayser).

**Gard** – Vauvert: centre du Scamandre, ad., phot., 28 juin (H. Touzé, M. Besnard).

**2012 Ardèche** – Mauves, 2<sup>e</sup> année, phot., du 19 mars au 5 avril (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Europe de l'Est, Asie centrale). L'espèce n'avait jusqu'ici jamais été observée en janvier. Un adulte a une nouvelle fois fréquenté brièvement la héronnière du Gard. Il doit s'agir du même individu. Par ailleurs, l'oiseau de 2012 porte à six le nombre de données obtenues cette année-là.

**AIGRETTE DES RÉCIFS** *Egretta gularis* (51/36) (45/30 - 2/2)

**Gard** – Vauvert: centre du Scamandre, ad., sous-espèce *gularis*, phot., du 26 juin au 9 août (Y. Kayser, J.-P. Trouillas, H. Touzé *et al.*); Vauvert: centre du Scamandre, ad., sous-espèce *gularis*, phot., du 20 au 24 août (B. Lebrun, B. Duchenne, V. Palomares *et al.*).

**2000 Hérault** – Frontignan: salins de Frontignan, du 20 avril au 5 mai (Y. Ponthieux).

(Afrique, Asie). L'oiseau présent de juin à août dans le Gard a été observé couvant trois œufs le 26 juin, puis quatre le 28. Le nid n'a toutefois pas pu être retrouvé par la suite dans l'immensité de cette colonie de hérons; de plus, il n'a pas pu être déterminé s'il s'agissait d'un couple mixte ou d'un couple pur, un second adulte ayant été vu plus tard dans cette même colonie. L'observation de 2000 porte à quatre le nombre d'oiseaux observés cette année.

**BUSARD PÂLE** *Circus macrourus* (239/239) (200/200 - 0/0)

**2012 Alpes-Maritimes** – La Trinité, mâle 3<sup>e</sup> année, phot., 8 septembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Bouches-du-Rhône** – Marseille, 2<sup>e</sup> année, phot., 9 avril (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)) puis sans doute le même individu, phot., du 13 au 17 avril (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Gironde** – Le Verdon-sur-Mer, femelle 2<sup>e</sup> année, phot., 16 avril (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Pyrénées-Atlantiques** – Banca: col de Lindux, mâle de plus de deux ans, 20 septembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Vendée** – Benet, mâle ad., 21 août (F. Caquineau) et non Bennet, 21 août (V. *Ornithos* 21-: 73).

(Asie centrale, à l'Ouest jusqu'en Roumanie). Difficile de dire si l'oiseau des Bouches-du-Rhône est un nouvel individu ou l'un de ceux qui avaient été observés sur le même secteur quelques jours auparavant (V. *Ornithos* 21-2: 72). Dans le doute, il n'a pas été comptabilisé. Par contre, les trois autres individus, sont sans conteste nouveaux, ce qui porte à 35 le nombre de Busards pâles homologués pour 2012. Pour rappel, cette espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013.

**BUSE FÉROCE** *Buteo rufinus* (45/41) (40/36 – 3/3)

**Aude** – Narbonne : église de Mandirac, 1<sup>re</sup> année, sous-espèce *rufinus*, phot., du 27 novembre au 30 mars 2014 (M.-A. Réglade, V. Goma, G. Picotin *et al.*).

**Doubs** – Paroy, ad., sous-espèce *rufinus*, 9 avril (C. Mauvais).

**Calvados** – Banneville-sur-Ajon : la Fêterie, ad., 20 juin, (D. Vigour).

**2012 Hérault** – Lansargues : domaine de Tartuguières, 28 juin (B. Nabholz, J. Terraube).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Avec trois oiseaux, 2013 est une bonne année, la moyenne annuelle étant d'un peu plus d'un individu depuis 1981. Les dates d'observations sont classiques. L'Aude accueille son quatrième oiseau après celui d'octobre 2009, le Doubs son troisième, et celui qui a été observé dans le Calvados est une première pour le département. Par ailleurs, avec l'observation héraultaise, l'année 2012 totalise quatre individus.

**BUSE PATTUE** *Buteo lagopus* (590/618) (521/545 – 0/0)

**2012 Aude** – Plaigne : La Courbe, 2<sup>e</sup> année, 29 janvier (T. Guillosson, L. Guillosson).

**2012 Cantal** – Ussel, mâle 3<sup>e</sup> année, phot., du 23 décembre au 26 janvier 2013 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Manche** – Helleville : rue des Monts, 20 février (E. Robbe).

**2011 Cantal** – Coltines, Celles, Ussel, 2<sup>e</sup> année, phot., du 5 novembre 2011 au 18 mars 2012 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Coltines, Celles, Ussel, 2<sup>e</sup> année, phot., du 11 novembre au 11 mars 2012 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2011 Haute-Loire** – Bains, Sénéjols et Saint-Christophe-sur-Dolaison, 1<sup>re</sup> année, phot., du 1<sup>er</sup> novembre au 7 janvier 2012 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Le Bouchet-Saint-Nicolas, 1<sup>re</sup> année, phot., du 12 au 14 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2011 Puy-de-Dôme** – Valcivières : montagne de Monthallier, 2<sup>e</sup> année, phot., 17 janvier (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Aurières, 1<sup>re</sup> année, phot., du 3 décembre au 24 février 2012 (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2010 Bouches-du-Rhône** – Arles : Camargue, Mas-Thibert, Le Cassaire, 1<sup>re</sup> année, 3 décembre (G. Masseur).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Avec ces nouvelles données, l'hiver 2010-2011 compte désormais 142 oiseaux observés sur le territoire français et l'hiver 2011-2012, 57 individus. On peut noter que l'oiseau de l'Aude est une deuxième observation pour le département et celui des Bouches-du-Rhône, une sixième. Au moins deux oiseaux d'Auvergne observés lors de l'hiver 2011-2012 sont des revenants. Pour rappel, cette espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013.

**AIGLE CRIARD** *Aquila clanga* (257/201) (211-142 – 13/10)

Individus de type Aigle criard

**Ain** – Birieux : grand étang de Birieux, ad., phot., du 26 octobre au 5 janvier 2014 (P. Crouzier *et al.*).

**Ariège** – Montoulieu, 12 octobre (S. Reyt).

**Bouches-du-Rhône** – Saintes-Maries-de-la-Mer : étang de Consécanière, ad., 10 février (F. Legendre, A. Laurent); Arles : Camargue, Tour du Valat et Amphise, phot., 23 mars (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, étang de Consécanière, ad. et 1<sup>re</sup> année, 29 novembre (Y. Kayser); Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, étang de Consécanière, ad. différent du précédent, 3 décembre (Y. Kayser); Saintes-Maries-de-la-Mer : Camargue, Château d'Avignon, ad., phot., 29 décembre (P. Kern).

**Gard** – Vauvert : Camargue, les Cargattes, phot., 8 janvier (S. Popy); Vauvert : Camargue, les Cargattes, 2<sup>e</sup> année, phot., 11 et 14 février (M. Thibault); Vauvert : Camargue, étang du Charnier, pont des Tourradons, 2<sup>e</sup> année, prob. le même ind., phot., 21 février (S. Reyt).

**Landes** – Saint-Martin-de-Seignanx : réserve de Bergusté, ad., phot., 17, 18 puis 20 et 21 novembre (P. Doniol-Valcroze, B. Lamothe).

**Pyrénées-Orientales** – Salses-le-Château, 1<sup>re</sup> année, 28 octobre (Y. Aleman).

**Vendée** – Saint-Denis-du-Payré, ad., 25 mai (P. Trotignon).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Les difficultés rencontrées pour l'identification des Aigles criards et leur séparation d'éventuels hybrides font en sorte que le nombre d'aigles vus en France est naturellement sous-estimé. Les Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement la Camargue, ont une nouvelle fois accueilli une bonne partie des oiseaux observés (50%). Cela dit, il n'y a pas eu d'hivernage complet à proprement parler en Camargue. Par ailleurs, sur les cinq oiseaux, un seul est un revenant, tout comme le sont ceux de l'Ain et des Landes. Les départements de l'Ariège et de la Vendée fournissent leur troisième mention.

**5.** Buse féroce *Buteo rufinus*, 1<sup>er</sup> hiver, Aude, décembre 2013

(Christophe Mercier).

First-winter Long-legged Buzzard.

**AIGLE POMARIN** *Aquila pomarina* (101/86) (97/70 – 1/1)

Individus de type Aigle pomarin

**Haute-Savoie** – Chevrier : défilé de l'Écluse, 1<sup>re</sup> année, 20 septembre (J.-P. Matérac, S. Kimmel, R. Broch).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Avec une seule donnée, 2012 est l'une des années les plus basses. Cet oiseau, observé en migration active a été noté à une date des plus classiques. Il s'agit de la sixième donnée pour la Haute-Savoie et du quatrième vu sur ce site.

**AIGLE DES STEPPES** *Aquila nipalensis* (4/3) (3/2 – 1/1)

**Haute-Savoie** – Chevrier : défilé de l'Écluse, imm., phot., 2 octobre (J.-P. Matérac, S. Henneberg, C. Giacomo *et al.*).

(De l'Ukraine à l'Asie centrale). Cinquième donnée française après la dernière observation qui date de 2006. L'oiseau a été observé en migration active par une poignée d'observateurs sur un site qui réserve chaque année son lot de surprises.

**FAUCON LANIER** *Falco biarmicus* (-/-) (-/- – 1/1)

**2009 Bouches-du-Rhône** – Istres : Crau, Coussoul de Calissane, 1<sup>re</sup> année, phot., 24 septembre (G. Paulus).

(Afrique du Nord, Asie occidentale). Enfin une donnée de Faucon lanier certifiée dans une région où l'on pouvait s'attendre à voir cette espèce. Rappelons que toutes les données françaises sont en cours de révision, suite notamment à l'émergence des problèmes liés à l'hybridation entre grands faucons, surtout en captivité mais aussi en nature. Les résultats de ce travail seront publiés prochainement.

**MARQUETTE DE BAILLON** *Porzana pusilla* (122/163) (76/90 – 6/6)

**Ain** – Versailleux, La Dombes, chanteur, 10, 13 et 29 juin (P. Crouzier, M. Crouzier).

**Aube** – Maizières-lès-Brienne : étang du Grand Verdat, chanteur, 25 juin (E. Lhomer).

**Creuse** – Lussat : étang des Landes, ad., 27 août (F. Desage, C. Mercier).

**Maine-et-Loire** – Soulaire-et-Bourg : la Baillie de Noyant, 1<sup>re</sup> année, phot., du 13 au 17 août (R. Bonnet, Y. Guenescheau, E. Debenest *et al.*).





6. Marouette de Baillon *Porzana pusilla*, juvénile, Saône-et-Loire, juillet 2013 (Alexis Réveillon). *Juvenile Baillon's Crake*.



7. Courvite isabelle *Cursorius cursor*, adulte, Aude, juin 2013 (Julien Gernigon). *Adult Cream-coloured Courser*.

**Saône-et-Loire** – Saint-Maurice-en-Rivière: le Perthuis de la Lampe, juv. non volant, capt. et phot., 22 juillet (B. Grand, A. Réveillon, S. Horent *et al.*).

**Somme** – Saint-Quentin-en-Tourmont, mâle de plus d'un an, 1<sup>er</sup> juillet (A. Leprêtre).

**2012 Nièvre** – La Collancelle, 1<sup>re</sup> année, capt. et phot., 10 août (J.-M. Coquillat, J.-L. Clavier, J. Oberson).

**2009 Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, marais du Vigueirat, mâle chanteur, 18 mars (G. Masseur).

(Europe, Asie centrale, Japon). Par rapport à 2012, le nombre total d'oiseaux est divisé par deux, mais une nouvelle preuve de reproduction est obtenue, cette fois-ci en Saône-et-Loire, avec ce juvénile non volant capturé, qui est d'ailleurs une première donnée pour ce département. On peut également relever ces deux mâles chanteurs: l'un dans la Dombes, l'autre dans l'Aube qui de ce fait accueille également sa première Marouette de Baillon.

**COURVITE ISABELLE** *Cursorius cursor* (27/27) (8/8 – 1/1)

**Aude** – Port-la-Nouvelle: salins de Sainte-Lucie, ad., phot., du 20 mai au 11 juin (J. Paoli, M. Tomasella *et al.*).

**2012 Finistère** – Lampaul-Ploudalmézeau et Saint-Pabu, ind. de plus d'un an, phot., du 21 juin au 10 juillet (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Afrique, Asie du Sud-Ouest). Troisième année d'observation consécutive pour cette espèce qui n'avait jusqu'ici été notée qu'à huit reprises depuis la création du CHN. Il s'agit également du séjour le plus long d'un courvite noté jusqu'ici.

**PLUVIER BRONZÉ** *Pluvialis dominica* (64/66) (62/64 – 2/2)

**Loire-Atlantique** – Saint-Mars-de-Coutais: lac de Grand-Lieu, 2<sup>e</sup> année, phot., du 14 au 19 mai (S. Reeber *et al.*).

**Vendée** – Olonne-sur-Mer: marais des Loirs, ad., 5 septembre (O. Girard).

**2010 Morbihan** – Île d'Hoëdic, mâle, phot., 16 juin (F. Spinnler, A. Lombart).

**2009 Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, marais du Grenouillet, 1<sup>re</sup> année, du 15 au 23 novembre (Y. Kayser, F. Poumarat, M. Poumarat *et al.*).

(Amérique du Nord). Retour à la normale puisque la moyenne annuelle est de près de deux oiseaux par an depuis la création du CHN. L'oiseau du lac de Grand-Lieu observé au mois de mai fournit l'une des rares données printanières. Par ailleurs, l'observation effectuée à Hoëdic en 2011 porte le nombre de données à six pour cette année, ce qui est l'une des meilleures pour cette espèce avec 2007. Ce pluvier a en outre été observé au mois de juin, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Enfin, la donnée de 2009 parvenue tardivement au CHN est une troisième mention pour les Bouches-du-Rhône et la Camargue.

**PLUVIER FAUVE** *Pluvialis fulva* (23/23) (23/23 – 1/1)

**Charente-Maritime** – Saint-Clément-des-Baleines: réserve naturelle de Lilleau des Niges, phot., du 12 au 16 juillet (J. Gernigon, H. Roques).

(Sibérie, Alaska). Il s'agit de la quatrième donnée de Charente-Maritime qui reste, avec la Vendée, le département le plus fréquenté par ce pluvier. Les observations de la deuxième décennie de juillet sont les plus nombreuses.

**VANNEAU SOCIABLE** *Vanellus gregarius* (124/122) (115/113 – 4/4)

**Loire** – Saint-Étienne-le-Molard, ind. de plus d'un an, phot., 16 au 21 mars (B. Raffin, A. Faure, R. Sève *et al.*).

**Marne** – Tibie, 1<sup>re</sup> année, phot., 6 octobre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Moselle** – Saint-Georges, ind. de plus d'un an, phot., du 3 au 7 avril (N. Hoffmann, J.-P. Stuber); Guermange, ad., phot., 1<sup>er</sup> septembre (F. Poumarat, M. Poumarat).

**Yonne** – Piffonds, phot., 24 mars (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). Trois des quatre données correspondent aux dates de passage pré-nuptial dans nos régions. La quatrième observation a été faite à une date automnale classique. Les observations ont été effectuées dans des départements qui sont habituellement peu fréquentés par l'espèce. En effet, l'oiseau de Piffonds est une première pour l'Yonne tandis que celui de Saint-Étienne-le-Molard est seulement une seconde mention pour la Loire et celui de Saint-Georges une troisième pour la Moselle.

**BÉCASSEAU SEMIPALMÉ** *Calidris pusilla* (29/29) (28/28 – 3/3)

**Finistère** – Île de Sein: plage du Sphinx, 1<sup>re</sup> année, phot., 14 septembre (W. Raitière *et al.*); Ouessant: Porz Doun, 1<sup>re</sup> année, phot., du 6 au 14 octobre (J. Mérot *et al.*).

**Landes** – Mimizan, 1<sup>re</sup> année, phot., 15 septembre (D. Damian-Picollet).

(Amérique du Nord). Avec trois Bécasseaux semipalmés, 2013 est une bonne année après 2012 qui avait été une année blanche pour l'espèce. Si les Landes accueillent ce bécasseau pour la première fois, les deux autres observations ont été effectuées dans le département qui compte le plus de données.

8. Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla*, juvénile, Ouessant, Finistère, octobre 2013 (Nidal Issa). *Juvenile Semipalmated Sandpiper*.



**BÉCASSEAU DE BONAPARTE** *Calidris fuscicollis* (57/58) (53/54 – 5/6)

**Finistère** – Île de Sein: pointe de Plas Ar Skoul, 1<sup>re</sup> année, phot., 3 et 4 novembre (K. Schmale, H. Touzé, J. Renoult *et al.*).

**Hautes-Pyrénées** – Luquet: retenue du Gabas, 1<sup>re</sup> année, du 6 au 9 novembre (J.-L. Grangé *et al.*).

**Landes** – Orx: marais d'Orx, casier sud, 1<sup>re</sup> année, phot., du 31 octobre au 10 novembre (A. Noël) puis 2 ind. de 1<sup>re</sup> année, du 10 au 23 novembre (P. Legay, F. Cazaban, S. Tillo *et al.*).

**Morbihan** – Belle-Île: Sauzon, Anter, 1<sup>re</sup> année, phot., 29 octobre (M. Giroud, I. Giroud); Locmariaquer: Brénéguay, 1<sup>re</sup> année, phot., du 30 octobre au 1<sup>er</sup> novembre (P.J. Dubois, S. Guérin, Y. Blat *et al.*); Erdeven: la Roche Sèche, 1<sup>re</sup> année, phot., du 6 au 12 novembre (P.J. Dubois, E. Rousseau, S. Provost *et al.*).

(Amérique du Nord). De nouveau une bonne année avec cinq données. Non seulement le département des Landes accueille cette espèce pour la première fois mais ce n'est que la deuxième fois que deux Bécasseaux de Bonaparte sont vus ensemble. Il faut en effet remonter à 1999 où deux individus avaient été observés dans le Finistère. L'oiseau de Luquet constitue également une première mention départementale. Les dates des observations sont conformes à ce qui est connu chez nous pour ce limicole néarctique, toutes les mentions concernant des jeunes oiseaux.

**BÉCASSEAU DE BAIRD** *Calidris bairdii* (55/56) (51/52 – 1/1)

**Ain** – Saint-Niziers-le-Désert, la Dombes, 2<sup>e</sup> année ou ad., phot., 28 juillet (P. Crouzier).

(Amérique du Nord). Une seule donnée cette année à une date plutôt atypique et dans un département où de surcroît, l'espèce n'avait jusqu'ici jamais encore été observée...

**BÉCASSEAU À ÉCHASSES** *Calidris himantopus* (10/10) (10/10 – 1/1)

**Gironde** – Le Teich: parc ornithologique du Teich, ad., phot., du 21 au 27 juillet (J. Gernigon, A. Liger *et al.*).

(Amérique du Nord). Une nouvelle mention estivale d'adulte sur un site qui compte sa troisième donnée de Bécasseau à échasses après celles de juillet 1989 et d'août 2012.

**BÉCASSEAU FALCINELLE** *Limicola falcinellus* (223/302) (177/250 – 10/10)

**Bouches-du-Rhône** – Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, étang du Galabert, ind. de plus d'un an, phot., 16 avril (P. Renard); étang du Galabert, phot., du 22 avril au 3 mai (L. Carrier *et al.*); Arles: Camargue, étang du Fangassier, ind. de plus d'un an, phot., du 5 au 15 mai (A. Faure, R. Sève *et al.*); Saintes-Maries-de-la-Mer: Pourtour du Rascaillan, phot., du 5 au 9 mai (H. Touzé, P.-A. Crochet, M. Thibault *et al.*); Arles: Camargue, étang du Fangassier, 2 ind., phot., du 11 au 13 mai (H. Touzé, A. Faure, S. Rolland *et al.*); Saintes-Maries-de-la-Mer: étang du Galabert, 2 ind., phot., du 11 au 14 mai (H. Touzé, A. Faure, S. Rolland *et al.*); Arles:

9. Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis*, 1<sup>er</sup> hiver, île de Sein, Finistère, novembre 2013 (Frédéric Veyrunes).  
*First-winter White-rumped Sandpiper.*



10. Bécasseau à échasses *Calidris himantopus*, adulte, parc du Teich, Gironde, juillet 2013 (Julien Gernigon).  
*Adult Stilt Sandpiper.*



Camargue, étang du Fangassier, ad., phot., du 13 au 15 août (M. Zucca, F. Schnurr); baisse des Cinq Cents Francs, 1<sup>re</sup> année, du 22 août au 2 septembre (B. Lebrun, S. Risser, S. Maury *et al.*); Saintes-Maries-de-la-Mer, 1<sup>re</sup> année, phot., du 25 au 28 septembre (G. Brouard, A. Fonfrède).

**Moselle** – Mondelange, phot., 14 mai (A. Lehalle, J. François).

(Europe septentrionale). Avec dix données, 2013 est une très bonne année pour cette espèce et toutes les observations ont été réalisées à des dates classiques. La donnée de Mondelange est une première mention pour le département de la Moselle. Tous les autres contacts ont été effectués en Camargue qui totalise plus de la moitié des données françaises.

**BÉCASSEAU ROUSSET** *Tryngites subruficollis* (228/275) (198/213 – 4/4)

**Charente-Maritime** – Saint-Jean-d'Angle: Malaigre, 1<sup>re</sup> année, 10 septembre (L. Jomat).

**Var** – Hyères: salins des Pesquiers, ind. de plus d'un an, phot., du 24 au 27 août (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Vendée** – Maché: lac de Maché-Apremont, ind. de plus d'un an, phot., du 4 au 14 septembre (F. Portier, D. Cleva *et al.*); 1<sup>re</sup> année, phot., du 25 au 30 septembre (F. Portier, D. Cleva *et al.*).

(Amérique du Nord). Retour à une année plus normale avec quatre données seulement. Pour rappel, 2011 et 2012 avaient fourni respectivement 22 et 11 données. Les trois bécasseaux de la côte atlantique ont été observés dans des départements qui accueillent assez régulièrement l'espèce. La donnée varoise est une troisième pour le département.

**BÉCASSINE DOUBLE** *Gallinago media* (309/353) (68/70 – 7/8)

**Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, domaine de Giraud, phot., 14 mai (H. Touzé, D. Cohez).

**Cantal** – Coltines: le Cham de Coltines, 24 avril (R. Riols).

**Côte-d'Or** – Baubigny, phot., du 5 au 8 septembre (B. Fontaine, A. Rougeron); 2 ind., phot., 6 septembre (B. Fontaine, A. Rougeron).

**Corse-du-Sud** – Serriera, 9 septembre (M. Craig).

**Haute-Corse** – Macinaggio-Rogliano, 28 avril (P.J. Dubois, P. Crouzier).

**Hautes-Alpes** – Névache, 13 août (J.-P. Marie).

**Pyrénées-Orientales** – Salses-le-Château: marais de Salses, 23 mars (M. Poumarat, F. Poumarat).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Une très bonne année pour cette espèce car en dehors de 2007 et de 2011, les autres années ne totalisent pas plus de quatre données depuis la création du CHN. À noter qu'il y a presque autant de mentions automnales que printanières alors que ces dernières sont normalement très majoritaires. La présence simultanée de deux oiseaux n'est pas classique puisque depuis 1981, plus de 95% des contacts concernent des individus isolés.

**CHEVALIER À PATTES JAUNES** *Tringa flavipes* (54/54) (39/39 – 1/1)

**Finistère** – Le Conquet, Molène, île de Quéménès, ad., phot., 23 juillet (M. Bazin, D. Halleux, A. Le Nevé).

(Amérique du Nord). Une seule donnée en 2013, la 21<sup>e</sup> mention pour le Finistère, à une date classique.

**CHEVALIER BARGETTE** *Tringa cinerea* (139/123) (115/101 – 4/4)

**Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, baisse des Cinq Cents Francs, phot., 12 mai (H. Touzé).

**Gironde** – Audenge: domaine de Certes, ad., phot., du 26 au 30 mai (M. Taillade, A. Liger).

**Var** – Hyères: salins des Pesquiers, ad., phot., 14 mai (A. Audevard, E. Cougnec, N. Chardon *et al.*).

**Vendée** – Saint-Denis-du-Payré, ad., 16 mai (P. Trotignon).

2012 **Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, étang du Fangassier, ind. de plus d'un an, 23 mai (Y. Kayser); Camargue, marais du Vigueirat, ind. de plus d'un an, du 28 au 30 juillet (R. Tiné, L. Debiesse); Camargue, domaine de la Palissade, phot., du 29 août au 4 octobre (C. Tétré, K. Schmale, E. Violet).

2010 **Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, marais du Vigueirat, phot., du 21 juillet au 1<sup>er</sup> août (R. Tiné, S. Ceyte, R. Bazire *et al.*).

2009 **Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, marais du Vigueirat, ind. de plus d'un an, 11 septembre (J.-L. Lucchesi). (Europe du nord-est, Sibérie). Avec quatre données, 2013 est légèrement supérieure à la moyenne. Les observations ont été réalisées au pic du passage printanier. Les données parvenues tardivement au CHN portent le nombre de mentions à trois pour 2012, deux pour 2010 et sept pour 2009.



**CHEVALIER GRIVELÉ** *Actitis macularia* (20/22) (20/22 – 1/1)

**Finistère** – Trébabu, 1<sup>re</sup> année, phot., du 26 au 30 septembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Amérique du Nord). Quatrième année consécutive pour l'observation de ce chevalier en France, où la moyenne ne dépasse pas 0,6 oiseau par an. Il s'agit de nouveau d'une donnée finistérienne à des dates classiques.

**MOUETTE DE BONAPARTE** *Chroicocephalus philadelphia* (31/30) (30/29 – 2/2)

**Finistère** – Ouessant: Rilouet-Yuzin, 1<sup>re</sup> année, 23 octobre (F. Legendre).

**Loire-Atlantique** – Saint-Mars-de-Coutais: lac de Grand-Lieu, 2<sup>e</sup> année, phot., 16 mai (A. Oates, E. Archer).

(Amérique du Nord). La Mouette de Bonaparte est observée chaque année depuis 2003. Si la plupart des données françaises sont printanières, les observations postnuptiales s'échelonnent de fin juillet à octobre.

**MOUETTE DE ROSS** *Rhodostethia rosea* (7/7) (6/6 – 2/1)

**Isère** – Saint-Pierre-de-Boëuf: barrage, 1<sup>re</sup> année, phot., 23 novembre (V. Palomares).

**Loire** – Saint-Pierre-de-Boëuf: barrage, le même 1<sup>re</sup> année, phot., 23 novembre (V. Palomares).

(Circum-arctique. Hiverné dans l'océan Glacial Arctique). Observation pour le moins extraordinaire pour cet ornithologue chanceux, avec cette Mouette de Ross posée parmi des Mouettes rieuses *Larus ridibundus* sur le Rhône ! Il s'agit de la huitième mention française, les dernières ayant été obtenues en 2007. Ce laridé n'avait par ailleurs jamais été observé à l'intérieur des terres.

**MOUETTE ATRICILLE** *Larus atricilla* (44/42) (39/37 – 1/1)

**Vendée** – L'Aiguillon-sur-Mer, 2<sup>e</sup> année, phot., du 12 au 14 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Amérique du Nord). Il s'agit de la dixième mention vendéenne (et de la seconde sur cette commune), pour cette mouette qui n'a été observée que quatre fois en France depuis 2006. Les observations du mois de novembre sont assez régulières.

**MOUETTE DE FRANKLIN** *Larus pipixcan* (35/33) (34/32 – 1/1)

**Sarthe** – La Flèche: les Poulriers, 3<sup>e</sup> année, phot., 20 avril (O. Vannucci, F. Vaidie).

(Amérique du Nord). Il s'agit de la première observation de cette mouette dans la Sarthe. Il existait déjà des mentions en avril, et la Mouette de Franklin peut être vue en France quasiment toute l'année puisque seul le mois de juillet ne compte aucune donnée. Par ailleurs, les contacts dans des départements intérieurs ne sont pas exceptionnels puisque c'est la septième fois qu'elle est vue loin des zones littorales. On a observé ce laridé jusque dans le Rhône en 1982 et dans l'Ain en 2004.

**GOÉLAND À AILES BLANCHES** *Larus glaucoides* (347/379) (339/370 – -/-)

**2012 Finistère** – Penmarc'h: Saint-Guérolé, 3<sup>e</sup> hiver, phot., du 5 janvier au 12 mars (P. Bounie, M. Canevet *et al.*), 2<sup>e</sup> hiver, phot., du 17 au 19 février (M. Canevet *et al.*), 2<sup>e</sup> hiver, phot., 19 février (M. Canevet *et al.*), 2<sup>e</sup> hiver, le même ind. que celui présent au 17 février, du 22 février au 14 mai (P. Bounie *et al.*) et non Saint-Guérolé: port, 3<sup>e</sup> hiver, phot., 5 et 6 janvier (M. Canévet *et al.*), 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 17 au 19 février (M. Canévet *et al.*), 1<sup>er</sup> hiver, phot., 19 février (M. Canévet *et al.*); Penmarc'h: Saint-Guérolé, 1<sup>er</sup> hiver, phot., 2 janvier (S. Mauvieux), 3<sup>e</sup> hiver, phot., du 28 janvier au 12 mars (P. Bounie), 1<sup>er</sup> hiver, phot., du 22 février au 9 mars (P. Bounie).

**2012 Manche** – Crosville-sur-Douve, 1<sup>re</sup> année, 26 décembre (J. Desmares).

**2012 Vendée** – Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2<sup>e</sup> année, phot., 9 mai (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *kumlieni* (21/19) (21/19 – 1/1)

**Loire-Atlantique** – Guérande: Bout de la Rue, 2<sup>e</sup> année, phot., 21 février (W. Raitière).

(Arctique canadien, Groenland). Les deux données homologuées tardivement par le CHN portent à 67 le nombre d'oiseaux observés lors de l'année 2012. L'individu de Vendée est un troisième oiseau séjournant dans ce département à cette époque de l'année. Dans la Manche, il y en avait eu deux en mars. Le Goéland de Kumlien observé en Loire-Atlantique est le vingtième oiseau français. Cette sous-espèce avait déjà été contactée dans ce département. Pour rappel, la sous-espèce nominale du Goéland à ailes blanches n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013.

**STERNE ÉLÉGANTE** *Sterna elegans* (46/9) (43/8 – 2/1)

Individus présentant les caractéristiques de la Sterne élégante

**Vendée** – Noirmoutier-en-l'Île: Barbâtre, polder de Sébastopol, phot., 12 et 26 mai (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); ad., phot., du 9 juin au 20 juillet (D. Robard, J. Gernigon, X. Hindermeier *et al.*).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). Comme par le passé, le mâle bagueé en 2007 au banc d'Arguin a fréquenté le polder de Sébastopol. Par contre, l'oiseau noté de juin à juillet est un nouvel individu qui a été vu paradant à plusieurs reprises.

**STERNE VOYAGEUSE** *Sterna bengalensis* (48/40) (41/25 – 1/1)

**Alpes-Maritimes** – Saint-Laurent-du-Var: embouchure du Var, ind. de plus d'un an, phot., 17 et 18 mai (B. Delahaie, J. Bel, J. Ben-Saïd *et al.*).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Troisième observation dans le département des Alpes-Maritimes. La majorité des autres observations réalisées sur la bordure méditerranéenne française provient des Bouches-du-Rhône et plus particulièrement de Camargue.

**STERNE DE FORSTER** *Sterna forsteri* (6/5) (6/5 – 3/2)

**Manche** – Montfarville: Landemer, ad., phot., 13 novembre (S. Crestey); Réthoville, ad., 8 décembre (A. et V. Verneau).

**Morbihan** – Séné: réserve de Séné, 2<sup>e</sup> année, phot., du 11 mars au 7 avril (M. Diraison, T. Zgirski, G. Gélinaud).

(Amérique du Nord). Il n'y avait plus eu d'observations de cette sterne depuis 2007. Les deux contacts dans la Manche sont des premières pour ce département et concernent le même individu tout comme l'oiseau du Morbihan est une première départementale. Il s'agit du second immature noté en France.

**GUILLEMOT À MIROIR** *Cephus grylle* (66/76) (44/48 – 1/1)

**Manche** – Gatteville-le-Phare, 30 novembre (A. Verneau, L. Legrand *et al.*).

**2009 Seine-Maritime** – Saint-Jouin-Bruneval: digue Thieullent, 1<sup>re</sup> année, phot., 12 novembre (G. Deboom, E. Delaure *vide* M. Duvilla).

**2008 Seine-Maritime** – Saint-Jouin-Bruneval: digue du terminal pétrolier d'Antifer, 1<sup>re</sup> année, phot., 7 et 24 décembre (M. Duvilla, A. Guillemont).

(Arctique, Atlantique Nord). Sixième observation dans la Manche à une date classique. Les observations homologuées tardivement par le CHN portent à quatre le nombre de données concernant cette espèce en 2009 et trois en 2008. Par ailleurs, il y aura eu deux oiseaux différents en décembre 2008 dans le terminal pétrolier d'Antifer.



11. Mouette atricille *Larus atricilla*, 2<sup>e</sup> année, Vendée, novembre 2013 (Yann Brilland). 2nd-yr Laughing Gull.

**COULICOU À BEC NOIR** *Coccyzus erythrophthalmus* (2/2) (1/1 - 1/1)

**Finistère** – Brélès, 1<sup>re</sup> année, phot., 15 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Amérique du Nord). Première donnée française pour ce coulicou. Une autre mention d'une femelle adulte tuée le 20 juillet 1886 à Nissan-lez-Enserune dans l'Hérault a été placée en catégorie E par la CAF, la date ne plaidant pas en faveur d'une origine naturelle. Par ailleurs, les rectrices externes étaient en mue active, ce qui est normalement le cas sur les sites d'hivernage. La signature isotopique d'une rectrice externe en pousse ne correspondait pas au sud de l'Europe, mais indiquait bien le nord de l'Amérique du Sud (F. Jiguet, comm. pers.). Enfin, comme le mentionnent Dubois *et al.* (2008), les autres mentions européennes sont plus tardives, principalement de septembre et d'octobre.

**HARFANG DES NEIGES** *Bubo scandiacus* (21/20) (15/13 - 2/2)

**Charente-Maritime** – La Couarde-sur-Mer, Loix-en-Ré et La Flotte-en-Ré, fem. 2<sup>e</sup> année, phot., du 26 décembre au 9 avril 2014, puis Ars-en-Ré, du 17 au 20 avril 2014 (J. Gernigon, A. Le Nevé, M.-A. Réglade *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Sangatte, phot., 21 décembre (M. Dehaye, G. Flohart, S. Devos).

(Circumboréal). L'oiseau de Charente-Maritime aura passé près de quatre mois sur l'île de Ré, alors que celui du Pas-de-Calais n'aura fait qu'un séjour éclair ! Ce dernier est par ailleurs peut-être le même que celui qui avait été signalé auparavant à Zeebrugge en Belgique.

**MARTINET DES MAISONS** *Apus affinis* (1/1) (1/1 - 1/1)

**Finistère** – Île de Molène, phot., 17 octobre (D. Vigour *et al.*).

(Afrique du nord-ouest à l'Asie centrale et au Pakistan, Afrique orientale). Deuxième observation française, à l'automne cette fois-ci, après l'oiseau capturé en Haute-Corse le 13 mai 2001.



12. Coulicou à bec noir *Coccyzus erythrophthalmus*, 1<sup>er</sup> hiver, Brélès, Finistère, novembre 2013 (Mikaël Champion). *First-winter Black-billed Cuckoo*.



13. Harfang des neiges *Bubo scandiacus*, Charente-Maritime, janvier 2014 (Fabrice Jallu). *Snowy Owl*.

**PIPIT À DOS OLIVE** *Anthus hodgsoni* (22/22) (22/22 - 1/1)

**Morbihan** – Erdeven, 1<sup>re</sup> année, phot., du 21 au 23 octobre (Y. Blat, A. Le Doze, B. Sinot).

(Sibérie, Extrême-Orient). Année classique avec une observation effectuée à une date normale, dans un département qui a déjà accueilli l'espèce en 2012.

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** *Motacilla flava* (99/120) (88/107 - 13/14)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *feldegg*, appelée « Bergeronnette des Balkans ».

**Ain** – Pérouges : étang de la Trappe du Loup, mâle, phot., 22 avril (P. Crouzier).

**Doubs** – Bannas, mâle ad., 12 mai (V. Romera).

**Haute-Corse** – Macinaggio : parc à chevaux, 2 mâles, 27 et 28 avril (V. Palomares, P. Crouzier, P.J. Dubois); fem. ad., 28 avril (P. Crouzier, P.J. Dubois) puis 1 mâle, phot., 29 avril (V. Palomares, P. Crouzier, P.J. Dubois); Macinaggio : pré de Tamarone, mâle ad., 28 avril (V. Palomares, J. Girard-Claudon); Luri : Santa Severa, mâle ad., 1<sup>er</sup> mai (V. Palomares).

**Var** – Hyères : le Roubaud, mâle, 11 et 12 mars (A. Audevard, J.-M. Rabby, A. van der Yeught); Hyères : les Vieux Salins, mâle, phot., 27 mars (A. Audevard, A. van der Yeught, J.-M. Rabby); Hyères : salins des Pesquiers, mâle, 27 mars (A. Audevard); mâle, 3 avril (A. Audevard); mâle, phot., 13 avril (A. Audevard).

**Vendée** – Barbâtre : station d'épuration, mâle ad., phot., 9 juin (D. Robard, M. Guimbretière).

**2012 Haute-Savoie** – Passy, mâle ad., phot., 17 avril (J. Calvo).

(Balkans jusqu'en Iran et en Afghanistan). L'année 2013 fournit le même nombre de données que 2010, qui avait été une année record. En revanche, le nombre d'oiseaux observés est bien inférieur, puisqu'il avait été de 21 cette année-là. Comme à l'accoutumée, la Haute-Corse fournit un nombre important d'observations de même que le département du Var, ces deux départements totalisant 77% des données de 2013. Ailleurs, les observations de l'Ain sont aussi régulières, mais la mention vendéenne est une première pour le département. Elle a de plus été faite à une date qui n'est pas classique. Toutes les autres observations ont été réalisées à des dates d'apparition normale de l'espèce.



**BERGERONNETTE CITRINE** *Motacilla citreola* (40/41) (40/41 - 2/2)

**Bas-Rhin** – Muttersholtz, mâle de plus d'un an, phot., 29 avril (A. Willer).

**Haute-Savoie** – Taninges, mâle, phot., 20 avril (P. Charrière, J.-F. Desmet).

**2012 Alpes-Maritimes** – Saint-Laurent-du-Var, 1<sup>er</sup> mai (J. Ben-Saïd, J. Bel *et al.*).

**2012 Drôme** – Châteauneuf-sur-Isère, mâle 2<sup>e</sup> année, phot., du 14 au 18 avril (H. Pottiau, S. Risser *et al.*) et non mâle ad. (V. *Ornithos* 21-2 : 92).

**2009 Var** – Hyères : salins des Pesquiers, 1<sup>re</sup> année, phot., 14 septembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). Deux observations en 2013 qui sont dans la continuité de données obtenues chaque année depuis 2005. La mention du Bas-Rhin est une première départementale, alors que la Haute-Savoie est visitée pour la seconde fois par cette espèce. Les deux observations se situent dans le pic du passage printanier en France.

**ROUGEQUEUE DE MOUSSIER** *Phoenicurus moussieri* (0/0) (0/0 - 1/1)

**Hérault** – Fraïsse-sur-Agout, mâle ad., phot., 7 mai (B. Labrousse).

(Afrique du Nord). Première mention française pour ce rougequeue nord-africain, et de surcroît d'un mâle adulte (LABROUSSE 2015). Cet oiseau a été découvert dans les monts de l'Espinouse, à 45 kilomètres à vol d'oiseau de Béziers. Une donnée avait été obtenue à Ouessant dans le Finistère en mai 1993 mais elle a été refusée par le CHN après révision.

**TARIER DE SIBÉRIE** *Saxicola maurus* (38/39) (34/35 - 1/1)

**Loire-Atlantique** – Guérande : Sissable, mâle, sous-espèce *variegatus*, phot., du 29 janvier au 7 avril (W. Raitière, H. Guennec, E. Archer).

(Mer Blanche, Sibérie). Première mention française de cette sous-espèce, appelée Tarier de la Caspienne (RAITIÈRE & ARCHER 2014). Par ailleurs, il n'existait jusqu'ici que deux données de plein hiver et il s'agit là du plus long séjour (68 jours) qu'ait effectué un tarier de cette espèce sur notre territoire (deux autres séjours n'ont duré qu'une quinzaine de jours).



14. Tarier de Sibérie  
*Saxicola maurus*, mâle,  
sous-espèce *variegatus*,  
Loire-Atlantique, avril  
2013 (Daniel Mauras).  
Male Eastern Stonechat  
of subspecies *variegatus*.

**TRAQUET PIE** *Oenanthe pleschanka* (5/5) (5/5/ 2/2)

**Loire-Atlantique** – Mesquer : Le Rosthu, mâle, phot., 4 octobre (C. Lehy).

**Pyénées-Atlantiques** – Anglet : la Barre, mâle 1<sup>re</sup> année, phot., du 15 au 27 novembre (A. Larrieu, F. Cazaban, M.-A. Réglade *et al.*).

(De la Roumanie au Moyen-Orient jusqu'en Sibérie orientale). Ce traquet reste vraiment très rare en France puisqu'il n'y avait eu jusqu'alors que cinq données. Il n'avait plus été observé depuis 2005.

**TRAQUET DU DÉSERT** *Oenanthe deserti* (35/36) (34/34 - 1/1)

**Manche** – Digulleville : la Murette dans l'anse Saint-Martin, mâle, phot., 7 et 8 décembre (O. Aubrais, F. Noël).

**2012 Finistère** – Ploudalmézeau, mâle ad., phot., du 4 au 15 décembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). L'oiseau de 2012 fournit la cinquième mention pour le Finistère et celui de 2013 est la troisième pour la Manche. Ils ont été observés à des dates classiques.

**ROUSSEROLLE ISABELLE** *Acrocephalus agricola* (46/46) (46/46 - 3/3)

**Finistère** – Tréogat, 1<sup>re</sup> année, capt. et phot., 6 septembre (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Gard** – Saint-Laurent d'Aigouzes : la Tour Carbonnière, 2<sup>e</sup> année, capt. et phot., 20 février et 3 mars (B. Vollot, H. Touzé, A. Vernet *et al.*).

**Seine-Maritime** – Le Havre, ind. de plus d'un an, phot., 10 juin (D. Hémerly).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Le Finistère est le département qui fournit le plus de données depuis la création du CHN. Quant à la Seine-Maritime, elle est visitée par cette espèce pour la troisième fois alors que pour le Gard, il ne s'agit que de la première mention. Cette donnée hivernale n'est pas la première puisqu'il en existe une autre de Charente-Maritime un 25 février.

**HYPOLAÏS BOTTÉE** *Iduna caligata* (11/11) (11/11 - 1/1)

**Finistère** – Île de Sein, 23 octobre (F. Garcia).

(Iran, Asie centrale, Mongolie). Une huitième mention provenant du Finistère et la seconde sur l'île de Sein à une date classique puisqu'il y a autant de données de septembre que d'octobre.



15. Traquet pie  
*Oenanthe pleschanka*,  
mâle 1<sup>er</sup> hiver, Anglet,  
Pyénées-Atlantiques,  
novembre 2013 (Grégoire  
Trunet). First-winter  
male Pied Wheatear.



16. Fauvette épervière *Sylvia nisoria*, 1<sup>er</sup> hiver, Camargue, novembre 2013 (Samuel Hilaire). First-winter Barred Warbler.

#### FAUVETTE ÉPERVIÈRE *Sylvia nisoria* (83/85) (56/57 – 4/4)

**Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, Tour du Valat, 1<sup>re</sup> année, capt. et phot., 7 novembre (Y. Kayser, T. Blanchon, C. Pernollet *et al.*).

**Finistère** – Ouessant: chapelle Notre-Dame de Bon Voyage, 1<sup>re</sup> année, phot., du 9 au 29 octobre (G. Riou, S. Risser, S. Maury, S. Houpert *et al.*).

**Pas-de-Calais** – Wimereux: dunes de la Slack, 1<sup>re</sup> année, capt. et phot., 24 octobre (C. Duponcheel, B. Faucon); 1<sup>re</sup> année, capt. et phot., 30 octobre (C. Duponcheel, A. Marsy).

**2012 Pas-de-Calais** – Wimereux: dunes de la Slack, 1<sup>re</sup> année, capt., 11 août (C. Duponcheel).

**2010 Finistère** – Ouessant: Pennorz, 1<sup>re</sup> année, 18 octobre (A. Faure *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Avec quatre données, 2013 est une bonne année. Trois de ces quatre oiseaux ont été capturés. En dehors de l'oiseau des Bouches-du-Rhône, qui constitue la troisième donnée camarguaise, les autres proviennent des deux départements les plus fréquentés par cette espèce en France.

#### FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (2/2) (2/2 – 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de l'une des sous-espèces *margelanica*, *halimodendri* ou *minula*.

**Nord** – Loon-Plage: port de Dunkerque, ancienne Capitainerie, 1<sup>re</sup> année, capt. et phot., 16 octobre (Q. Dupriez, D. Haubreux).

(Sud de l'Asie, entre l'Iran et la Mongolie). Pour les deux seules mentions françaises qui existaient jusqu'à présent, la sous-espèce n'avait pas été déterminée, même si la seconde mention se rapprochait fortement de *halimodendri*. Pour l'oiseau de 2013, des analyses ADN effectuées à partir de plumes de l'oiseau perdues lors de la manipulation n'ont pas permis de conclure formellement à *halimodendri*, mais pointent vers un groupe non encore nommé, proche de celui-ci (DUPRIEZ & HAUBREUX 2014). Deux autres observations d'individus appartenant à l'une de ces sous-espèces orientales ont été faites: un oiseau à Desnes, Jura, du 30 novembre 2002 au 5 janvier 2003 et un autre capturé à Saint-Just, Ille-et-Vilaine, le 30 décembre 2009.

#### FAUVETTE SARDE *Sylvia sarda* (22/21) (21/20 – 1/1)

**Var** – Hyères: île de Porquerolles, 2<sup>e</sup> année prob., phot., 22 avril (P. Miguet, R. André).

(Principalement Corse et Sardaigne). Il n'y avait eu aucune observation en France continentale depuis 2004. Celle-ci a été réalisée à une date typique dans un département qui a déjà fourni plusieurs mentions.

#### POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (27/27) (25/25 – 2/2)

**Finistère** – Ouessant: réservoir amont, 1<sup>er</sup> septembre (S. Provost).

**Jura** – Étrepigny, 20 et 21 octobre (J.-P. Paul, C. Mauvais).

(De la Baltique à la Sibérie centrale et l'Afghanistan). Il n'y avait pas eu d'observation en 2012, par contre deux données en 2010 et en 2011. Ouessant fournit sa onzième mention. Par ailleurs, le Pouillot verdâtre n'avait encore jamais été observé dans le département du Jura.

#### POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (109/111) (107/109 – 2/2)

**Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, plage de Piémanson, phot., 1<sup>er</sup> novembre (M. Thibault, D. Cohez, T. Galewski *et al.*).

**Nord** – Dunkerque, 8 novembre (F. Gabillard).

**2012 Finistère** – Ploumoguier, phot., du 8 au 28 janvier (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). L'observation de 2012 constitue donc une seconde mention pour cette année. L'observation de Camargue est une troisième pour le secteur et reste une des rares données pour la côte méditerranéenne alors que l'immense majorité des observations provient du Finistère et du Pas-de-Calais. Les données hivernales restent très rares puisque ce pouillot n'avait encore jamais été observé en janvier et qu'il n'y a que deux mentions en décembre avec un le 2 décembre 1990 dans l'Hérault et un le 15 décembre 2007 dans le Haut-Rhin.

#### POUILLOT DE HUME *Phylloscopus humei* (21/21) (21/21 – 1/1)

**Nord** – Lambersart: résidence la Boisière, phot., du 6 au 8 janvier (F. Gabillard *et al.*).

(Nord-est de l'Afghanistan à la Chine centrale). Ce pouillot n'avait pas été observé en 2010, ni en 2011. En 2012, il avait également été contacté dans le Nord, à Gravelines.

#### POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (57/58) (57/58 – 4/4)

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, 14 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois).

**Loire-Atlantique** – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, capt. et phot., 30 octobre (O. Poisson, Y. Briland *et al.*).

**Nord** – Loon-Plage: port de Dunkerque, ancienne Capitainerie, 12 octobre (Q. Dupriez, C. Capelle, T. Tancrez).

**Seine-Saint-Denis** – Montreuil: parc des Beaumonts, phot. et enregistré, du 20 au 24 octobre (D. Thorns, T. Chansac, M. Zucca *et al.*).

(Sibérie, Mongolie, Chine). Un peu moins de deux oiseaux sont observés chaque année en France. On peut donc considérer que 2013 est un « bon cru ». Bien que plus de 60% des observations soit effectuées dans le Finistère, la donnée d'Hoëdic est une première pour le département voisin du Morbihan. Celle de Montreuil est aussi une nouveauté pour la Seine-Saint-Denis.

#### POUILLOT DE SCHWARZ *Phylloscopus schwarzi* (13/13) (13/13 – 1/1)

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, 26 octobre (A. Le Nevé, B. Sinot, A. Stoquert); Bangor (Belle-Île): Bon Accueil, 31 octobre (M. Giroud, I. Giroud).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Le Pouillot de Schwarz reste d'une grande rareté en France. La majorité des observations provient du Finistère, notamment d'Ouessant, mais le Morbihan et l'île d'Hoëdic en sont à leur quatrième donnée. Ces deux départements fournissent plus de 75% des mentions françaises.

#### MÉSANGE À LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *caudatus* (114/679) (114/679 – 2/3)

**Hauts-Alpes** – Briançon, phot., du 9 janvier au 22 février (E. Ducos, C. Lassalle).

**Rhône** – Miribel-Jonage, 2 ind., phot., 5 février (O. Ferrer).

**2012 Haute-Saône** – Dampvalley-lès-Colombes, ad., phot., 20 avril (J. Langlade).



Individus acceptés comme Mésange à longue queue « à tête blanche » (76/171) (76/171 - 7/9)

**Bas-Rhin** – Maisongoutte: Merloch, 2 ind., 3 janvier (D. Dujardin).

**Bouches-du-Rhône** – Le Puy-Sainte-Réparate, phot., 13 janvier (A. Gaspérini).

**Hautes-Alpes** – Saint-Martin-de-Queyrières: Prelles, les Andrieux, ad. prob., phot., du 9 janvier au 7 avril (E. Ducos).

**Haute-Savoie** – Saint-Jorioz: port de l'Espérance, 22 février (O. Rumianowski); Saint-Jorioz: marais de l'Enfer, 2 ind., 23 février (O. Rumianowski); Doussard: réserve du Bout du Lac, 28 février (M. Parent).

**Marne** – Beaumont-sur-Vesle, phot., 9 avril (R. Deschamps).

(Sous-espèce *caudatus*: Fennoscandie, Pologne et Russie). Ce taxon a été retiré de la liste des espèces soumises à homologation nationale à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2013. En effet, le phénomène invasif ayant touché à sa fin au mois de mars 2011, en 2013, des Mésanges à longue queue présentant une tête entièrement blanche ont été observées presque toutes à l'unité, une nouvelle fois surtout dans l'est de la France. Or comme cela avait déjà été mentionné, du fait de l'existence en Europe centrale d'une zone d'hybridation entre les sous-espèces *caudatus* et *europaeus*, il semblait délicat de poursuivre l'homologation de ces individus, car il est en outre fort possible que des hybridations aient eu lieu en France suite à cette invasion.

**PIE-GRIÈCHE ISABELLE** *Lanius isabellinus* (17/17) (17/17 - 1/1)

**Morbihan** – Île d'Hoëdic, 1<sup>re</sup> année, phot., sous-espèce *isabellinus* 11 novembre (M. Zucca, A. Le Nevé).

(Asie méridionale jusqu'à la Chine). Plus d'un tiers des observations provient du Finistère, de l'île d'Ouessant. Trois autres données sont de Camargue. Pour le Morbihan, l'île d'Hoëdic a accueilli la Pie-grièche brune *L. cristatus* avant la Pie-grièche isabelle (FRÉMONT *et al.* 2002).

**ÉTOURNEAU ROSELIN** *Pastor roseus* (236/417) (236/417 - 0/0)

**2012 Bouches-du-Rhône** – Berre-l'Étang, 2<sup>e</sup> année, phot., 2 mars (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Finistère** – Pospoder, 1<sup>re</sup> année, phot., 18 septembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Plougonvellin, 1<sup>re</sup> année, phot., 18 octobre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Gard** – Codognan, 2<sup>e</sup> année, phot., 18 avril (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Vergèze, phot., 19 avril (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Hautes-Alpes** – Lardier-et-Valença, 2 mâles et 1 fem., phot., 3 juin (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Manche** – Auderville: Les Cours, ad., phot., 29 et 30 juin (P. Colot *et al.*) et non Vendée (V. *Ornithos* 21-2: 98).

**2011 Bouches-du-Rhône** – Arles: Camargue, Mas-Thibert, ad., 15 avril (G. Massez).

(Sud-est de l'Europe et Sud-est de l'Asie). L'Étourneau roselin n'est plus soumis à homologation depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013. Les données récoltées tardivement par le CHN ne montrent guère de changement quant au pattern d'apparition de l'espèce chez nous, si ce n'est cette seconde mention pour les Hautes-Alpes qui concerne tout de même trois individus.



17. Pie-grièche isabelle  
*Lanius isabellinus*, 1<sup>er</sup> hiver,  
île d'Hoëdic, Morbihan,  
novembre 2013 (Maxime  
Zucca). *First-winter*  
*Isabelline Shrike*.

18. Linotte à bec jaune  
*Carduelis flavirostris*, Loon-  
Plage, Nord, décembre  
2013 (Julien Piette). *Twite*.



**MOINEAU ESPAGNOL** *Passer hispaniolensis* (35/52) (35/52 - 1/1)

**Corse-du-Sud** – Porto-Vecchio: golfe de Santa-Giulia, mâle ad., phot., 13 août (J.-F. Mandelbaum, N. Capelle).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'à l'Inde). Une nouvelle donnée en provenance de Corse. Il est à signaler que bon nombre d'oiseaux ne sont pas homologués par le CHN en raison des possibilités d'hybridation avec le Moineau cisalpin *P. d. italiae*. Des descriptions précises de la tête, des parties supérieures et inférieures sont donc importantes.

**VIREO À ŒIL ROUGE** *Vireo olivaceus* (16/16) (16/16 - 1/1)

**Vendée** – Île d'Yeu: vallon des Broches, 11 octobre (J. Tillet).

(Amérique du Nord). Treize observations proviennent d'Ouessant dans le Finistère. Deux autres de l'île de Sein, également dans le Finistère. La dernière donnée obtenue avant celle-ci a été faite dans le Nord, année qui avait produit cinq observations. Il s'agit ici de la première mention vendéenne.

**LINOTTE À BEC JAUNE** *Carduelis flavirostris* (3/11) (3/11 - 3/21)

**Nord** – Loon-Plage: plage du Clipon, 4 à 6 ind., phot., 1<sup>er</sup> et 3 décembre (J. Piette, E. Dansette).

**Pas-de-Calais** – Marck: Hemmes-de-Marck, 1 à 14 ind., phot., du 18 novembre au 1<sup>er</sup> mars 2014 (J. Piette *et al.*).

**Somme** – Fort-Mahon-Plage, 2 et 15 décembre (Y. Dubois, A. Macquet).

(Îles Britanniques, Scandinavie). Bien que concernant 21 oiseaux, le nombre de données obtenues pour la seconde année montre bien la rareté actuelle de cet oiseau en France. L'espèce avait été hivernante en nombre assez important en baie du Mont-Saint-Michel vers 1965 avec 400-500 individus et Dubois *et al.* (2008) mentionnent jusqu'à 2 000 Linottes à bec jaune en décembre 1976 en baie de Somme.

**BEC-CROISÉ BIFASCIÉ** *Loxia leucoptera* (9/11) (9/11 - 1-1)

**Maine-et-Loire** – Savennières: bois du Ricohet, femelle ad., phot., du 10 au 15 novembre (D. Bizien, F. Recoquillon, S. Angebault *et al.*).

(Eurasie septentrionale). Il s'agit de la troisième observation homologuée depuis la création du CHN. Un individu avait été vu en Gironde en novembre 1986 et deux femelles dans l'Oise en février 1991. Il avait par ailleurs déjà été cité par MAYAUD (1953, 1957, 1965) à sept reprises dans le Calvados, en Loire-Atlantique, dans l'Orne, dans les Vosges, en Côte-d'Or, dans la Marne et dans le Jura.



19. Roselin cramois  
*Carpodacus erythrinus*,  
1<sup>er</sup> hiver, Ouessant,  
octobre 2013 (Aymeric  
Le Calvez). *First-winter  
Common Rosefinch*.

**ROSELIN CRAMOISI** *Carpodacus erythrinus* (214/249) (199/232 – 8/9)

**Finistère** – Ouessant : Kervasdoué, 2 ind. type fem., 7 octobre (P. Derrien, M.-C. Derrien *et al.*) puis 1<sup>re</sup> année, phot., jusqu'au 14 octobre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)). Île de Sein, 1<sup>re</sup> année, phot., du 18 au 20 octobre (F. Garcia, E. Gfeller).

**Hérault** – Villeneuve-lès-Maguelone, 1<sup>re</sup> année, capt. et phot., 25 septembre (G. Balança, M. Gély).

**Jura** – Lac-des-Rouges-Truites, 11 juin (T. Gruson).

**Savoie** – Champagny-en-Vanoise : Laisonnay d'en haut, mâle, phot., 18 et 19 juin (J. Kunzler, J. Kunzler) puis 30 juin (M.-P. Guern, L. Frédéric).

**Var** – Toulon, 1<sup>re</sup> année, phot., 28 et 29 novembre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Vendée** – Île d'Yeu : port Joinville, 1<sup>re</sup> année, 5 octobre (X. Hindermeier, M.-P. Hindermeier).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). L'espèce a été signalée en période de reproduction dans le Jura et en Haute-Savoie, mais ce ne sont que deux oiseaux qui ont été vus. Jusqu'ici, le gros des observations est obtenu vers la fin du mois de mai ou au début de juin. Un second pic d'observation est normalement perceptible en automne, correspondant à la dispersion postnuptiale. Les données méridionales ont été jusqu'alors très rares : une mention dans l'Hérault et deux dans les Bouches-du-Rhône.

**BRUANT À CALOTTE BLANCHE** *Emberiza leucocephalos* (37/43) (23/29 – 3/4)

**Bouches-du-Rhône** – Arles : Camargue, pont de Gimeaux, mâle, phot., du 31 janvier au 2 février (M. Thibault, Y. Kayser, G. Monchaux *et al.*). Arles : Camargue, pont de Mollèges, 2 fem., phot., du 12 au 20 février (Y. Kayser, G. Paulus).

**Hautes-Alpes** – Chabottes, mâle, phot., 11 décembre (T. Joubert).

(Sibérie). Le dernier oiseau vu en Camargue avait été signalé en 2007 après une vingtaine de données obtenues dans cette région. Par la suite, il y a eu ces trois oiseaux observés dans le Vaucluse. Un mâle avait par ailleurs déjà été signalé en novembre 1999 dans les Hautes-Alpes, suggérant la possibilité d'un hivernage discret mais à rechercher ailleurs dans la partie est de la France...

**BRUANT NAIN** *Emberiza pusilla* (136/143) (123/129 – 5/6)

**Eaux territoriales** – En mer, au large de l'île de Porquerolles, Var, 42°56'N 6°35'E puis dernière localisation, 43°21'91N 7°19'01E, 1<sup>re</sup> année, phot., 19 et 20 octobre (S. Molliex).

**Doubs** – Remoray-Boujeons, 1<sup>re</sup> année, capt., phot., 1<sup>er</sup> novembre (P. Durllet, L. Beschet *et al.*).

**Finistère** – Ouessant : Pern, fem. 1<sup>re</sup> année, phot., 4 octobre (A. Rougeron, N. Biron, L. Basso) puis 2 fem. 1<sup>re</sup> année, phot., 7 et 8 octobre (A. Rougeron, L. Spanneut *et al.*); Île de Sein, 1<sup>re</sup> année, phot., 16 octobre (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Donnée pour le moins remarquable d'un oiseau qui a séjourné deux jours sur un bateau de l'Ifrémer au large des côtes varoises. L'observation effectuée à Remoray-Boujeons est une première départementale. Il y a par ailleurs déjà eu plusieurs fois deux Bruants nains ensemble sur Ouessant.

**BRUANT MÉLANOCÉPHALE** *Emberiza melanocephala* (106/128) (86/105 – 4/4)

**Bouches-du-Rhône** – Saint-Martin-de-Crau : Peau de Meau, fem., phot., 23 mai (G. Todd, F. Evans); Arles : Camargue, marais du Retour, fem., phot., 4 juin (J. Delannoy).

**Corse-du-Sud** – Bonifacio : Francolu, mâle de plus d'un an, phot., 23 mai (R. Marichy, S. Seiner).

**Hérault** – Lattes, mâle, phot., 18 mai (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Lozère** – Nivoliers, mâle de plus d'un an, phot., 20 juin (B. Herren, K. Herren).

**2009 Bouches-du-Rhône** – Eyguières : la Jasse, mâle de plus d'un an, 12 et 21 mai (A. Flitti, E. Durand).

(Sud-est de l'Europe et sud-ouest de l'Asie). De nouveau une observation en Lozère, à une date où l'espèce peut se reproduire !

**ANNEXE 1 – ESPÈCES OU DONNÉES EN COURS DE CATÉGORISATION PAR LA CAF**

**GARROT ALBÉOLE** *Bucephala albeola* (9/9) (8/8 – 1/1)

**2005 Ariège** – Saverdun : gravières du Siadou, fem. ou imm., phot., du 15 octobre au 15 février 2006 (T. Guillosson, O. Endzt *et al.*).

(Amérique du Nord). Une donnée parvenue tardivement au CHN qui concerne un département où cette espèce n'avait encore jamais été observée.

**PÉLICAN BLANC** *Pelecanus onocrotalus*

**Côtes-d'Armor** – La Hisse : église du Chatelier, phot., 11 juillet (S. Boullier).

**Eure** – Poses, ad., 31 août (G. Rethore, A. Ploquin).

**Finistère** – Pont-Croix, imm., phot., 15 et 21 juillet (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**2012 Aude** – Lapalme : plateau de Lapalme, ad., phot., 20 mars (T. Guillosson, S. Daydé).

**2011 Ain** – Villars-lès-Dombes, ad., phot., 26 septembre (R. Poulet).

**2004 Ariège** – Mazères : domaine des Oiseaux, ad., phot., 14 et 15 avril (T. Guillosson, M. Pujol *et al.*).

(Sud-est de l'Europe, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest)

**ANNEXE 2 – ESPÈCES DONT L'ORIGINE SAUVAGE N'EST PAS ÉTABLIE (CATÉGORIE D)**

**HARLE COURONNÉ** *Lophodytes cucullatus* (24/25) (24/25 – 2/1)

**Ardennes** – Les Ayvelles : ballastière, mâle, phot., 9 mars (K. Gaudry).

**Manche** – Marcey-les-grèves, mâle ad., phot., 17 mars (S. Provost).

(Amérique du Nord). À nouveau deux observations de ce harle qui est fréquemment détenu en captivité, même si une origine sauvage peut être envisagée pour l'oiseau de la Manche. L'oiseau des Ardennes a été considéré comme étant un revenant car il a été observé à quelques kilomètres de là de février à mars 2011.

**FLAMANT NAIN** *Phoenicopterus minor* (41/20) (41/20 – 11/8)

**Aude** – Sigean : réserve africaine, étang de l'Œil de Ca, ad., phot., du 27 mai au 18 juin (A. Joris, P. Billot, F. Barreda, G. Olioso).



**Bouches-du-Rhône** – Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, parc ornithologique de Pont-de-Gau, ad., phot., du 13 janvier au 30 juin (G. Picotin, J. Picotin, B. Vollet *et al.*); Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, Salanquette, 1 ad., phot., du 4 avril au 3 mai (H. Touzé *et al.*); Arles: Camargue, étang du Fangassier et Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, Enfores de la Vignolle, 1 à 5 ad., du 16 avril au 17 juillet (A. Arnaud, A. Béchet, Y. Kayser, L. Pelloli *et al.*); Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, Gaze du Marteau, 1 ad., 21 avril (P. Foulquier *vide* A. Arnaud, Y. Kayser) puis 1 à 5 ad., du 17 août au 9 novembre (M.-A. Réglade *et al.*); Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, étang du Galabert, 1 ad., 22 avril (P. Foulquier *vide* A. Arnaud, Y. Kayser); Arles: Camargue, la Goule et Vieux-Rhône, ad., du 22 avril au 2 août (M. Thibault, Y. Kayser, T. Blanchon).

**Hérault** – Marseillan, ad., phot., 20 février (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)).

**Var** – Hyères: salins des Pesquiers, 2 ad., phot., 30 mai (J.-M. Rabby); Hyères: salins des Pesquiers, ad., phot., du 5 au 24 décembre (A. Audevard).

(Afrique tropicale). Cinq oiseaux différents ont séjourné en Camargue durant une bonne partie de l'année. Des tentatives de reproduction ont une nouvelle fois été constatées sur le site habituel des Flamants roses *P. roseus*, situé dans les étangs et marais des anciens salins de Camargue. Un couple mixte, Flamant nain et Flamant du Chili *P. chilensis* a été observé au nid du 16 avril au 5 juin. Cette nidification s'est soldée par un échec, tout comme la tentative de reproduction d'un couple « pur », observé sur la colonie du 14 mai au 15 juin. En 2011, les deux essais notés sur le même site avaient également été infructueux (Reeber *et al.* 2012).

**TOURTERELLE MAILLÉE** *Streptopelia senegalensis* (11/11) (9/9 – 1/1)

**Meurthe-et-Moselle** – Lucey, fem. de plus d'un an, 12 juin (P. Aubry).

(Afrique, Asie mineure). La localité ne plaide pas vraiment en faveur d'un oiseau d'origine naturelle...

### ANNEXE 3 – LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle une nouvelle fois que la plupart des données qui figurent dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Ceci est bien souvent dû à une description trop courte, manquant d'éléments. Il est donc une nouvelle fois conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée. La non-homologation d'une donnée ne préjuge évidemment pas de l'identité de l'oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité du (ou des) observateur(s), mais bien souvent du manque de robustesse de la description, notamment au regard des archives du CHN et de l'inventaire des oiseaux de France. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non-homologation sont indiquées entre parenthèses.

#### 2013

**Oie de taïga** *Anser fabalis fabalis* – Marne – Écollemont: la Pièce Saint-Sauveur, lac du Der-Chantecoq, phot., 27 février (description insuffisante et peu précise).

**Oie à bec court** *Anser brachyrhynchus* – Landes – Labenne, 25 novembre (aucun des critères distinctifs de l'espèce n'a été mentionné dans la description).

**Macreuse à bec jaune** *Melanitta americana* – Morbihan – Saint-Pierre-Quiberon: pointe de Keraud, port d'Orange, mâle ad., phot., 13 janvier (il ne s'agissait à l'évidence pas d'un mâle adulte comme proposé, et en l'absence de description des parties inférieures, il n'a donc été possible ni de donner un âge à cet oiseau ni d'arriver à une identification spécifique).

**Macreuse à front blanc** *Melanitta perspicillata* – Morbihan – Île d'Houat, mâle 1<sup>re</sup> année, phot., 11 décembre (description trop succincte comportant en outre des contradictions sur l'âge et le sexe).

**Plongeon à bec blanc** *Gavia adamsii* – Manche – Granville, 9 mai (observation brève, la date nécessitant des critères précis et une observation plus longue. Vu l'âge de l'oiseau, la fiche aurait dû indiquer des caractères plus discriminants pour éviter la confusion avec un Plongeon imbrin *G. immer*).

**Albatros à sourcils noirs** *Thalassarche melanophris* – Finistère – Ouessant: phare du Créac'h, imm., 28 octobre (la description incomplète n'a pas permis de valider une espèce aussi rare).

**Albatros indéterminé** *Thalassarche sp.* – Vendée – L'Aiguillon-sur-Mer: plage de la Pointe, 9 juillet (les photographies montrent un Goéland marin *Larus marinus*).

**Pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus* – Aude – Gruissan, 2 ad. et un 1<sup>re</sup> année, phot., 6 mai (les photographies montrent des Pélicans gris *P. rufescens*), Gruissan: étang de Campagnol, ad., phot., 29 août (les photographies montrent un hybride présumé entre Pélican blanc et P. frisé *P. crispus*), Fleury-d'Aude, ad., 14 septembre (la description n'a pas permis d'écarter

l'hybride présumé cité plus haut), Peyriac-de-Mer: étang de Bages, ad., 23 septembre (la description n'a pas permis d'écarter l'hybride présumé cité plus haut); Hérault – Agde: réserve du Bagnas, subadulte ?, phot., du 28 août au 15 septembre (les photographies montrent un hybride présumé entre Pélican blanc et P. frisé); Moselle – Loudrefing, ad., 15 août (description insuffisante pour être certain de l'espèce proposée).

**Aigrette des récifs** *Egretta gularis* – Gard – Vauvert: centre du Scamandre, 1<sup>re</sup> année, du 25 août au 2 septembre (l'éventualité d'un hybride avec une Aigrette garzette *E. garzetta* n'a pas pu être écartée).

**Buse féroce** *Buteo rufinus* – Bouches-du-Rhône – Saint-Rémy-de-Provence: Pas de l'Aigle, ad., 10 septembre (critères diagnostiques manquant, comme les taches carpiennes, ou vagues, comme la couleur de la queue); Doubs – Reculfoz, ad., 4 avril (pas de description de la queue).

**Aigle criard** *Aquila clanga* – Gard – Vauvert: marais des Gargattes, ad., phot., du 8 janvier au 8 février (ni la description, ni les photographies n'ont permis d'écarter un hybride, voire un Aigle pomarin), Vauvert: marais des Gargattes, ad., phot., 10 février (il n'a pas été possible d'écarter un hybride); Haute-Savoie – Chevrier: défilé de l'Écluse, 1<sup>re</sup> année, phot., 13 octobre (il n'a pas été possible d'écarter un hybride); Loire – Arthun: étang du Solat est, subad., phot., 23 août (description quasi inexistante et photographies non exploitables); Pyrénées-Atlantiques – Saint-Pierre d'Irube, ad., 16 novembre (les photographies montrent une Buse variable *Buteo buteo*).

**Aigle pomarin** *Aquila pomarina* – Doubs – Vandoncourt, phot., du 7 mai au 28 juin (les photographies montrent une Buse variable); Puy-de-Dôme – Veyre Monton: Puy de Marmant, 1<sup>re</sup> année, 5 octobre (description incomplète notamment sans précision sur la main et les digitations. De plus, la couleur du plumage ne correspond pas).

**Aigle des steppes** *Aquila nipalensis* – Bouches-du-Rhône – Arles: Mas de Giraud, imm., 29 novembre (description insuffisante).

**Faucon lanier** *Falco biarmicus* – Gironde – Bruges: réserve naturelle des marais de Bruges, 7 et 8 novembre (description de l'oiseau nettement insuffisante, notamment de la tête, de la queue, des parties inférieures).

**Faucon sacre** *Falco cherrug* – Corrèze – Brive-la-Gaillarde: le Mas, fem. ad., 26 février (description limitée qui ne permet pas d'écarter entre autre un hybride); Haute-Savoie – Le Bourget-du-Lac, ind. de plus d'un an, phot., 9 octobre (les photographies montrent un jeune Faucon pèlerin *F. peregrinus* de type *calidus*); Pyrénées-Atlantiques – Montaner, ad.?, 14 janvier (description incomplète ne permettant pas d'éliminer un autre grand faucon).

**Marouette de Baillon** *Porzana pusilla* – Haute-Loire – Localité tenue secrète, mâle probable, phot., du 23 au 26 août (certaines photos semblent montrer une Marouette poussin *P. parva* et prêtent à confusion. Il est possible qu'il y ait eu deux oiseaux mais cela ne peut pas être déterminé avec certitude). Loire – Localité tenue secrète, ad., 23 août (mêmes remarques que pour la fiche précédente).

**Pluvier fauve** *Pluvialis fulva* – Charente-Maritime – Dolus d'Oléron: la Brande, mâle ad., phot., 19 juillet (description ne permettant pas d'écarter un Pluvier bronzé *P. dominica*); Pas-de-Calais – Audinghen, 21 septembre (oiseau vu en vol et peu détaillé).

**Bécasseau semipalmé** *Calidris pusilla* – Gironde – La Teste-de-Buch: réserve naturelle du Banc d'Arguin, 1<sup>re</sup> année?, 26 septembre (la description n'a pas permis d'éliminer une autre espèce de bécasseau).



20. Goéland de Kumlien  
*Larus glaucoideus kumlieni*,  
1<sup>er</sup> hiver, Guérande,  
Loire-Atlantique, février  
2013 (Willy Raitière).  
First-winter Kumlien's Gull.

**Bécasseau à échasses** *Calidris himantopus* – Charente-Maritime – Saint-Pierre d'Oléron, 21 juillet (description bien trop courte).

**Bécassine double** *Gallinago media* – Bas-Rhin – Erstein, 1<sup>re</sup> année probable (la description n'a pas permis d'exclure une Bécassine des marais *G. gallinago*). Saône-et-Loire – Marnay, 9 août (incertitude sur les critères de la queue en raison du contre-jour évoqué par l'observateur lui-même, et certains critères importants manquent, comme la présence de barres alaires).

**Mouette de Bonaparte** *Chroicocephalus philadelphia* – Landes – Tarnos, ad., 19 janvier (description trop limitée avec des éléments manquants); Nord – Lille, 2<sup>e</sup> année, 18 janvier (description trop limitée avec des éléments manquants); Pyrénées-Atlantiques – Anglet, 2<sup>e</sup> année, 22 janvier (description trop limitée avec des éléments manquants).

**Mouette atricille** *Larus atricilla* – Landes – Capbreton, ad., 19 août (les conditions d'observation ajoutées à un problème de taille de l'oiseau n'ont pas permis de valider la donnée).

**Goéland de la Baltique** *Larus fuscus fuscus* – Côte-d'Or – Labergement-lès-Seurre, 3<sup>e</sup> année, phot., 9 mai (l'oiseau ne portait pas de bague, or le CHN n'accepte plus que les individus bagués – voir [www.chn-france.org](http://www.chn-france.org)); Saône-et-Loire – Saint-Albain, 3<sup>e</sup> année, phot., du 4 au 6 mai puis Verdun-sur-Doubs, le même ind., phot., 9 mai (même remarque que précédemment).

**Sterne fuligineuse** *Onychoprion fuscatus* – Gironde – Vendays-Montalivet, 4 août (description incomplète à partir de laquelle il n'a pas été possible de trancher entre la Sterne fuligineuse et la Sterne bridée).

**Sterne bridée** *Onychoprion anaethetus* – Vendée – L'Aiguillon-sur-Mer: plage de la Pointe, ad. probable, 9 juillet (description incomplète à partir de laquelle il n'a pas été possible de trancher entre la Sterne fuligineuse et la Sterne bridée).

**Sterne voyageuse** *Sterna bengalensis* – Gironde – La Teste-de-Buch: sud du Wharf, ad., phot., 4 août (la description incomplète et les photographies peu exploitables ont fait qu'il n'a pas été possible d'aller plus loin que « Sterne à bec orange »).

**Tourterelle orientale** *Streptopelia orientalis* – Finistère – Ouessant: phare du Créac'h, 31 octobre (il n'a pas été possible de confirmer les critères énoncés pour un oiseau uniquement vu en vol).

**Pipit à dos olive** *Anthus hodgsoni* – Pyrénées-Atlantiques – Lecumberry, 28 septembre (description de la tête incorrecte); Vendée – Île d'Yeu: marais de la Guerche, 12 octobre (description incomplète, il manque les critères de comportement).

**Bergeronnette des Balkans** *Motacilla flava feldegg* – Hérault – Lansargues: les Cayrelles, mâle ad., 13 avril (rien n'a permis d'exclure une Bergeronnette nordique *M. f. thunbergi*); Haute-Savoie – Passy, 4 ind., phot., 7 mai (les photographies montrent au moins une Bergeronnette nordique).

**Bergeronnette citrine** *Motacilla citreola* – Gironde – Le Teich, 1<sup>re</sup> année, 26 juin (le peu de description fournie plaide en faveur d'une jeune Bergeronnette grise *M. alba*); Vendée – Île d'Yeu: pointe de la Gournaise, 1<sup>re</sup> année, 17 août (absence de cri et aucun élément sur la longueur de la queue).

**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus samamisis* – Alpes-Maritimes – Cipières, fem. ad., 6 octobre (la description du blanc de l'aile n'était pas assez précise pour éliminer la sous-espèce locale); Bouches-du-Rhône – Arles, fem. ad., phot., 27 octobre (les photographies montrent un Rougequeue noir *P. ochruros*).

**Tarier de Sibérie** *Saxicola maurus* – Territoire-de-Belfort – Argiésans, mâle ad., 24 et 30 mars (absence de description des sous-alaires et sus-caudales mal décrites); Vendée – Île d'Yeu: dune de la Grande Conche, mâle, phot., 18 octobre (les photographies montrent un Tarier pâtre européen à croupion blanc).

**Grive à dos olive** *Catharus ustulatus* – Somme – Port-le-Grand, phot., 11 décembre (photos inexploitables, description insuffisante).

**Grive de Naumann** *Turdus naumanni* – Vosges – La Croix-aux-Mines: les Grandes Gouttes, 14 avril (description sommaire pour un oiseau vu brièvement en vol).

**Hypolaïs bottée** *Iduna caligata* – Finistère – Ouessant: Stang Korz, 1<sup>re</sup> année probable, 25 octobre (la description n'a pas permis d'écarter une Hypolaïs rama *I. rama*, voire une Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola*).

**Hypolaïs pâle** *Iduna pallida* – Finistère – Île de Sein, mâle? ad.?, 18 juin (description trop brève pour cette espèce délicate).

**Pouillot de Pallas** *Phylloscopus proregulus* – Gironde – Bruges: réserve naturelle des marais de Bruges, 3 décembre (description trop courte avec peu de critères observés, cri ne correspondant pas).

**Pouillot brun** *Phylloscopus fuscatus* – Finistère – Ouessant: chapelle Notre-Dame de Bon Voyage, 24 octobre (description largement insuffisante).

**Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus caudatus* – Bas-Rhin – Biblisheim, 6 janvier (trace de gris sur la tête ne pouvant écarter un oiseau intermédiaire), Strasbourg, 9 janvier (absence de description), Strasbourg, 8 mars (description trop courte); Cher – Marmagne: écluse de Saint-Aubin, phot., 10 avril (il n'a pas été possible d'exclure un hybride ou un oiseau intermédiaire); Hautes-Alpes – Saint-Martin-de-Queyrières: Pnelles, les Andrieux, ind. différent de celui homologué plus haut, 16 mars (pas de description ni de photographie); Haute-Marne – Bayard-sur-Marne, phot., du 17 au 19 février (traces de gris sur la nuque donc intermédiaire ou hybride), Thonnance-les-Joinville, 6 ind., du 28 février au 2 mars (absence de description).

**Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis* – Corse-du-Sud – Pianotolli-Caldarellu, mâle, phot., 11 mai (ressemble beaucoup à l'espèce proposée mais la joue grise et les bretelles ne conviennent pas pour cette espèce. Un hybride ne peut être exclu), Bonifacio, mâle de plus d'un an, 18 juillet (description insuffisante qui ne permet pas d'exclure un hybride).

**Linotte à bec jaune** *Carduelis flavirostris* – Somme – Saint-Quentin-en-Tourmont: réserve naturelle de baie de Somme, 11 janvier (description nettement trop courte).

## 2012

**Busard pâle** *Circus macrourus* – Charente-Maritime – Saint-Sornin, fem. ad., 18 avril (pas de description des rémiges primaires, ni des axillaires ou des parties inférieures).

**Aigle ibérique** *Aquila adalberti* – Hautes-Pyrénées – Arbéost: col du Soulor, subadulte, phot., 8 septembre (la description n'a pas permis d'écarter avec certitude un Aigle royal *Aquila chrysaetos*).

**Faucon lanier** *Falco biarmicus* – Charente-Maritime – Le Château d'Oléron: pointe des Doux, imm., 22 mars (absence de description détaillée de la tête).

**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava feldegg* – Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer: Camargue, Mazet de Fabre, 7 mai (description imprécise, notamment en ce qui concerne les couleurs de la tête); Gard – Marguerittes: le Frescamp, mâle ad., phot., 24 avril (certaines des photographies montrent une Bergeronnette nordique).

**Bergeronnette citrine** *Motacilla citreola* – Charente-Maritime – Saint-Pierre d'Oléron: Bellevue, 1<sup>re</sup> année, 28 septembre (le tour des parotiques n'est pas décrit, la queue est trop longue et le cri correspond difficilement à l'espèce proposée); Vendée – La Faute-sur-Mer: lagune de la Belle Henriette, 1<sup>re</sup> année, 9 septembre (absence du cri et queue décrite comme étant longue).

**Rousserolle des buissons** *Acrocephalus dumetorum* – Charente-Maritime – Rochefort: station de Lagunage, 11 novembre (description trop sommaire et absence de photographies).

**Fauvette épervière** *Sylvia nisoria* – Charente-Maritime – Saint-Trojan-les-Bains: marais des Bris, 1<sup>re</sup> année, 28 septembre (description et conditions d'observation trop brèves); Vendée – île d'Yeu: les Cinq Pierres du Chatonnet, 1<sup>re</sup> année, 8 octobre (l'œil et les pattes sombres ne correspondent pas à une Fauvette épervière et le reste de la description est trop court).

## 2011

**Aigle criard** *Aquila clanga* – Hérault – Montpellier: zoo, 22 septembre (description sommaire qui n'a pas permis de déterminer l'identité spécifique de cet aigle).

**Bécassin à long bec** *Limodromus scolopaceus* – Charente-Maritime – Moëze: réserve naturelle de Moëze-Oléron, 1<sup>re</sup> année, phot., 29 septembre (il n'a pas été possible d'aller plus loin que bécassin indéterminé).

## 2010

**Busard pâle** *Circus macrourus* – Drôme – Crozes-Hermitage: Pierre-Aiguille, fem. ad., 9 avril (description beaucoup trop brève pour pouvoir identifier une femelle de cette espèce).

**Buse des steppes** *Buteo buteo vulpinus* – Ardèche – Andance, 2 ad., phot., 11 janvier (forme intermédiaire ne pouvant pas être exclue et absence de mesures biométriques); Aude – Gruissan: Roc de Cornilhac, 9 ad. et un 1<sup>er</sup> hiver, 19 septembre (absence de photographies, absence de mesures biométriques); Drôme – Saint-May, 2 ad., phot., 11 mai (forme intermédiaire ne pouvant pas être exclue et absence de mesures biométriques), Crozes-Hermitage: Pierre-Aiguille, ad., 15 mars (absence de photographies, absence de mesures biométriques), Crozes-Hermitage: Pierre-Aiguille, 2<sup>e</sup> année, 17 mars (description très sommaire, absence de photographies, absence de mesures biométriques); Haut-Rhin – Wolchswiller, ad., phot., 20 octobre (une Buse variable ou un oiseau de type intermédiaire n'ont pu être exclus).

**Bécassine double** *Gallinago media* – Finistère – Cléden-cap-Sizun, 24 novembre (aucun élément n'a été décrit sur la queue, mais rien non plus sur les sus-alaires et pas d'éléments comportementaux).

**Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus caudatus* – Mayenne – Entrammes: Persiguan, phot., du 15 au 17 décembre (impossible d'exclure un oiseau intermédiaire).

**Bruant nain** *Emberiza pusilla* – Landes – Saint-Julien-en-Born: Contis plage, 26 octobre (fiche presque dépourvue de description ne permettant pas d'éliminer un autre petit bruant d'origine asiatique).

**TONDEUR**  
OPTIQUE - PHOTO - VIDEO

images  
PHOTO  
TONDEUR

SWAROVSKI-STEINER  
PERL-NIKON-ZEISS-KOWA.

PHOTO NUMERIQUE & ARGENTIQUE  
SPECIALISTE DIGISCOPE

TARIFS PREFERENTIELS  
ASSOCIATIONS

Votre interlocuteur  
M. Gilles Corsand Tél. 04 74 09 45 67  
fax 04 74 09 45 68 - <http://www.optiquetondeur.com>  
email : [contactornitho@optiquetondeur.com](mailto:contactornitho@optiquetondeur.com)



## 2008

**Grive à gorge noire** *Turdus atrogularis* – Morbihan – Theix: Cleisse, mâle ad., décembre (pas de notes de terrain prises pour une observation remontant à six années et concernant une espèce très rare).

## 2007

**Marouette de Baillon** *Porzana pusilla* – Gironde – Le Teich, 20 juillet (description trop courte et enregistrement indisponible).

## 2006

**Traquet oreillard oriental** *Oenanthe hispanica melanoleuca* – Bouches-du-Rhône – Eyguières: les Opies, mâle ad., phot., du 7 au 21 mai (les oiseaux du sud-est de la France présentent une coloration ocre et le masque de cet oiseau ne correspond pas à la sous-espèce proposée).

## 2004

**Pluvier bronzé** *Pluvialis dominica* – Finistère – Plumeur: pointe de la Torche, 1<sup>re</sup> année, 9 octobre (description insuffisante).

**Grive de Naumann** *Turdus naumanni* – Morbihan – Île d'Hoëdic, 28 octobre (description incomplète pour un oiseau observé furtivement à l'œil nu).

## 1996

**Labbe à longue queue** *Stercorarius longicaudus* – Haute-Savoie – Chevrier: défilé de l'Écluse, 1<sup>re</sup> année, 29 septembre (il n'a pas été possible de valider ce labbe sans détails sur la silhouette, sans description du croupion, des axillaires, du bec).

**Fauvette sarde** *Sylvia sarda* – Alpes-Maritimes – Cannes, îles de Lerins: île Sainte-Marguerite, phot., 24 mars (une photographie de très mauvaise qualité et pas de description).

## 1988

**Bécassine double** *Gallinago media* – Aube – Dienville – Randonvilliers: lac Amance, 23 novembre (aucun critère de plumage n'a été noté).

## ANNEXE 4 – ESPÈCES DONT L'ORIGINE EST PROBABLEMENT CAPTIVE (CATÉGORIE E)

- **Ibis blanc** *Eudocimus albus* – Vendée – La Barre-de-Monts, ad., phot., 9 mars (J.-J. Boujot, A. Boujot, V. Boujot).
- **Vautour de Rüppell** *Gyps rueppellii* – Alpes-de-Haute-Provence – Rougon: Barre de l'Aigle, phot., 9 et 18 août (A. van der Yeught, S. Henriquet, E. Cougnenc *et al.*); Alpes-Maritimes – Villeneuve d'Entraunes: les Fourcheires, 5 août (A. van der Yeught, S. Henriquet, E. Cougnenc *et al.*); Aveyron – Millau, phot., 10 septembre (A. van der Yeught, S. Henriquet, E. Cougnenc *et al.*).
- **Outarde barbut** *Otis tarda* – Finistère – Quimper: Men Fouez, mâle, 1<sup>er</sup> janvier (A. Lambrechts). Vendée – Grues, phot., 14 février (photos sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)), Lairoux, le Payré, mâle imm., phot., 24 février (S. Mauvieux), Saint Denis-du-Payré: Les Prés Jaillard, mâle imm., phot., 27 février (S. Mauvieux).
- **Roselin familier** *Carpodacus mexicanus* – Bas-Rhin – Schaffhouse-près-Seltz, mâle, phot., 23 novembre (photo sur [www.ornitho.fr](http://www.ornitho.fr)); Val-de-Marne – Champigny-sur-Marne: Coeuilly, mâle, phot., 12 février (A. Féret *vide* F. Jiguet).

## REMERCIEMENTS

Le CHN tient une nouvelle fois à remercier tous ceux qui au cours de l'année 2013 ont contribué à son fonctionnement:

- il s'agit avant tout de l'ensemble des ornithologues et photographes ayant contribué à cette synthèse par la rédaction de fiches, l'envoi de photographies sans qui le CHN ne pourrait pas fonctionner;
- nous remercions également les responsables de comités d'homologation régionaux, d'associations ou organismes collectant des données: Thibault Brugerolle, Cyrille Deliry, Christian Dronneau, Alain Fossé, Jean François, Xavier Hindermeier, Grégory Juppet, Dominique Michelat, Cédric Peignot, Michel-Antoine Réglade;
- Antoine Arnaud, Arnaud Béchet, Samuel Hilaire ont soit apporté des informations complémentaires, soit aidé au traitement des données;
- Sébastien Reeber, Marc Thibault, Thomas Blanchon, Philippe J. Dubois et Jean-Yves Frémont pour leurs relectures et conseils avisés;
- Dick Forsman pour l'expertise qu'il fournit régulièrement au CHN sur l'identification des rapaces;
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour l'aide matérielle et financière attribuée au secrétariat du Comité et nécessaire à son fonctionnement;
- la revue *Ornithos* pour la prise en charge du coût des photos en couleurs qui illustrent ce rapport.

21. Bergeronnette des Balkans *Motacilla flava feldegg*, mâle, Hyères, Var, mars 2013 (Aurélien Audevard). Mâle Black-headed Wagtail.



## BIBLIOGRAPHIE

• BÖHNING-GAESE K., SCHUDA M.D. & HELBIG J. (2003). Weak phylogenetic effects on ecological niches of *Sylvia* warblers. *J. Evol. Biol.* 16: 956-965.

• CROCHET P.-A., DUBOIS P.J., JIGUET F., LE MARÉCHAL P., PONS J.-M. & YÉSOU P. (2013). Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2010-2012). 13<sup>e</sup> rapport de la CAF. *Ornithos* 20-3: 164-173.

• DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. & YÉSOU P. (2008). *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris.

• DUPRIEZ Q. & HAUBREUX D. (2014). Capture d'une Fauvette babillarde *Sylvia curruca* orientale dans le Nord. *Ornithos* 21-4: 246-247.

• FRÉMONT J.-Y. & LE CHN (2002). Les oiseaux rares en France en 2001. Rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 10-2: 49-83.

• HINDERMEYER X. & M.-P., AURIAUX V. & LANZANI C. (2014). Un groupe de neuf Canards à front blanc *Anas americana* sur l'île d'Yeu, Vendée. *Ornithos* 21-5: 290-296.

• LABROUSSE B. (2015). Un Rougequeue de Moussier *Phoenicurus moussieri* dans l'Hérault en mai 2013: première mention française de l'espèce. *Ornithos* 22-1: 51-53.

• MAYAUD N. (1953). Liste des oiseaux de France. *Alauda* 21: 1-63.

• MAYAUD N. (1957). Notes d'ornithologie française II. *Alauda* 25: 116-121.

• MAYAUD N. (1965). Notes d'ornithologie française VIII. *Alauda* 33: 131-147.

• RAITIÈRE W. & ARCHER E. (2014). Première mention française du Tarier de la Caspienne *Saxicola maurus variegatus*. *Ornithos* 21-5: 286-289.

• REEBER S. & LE CHN (2012). Les oiseaux rares en France en 2011. 29<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 19-6: 353-395.

• SANGSTER G., COLLINSON J.M., CROCHET P.-A., KNOX A.G., PARKING D.T. & VOTIER S.C. (2012). Taxonomic recommendations for British birds: eighth report. *Ibis* 154: 874-883.

• SHIRIHAI H., GARGALLO G., HELBIG A.J., HARRIS A. & COTTRIDGE D. (2001). *Sylvia Warblers: Identification, Taxonomy and Phylogeny of the Genus Sylvia*. Christopher Helm, London.

• SVENSSON L. (2013a). Subalpine Warbler variation and taxonomy. *British Birds* 106-11: 651-668.

• SVENSSON L. (2013b). A taxonomic revision of the Subalpine Warbler *Sylvia cantillans*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 133: 240-248.

• VOELKER G. & LIGHT J.E. (2011). Palaeoclimatic events, dispersal and migratory losses along the Afro-European axis as drivers of biogeographic distribution in *Sylvia* warblers. *BMC Evol. Biol.* 11: 163.

## SUMMARY

**Rare birds in France in 2013.** This 31st report of the French Rareities Committee (CHN) covers the year 2013, when 550 rare bird reports were examined. Among the highlights, the number of Nearctic ducks was particularly high in 2013: at least 11 American Wigeon were recorded, including a flock of 9, which constitutes a record for France; 8 Green-winged Teal and 4 Lesser Scaup. Furthermore, Greenland White-fronted Goose provides a fifth record. A record long-stay of 211 days was noted for a Pied-billed Grebe in Crau. Four Black-browed Albatross were recorded and 13 records of Black-headed Wagtail were obtained. New evidence of breeding of Baillon's Crake was obtained. Moreover, the first record for France of Lanner Falcon, Black-billed Cuckoo and Moussier's Redstart were obtained, while Little Swift provides a second mention, eastern Lesser Whitethroat a third, Pied Wheatear a fourth and a fifth, and Steppe Eagle a fifth. Furthermore a Ross's Gull was discovered inland in the Rhône valley, which is new for France.

CHN c/o LPO, Fonderies Royales, 8 rue du Dr Pujos, CS 90263, 17305 Rochefort Cedex