



Les oiseaux rares en France en 2016 et 2017

34^e rapport du Comité d'Homologation National

Sébastien Reeber, Jean-François Blanc, Frédéric Jiguet & le CHN

Ce 34^e rapport du Comité d'Homologation National couvre les années 2016 et 2017. En 2016, un total de 333 fiches a été analysé, ce qui est inférieur aux 417 fiches de l'année précédente mais plus conforme au rythme habituel. Le taux d'acceptation des fiches a été de 84,1%, soit 0,1% de moins qu'en 2015 et un chiffre tout à fait conforme à la normale. En 2017, 303 fiches ont été analysées, avec un taux d'acceptation de 83,5%.

En 2016, la réunion plénière s'était tenue à Paris les 11 et 12 juin. Les mandats de Nidal Issa et d'Yves Kayser, secrétaire en poste, arrivaient à leur terme, et Amine Flitti avait souhaité abréger son mandat. Au cours de cette réunion plénière, le secrétariat a été repris par Sébastien Reeber et les trois postes vacants ont été confiés à Julien Gonin, Frédéric Jiguet et Frédéric Veyrunes. Le CHN comptait donc les membres suivants: Alain de Broyer, Pierre-André Crochet, Julien Gonin, Frédéric Jiguet (Président), Jean-Pierre Jordan, Julien Piette, Sébastien Provost, Sébastien Reeber (Secrétaire), Frédéric Veyrunes et Maxime Zucca.

En 2017, la réunion plénière a de nouveau eu lieu à Paris, les 1^{er} et 2 juillet, et a vu les mandats de Jean-Pierre Jordan et de Julien Piette prendre fin. Nous les remercions chaleureusement pour le travail fourni. Les deux postes vacants ont été confiés à Jean-François Blanc et Quentin Dupriez. Lors de cette réunion, il a également été décidé de proposer à Hugo Touzé de réaliser des synthèses mensuelles et d'animer la page Facebook du CHN (V. plus loin).

En 2018, la réunion plénière s'est également tenue à Paris, le 7 avril, et a vu les mandats de Alain de Broyer et Sébastien Provost arriver à leur terme. Qu'ils soient eux aussi remerciés pour leur investissement dans les travaux du CHN. Leurs postes ont été confiés à Hugo Touzé et Thibaut Chansac. Frédéric Jiguet et Sébastien Reeber ont quant à eux été respectivement reconduits aux postes de Président et Secrétaire.

Le CHN renouvelle deux de ses dix membres chaque année, la durée d'un mandat étant donc de cinq années, qui ne peut être reconduit qu'après une année de vacance. Pour assurer ce rythme de renouvellement soutenu, le CHN profite de ce rapport annuel pour faire un appel à candidatures. Si vous souhaitez contribuer au travail de ce comité, merci de prendre contact avec le Président ou le Secrétaire à l'adresse mail suivante: homologation.chn@gmail.com

SITE INTERNET, VISIONATURE ET PAGE FACEBOOK DU CHN

Le site internet du CHN (www.chn-france.org) a fait l'objet de quelques mises à jour en 2017. Ce site nous permet de mettre à disposition de tous la base de données du CHN, ainsi que l'essentiel des informations nécessaires sur ses objectifs, son fonctionnement et ses travaux. On y trouve aussi tous les documents téléchargeables, à savoir la fiche d'homologation CHN vierge, la liste des espèces soumises à homologation nationale, les rapports annuels, etc. Merci de nous signaler les éventuelles erreurs qui pourraient être trouvées sur ce site web, à l'adresse suivante: homologation.chn@gmail.com.

Depuis fin 2017, des synthèses mensuelles d'observations d'espèces soumises à homologation sont

également publiées chaque mois sur le site, permettant à chacun d'accéder facilement aux informations récentes sur les oiseaux rares en France. Ces synthèses sont publiées rapidement après la fin de chaque mois, les données qu'elles incluent n'étant pas encore homologuées. Le CHN attend donc les fiches d'homologation qui leur correspondent. La conception et la rédaction de cette chronique en images sont assurées par Hugo Touzé, qui est remercié ici pour le travail que cela représente. Toujours en 2017, le CHN s'est doté d'une page Facebook et y publie les liens vers les synthèses mensuelles, dès leur parution, mais également de temps à autre des informations sur des raretés passées ou futures pour la France. N'hésitez pas à « liker » la page CHN et à suivre les actualités qui y sont publiées, comme déjà plus de 1 100 personnes !

Beaucoup de données publiées sur les bases de données en ligne ne parviennent malheureusement pas au CHN, pour diverses raisons. Nous œuvrons à moderniser les outils mis à disposition des observateurs, notamment à la mise en place d'un module d'homologation en ligne sur les bases Visionature, qui permettra aux observateurs d'inclure les éléments descriptifs directement lors de la saisie. Les avis du CHN seront rendus beaucoup plus rapidement, et directement répercutés sur les données en ligne. Ce module est en cours de test par le CHN et devrait être opérationnel prochainement. En attendant, nous faisons une fois encore appel à la bonne volonté des ornithologues de terrain pour nous transmettre directement leurs données par mail (homologation.chn@gmail.com). Par ailleurs, et comme l'année passée, pour chaque espèce citée, les observations publiées en ligne et non signalées au CHN ont été mentionnées (il est toutefois possible que certaines de ces fiches nous soient parvenues entre l'écriture de ce rapport et sa publication...).

FONCTIONNEMENT DU CHN

Traitement des observations publiées avec photos

Le CHN tient à rappeler une nouvelle fois que les photos publiées par le biais d'Internet et ne faisant pas l'objet de fiches descriptives sont traitées, dans la mesure où elles sont rendues publiques. Bien entendu, il est toujours préférable de prendre un peu de temps pour remplir une fiche descriptive, les photographies n'offrant souvent qu'une vision incomplète de l'oiseau observé... Si aucune fiche n'est envoyée, la donnée est donc examinée un an après le rapport de l'année en cours. Les données rejetées ne sont pas publiées et les données acceptées le sont en précisant la source électronique (lien vers le site web) en lieu et place du nom des observateurs, à moins que ceux-ci aient fait la démarche autorisant le CHN à publier leur(s) nom(s).

1. Garrot d'Islande *Bucephala islandica*, mâle et femelles, Islande, juillet 2012 (Julien Gonin). *Barrow's Goldeneye*.



Publication des données issues de suivis par satellite

Ce rapport ne comprend pas de données issues de programmes de radio-tracking (aigles par exemple), souvent très nombreuses de par la nature même du procédé de collecte. Ces données seront publiées en ligne au fur et à mesure de leur traitement sur le site web du CHN, et un rappel sera systématiquement fait dans le rapport annuel, en résumant le nombre de données et le parcours de l'oiseau.

TRAVAUX DU CHN

Révisions terminées

Le CHN a terminé la révision des données de Buse des steppes *Buteo vulpinus vulpinus*, de Faucon lanier *Falco biarmicus*, de Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis*, de Locustelle de Pallas *Locustella certhiola* et de Locustelle lancéolée *Locustella lanceolata*. Les résultats de ces révisions feront prochainement l'objet de publications spécifiques. Ce sera l'occasion d'expliquer clairement les raisons ayant conduit à procéder à ces réexamens.

Révision en cours et à venir

Le CHN révisé actuellement, en coordination avec la CAF, les données françaises de Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii* et de Garrot d'Islande *Bucephala islandica*. Voici une liste des révisions que le CHN va entamer très prochainement :

- **Puffin de Macaronésie** *Puffinus baroli* – À la lumière des connaissances acquises au cours des deux dernières décennies, il apparaît que le statut de cette espèce en France tranche singulièrement avec ce qui en est connu ailleurs en Europe de l'Ouest. Il s'agit d'abord d'une espèce très rare et qui l'est devenue plus encore. En Angleterre et en Irlande par exemple, sa fréquence est inférieure à celle du Pétrel gongon *Pterodroma feae*, alors que le rapport est de 15 pour un en faveur du Puffin de Macaronésie en France. Par ailleurs, alors que le pic d'abondance, décrit sur la base de sorties en mer dans le golfe de Gascogne, a lieu vers la fin du mois d'août, il se prolonge en France jusque vers le 10 octobre... Il paraît donc nécessaire de réévaluer la fiabilité des données françaises à la lumière des changements intervenus dans son statut et sa répartition au fil des décennies passées.
- **Sterne élégante** *Sterna elegans* – Les analyses génétiques effectuées sur plusieurs oiseaux européens (DUFOUR *et al.* 2017) montrent non seulement que les individus montrant les caractères typiques de l'espèce sont bien des Sternes élégantes, mais que le CHN s'est possiblement montré trop restrictif quant à des oiseaux à bec entièrement jaune-orangé, mais par ailleurs moins typiques. Les données de Sternes à bec orange non identifiées spécifiquement seront donc révisées à l'aune de ces nouvelles connaissances.
- **Albatros sp.** – Dans la continuité de la suppression des données non spécifiquement attribuées entamée de longue date par le CHN, les cinq données acceptées comme Albatros sp. vont être révisées, de manière à les attribuer à une espèce ou à les rejeter. Plusieurs binômes ou groupes d'espèces ont fait l'objet de ce traitement par le passé (Marouette poussin/Marouette de Baillon, Pluvier bronzé/fauve, Érismaure sp., etc.) dans la mesure où ils n'ont pas une grande signification ornithologique.
- **Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis* – Un travail de fond doit être conduit sur cette espèce, qui s'avère assez variable, les populations de Sardaigne par exemple ne montrant pas forcément les mêmes phénotypes qu'en Afrique du Nord. Ces populations sardes ayant été étudiées récemment, y compris génétiquement, le CHN va tenter d'établir plus précisément les critères nécessaires à l'homologation de l'espèce en France et éventuellement conduire des révisions en conséquence.
- **Bruant à calotte blanche** *Emberiza leucocephala* – Une publication récente (HELLQUIST 2016) fait le point sur la distinction des femelles de Bruant à calotte blanche et de Bruant jaune *E. citrinella*, tenant compte tout particulièrement du contexte d'hybridation dans la zone de sympatrie des deux espèces. À la lumière de ces connaissances nouvelles, les données françaises de femelles, précédemment acceptées ou refusées, seront révisées prochainement.

• Par ailleurs, un travail de fond va être entamé sur toutes les espèces ayant été mentionnées cinq fois ou moins en France, afin de détecter les éventuels patterns d'apparition inhabituels au regard de la situation dans les autres pays d'Europe de l'Ouest, de mieux en mieux connue. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'ont déjà été révisées les locustelles précitées.

Critères de vote propres aux révisions

La mise au jour permanente de nouvelles connaissances, que ce soit sur le statut ou l'identification, oblige le CHN à conduire une politique de révision plus fluide et réactive. Les membres du CHN s'accordent donc sur la nécessité de recourir plus facilement à des révisions tout en ne remettant pas constamment en cause son propre travail... Il a donc été décidé de modifier les critères de vote liés aux révisions. Jusqu'ici, une fiche révisée était traitée comme une fiche normale, c'est-à-dire qu'elle était rejetée avec quatre votes contre (ou plus) au premier tour, deux votes contre (ou plus) au second tour et quatre votes contre (ou plus) en séance plénière. Dorénavant, une majorité simple de refus sera requise pour rejeter une fiche précédemment acceptée (là où deux refus pouvaient suffire). Les critères des premières mentions françaises restent inchangés : acceptation à l'unanimité.

Envoi des fiches d'homologation

Le CHN tient à rappeler qu'il est préférable de rédiger la fiche (téléchargeable sur le site Internet du CHN www.chn-france.org ou disponible sur demande à l'adresse suivante : homologation.chn@gmail.com) même si vous n'êtes pas le découvreur de l'oiseau. Toutefois, afin de pouvoir indiquer le nom du découvreur, il est préférable que celui-ci rédige une fiche. En effet, le CHN effectue son travail sur la base des documents qu'il reçoit et n'est pas toujours informé du nom du découvreur...

Il est aussi recommandé de rédiger sa fiche dès que possible après l'observation, ce qui évite une publication tardive des données ou la nécessité de publier des compléments et/ou rectificatifs à des données déjà parues. La transmission rapide des fiches permet également de tenir le rythme de parution du rapport et de rester ainsi au plus près de l'actualité ornithologique.

À noter aussi que les documents photographiques peuvent être des compléments précieux aux fiches déjà reçues. Nous invitons donc tous les photographes à communiquer leurs photos d'espèces rares, y compris lorsqu'ils ne sont pas les découvreurs de l'oiseau ou n'ont pas rempli de fiche d'homologation. Cependant, en cas de découverte, il est important d'éviter l'envoi de fiches uniquement basées sur des photos. Elles peuvent être trompeuses et soulever des questions inutiles auxquelles une description écrite permettrait de répondre facilement. Ce point est ainsi fondamental dans la détermination d'espèces ou de sous-espèces délicates.

Le travail du CHN est d'autant plus appréciable et utile à tous que le nombre de fiches qui lui parviennent est important. N'hésitez donc pas à nous faire parvenir des fiches descriptives ou des photographies d'oiseaux que vous avez observés et qui ne figurent pas dans les rapports. Les données non parvenues au CHN sont citées dans les commentaires spécifiques du présent rapport à cet effet... Paradoxalement, les oiseaux vus par de nombreux observateurs sur des sites très fréquentés comme les îles bretonnes ou la Camargue sont souvent ceux qui sont oubliés.

LES FAITS MARQUANTS

L'année 2016 a été dans la norme pour la plupart des espèces rares, mais particulièrement riche pour un certain nombre de passereaux. Elle a apporté de belles surprises notamment chez les passereaux migrateurs, fournissant les premières mentions françaises pour l'Ammomane élégante *Ammomanes cinctura*, la Fauvette de l'Atlas *Sylvia deserticola*, le Pouillot de Temminck *Phylloscopus coronatus*, mais aussi la « Bergeronnette orientale » (groupe de sous-espèces orientales de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava*). Une donnée d'Alouette monticole *Melanocorypha bimaculata* de 2015 vient compléter cette liste de passereaux nouvellement inscrits sur la Liste des Oiseaux de France. On notera aussi les secondes

données françaises pour le Bécasseau à longs doigts *Calidris subminuta* et le Martinet cafre *Apus caffer*. La Grive à ailes rousses *Turdus eunomus* produit la cinquième donnée française, après plus de vingt années d'absence. Plusieurs espèces ont connu en 2016 des affluences inhabituelles, à savoir le Canard à front blanc *Anas americana* (6 individus), la Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* (11 individus), le Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* (record annuel de 20 individus), le Pouillot de Hume *Phylloscopus humei* (7 individus) et le Bruant nain *Emberiza pusilla* qui, avec 13 individus, bat le record de 12 oiseaux en 2015. Enfin, l'année 2016 constitue un cru très honorable pour la Mouette de Franklin *Larus pipixcan*, avec 5 oiseaux.

L'année 2017 a également réservé son lot de surprises, avec la première mention française du Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis*, les secondes mentions françaises pour le Fou à pieds rouges *Sula sula* et la Locustelle lancéolée *Locustella lanceolata*, la troisième mention française pour l'Alouette pispolette *Alauda rufescens*, la quatrième Sterne royale *Sterna maxima*, les quatrième et cinquième Bécasseaux à cou roux *Calidris ruficollis* et le cinquième Aigle des steppes *Aquila nipalensis*. Notons également un groupe de 8 Oies naines *Anser erythropus*, des totaux inédits pour l'Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus* (13 individus), le Chevalier solitaire *Tringa solitaria* (2), le Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* (5) et le Bec-croisé perroquet *Loxia pytyopsittacus* (28).

Rappelons pour terminer que depuis le 1^{er} janvier 2018, les observations de Bruant nain *Emberiza pusilla* et de Bécasseau falcinelle *Calidris falcinellus* ne sont plus soumises à homologation nationale.

2. Bécasseau falcinelle *Calidris falcinellus*, 1^{re} année, Hyères, Var, août 2016 (Aurélien Audevard). 1st-ty Broad-billed Sandpiper.



LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES (CATÉGORIES A & C)

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses, les deux premiers chiffres, représentant respectivement le nombre total de données françaises et celui des individus correspondants à l'exclusion des années 2016 et 2017, les deux suivants désignant les données homologuées depuis 1981 (jusqu'en 2015) et celui des individus correspondants; les deux dernières paires représentent la même chose pour 2016 et 2017 respectivement. Les données issues des programmes de radio-tracking sont comptabilisées à part, sous la forme d'une parenthèse supplémentaire pour les espèces concernées.
3. Présentation des données par année et par ordre alphabétique des départements.
4. Localité (commune puis lieu-dit éventuel, parfois suivie des coordonnées géographiques en degrés décimaux sous le système WGS84), effectif (si non précisé: se réfère à un individu), âge et sexe si connus. À noter que l'âge est désormais présenté en années civiles: 1A = oiseau né dans l'année civile de l'observation, 2A = 2^e année civile, +1A = né l'année précédente ou avant, etc.)
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.) ou enregistré en vidéo (vidéo) ou en audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention « *et al.* » indique que d'autres observateurs ont vu le (ou les) oiseau(x) en question; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné dans le rapport du CHN est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche ou transmis une photo). Les photographies publiées sur Internet pour lesquelles aucune fiche n'a été adressée au CHN sont analysées avec une année de retard sur le rapport annuel; dans ce cas, les références webographiques sont indiquées en lieu et place du nom de l'observateur.
9. Au début du commentaire sur chaque espèce, la distribution générale de l'espèce est indiquée entre parenthèses.
10. La séquence taxonomique est celle de la récente Liste officielle des oiseaux de France (COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE 2016).
11. Les données concernant les sous-espèces sont mentionnées comme « présentant les caractéristiques » de la sous-espèce concernée.
12. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs indiqués. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple: Oie à bec court, 2 ind., Merville-Franceville-Plage (Calvados), 26 novembre (J.-P. Marie *et al.*).

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (242/1257) (173/490 – 8/10 – 7/33)

- 2017 Finistère** – Goulven, La Palud, 11 ind., phot., du 19 octobre au 3 janvier 2018 (H. Foxonet, B. Pellegrini *et al.*).
Manche – Saint-Pair-sur-Mer, phot., du 13 novembre au 28 décembre (M. Leroux).
Marne – Belval-en-Argonne, 1A, phot., du 1^{er} au 3 novembre (D. Lecompte *et al.*).
Moselle – Bistroff, +2A, phot., du 4 au 13 mars (S. Kmiecik).
Nord – Dunkerque, 2 ind. de +2A, 3 ind. de 2A, phot., 21 et 22 janvier (H. Moflelein); Armbouts-Cappel, lac, les mêmes oiseaux, phot., 26 janvier (M. Delsaut, M.-P. Delsaut); Dunkerque, 10 ind., 18 septembre (J. Piette).
Pas-de-Calais – Marck, Hemmes-de-Marck, 4 ind., 6 janvier (M. Dehay).
2016 Bouches-du-Rhône – Vauvert, tué à la chasse, phot., 15 janvier (*vide J.-B. Mouronval*).
Calvados – Merville-Franceville-Plage, 2 ind., 26 novembre (J.-P. Marie *et al.*).
Finistère – Guissény, Goulven et Tréfléz, +1A, phot., du 6 novembre au 11 janvier 2017 (S. Mauvieux, B. Pellegrini *et al.*), Henvic, phot., du 28 décembre au 6 février 2017 (Y. Créau *et al.*).
Morbihan – Guidel, du 24 novembre au 8 février 2017 (Y. Blat *et al.*).
Moselle – Bistroff, +1A., phot., du 9 au 19 septembre (S. Kmiecik).
Nord – Rexpoede, +1A, phot., 27 novembre (H. Moflelein).
Pas-de-Calais – Marck, Hemmes de Marck, 2 ind., phot., 20 décembre (F. Duchenne, B. Duchenne).
2003 Morbihan – Séné, marais de Séné, phot., du 19 novembre au 19 mars 2004 (X. Rozec, N. Issa *et al.*), et non le 5 décembre seulement (V. *Ornithos* 13-2: 75).
 (Est du Groenland, Islande, Spitzberg). L'année 2016 fut normale, en dehors de tout afflux notable, avec des données en provenance des Hauts-de-France, de Normandie et de Bretagne, plus une donnée de Moselle, où l'oiseau est d'ailleurs revenu l'année suivante, et surtout une donnée de Camargue nette-

3. Oie à bec court
Anser brachyrhynchus,
 Goulven, Finistère,
 décembre 2016
 (Pierre Rigalleau).
Pink-footed Goose.



ment plus originale. En effet, l'espèce n'avait pas été signalée depuis 1982 en Méditerranée, où il n'existe d'ailleurs que quatre mentions homologuées. L'année 2017 a vu davantage d'oiseaux, avec notamment deux groupes de 10 et 11 oiseaux dans le Nord et le Finistère. À signaler que les deux adultes vus avec leurs jeunes à Armbouts-Cappel et Dunkerque, Nord, avaient été marqués de colliers le 28 avril 2016 à Ekne, Levanger, Norvège.

OIE NAINE *Anser erythropus* (18/19) (8/6 – 0/0 – 1/8)

- 2017 Marne** – Giffaumont-Champaubert, lac du Der-Chantecoq, Machelignots, 4 ind de +1A et 4 ind. de 1A, phot., du 28 décembre au 10 mars 2018 (V. Palomares, L. Dubois, P. Dubois *et al.*).
 (Europe du Nord, Sibérie). Donnée extraordinaire par le nombre d'individus concernés, jamais plus de deux Oies naines n'ayant jusqu'ici été vues ensemble en France... Le lac du Der avait déjà accueilli l'espèce en 2000 et 2001.

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis* (60/61) (44/43 – 2/2 – 1/1)

- 2017 Bas-Rhin** – Seltz/Wintzenbach/Beinheim/Neewiller-près-Lauterbourg/Neuhaeusel, 1A, phot., du 19 novembre au 3 mars 2018 (T. Lux *et al.*).
2016 Loire-Atlantique – Lavau-sur-Loire, 1A, phot., du 28 novembre au 15 décembre (D. Tavenon, A. Trémion *et al.*).
Vendée – Sainte-Radégonde-des-Noyers, la Prée-Mizotière, 1A, phot., du 6 décembre au 26 janvier 2017 (photos sur www.ornitho.fr).
2015 Pas-de-Calais – Oye-Plage, 2 ind. +1A., phot., du 18 au 25 mars (photo sur www.ornitho.fr).

(Sibérie). Deux données en 2016 et une en 2017, ce qui se situe dans la moyenne de ces dernières années, et toutes en provenance de secteurs fréquentés par des oies grises hivernantes. À noter cependant que plusieurs données ont été placées en catégorie E du fait de l'observation de bagues plastiques aux pattes des oiseaux... L'espèce est en effet un bon exemple des difficultés à faire la part entre oiseaux sauvages et échappés de captivité.

CANARD À FRONT BLANC *Anas americana* (64/68) (61/65 – 6/5 – 0/0)

- 2016 Finistère** – Guissény, fem. 1A, phot., 21 et 22 octobre (J.-F. Blanc, L. Deplaine *et al.*), fem., phot., 29 novembre (S. Wroza *et al.*), mâle 2A, phot., du 29 novembre au 5 avril 2017, mâle 2A, phot., du 2 décembre au 11 février 2017, mâle +1A, phot., du 10 au 29 décembre (S. Mauvieux, S. Wroza, N. Issa *et al.*), 3 fem., phot., du 18 au 22 décembre (S. Wroza *et al.*).
 (Amérique du Nord). Au total, au moins 3 mâles et 3 femelles différents semblant avoir fréquenté le secteur de Guissény-Kerlouan, ce qui est remarquable, non seulement par le nombre d'oiseaux mais aussi par la durée des stationnements. Deux mâles ayant stationné en baie de Goulven l'hiver précédent, le mâle adulte de cette année n'a pas été comptabilisé comme un nouvel oiseau. Pour 2017, un mâle observé en Loire-Atlantique n'a pas été signalé au CHN à ce jour.

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis* (95/78) (94/77 – 8/5 – 3/2)

2017 Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, Saint-Seren, mâle +1A, phot., 16 mars (D. Cohez), mâle, phot., du 16 au 18 décembre (B. Louboutin, E. Gaget *et al.*).

Puy-de-Dôme – Rentières, Pré Perché, mâle +1A, phot., du 27 mars au 9 avril (M. Bernard, A. Crégu *et al.*).

2016 Ain – Villars-les-Dombes, étang du Petit Turlet, mâle +1A, phot., 30 octobre (P. Crouzier *et al.*).

Calvados – Merville-Franceville-Plage, mâle, phot., 17 mars (photos sur www.ornitho.fr).

Charente-Maritime – Moëze, les Bosses aux Écossais, mâle 1A, phot., du 1^{er} au 7 novembre (J.-F. Blanc).

Finistère – Plouzané, gravière de Bodonnou, mâle, phot., du 7 au 13 janvier puis Trébabu, étang de Kerjean, phot., du 16 janvier au 20 mars (B. Pellegrini, A. Corre, S. Molliex *et al.*).

Landes – Labenne, marais d'Orx, Casier sud, mâle +2A, phot., du 28 janvier au 25 février (S. Reyt, J.-M. Dramard *et al.*).

Marne – Outines, étang des Landres, mâle, phot., du 21 février au 13 mars (B. Salvarelli *et al.*).

Vendée – L'Île-d'Olonne, réserve de Chanteloup, mâle, phot., 25 mars (photos sur www.ornitho.fr).

2015 Aube – Lusigny-sur-Barse, anse de la Picarde, mâle, phot., du 27 décembre au 24 février 2016 (B. Luneau *et al.*).

Finistère – Plouzané, mâle +1A, phot., 15 avril (D. Grandière *et al.*).

(Amérique du Nord). Avec cinq oiseaux supplémentaires, 2016 est dans la lignée des trois années précédents, qui cumulent 22 oiseaux. L'oiseau des Landes est peut-être bien le même que celui ayant stationné sur le site du 10 avril au 8 mai 2015 et n'a donc pas été comptabilisé, de même que les deux données du Finistère, qui se rapportent au même mâle revenant. 2017 est plus modeste, même s'il manque encore une mention en provenance de Brenne. À signaler toutefois que la mention auvergnate constitue une première régionale pour cette espèce, plus classiquement contactée le long du littoral et dans les grandes concentrations de Sarcelle d'hiver *A. crecca*.

4. Érismaure à tête blanche *Oxyura leucocephala*, femelle, lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique, mai 2016 (Sébastien Reeber). *Female White-headed Duck*.

**SARCELLE À AILES BLEUES** *Anas discors* (71/72) (61/62 – 1/1 – 0/0)

2016 Vendée – Saint-Hilaire-des-Loges, mâle 1A, phot., du 9 au 23 octobre (H. Foxonet, G. Besseau *et al.*).

(Amérique du Nord). L'année 2016 apporte une nouvelle donnée d'un jeune mâle sur la côte atlantique en octobre, qui plaide en faveur d'une arrivée naturelle. Rien en 2017, ce qui tend à confirmer une tendance à la raréfaction de cette espèce en France (2,2 données par an en moyenne pour la période 1990-2000).

FULIGULE À TÊTE NOIRE *Aythya affinis* (37/30) (37/30 – 2/1 – 2/1)

2017 Finistère – Pont-Croix, lagunage de Lespoul, mâle 1A, phot., du 28 décembre au 3 mars 2018 (L. Kergoat *et al.*).

Haute-Savoie – Publier, delta de la Dranse, mâle +1A, phot., du 26 février au 25 mars (P. Charrière, Q. Guibert *et al.*).

2016 Haute-Savoie – Publier, delta de la Dranse, mâle +1A., phot., du 26 mars au 15 mai (J.-J. Beley, A. Bernard, C. Charobert, M. Isselé, T. Lux *et al.*).

Savoie – Viviers-du-Lac, zone de loisirs des Mottets, mâle, phot., du 29 février au 27 mars (P. De Ferrière, M. Poumarat, F. Poumarat *et al.*).

2014 Haut-Rhin – Rhinau, canal d'Alsace, mâle +1A, fem., 18 janvier (T. Ullrich *fade* B. Disch).

(Amérique du Nord). Retour pour deux nouveaux hivers du mâle du delta de la Dranse, qui avait déjà séjourné sur ce site du 30 avril au 23 mai 2015 (V. *Ornithos* 23-6: 304). Chacune des deux années récolte une autre mention, d'un mâle dans les deux cas. À signaler qu'un mâle de 1^{er} hiver a été observé sur un autre site finistérien du 6 au 9 décembre, peut-être le même, mais n'a pas été signalé au CHN à ce jour.

MACREUSE À BEC JAUNE *Melanitta americana* (12/11) (12/11 – 0/0 – 1/1)

2017 Vendée – La Tranche-sur-Mer, plage de la Terrière, mâle +2A, du 5 au 8 janvier (T. Dagonet *et al.*).

(Amérique du Nord). Treizième mention française pour cette macreuse, qui n'avait pas été vue en France depuis 2013, sur un site réputé pour l'observation des macreuses occasionnelles.

MACREUSE À FRONT BLANC *Melanitta perspicillata* (69/70) (54/55 – 2/2 – 2/2)

2017 Finistère – Île de Sein, 1A, phot., 20 octobre (M. Zucca).

Sarthe – La Ferté-Bernard, base nautique, mâle +2A, phot., 16 janvier (J.-F. Blanc *et al.*).

2016 Charente-Maritime – Saint-Clément-des-Baleines, phare des Baleines, fem. +1A, phot., du 4 décembre au 22 janvier 2017 (J.-F. Blanc, J. Gernigon *et al.*).

Morbihan – Penthièvre, fem., phot., du 6 au 14 décembre (B. Raymond *et al.*).

(Amérique du Nord). Deux données en 2016 et en 2017, c'est parfaitement dans la norme, ce qui n'est en revanche pas le cas de la localité sarthoise, fréquentée une seule journée par ce mâle adulte ! Il existe deux autres mentions françaises franchement intérieures : dans l'Aisne en 1945 et dans la Meuse en 1971. Une donnée manque encore pour le Morbihan.

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala* (41/46) (39/44 – 2/0 – 1/0)

2017 Charente-Maritime – Rochefort, station de lagunage, fem. +1A, phot., du 21 au 28 janvier 2017 (N. Issa *et al.*).

2016 Charente-Maritime – Rochefort, station de lagunage, fem. +1A, phot., du 8 au 19 mai 2016 (N. Issa *et al.*).

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, fem. +1A., phot., du 19 au 23 mai (S. Reeber *et al.*).

2015 Charente-Maritime – Rochefort, station de lagunage, fem. +1A, phot., du 12 novembre au 15 février 2016 (N. Issa *et al.*).

(Circum-méditerranéenne : Espagne, Turquie, Tunisie, Balkans, également au nord de la Caspienne). Il est probable que les trois données de 2016 et 2017 concernent toutes la même femelle, déjà vue en 2015 à Rochefort, Charente-Maritime. Dans cette hypothèse, cette femelle, disparue du site charentais le 19 mai 2016 au matin, aurait été retrouvée le soir même à Grand-Lieu, Loire-Atlantique !

PLONGEON À BEC BLANC *Gavia adamsii* (22/20) (18/16 – 1/1 – 1/1)

2017 Nord – Loon-Plage, jetée du Clipon, 16 décembre (M. Roca *et al.*).

2016 Pas-de-Calais – Calais, en mer, depuis le ferry Dunkerque-Douvres, 19 mars (F. Gabillard, S. Ernst, B. Bril).

(Sibérie, Alaska). Deux nouvelles données pour cette espèce qui n'est pas mentionnée en France tous les ans. Dates et localités sont sans surprise.

ALBATROS À SOURCILS NOIRS *Thalassarche melanophris* (17/14) (17/14 – 3/2 – 1/1)

2017 Landes – Capbreton, face au Casino et à l'Estacade, imm., phot., 12 novembre (P. Legay, E. Legay).

2016 Finistère – Brignogan, sémaphore, 3A/4A, 19 octobre (S. Mauvieux *et al.*).

Morbihan – Quiberon, pointe du Vivier, +4A, phot., 27 mars (P.J. Dubois, Y. Blat).

Vendée – Noirmoutier-en-l'Île, pointe de l'Herbaudière, +4A, phot., 27 mars (D. Robard).

(Mers australes). Quatre nouvelles observations en 2016 et 2017, portant à 12 le nombre de mentions françaises depuis 2011. Les données du printemps 2016 ont été considérées comme se rapportant au même oiseau, vu à 9h30 depuis l'île de Noirmoutier, Vendée, vers midi à la pointe du Vivier, Quiberon, Morbihan, et à 12h30 à la pointe du Percho, Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan. À noter que le CHN va réévaluer prochainement cinq observations homologuées comme albatros indéterminé, de façon à voir s'il est possible de les attribuer à une espèce.



5. Albatros à sourcils noirs *Thalassarche melanophris*, Quiberon, Morbihan, mars 2016 (Yves Blat). *Black-browed Albatros*.

OCÉANITE DE WILSON *Oceanites oceanicus* (29/30) (26/26 – 4/4 – 8/13)

2017 Charente-Maritime – En mer, 46,20860°N/1,72733°W, 30 août (V. Boutifard); En mer, Rochebonne, 46,10463°N/1,75423°W, 2 ind., phot., 16 septembre (A. Virondeau, E. Fressinaud Mas De Feix, J. Gernigon *et al.*).

Finistère – En mer, au large de Brignogan, 49,86232°N/2,79694°W, 2 ind., 22 août (S. Reyt).

Landes – Capbreton, Estacade, 11 août (J. Dupuy, E. Daviaud).

Loire-Atlantique – Le Croisic, phot., 11 septembre (J.-M. Thibault).

Morbihan – Hoëdic, 4 ind., phot., 20 août (Y. Blat *et al.*); Sarzeau, pointe de Penvins, 22 août (P. Devoucoux); Hoëdic, 7 km au sud des Cardinaux, phot., 29 août (A. Le Nevé).

2016 Charente-Maritime – En mer, 46,00766°N/1,60764°W, 10 septembre (J. Gonin *et al.*).

Finistère – au large d'Ouessant, phot., 13 août (H. Touzé, S. Wroza *et al.*).

Morbihan – En mer, au large des Grands Cardinaux, 47,28955°N/2,79275°W, 12 septembre (A. Gergaud *et al.*); en mer, au large d'Hoëdic, phot., 24 septembre (Y. Blat, P.J. Dubois, E. Rousseau, P. Tillier *et al.*).

(Mers australes). Après quatre oiseaux homologués en 2016, les 13 oiseaux de 2017 constituent (de loin) un nouveau record annuel... Et encore manque-t-il trois données non soumises de la pointe du Finistère, une autre de Charente-Maritime et une des Côtes-d'Armor, pour un total de 10 individus supplémentaires potentiels. Toutes ces données sont en provenance du littoral atlantique et ont été obtenues entre un 11 août et un 24 septembre.

FOU À PIEDS ROUGES *Sula sula* (1/1) (1/1 – 0/0 – 1/1)

2017 Côtes-d'Armor – Perros-Guirec, RNN des Sept-Îles, 3A/4A, phot., 26 juin (P. Provost *et al.*).

(Zone intertropicale de tous les océans). Seconde mention française de cette espèce (PROVOST 2017), après celle de juillet 2011, qui provenait d'une localité beaucoup plus inattendue qu'ici : le lac de Sainte-Croix, Var et Alpes-de-Haute-Provence (FLITTI & ROCHA 2014).

CORMORAN PYGMÉE *Phalacrocorax pygmaeus* (31/26) (29/28 – 3/1 – 4/1)

2017 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Vieux Marais du Pèbre, +1A, du 29 août au 16 septembre (T. Blanchon *et al.*).

Gard – Vauvert, Scamandre, +3A, phot., du 29 mars au 1^{er} avril (Y. Kayser, J.-P. Trouillas *et al.*), la Fromagère, +2A, du 1^{er} au 12 avril (J.-P. Trouillas *et al.*).

Haute-Garonne – Boussens, le Lac, 3A, phot., du 7 janvier au 25 février (C. Rombaut, S. Reyt).

2016 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Pont de Sylvéréal, 2 ind. de +2A, 24 mai (J. Birard).

Gard – Saint-Laurent-d'Aigouze, +2A., du 8 au 20 février (R. Tiné); Vauvert, RNR du Scamandre, la Fromagère, +2A, phot., du 14 au 18 mai (J.-P. Trouillas, G. Riou, L. Pelloli *et al.*).

(Europe de l'Est, Asie centrale). Difficile de savoir si les individus fréquentant la Camargue gardoise et la Grande Camargue sont les mêmes, et s'ils reviennent d'année en année... Toujours est-il qu'il y a eu au moins deux oiseaux chaque printemps fréquentant plus ou moins longuement la colonie du Scamandre, ce qui est peut-être annonciateur d'une installation... En 2017, un autre oiseau a été vu en Haute-Garonne, constituant désormais, de peu, la mention française la plus occidentale.

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus* (117/138) (100/110 – 0/0 – 1/1)

2017 Aude – Gruissan, phot., 22 août (W. Ferry).

1990 Charente-Maritime – Yves, marais d'Yves, +4A, 9 septembre (W. Maillard *et al.*).

(Sud-est de l'Europe, Afrique, Asie de l'Ouest et du Sud-Ouest). Le travail de catégorisation des données est toujours en cours pour cette espèce, et toutes les nouvelles données seront catégorisées individuellement. La donnée de 1990 est intéressante dans la mesure où elle s'ajoute aux douze mentions déjà récoltées pour cette année, ce qui correspondait à un afflux notable en Europe de l'Ouest... Par sa date et sa localité, la donnée de 2017 pourrait concerner elle aussi un oiseau sauvage.

PELICAN FRISÉ *Pelecanus crispus* (2/1) (2/1 – 0/0 – 0/0)

(Balkans au sud de l'Asie centrale jusqu'à l'ouest de la Mongolie). Pour rappel, la CAF vient d'inscrire l'espèce sur la Liste des Oiseaux de France, sur la base d'un oiseau vu le 2 mai 2010 dans le Jura puis le 4 mai au lac du Bourget en Savoie. Cet oiseau avait traversé auparavant plusieurs pays européens depuis sa première mention en Hongrie, à une date coïncidant avec la dispersion de l'espèce autour des colonies. D'autres données sont en cours de catégorisation ou ont été placées en catégorie E, soit parce des signes de captivité ont été notés, soit parce que le patron spatial de leurs observations correspondait davantage à des individus échappés de captivité.

AIGRETTE DES RÉCIFS *Egretta gularis* (55/39) (49/33 – 0/0 – 0/0)

1991 Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, la Capelière, ssp. *gularis*, phot., 3 juillet (photo sur www.ornitho.fr).

1986 Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, la Capelière, ssp. *gularis*, phot., 5 octobre (G. Olioso).

(Afrique, Asie). Rien en 2016 ni en 2017, même si plusieurs possibles hybrides ont été signalés çà et là en France... Deux données anciennes ont été ajoutées, mais l'oiseau de 1991 n'a pas été comptabilisé, dans la mesure où l'espèce a été contactée sur le même site l'année précédente et l'année suivante.

FLAMANT NAIN *Phoenicopterus minor* (42/20) (42/20 – 3/0 – 0/0)

2016 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, Enfores de la Vignolle, +2A, du 26 mars au 17 avril (P. Foulquier, B. Rivière-Lachaud, G. Joannès *et al.*), station d'épuration, phot., 6 août (S. Wroza *et al.*), pointe de Jean Place, 21 septembre (S. Reyt *et al.*).

(Afrique tropicale). Le Flamant nain vient d'être inscrit en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France, sur la base de l'augmentation récente du nombre d'individus en France et en Espagne. À signaler que deux oiseaux ont été vus en Camargue en 2017, mais n'ont pas fait l'objet de fiches d'homologation à ce jour.

GRÈBE À BEC BIGARRÉ *Podilymbus podiceps* (12/11) (12/11 – 2/1 – 0/0)

2016 Bouches-du-Rhône – Saint-Martin-de-Crau, baisse de Raillon, +1A, phot., du 2 juillet au 2 novembre (P. Durafort *et al.*).

Maine-et-Loire – La Prévrière, étang de la Primaudière, +1A, phot., du 26 juillet au 10 août, puis Amaillé, du 5 au 27 décembre (S. Béasse, D. Cléva *et al.*).

2015 Deux-Sèvres – Pugnny, étang de Courberive, phot., du 31 mai au 16 septembre (J.-Y. Airaud *et al.*).

(Amérique du Nord). L'oiseau qui était observé depuis le 5 juillet 2012 à Saint-Martin-de-Crau, mais qui n'avait pas été signalé en 2015, a refait son apparition en 2016... Deux nouveaux oiseaux s'ajoutent, l'un en 2015 et l'autre en 2016, à chaque fois sur des étangs intérieurs de l'ouest de la France. L'oiseau des Deux-Sèvres avait construit un nid et le défendait.

ÉLANION BLANC *Elanus caeruleus* (131/533) – (123/524 – -/- -/-)

2009 Aude – Espezel, Le Pujet, +1A, 29 août (description sur www.ornitho.fr).

(Afrique, Asie méridionale, Espagne, Portugal, sud-ouest de la France). Une donnée ancienne de plus pour l'espèce, dont les observations ne sont plus soumises à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2010.

VAUTOUR DE RÜPPELL *Gyps rueppellii* (2/1) – (2/1 – -/- -/-)

2017 Hautes-Pyrénées – Arbéost, col de Soulor, 2A, 19 juin (J.-L. Grangé).

Pyrénées-Atlantiques – Aste-Béon, 2A, phot., 9 juillet (D. Meininger).

(Afrique subsaharienne). L'espèce vient d'être placée en catégorie A de la Liste des Oiseaux de France, sur la base d'un oiseau vu dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans la Drôme en 2011 (PONS 2018). Ces deux nouvelles mentions, qui concernent plus que vraisemblablement le même oiseau, seront prochainement examinées en vue de leur catégorisation.

BUSE FÉROCE *Buteo rufinus* (51/47) (46/42 – 1/1 – 0/0)

2016 Pas-de-Calais – Widehen, 1A, phot., du 25 août au 31 octobre (E. Gesquiere *et al.*).

(Afrique du Nord, Balkans, Moyen-Orient, Asie centrale). Beau stationnement et première mention de l'espèce pour le Pas-de-Calais, après celle du Nord en octobre 2010 (V. *Ornithos* 18-6: 336). Deux données n'ont pas encore été envoyées au CHN: l'une de juillet 2016 dans les Bouches-du-Rhône et l'autre de mars 2017 dans les Pyrénées-Orientales.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (596/624) (527/551 – -/- -/-)

2011 Haut-Rhin – Andolsheim, 1A, phot., du 27 décembre au 15 février 2012 (C. Dronneau *et al.*).

(Scandinavie, Sibérie, Arctique canadien, Alaska). Une donnée parvenue un peu tardivement s'ajoute à celles de l'hiver 2011, qui suivait un afflux majeur pour la France durant l'hiver 2010-2011. Pour rappel, l'espèce n'est plus soumise à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2013.

AIGLE CRIARD *Aquila clanga* (286/213) (240/154 – 9/3 – 5/0)

2017 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, marais de Pioch, 2A, 12 janvier (Y. Kayser), le même oiseau que celui observé à Vauvert, Gard, à partir du 20 novembre 2016.

2016 Charente-Maritime – Yves, Voutron, marais de la Levée des Bouffards, 2A, phot., du 18 février au 7 mars (P. Reveillaud, M. Caupenne, G. Arnaud *et al.*); Saint-Sornin, 2A, phot., le même oiseau, du 17 décembre au 6 avril 2017 (Y. Geay *et al.*), bagué en Estonie le 2 août 2015.

Gard – Vauvert, Scamandre, 1A, phot., du 20 novembre au 20 mars 2017 (R. Tiné, J.-P. Trouillas *et al.*), 1A, phot., 16 décembre (J.-P. Trouillas).

Hérault – Capestang, 1A, 3 décembre (S. Albouy).

Individus de type Aigle criard

2017 Ain – Meyzieu, lac de la Forestière 1, +3A, 27 mars (L. Le Comte).

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Pont des Cinq Gorges, phot., 29 janvier (M.-A. Réglade).

Haute-Garonne – Cugnaux, +5A, phot., 7 décembre (M. Réglade *et al.*), Tonn.

Haute-Loire – Beyssere-Saint-Mary, l'Hasty, 3 décembre (A. Crégu), Tonn.

2016 Aude – Gruissan, Roc de Cornilhac, 1A, phot., 2 novembre (H. Foxonet).

Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, marais du Mas d'Agon, +3A, phot., 5 et 6 mars (P. Foulquier, B. Rivière-Lachaud), 3A/4A, phot., du 30 décembre au 17 mars 2017 (S. Tillo, M.-A. Gasperini, J.-P. Trouillas *et al.*), la Bomborinette, +3A, phot., 17 novembre (D. Cohez).

Gard – Vauvert, Petite Camargue, +4A, phot., du 25 novembre au 24 janvier 2017 (R. Tiné *et al.*).

(De la Pologne à la Sibérie orientale). Comme à l'accoutumée, la situation est un peu confuse en Camargue, certains oiseaux stationnant longtemps et changeant plus ou moins régulièrement de secteur de prédilection. Un travail de synthèse fondé sur des photographies des oiseaux et la consultation de connaisseurs des lieux a permis de comptabiliser un total de sept Aigles criards ou hybrides pour l'hiver 2016-2017 en Camargue et Petite Camargue. D'autres fiches se référant à des données ponctuelles sont actuellement intégrées à ce travail de synthèse, qui est par ailleurs en cours pour l'hiver 2017-2018. Rien de très original

6. Aigle criard *Aquila clanga*, 1^{re} année, Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône, mars 2016 (Thierry Laurent). 1st-cy Greater Spotted Eagle.



en dehors de ces stationnements camarguais, si ce n'est la présence en Charente-Maritime, deux hivers consécutifs, d'un oiseau bagué en Estonie, et de deux nouvelles observations de Tönn sur son chemin vers l'Espagne. Manquent encore trois fiches de 2016 pour des oiseaux dans les Landes, l'Isère et les Bouches-du-Rhône.

AIGLE POMARIN *Aquila pomarina* (112/97) (108/81 – 5/3 – 3/1)

2017 Doubs – localité tenue secrète, 1 ad. à partir du 8 avril, couple du 14 avril au 2 septembre, encore un ad. le 19 septembre, 1 ind. de +3A supplémentaire le 23 juillet (D. Michelat comm. pers., C. Helligo, K. Maltese-Crottier *et al.*)

2016 Aude – Gruissan, Petit Tournebelle, 1A, 22 août (M. Guillaneuf *et al.*).

2016 Doubs – localité tenue secrète, mâle ad., du 12 avril au 20 septembre, fem. ad. du 18 avril au 6 septembre, envol d'un ind. de 1A le 6 août, présent jusqu'au 6 septembre (D. Michelat comm. pers., Q. Guibert *et al.*)

Individus de type Aigle pomarin

2016 Haute-Savoie – Chevrier, défilé de l'Écluse, 10 septembre (J.-P. Matérac).

2015 Haute-Savoie – Chevrier, défilé de l'Écluse, +4A, 28 septembre (J.-P. Matérac).

(Europe centrale, Balkans, Sibérie occidentale). Le couple installé en Franche-Comté a produit un jeune en 2016, mais n'a pas réussi sa reproduction en 2017 (D. Michelat comm. pers.). En dehors de ces données liées à la nidification, deux autres mentions concernent la migration en Haute-Savoie. À signaler cependant que la majorité des observations françaises de l'espèce ne font pas l'objet de fiches d'homologation, peut-être en raison du niveau d'exigence du CHN quant à l'identification des Aigles criard, pomarin et de leurs hybrides, qui est malheureusement justifié... Ainsi, il manque encore trois fiches pour 2016 (Indre-et-Loire, Drôme et Aude) et huit fiches pour 2017 (Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Indre, Isère et Pyrénées-Orientales), qu'il serait dommage de ne pas communiquer.



7. Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*, Lampaul-Ploudal-mézeau, Finistère, septembre 2016 (Benjamin Pellegrini). *American Golden Plover*.

AIGLE DES STEPPES *Aquila nipalensis* (5/4) (4/3 – 0/0 – 1/1)

2017 **Aude** – Pexiora, plaine du Loragais, 2A/3A, phot., 27 novembre (J.-M. Delrieu).

(De l'Ukraine à l'Asie centrale). Une nouvelle observation de cette espèce rarissime en France, d'un oiseau qui n'a pas stationné... La dernière mention française remontait à 2013.

AIGLE IBÉRIQUE *Aquila adalberti* (13/13) (7/7 – 1/1 – 1/1)

2017 **Haute-Garonne** – Melles, 2A, 11 mai (S. Roques).

2016 **Pyrénées-Atlantiques** – Laruns, Port Vieux de Sallent, 2A, phot., 12 et 13 septembre (fide J.-L. Grangé).

2015 **Aude** – Laroque-de-Fa, Matefagine, 3A/4A, phot., 13 juillet (M. Vaslin).

(Péninsule Ibérique). Voici quatre années consécutives que cette espèce est vue en France, alors qu'elle n'avait été vue que cinq fois auparavant et depuis 1951. Cette situation reflète manifestement la meilleure santé des populations de l'espèce dans le centre et le nord de l'Espagne. À signaler qu'une fiche manque encore à l'appel, fin août 2016 à Organbidexka, Pyrénées-Atlantiques, se rapportant probablement au même oiseau que celui homologué pour cette année.

MARQUETTE DE BAILLON *Zapornia pusilla* (142/183) (98/110 – 3/3 – 0/0)

2016 **Ain** – Arbigny, mâle cht., du 6 au 8 juin (P. Crouzier *et al.*).

Manche – Genêts, 1A, capt., phot., 6 août (S. Provost, H. Touzé *et al.*); Pontorson, 1A, vidéo, piège phot., 7 et 8 septembre (fide A. Hemon).

2015 **Manche** – Genêts, 1A, capt., phot., 18 et 19 août (S. Provost *et al.*).

(Europe, Asie centrale, Japon). Deux données s'ajoutent pour 2015 et 2016 dans la Manche, sur le site de Genêts, qui accueille régulièrement l'espèce... Alors que dans le même département s'est déroulée une première pour le CHN, à savoir l'acceptation d'une donnée obtenue par piège vidéo! Enfin, la présence d'au moins un chanteur en Dombes montre l'intérêt que représente la prospection des régions d'étangs pour cette espèce. À signaler enfin que quatre données sont encore en cours d'examen pour l'année 2017.

OUTARDE BARBUE *Otis tarda* (80/214) (13/19 – 0/0 – 1/1)

2017 **Pyrénées-Atlantiques** – Larrau, Organbidexka, 15 septembre (E. Rogeau *et al.*).

2012 **Pyrénées-Atlantiques** – Geüs-d'Oloron, mâle, 15 août (C. Peboscq fide M.-A. Réglade).

2008 **Haute-Garonne** – Lagardelle-sur-Lèze, mâle, phot., 23 février (D. Ludot fide M. Réglade).

(Europe centrale, Espagne, Turquie et Asie centrale). Une donnée de 2017 et deux plus anciennes s'ajoutent pour cette espèce, qui reste très rare en France, en provenance d'Espagne comme l'indiquent les localités visitées. D'autres mentions venues de Bretagne et de la Manche concernent quant à elles des oiseaux issus du programme de réintroduction anglais, et sont donc placées en catégorie E (V.en fin de rapport).

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica* (72/74) (70/72 – 4/4 – 5/5)

2017 **Charente-Maritime** – Saint-Clément-des-Baleines, prise de la Groie, 2A, phot., du 28 avril au 10 mai (A. Pajot *et al.*); La Couarde-sur-Mer, +1A, phot., 27 juin (S. Reverdiau); Les Portes-en-Ré, RNN de Lilleau des Niges, 1A, phot., du 17 octobre au 6 novembre (J. Gernigon).

Jura – Vincent, phot., du 16 au 25 septembre (T. Petit *et al.*).

Vendée – Barbâtre, 2A, phot., 27 mai (D. Robard *et al.*).

2016 **Finistère** – Île de Sein, plage du Sphinx, +1A, phot., du 18 août au 5 septembre (D. Bosman *et al.*); Lampaul-Ploudal-mézeau, plage des Trois-Moutons, +1A, phot., 11 septembre (B. Pellegrini).

Morbihan – Locmiquélic, +1A., phot., 11 août (G. Duffez *et al.*); Ambon, +1A., phot., 16 septembre (Y. Blat).

2015 **Vendée** – Noirmoutier-en-l'Île, RNN des marais de Müllembourg, 1A, 29 septembre (D. Desmots).

(Amérique du Nord). Deux bonnes années pour cette espèce, puisque cinq mentions sont déjà homologuées pour 2017, et il en manque encore quatre pour cette année-là (deux dans l'Hérault, une dans l'Ain et une dans le Finistère), ce qui devrait permettre de dépasser le précédent record de six données en 2007. Parmi les mentions acceptées ici, neuf proviennent de départements du centre-ouest de la France, les plus visités habituellement, deux étant printanières, une estivale et six postnuptiales. Terminons sur une mention spéciale pour cet oiseau du Jura, qui constitue une première pour la région Franche-Comté.

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva* (32/31) (32/31 – 2/2 – 1/1)

2017 **Finistère** – Plomeur, pointe de la Torche, mâle+2A, phot., du 9 au 11 juillet (T. Quelennec *et al.*).

2016 **Gironde** – Le Teich, parc ornithologique, +1A, phot., du 9 au 30 août (D. Tissier, A. Pollet *et al.*).

Var – Hyères, salins des Pesquiers, +1A, phot., du 21 au 23 juillet (A. Audevard *et al.*).

2015 **Charente-Maritime** – Rochefort-sur-Mer, +1A, phot., 20 août (J.-F. Blanc *et al.*).

2014 **Charente-Maritime** – Charron, +1A, 24 juillet (A. Thomas).

Vendée – Sainte-Radégonde-des-Noyers, la Prée-Mizotière, +1A, phot., 23 juillet (J.-F. Blanc).

(Sibérie, Alaska). Deux données s'ajoutent à l'année 2014, qui en compte désormais six et bat le précédent record annuel de 2000, et une autre en 2015, qui en comptait déjà une, en Charente-Maritime aussi. Les trois données de 2016 et 2017 sont très classiquement de juillet-août, et proviennent de trois départements qui avaient déjà été visités par l'espèce. Une donnée potentielle de la Somme n'a pas été adressée au CHN à ce jour.



8. Pluvier fauve *Pluvialis fulva*, adulte, Le Teich, Gironde, août 2016 (Michel Réglade). *Adult Pacific Golden Plover*.

VANNEAU SOCIABLE *Vanellus gregarius* (139/137) (130/128 – 5/5 – 2/2)

2017 Maine-et-Loire – Les Rosiers-sur-Loire, les Pelouses, +1A, phot., du 28 juillet au 9 septembre, puis du 4 au 7 octobre (P. Briot *et al.*).

Pyrénées-Orientales – Saint-Laurent-de-la-Salanque, pointe de la Maratxella, 11 février (S. Roques).

2016 Deux-Sèvres – Vernoux-sur-Boutonne, du 6 au 12 mars (G. Fontaine *et al.*).

Moselle – Tarquimpol, étang de Lindre, 1A, phot., du 22 septembre au 3 octobre (A. Lehalle, J.-P. Pichot *et al.*).

Pyrénées-Atlantiques – Momas, lac de l'Ayguelongue, phot., 7 et 8 novembre (J.-L. Grangé).

Seine-et-Marne – Sourduin, Villuis, +1A, phot., du 7 au 16 octobre (O. Plisson *et al.*).

Vendée – Sainte-Pexine, Saint-Linaire, 20 novembre (N. Fofana *vide* F. Portier).

2015 Aude – Ouveillan, l'étang, +1A, phot., 6 et 7 avril (photo sur www.ornitho.fr).

Charente – Merpins, le Cocuron, +1A, phot., du 9 au 21 mars (photo sur www.ornitho.fr).

Charente-Maritime – Courcoury, la Grande Rivière, +1A, phot., 25 mars (photo sur www.ornitho.fr).

Saône-et-Loire – Gigny-sur-Saône, +1A, phot., 19 et 20 mars (photo sur www.ornitho.fr).

(Sud-est de la Russie, Asie centro-méridionale). En termes de fréquence, l'année 2016 se situe un peu au-dessus de la moyenne (il manque encore une donnée de Charente en mars), et l'année 2017 un peu en dessous. Quatre données ont été ajoutées pour 2015, qui n'en comptait pas encore. Les départements visités l'ont tous déjà été au moins une fois, à l'exception des Pyrénées-Orientales, l'espèce ne restant vraiment exceptionnelle qu'en Normandie, en Bretagne et dans l'extrême est du pays. Parmi les onze données présentées ici, six sont pré-nuptiales, une estivale et quatre post-nuptiales.

GRAVELOT DE LESCHENAULT *Anarhynchus leschenaultii* (8/8) (5/5 – 0/0 – 0/0)

2015 Var – Hyères, salins des Pesquiers, +1A, phot., 7 et 8 août (A. Audevard *et al.*).

(Asie mineure, Sibérie centrale). Huitième donnée française de cette espèce asiatique, dont la dernière mention remonte à 2012 dans le Nord (V. *Ornithos* 21-2: 78). Trois autres données proviennent de la façade méditerranéenne, et de Camargue plus précisément. Même s'il s'agit ici d'une première pour le mois d'août, toutes les autres données françaises ont été obtenues entre mai et octobre.

9. Gravelot de Leschenault *Anarhynchus leschenaultii*, Hyères, Var, août 2015 (Aurélien Audevard). *Greater Sand Plover*.



10. Bartramie des champs *Bartramia longicauda*, Sein, Finistère, octobre 2017 (Maxime Zucca). *Upland Sandpiper*.

**BARTRAMIE DES CHAMPS** *Bartramia longicauda* (8/8) (6/6 – 0/0 – 1/1)

2017 Finistère – Île de Sein, 1A, phot., 24 octobre (F. Garcia, P. Rigalleau *et al.*).

(Amérique du Nord). Court séjour pour ce limicole néarctique qui n'avait pas été vu en France depuis 2005 (V. *Ornithos* 14-5: 282). Il s'agit de la sixième donnée finistérienne et de la première pour l'île de Sein, à une date assez tardive, six mentions françaises ayant été obtenues entre un 5 septembre et un 16 octobre.

BÉCASSEAU FALCINELLE *Calidris falcinellus* (266/357) (220/305 – 9/10 – 7/14)

2017 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Trabas de Jusiou, +1A, phot., du 2 au 8 mai (J.-F. Blanc *et al.*), étang du Tampan, 4 ind. de +1A, phot., du 7 au 10 mai (J.-F. Blanc *et al.*), 8 ind. le 10 mai au même endroit (G. Caucal *et al.*), encore 5 le 11 mai.

Morbihan – Ambon, +1A, phot., 29 avril (Y. Blat).

Pas-de-Calais – Marck, +1A, phot., 13 juin (A. Mauss).

Var – Hyères, Vieux Salins, +1A, phot., 11 mai (A. Audevard), salins des Pesquiers, +1A, phot., 11 mai (A. Audevard), 1A, phot., du 18 août au 5 septembre (A. Audevard *et al.*).

2016 Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, baisse des Cinq Cents Francs, 2 ind. de +1A, phot., 5 mai (M. Grienberger, D. Cleva *et al.*), baisse de Quenin, 1A, 8 mai (Y. Kayser); Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, étang du Galabert, +1A, phot., 16 mai (M. Péchaud), étang de l'Impérial, phot., 30 et 31 août (F. Berthollon, G. Berthollon).

Pas-de-Calais – Marck, les Hemmes de Marck, +1A, phot., 9 mai (H. Verne).

Rhône – Arnas, Gravière de Joux, +1A, phot., 13 mai (F. Domenjoud).

Var – Hyères, salins des Pesquiers, +1A, phot., 28 avril (A. Audevard), 1A, phot., du 7 au 9 août (A. Audevard), Vieux Salins, +1A, phot., du 27 au 30 juillet (A. Audevard *et al.*).

2015 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, étang du Tampan, phot., 27 août (V. Palomares).

(Europe septentrionale). Le nombre d'oiseaux pour 2015 est désormais de 25, un nouveau record... Les deux années suivantes ont été plus calmes, mais très honorables malgré tout, d'autant qu'il manque encore quatre données de 2017 (Charente-Maritime, Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or et Var). Les Bouches-du-Rhône et le Var sont classiquement les départements les plus fréquentés, avec même un groupe remarquable de huit oiseaux en Camargue en mai 2017. Le Pas-de-Calais obtient deux nouvelles données et conforte sa seconde place pour l'espèce au classement des départements non méditerranéens, derrière la Vendée. Les mentions du Morbihan et du Rhône sont évidemment plus originales, constituant respectivement la seconde et la première départementales. Étant donnée la fréquence relativement élevée de cette espèce en France depuis plusieurs années (plus de 10 oiseaux par an depuis 2010), les observations du Bécasseau falcinelle ne sont plus soumises à homologation nationale à compter du 1^{er} janvier 2018.

BÉCASSEAU À COU ROUX *Calidris ruficollis* (3/3) (3/3 - 0/0 - 2/2)

2017 Manche – Dragey-Ronthon/Genêts, +1A, phot., 6 et 7 août (S. Provost *et al.*).

Vendée – Noirmoutier-en-l'Île, RNN des marais de Müllembourg, +1A, phot., 4 septembre (D. Desmots).

(Est de la Sibérie, Asie du Sud-Est). Deux données en 2017, voilà qui est remarquable pour une espèce qui n'avait été notée que trois fois en France auparavant (en 1994, 2008 et 2010). Les deux départements visités ne constituent pas des surprises, ni d'ailleurs les dates d'observation, plutôt classiques au regard de ce qui est observé ailleurs en Europe...

BÉCASSEAU À LONGS DOIGTS *Calidris subminuta* (1/1) (1/1 - 1/1 - 0/0)

2016 Charente-Maritime – Île de Ré, Ars-en-Ré, 1A, phot., 12 septembre (T. Michel, A. Boyé *et al.*).

(Est de la Sibérie, Asie du Sud-Est). Très belle surprise pour cette seconde mention française, après celle de Loire-Atlantique à l'automne 2011 (V. *Ornithos* 19-6 : 370), d'une espèce qui reste d'apparition très rare en Europe de l'Ouest.

BÉCASSEAU DE BAIRD *Calidris bairdii* (57/58) (53/54 - 4/4 - 1/1)

2017 Var – Hyères, Vieux Salins, 1A, phot., du 12 au 21 octobre (A. Audevard *et al.*).

2016 Côtes-d'Armor – Pleubian, Sillon de Talbert, 1A, phot., du 13 au 15 octobre (G. Lesaffre *et al.*).

Landes – Labenne, RNN des marais d'Orx, +1A, phot., du 4 au 8 mai (F. Cazaban *et al.*).

Manche – Réthoville, 1A, phot., du 8 au 13 novembre (J.-F. Blanc, K. Schmale *et al.*).

Var – Hyères, salins des Pesquiers, 1A, phot., 13 septembre (A. Audevard).

(Amérique du Nord). Une bonne année 2016 pour ce bécasseau néarctique, d'autant qu'une donnée du Finistère est en cours d'examen. Les départements atlantiques et de la Manche sont attendus, même si ce ne sont habituellement pas les plus fréquentés par l'espèce, alors que la mention varoise constitue une première départementale et la troisième pour le littoral méditerranéen... Ce qui rend d'autant plus remarquable la récurrence l'année suivante ! Côté dates, la mention des Landes est évidemment remarquable, la troisième seulement pour le mois de mai. Quant aux mentions automnales, elles sont plutôt tardives, le pic de fréquence de l'espèce se situant vers la mi-septembre. L'observation de la Manche est même la seconde plus tardive enregistrée à ce jour...



11. Bécasseau de Baird
Calidris bairdii, 1^{re} année,
Pleubian, Côtes-d'Armor,
octobre 2016 (Fabrice Jallu).
1st-yr Baird's Sandpiper.

BÉCASSEAU DE BONAPARTE *Calidris fuscicollis* (63/65) (59/61 - 0/0 - 3/3)

2017 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, station d'épuration, +1A, phot., du 5 au 17 août (S. Wroza *et al.*).

Finistère – Plounéour-Trez, observatoire de Trégueiller, 1A, phot., 1^{er} novembre (M. Lacroix).

Vendée – Talmont-Saint-Hilaire, marais de la Fontaine, 1A, phot., 30 octobre (K. Dutour *cf.* M. Piriou, F. Portier).

2013 Finistère – Ouessant, Porz Noan, 1A, phot., 31 octobre (photo sur www.faune-bretagne.org).

(Amérique du Nord). La donnée ouessantine de 2013 porte à huit le nombre de données cette année-là, ce qui constitue un nouveau record. Curieusement, aucun Bécasseau de Bonaparte n'a ensuite été signalé en France entre 2014 et 2016, puis trois nouvelles données sont obtenues en 2017, sachant que deux autres n'ont pas encore été signalées au CHN (en Indre-et-Loire et dans le Finistère). Les départements visités sont tous très classiques, de même que les dates d'observation : août pour les adultes et octobre-novembre pour les jeunes de l'année.

BÉCASSEAU MINUSCULE *Calidris minutilla* (16/15) (11/10 - 2/2 - 0/0)

2016 Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, Grau de Piémanson, +1A, phot., du 8 août au 22 septembre (D. Gailly *et al.*).

Maine-et-Loire – Montjean-sur-Loire, +1A, phot., du 15 au 18 août (G. Gaschet, S. Angebaut).

(Amérique du Nord). Deux mentions obtenues à une semaine d'intervalle, alors que l'espèce n'avait pas été notée en France depuis 2012... Le Maine-et-Loire est visité pour la première fois, tandis qu'il s'agit d'une seconde pour la Camargue, la précédente datant de mai 2000 (V. *Ornithos* 9-1 : 14).

BÉCASSEAU ROUSSET *Calidris subruficollis* (237/284) (206/221 - 5/8 - 7/8)

2017 Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, Enfores de la Vignolle, phot., du 17 septembre au 2 octobre (J.-Y. Barnagaud, S. Meriotte, P. Devoucoux *et al.*).

Finistère – Île de Sein, 2 ind. de 1A, phot., 15 septembre, dont un jusqu'au 25 septembre (V. Tanneau, A. Le Nevé *et al.*).

Hérault – Mireval, étang du Vagaran, 1A, phot., du 21 septembre au 6 octobre (G. Picotin, C. Souc, P. Coiffard *et al.*).

Ille-et-Vilaine – Montreuil-sous-Pérouse, étang de la Cantache, +1A, phot., 14 et 15 septembre (F. Duchenne *et al.*).

Maine-et-Loire – Saumur, pont du Cadre noir, 1A, phot., du 27 septembre au 2 octobre (P. Raboin *et al.*).

Morbihan – Hoëdic, Men Rond, 1A, phot., 9 septembre (S. Desbrosses *et al.*); Plouhinec, 1A, phot., du 10 au 16 septembre (Y. Blat *et al.*).



12. Bécasseau de Bonaparte
Calidris fuscicollis, adulte,
Rillé, Indre-et-Loire, août
2017 (Sophie Reverdiau).
Adult White-rumped Sandpiper.



13. Bécasseau rouset
Calidris subruficollis,
1^{re} année, Ouessant,
Finistère, septembre
2016 (Maxime Zucca).
Buff-breasted Sandpiper.

2016 Calvados – Merville-Franceville-Plage, phot., 11 mai (J.-P. Moulin).

Finistère – Tréfléz, la Sablière, 1A, phot., du 2 au 9 septembre (S. Mauvieux, B. Pellegrini *et al.*); Ouessant, Parluc'hen, 1A, phot., du 17 au 28 septembre (T. Guillosson *et al.*).

Gard – Saint-Laurent-d'Aigouze, Mahistre, phot., 13 septembre (R. Tiné, K. Schmale).

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, 4 ind. de 1A, phot., du 19 septembre au 14 octobre (S. Reeber, A. Rougeron *et al.*).

(Amérique du Nord). Deux bonnes années avec huit oiseaux chacune, sachant qu'il manque encore cinq fiches pour 2016 (Finistère, Loire-Atlantique, Morbihan et Vendée) et trois pour 2017 (Finistère). Peu de choses remarquables à relever néanmoins, mis à part une première mention pour le Gard et le stationnement (de longue durée) de quatre oiseaux ensemble en Loire-Atlantique, ce qui ne s'était jamais produit en dehors du Finistère. Toutes les données sont classiquement de septembre, sauf celle du Calvados (mai).

BÉCASSEAU D'ALASKA *Calidris mauri* (5/5) (4/4 – 3/2 – 0/0)

2016 Finistère – Ploudalmézeau, 1A, phot., 6 et 7 octobre (T. Quelenec *et al.*); Guissény, anse de Tressény, 1A, le même oiseau, phot., du 22 au 25 octobre (J.-F. Blanc *et al.*).

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, 1A, phot., 18 septembre (S. Reeber).

(Amérique du Nord). Deux données pour cette année 2016, alors que l'espèce n'avait pas été vue en France depuis 2001... Les dates sont classiques pour l'arrivée des bécasseaux néarctiques, de même que les départements visités, qui accueillent chacun leur second oiseau. À noter toutefois que celui de Loire-Atlantique est le premier mentionné en eau douce.

BÉCASSEAU SEMIPALMÉ *Calidris pusilla* (34/34) (33/33 – 3/3 – 2/2)

2017 Finistère – Île de Sein, 1A, phot., du 18 au 23 septembre (J.-Y. Péron, A. Le Nevé *et al.*).

Morbihan – Gâvres, +1A, phot., 8 juin (Y. Blat *et al.*).

2016 Finistère – Plovan, étang de Kergalan, 1A, phot., du 29 août au 5 septembre (M. Canévet *et al.*); 1A, phot., 25 septembre (P. Rigalleau *et al.*).

Pyrénées-Atlantiques – Anglet, 1A, phot., du 26 octobre au 4 novembre (B. Lamothe *et al.*).

(Amérique du Nord). Deux années tout à fait correctes, la moyenne annuelle étant d'à peine un oiseau par an depuis la création du CHN en 1981. Il faut y ajouter deux données de 2016 (Finistère et Manche) et deux de 2017 (Finistère) qui n'ont pas fait l'objet de fiches d'homologation à ce jour ou sont en cours de traitement. La donnée du Morbihan n'est que la seconde pour le mois de juin, les autres étant plus conformes à la phénologie connue

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor* (81/82) (61/64 – 0/0 – 1/1)

2017 Vendée – Olonne-sur-Mer, 1A, phot., du 2 au 11 septembre (M. Pirio, F. Salmon, J. Gardon, G. Calu *et al.*). (Amérique du Nord). Une nouvelle donnée, classique par sa date et sa localisation, la Vendée étant le troisième département le plus visité par l'espèce, après les Bouches-du-Rhône et le Finistère. La forte raréfaction de l'espèce se confirme, puisqu'il n'existe que trois données pour les six dernières années. Pour comparaison, la décennie 1980 a fourni 29 données.

CHEVALIER BARGETTE *Xenus cinereus* (153/136) (129/114 – 2/2 – 5/3)

2017 Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, étang de Beauduc, +1A, 16 juillet (T. Blanchon), Consécanière, phot., du 14 septembre au 3 novembre (L. Pelloli, M. Réglade, S. Reyt *et al.*); Salin-de-Giraud, clos de Molinari, Vieux-Rhône Nord et Vaisseau, +1A, phot., du 11 au 31 août (T. Blanchon *et al.*).

Charente-Maritime – Saint-Laurent-de-la-Prée, pointe des Parpagnoles, 2 ind., phot., du 9 au 13 mai (J. Gonin *et al.*); Charron, Mizottes des Vrillandes, 2 ind., les mêmes oiseaux, phot., 11 mai (J. Gonin *et al.*).

2016 Var – Fréjus, 1A, phot., 29 août (C. Bury).

Vendée – Sainte-Radégonde-des-Noyers, La Prée Mizotière, +1A, phot., du 16 au 18 mai (T. Dagonet, A. Salmon, L. Barbaro).

(Europe du Nord-Est, Sibérie). Connaître le taux de renouvellement des oiseaux camarguais reste compliqué, l'absence de données dans le delta du Rhône en 2016 n'étant qu'une apparence, puisque quatre mentions locales n'ont pas encore fait l'objet de fiches. Même si c'est un peu arbitraire, l'oiseau de Consécanière et l'un des deux individus vendéens de 2017 n'ont pas été comptabilisés comme nouveaux, les deux sites ayant été fréquentés l'année précédente.

CHEVALIER GRIVELÉ *Actitis macularia* (23/25) (23/25 – 3/3 – 0/0)

2016 Ain – Serrières-de-Briord, +1A, phot., du 10 au 23 décembre (P. Crouzier, S. Risser *et al.*).

Aude – Preixan, Couffoulens, +1A, phot., 26 avril (P. Polette).

Finistère – Plovan, étang de Kervardez, +1A, phot., du 5 au 21 août (M. Canévet, B. Pellegrini *et al.*).

(Amérique du Nord). Encore une espèce de limicole pour laquelle beaucoup de fiches ne sont malheureusement pas parvenues au CHN, puisqu'il manque deux données du Finistère et une de Côte-d'Or pour 2016, ainsi qu'une de l'Ain et une du Morbihan pour 2017. Il est donc probable que cette année 2016 batte à terme le précédent record de 2011 et ses quatre mentions. Pour le reste, on pourra noter que les données de l'Aude et de l'Ain sont remarquables géographiquement, s'agissant respectivement d'une première et d'une seconde régionale, et par leurs dates...



14. Chevalier bargette
Xenus cinereus, Camargue,
Bouches-du-Rhône, août
2017 (Vincent Palomares).
Adult Spotted Sandpiper.



15. Courvite isabelle
Cursorius cursor, adulte,
Lumio, Haute-Corse, mai
2017 (Benjamin Luneau).
Cream-coloured Courser.



16. Courvite isabelle
Cursorius cursor, adulte,
Lumio, Haute-Corse, mai
2017 (Bernard Sonnerat).
Cream-coloured Courser.

CHEVALIER SOLITAIRE *Tringa solitaria* (8/8) (5/5 - 0/0 - 2/2)

2017 Charente-Maritime - La Couarde-sur-Mer, les Cloussies, 1A, phot., du 17 septembre au 18 octobre (S. Reverdiau, J.-F. Blanc, A. Le Nevé *et al.*); Le Bois-Plage, carrière de la Gachette, le même oiseau, 15 octobre (J. Gernigon).

Loire-Atlantique - Bourgneuf-en-Retz, la Roussière, 19 juillet (E. Archer, A. Oates).

(Amérique du Nord). Deux données de 2017 pour ce chevalier extrêmement rare en France, toutes deux dans des départements atlantiques et à des dates auxquelles on pouvait s'attendre, sept des huit mentions françaises ayant été obtenues entre juillet et octobre. Une troisième donnée en provenance de la Loire n'a pas fait l'objet de fiche à ce jour.

CHEVALIER CRIARD *Tringa melanoleuca* (6/6) (6/6 - 0/0 - 1/1)

2017 Loire-Atlantique - Guérande, marais salants, tué à la chasse, phot., 10 janvier (G. Le Bobiniec *vide* CRBPO).

(Amérique du Nord). Septième mention française pour ce chevalier, obtenue dans des circonstances malheureuses, sur un site qui avait vu hiverner un Chevalier à pattes jaunes *T. flavipes* l'hiver précédent... Les précédentes données remontent à 2008, puis 1996. Espérons qu'il ne faille pas attendre encore dix ans pour voir le prochain et que celui-ci sera vivant!

CHEVALIER À PATTES JAUNES *Tringa flavipes* (66/66) (51/51 - 1/1 - 0/0)

2016 Loire-Atlantique - La Turballe, Trévaly, phot., du 20 janvier au 2 avril (J.-P. Tilly, A. Gentric, B. Pubert).

2011 Gironde - Le Teich, +1A, phot., 17 août (photo sur www.ornitho.fr).

(Amérique du Nord). Une donnée de 2011 vient combler un vide cette année-là... La mention de Loire-Atlantique est intéressante par la durée du stationnement et aussi dans la mesure où elle est hivernale, même si l'espèce est relativement coutumière du fait. Trois données manquent encore pour 2016 (Morbihan, Finistère et Vendée), et deux autres données potentielles de Vendée n'ont pas été soumises en 2017.

BÉCASSIN À LONG BEC *Limnodromus scolopaceus* (49/47) (40/39 - 0/0 - 1/1)

2017 Charente-Maritime - Esnandes, +2A, phot., du 4 au 25 août (J.-F. Blanc *et al.*).

(Amérique du Nord). Une seule mention pour les deux années, c'est peu pour un limicole qui s'était montré à 16 reprises au cours de la décennie précédente... La Vendée est le second département le plus visité par ce limicole (quatre données) derrière le Finistère (23 données), mais la date est plus inhabituelle, s'agissant d'une première pour le mois d'août et suggérant une arrivée pas forcément récente.

BÉCASSINE DOUBLE *Gallinago media* (343/391) (102/108 - 1/1 - 0/0)

2016 Calvados - Saint-Arnoult, 1A, capt., phot., 28 août (D. Vigour *et al.*).

(Europe du Nord-Est, nord-ouest asiatique). Les années se suivent et ne se ressemblent pas... Après le record de 2015 et ses 26 individus homologués, une seule mention en 2016 et rien en 2017! À noter toutefois que trois données potentielles n'ont pas encore fait l'objet de fiches en 2016 (Isère, Vienne et Haute-Corse) et quatre autres manquent pour 2017 (Lozère, Rhône, Isère et Savoie).

GLARÉOLE À AILES NOIRES *Glareola nordmanni* (32/34) (28/19 - 0/0 - 1/0)

2017 Bouches-du-Rhône - Arles, Camargue, Mas Mon Canard, +1A, phot., du 6 juin au 12 juillet (Y. Kayser, S. Wroza, A. Pataud *et al.*).

(Asie occidentale). Un oiseau dans un secteur de Camargue déjà fréquenté par l'espèce en 2015, ainsi que du 15 au 25 juin 2016 (donnée non soumise). Il n'a donc pas été considéré comme un nouvel arrivant.

COURVITE ISABELLE *Cursorius cursor* (29/29) (9/9 - 0/0 - 1/1)

2017 Haute-Corse - Lumio, Punta Spano, 2A, phot., du 15 mai au 4 juillet (P. Edwards, B. Sonnerat *et al.*).

1837 Pyrénées-Orientales - Perpignan, tué à la chasse, récupéré au marché de Perpignan, 3 novembre (L. Companyo), date de la description du spécimen, probablement tué en octobre (*vide* L. Sallé).

(Afrique, Asie du Sud-Ouest). Une donnée très ancienne est ajoutée pour archive, et l'espèce fait une apparition en Corse, d'où aucune mention ne provenait jusqu'ici. La date est plutôt inhabituelle, même s'il existe déjà une donnée d'avril et une autre de juin.

GUILLEMOT À MIROIR *Cephus grylle* (72/83) (50/55 – 2/2 – 1/1)

2017 Finistère – Concarneau, baie, 1A, phot., du 1^{er} novembre au 24 janvier 2018 (E. Gaget, R. Pavec *et al.*).

2016 Charente-Maritime – Île de Ré, Ars-en-Ré, plage de Foirouse, +1A, phot., 19 novembre (H. Foxonet *et al.*).

Finistère – Ploumoguer, plage de Porsmoguer, 2A, phot., 18 et 19 mars (B. Pellegrini *et al.*).

(Arctique, Atlantique Nord). Deux mentions en 2016 et une en 2017, sachant qu'une donnée du Finistère n'a pas encore été examinée pour cette dernière année. Le Finistère reste le département français le plus visité, alors que la Charente-Maritime, département le plus méridional parmi ceux où l'espèce a été notée, ne l'avait pas accueillie depuis mars 1978.

STERNE BRIDÉE *Onychoprion anaethetus* (11/11) (11/11 – 1/1 – 0/0)

2016 Charente-Maritime – Angoulins-sur-Mer, Loiron, 2A, trouvée morte, phot., 5 février (*vide* J. Gonin *et al.*).

(Mers tropicales). Triste mention pour cette espèce, d'un individu récupéré mort dans la laisse de mer et rapporté à la maison par un chat...

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (55/11) (52/10 – 4/0 – 3/0)

2017 Calvados – Merville-Franceville-Plage, mâle +1A, phot., 25 juillet (photos sur www.ornitho.fr).

Gironde – La Teste-de-Buch, banc d'Arguin, mâle +1A, phot., 23 avril et 5 mai (M. Grandpierre, J. Gernigon).

Pas-de-Calais – Oye-Plage, mâle +1A, du 4 au 17 juillet (photos sur www.ornitho.fr)

2016 Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, They Sainte-Ursule, phot., 14 et 15 septembre (D. Cohez, J. Birard, K. Schmale *et al.*).

Charente-Maritime – Saint-Clément-des-Baleines, +2A, phot., 23 et 24 mai (M. de Lacoste, J. Gernigon *et al.*).

Gironde – La Teste-de-Buch, banc d'Arguin, mâle +1A, phot., du 1^{er} juin au 6 juillet (M. Grandpierre, J. Gernigon).

Vendée – Barbâtre, polder du Sébastopol, mâle +1A, phot., du 17 avril au 14 juillet (D. Robard, J. Gernigon *et al.*).

(Côte pacifique, de la Californie au Mexique). En 2016, l'oiseau bagué en 2007 sur le banc d'Arguin a stationné sur l'île de Noirmoutier, Vendée, comme depuis 2008, avec une courte apparition en Charente-Maritime. Aucune nouvelle de cet oiseau en 2017... Quant à l'oiseau bagué en 2003 sur le banc d'Arguin, il y a stationné en 2016, y a fait une courte apparition en 2017, puis a été vu le long des côtes sud de l'Angleterre, dans le Pas-de-Calais et enfin dans le Calvados! L'oiseau camarguais n'était pas bagué: il s'agit peut-être de celui qui avait été vu à cet endroit du 23 au 25 août 2015 (V. *Ornithos* 23-6: 312).

STERNE ROYALE *Sterna maxima* (3/2) (3/2 – 1/1 – 2/1)

2017 Côtes-d'Armor – Saint-Brieuc, baie, 2A, ssp. *maxima*, phot., du 6 au 29 juin (A. Plévin, M. Plestan *et al.*).

Manche – Saint-Pair-sur-Mer/Genêts, 2A, ssp. *maxima*, phot., du 10 au 17 juillet (X. Corteel, S. Provost, A. Trémion *et al.*), le même oiseau que celui des Côtes-d'Armor.

2016 Finistère – Plounéour-Trez, observatoire de Trégueiller, +1A, 24 août (M. Lacroix).

(Côtes américaines et côtes atlantiques d'Afrique). L'espèce est contactée pour la troisième année consécutive, après les données de 2015 dans les Bouches-du-Rhône et le Var, et celle de 2004 en Gironde. Le jeune oiseau de 2017 a beaucoup circulé dans la Manche et avait été vu pour la première fois le 4 février à Guernesey; cet individu a pu être identifié comme appartenant à la sous-espèce *maxima* non seulement du fait de son apparence, mais surtout grâce au fait qu'il avait été bagué en Caroline du Nord en 2016!

STERNE VOYAGEUSE *Sterna bengalensis* (51/42) (44/27 – 2/2 – 0/0)

2016 Gironde – La Teste-de-Buch, banc d'Arguin, pointe nord, +2A, phot., 5 juin (M. Taillade).

Var – Hyères, salins des Pesquiers, +2A, phot., 1^{er} août (A. Audevard).

(Méditerranée, océan Indien, Australie). Deux données classiques par les localités visitées et les dates, sachant qu'une potentielle donnée supplémentaire pourrait s'ajouter en Camargue pour 2016. L'oiseau du banc d'Arguin était bagué, probablement en Libye, mais le code n'a malheureusement pas pu être lu.

STERNE DE FORSTER *Sterna forsteri* (13/9) (13/9 – 0/0 – 0/0)

2015 Charente-Maritime – Rochefort, station de Lagunage, phot., 1^{er} février (photo sur www.ornitho.fr).

(Amérique du Nord). Troisième donnée pour l'année 2015... mais en revanche aucune en 2016 et 2017.

MOUETTE DE BONAPARTE *Chroicocephalus philadelphia* (37/36) (36/35 – 1/1 – 2/2)

2017 Finistère – Ploumoguer, plage de l'Illien, +2A, phot., 23 et 24 décembre (B. Pellegrini *et al.*).

Maine-et-Loire – Montjean-sur-Loire, 2A, phot., du 10 avril au 20 mai (L. Bellion *et al.*).

2016 Finistère – Lampaul-Ploudalmézeau, plage des Trois-Moutons, +3A, phot., du 11 au 14 février (B. Pellegrini, S. Arzel, Y. Le Corre *et al.*).

2015 Finistère – Plouhinec, 3A, phot., 6 avril (M. Baudraz *et al.*).

Loiret – Saint-Jean-le-Blanc, pont de Vierzon, +2A, 8 novembre (M. Lacroix).

(Amérique du Nord). L'année 2015 comptait déjà deux données, dans le Finistère et le Pas-de-Calais. Une donnée de Charente-Maritime manque encore pour 2017. À noter que les oiseaux du Loiret et du Maine-et-Loire constituent les deux premières mentions de l'espèce dans des départements non littoraux.

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan* (43/40)

(42/39 – 5/5 – 1/1)

2017 Finistère – Fouesnant, 1A, phot., du 15 au 19 novembre (R. Pavec *et al.*).


2016 Finistère – Douarnenez, plage du Ry, 2A, phot., du 3 janvier au 13 février (S. Nedellec *et al.*).

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, 2A, phot., 21 avril (S. Reeber); Le Croisic, 2A, 9 novembre (D. Tavenon, P. Archambeau).

Pas-de-Calais – Conchil-le-Temple, 2A, phot., 5 mai (V. Condal *et al.*).

Vendée – Sainte-Radégonde-des-Noyers, la Prée Mizotière, 2A, phot., 10 mai (A. Salmon, G. Besseau *et al.*).

(Amérique du Nord). À nouveau cinq mentions en 2016, tout comme en 2015, ce qui une fois encore est très honorable... Rappelant la phénologie des apparitions de la Mouette de Bonaparte, trois des données de 2016 ont été obtenues entre mi-avril et mi-mai dans des départements du littoral Manche-Atlantique, en même temps que le passage des Mouettes rieuses *Chroicocephalus ridibundus*, et une en hiver à la pointe bretonne. Une seule donnée en 2017, mais il manque encore une fiche de Charente-Maritime.



17. Mouette de Franklin *Larus pipixcan*, 1^{re} année, Douarnenez, Finistère, janvier 2016 (Hugo Touzé). 1st-yr Franklin's Gull.

GOÉLAND D'AMÉRIQUE *Larus smithsonianus* (13/13) (13/13 – 3/1 – 0/0)

2016 Landes – Moliets-et-Maa, embouchure du courant d'Huchet, 2A, phot., 30 janvier (J. Dupuy, E. Daviaud); Soorts-Hossegor, 2A, phot., du 9 au 15 février (A. Portmann, A. Legrand); Messanges, 2A, phot., 23 février (S. Tillo).

(Amérique du Nord). Trois nouvelles données pour le même oiseau, bien typique, cette fois-ci dans les Landes, département qui n'avait pas encore accueilli l'espèce...

GOÉLAND DE KUMLIEN *Larus glaucoides kumlieni* (33/30) (33/30 – 2/2 – 0/0)

2016 Charente-Maritime – La Rochelle, port de Commerce, 3A, phot., du 8 février au 5 mars (J. Gonin *et al.*).

Morbihan – Gueltas, 2A, phot., du 14 au 21 janvier (Y. Blat, P.J. Dubois).

2014 Finistère – Guilvinec, port, 2A, phot., 30 janvier (S. Mauvieux).

Vendée – Île d'Yeu, pointe des Corbeaux, 1^{er} mai (X. Hindermeyer), le même oiseau que celui ayant stationné du 1^{er} au 6 mai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (V. *Ornithos* 23-6: 314).

(Arctique canadien). Un nouvel oiseau s'ajoute pour 2014, qui en compte désormais huit... Après une donnée en 2015, deux autres ont été acceptées en 2016, mais rien en 2017.

HARFANG DES NEIGES *Bubo scandiacus* (26/23) (20/16 – 0/0 – 0/0)

2013 Charente-Maritime – La Couarde-sur-Mer, Loix, La Flotte, Esnandes, Marsilly et Nieul-sur-Mer, fem. 2A, phot., du 26 décembre au 20 avril 2014 (J. Gernigon, A le Nevé, M.-A. Réglade *et al.*).

(Circumboréal). Petits compléments de dates et de localités pour cet oiseau qui a stationné du 26 décembre 2013 au 7 février 2014 sur l'île de Ré (Loix et la Couarde-sur-Mer), a été vu sur le continent (Esnandes, Marsilly et Nieul-sur-Mer) du 16 au 24 février, puis était de retour sur Ré du 26 février au 20 avril (La Flotte, Ars-en-Ré et Loix).

ENGOULEVENT À COLLIER ROUX *Caprimulgus ruficollis* (10/10) (6/6 – 1/1 – 1/1)

2017 Aude – Gruissan, salins, mâle, phot., 17 mai (S. Reyt *et al.*).

2016 Var – Hyères, île de Porquerolles, fem. +1A, capt., phot., 18 avril (T. Coulée, D. Bacqué, P. Mulot *et al.*).

(Du Maroc à la Tunisie, Espagne). Deux nouvelles données d'oiseaux en migration pré-nuptiale venant sans doute de traverser la Méditerranée, dans des départements qui n'avaient pas encore accueilli l'espèce.

MARTINET CAFRE *Apus caffer* (1/1) (1/1 – 1/1 – 0/0)

2016 Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, Jasses de Bouchaud, 17 juin (Y. Kayser).

(Afrique subsaharienne, Maroc et localement péninsule ibérique). Seconde mention française après celle du 21 juin 2011 dans l'Hérault (KAYSER & CLÉMENT 2013), à une date très similaire. Il faut sans doute s'attendre, à terme, à voir cette espèce un peu plus souvent en France...

MARTINET DES MAISONS *Apus affinis* (3/3) (3/3 – 1/1 – 0/0)

2016 Hérault – Portiragnes, 18 avril (J.-C. Weidmann).

(Du nord-ouest de l'Afrique à l'Asie centrale et au Pakistan, Afrique orientale). Il existe désormais deux mentions méditerranéennes et une de Vendée au printemps, et une du Finistère en octobre... S'agissant de la troisième mention depuis 2013, il est possible que la fréquence de cette espèce augmente en France.

FAUCON SACRE *Falco cherrug* (17/17) (14/14 – 1/1 – 0/0)

2016 Bouches-du-Rhône – Saint-Martin-de-Crau, Terme blanc, 1A, phot., 11 août (G. Paulus).

(Sud-est de l'Europe, puis sud de la taïga et steppes asiatiques jusqu'en Chine). Il s'agit de la cinquième donnée pour les Bouches-du-Rhône et de la quatrième pour la Crau et ses environs, pour cette espèce qui pour l'instant ne s'est montrée que quatre fois en France au cours des années 2010.



18. Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis*, Gruissan, Aude, mai 2017 (Alain Confais). Red-necked Nightjar.



19. Ammomane élégante *Ammomanes cinctura*, Gruissan, Aude, mai 2016 (Antoine Joris). Bar-tailed Desert Lark.

PIE-GRIÈCHE ISABELLE *Lanius isabellinus* (20/20) (20/20 – 0/0 – 1/1)

2017 Calvados – Merville-Franceville-Plage, 1A, ssp. *isabellinus*, phot., 14 octobre (J.-A. Lenègre *fade* J. Jean-Baptiste). (Asie méridionale jusqu'à la Chine). Deuxième mention normande après celle de novembre 2002 en Seine-Maritime, qui concernait la sous-espèce *phoenicuroides* (V. *Ornithos* 14-5 : 298). À noter qu'une donnée de novembre 2017 en Vendée n'a pas encore pu être examinée.

AMMOMANE ÉLÉGANTE *Ammomanes cinctura* (0/0) (0/0 – 1/1 – 0/0)

2016 Aude – Gruissan, lido de la Mateille, phot., du 21 au 28 mai (S. Reyt, J.-M. Dramard *et al.*).

(Afrique du Nord, Sahara, Moyen-Orient, à l'est jusqu'au Pakistan). Première mention française pour cette alouette nord-africaine qui s'est déjà égarée à plusieurs reprises en Espagne. L'espèce a été placée en catégorie A par la CAF. Une note détaillée relatant cette découverte a été publiée dans *Ornithos* (REYT 2017).

ALOUETTE MONTICOLE *Melanocorypha bimaculata* (1/1) (1/1 – 0/0 – 0/0)

2015 Var – Hyères, salins des Pesquiers, phot., 11 avril (A. Audevard *et al.*).

(Turquie, Proche- et Moyen-Orient, à l'est jusqu'au Kazakhstan). Première mention française également pour cette autre alouette, en provenance de l'est cette fois... La donnée a été placée en catégorie A par la CAF (AUDEVARD 2018).

ALOUETTE PISPOLETTE *Alaudala rufescens* (2/2) (1/1 – 0/0 – 1/1)

2017 Isère – Gillonnay, phot., du 23 au 29 avril (J.-C. Cordara *et al.*).

(Espagne, Portugal, Maghreb, Proche- et Moyen-Orient, Ukraine, Turquie, puis zones steppiques jusque dans l'est de la Chine). C'est seulement la troisième mention française de cette alouette, après celles de Haute-Corse en 1906 et des Bouches-du-Rhône en 2001 ; l'espèce ne niche pourtant pas très loin en Espagne. La localité visitée ici pourrait toutefois laisser envisager une provenance orientale...



20. Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus,
Ouessant, Finistère, octobre
2017 (Thomas Dagonet).
Pallas's Leaf Warbler.

POUILLOT DE TEMMINCK *Phylloscopus coronatus* (0/0) (0/0 - 1/1 - 0/0)

2016 **Finistère** - Ouessant, Stang Korz, 1A probable, phot., 22 octobre (J.-M. Guilpain, S. Vincent).

(Centre de la Chine, Mandchourie, Corée, Japon). Première française pour ce pouillot très rare en Europe, noté à quelques reprises en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, en Finlande et en Allemagne. Une note détaillée relatant cette observation est parue récemment dans *Ornithos* (GUILPAIN & VINCENT 2018).

POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (28/28) (26/26 - 1/1 - 0/0)

2016 **Somme** - Saint-Quentin-en-Tourmont, 29 août (A. Leprêtre *et al.*).

(De la Baltique à la Sibérie centrale et l'Afghanistan). Une seule donnée pour ces deux années, à une date parfaitement typique. On est en droit de s'interroger sur la fréquence très faible de cette espèce en France par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Angleterre. Il est vrai que les îles atlantiques ne sont pas très fréquentées par les ornithologues à la bonne époque (seconde moitié d'août), mais les activités de baguage pourraient en déceler davantage...

POUILLOT BORÉAL *Phylloscopus borealis* (15/15) (15/15 - 1/1 - 0/0)

2016 **Finistère** - Ouessant, Stang Meur, +1A, phot., 8 et 9 octobre (S. Risser *et al.*).

2015 **Pas-de-Calais** - Marck, le Fort-Vert, capt. et phot., 28 octobre (X. Gruwier *et al.*), donnée déjà acceptée (V. *Ornithos* 23-6: 316), republiée pour correction de noms.

(Nord de la Scandinavie et Finlande, taïga sibérienne jusqu'à la Mandchourie et la mer de Béring). Ouessant accueille son douzième Pouillot boréal sur les 16 vus en France; date parfaitement classique...

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus* (119/121) (117/119 - 19/20 - 4/4)

2017 **Ain** - Saint-Jean-le-Vieux, 8 janvier (Y. Dubois).

Finistère - Ouessant, Créac'h, Locqueltas et Cost ar Reun, phot., du 27 octobre au 2 novembre (T. Dagonet *et al.*).

Gironde - Hourtin, lagune de Contaut, phot., du 21 au 26 novembre (A. Bert *et al.*).

Pas-de-Calais - Audinghen, phot., 2 novembre (M. Dehay, A. Mauss *et al.*).

2016 **Bouches-du-Rhône** - Marseille, campus universitaire de Luminy, phot., 28 octobre (F. Dhermain).

Côte-d'Or - Rouvres-en-Plaine, phot., du 27 novembre au 10 décembre (A. Rougeron *et al.*).

Finistère - Ouessant, Cost ar Reun, phot., 9 octobre (J.-M. Guilpain, S. Vincent *et al.*), Kernigou, phot., 13 et 14 octobre (A. Sponga, F. Bouzendorf *et al.*), phot., en compagnie du précédent, 14 octobre (A. Sponga, F. Bouzen-

dorf *et al.*), Poull Brac'h, phot., 23 octobre (V. Palomares *et al.*), Kerlann, 23 et 24 octobre (S. Reyt, J. Prunier *et al.*), Poull Bojer, 26 et 27 octobre (L. Sallé, F. Communier); Île de Sein, phot., 14 octobre (J. Birard *et al.*), phot., 23 octobre (P.J. Dubois, F. Garcia *et al.*).

Hérault - Sète, mont Saint-Clair, phot., 24 décembre (P. Bonfils).

Marne - Vertus, enr., phot., du 10 au 29 décembre (B. Geoffroy *et al.*).

Morbihan - Hoëdic, phot., du 17 au 21 octobre (A. Le Nevé *et al.*); Houat, phot., 1^{er} novembre (S. Guérin *et al.*).

Nord - Leffrinckoucke, 24 janvier (V. Salenbier, C. Salenbier, N. Michalski); Grand-Fort-Philippe, parc de l'Estran, phot., 21 octobre (A. Mauss, T. Bitsch); Dunkerque, parc du Vent, 2 ind., phot., 22 octobre (A. Mauss, T. Bitsch *et al.*); Le Portel, parc de la Falaise, 4 novembre (F. Bouzendorf, S. Vincent *et al.*); Grande-Synthe, réserve de Prédembourg, 5 novembre (J. Boulanger).

2013 **Pas-de-Calais** - Marck, le Fort-Vert, capt., phot., 24 novembre (F. Toulotte, X. Gruwier *et al.*).

(Asie centrale, de l'Est et du Sud-Est). Après une donnée originale de janvier dans le Nord, l'automne 2016 a été le théâtre d'un nouveau record d'affluence pour ce pouillot, loin devant celui de 2011 et ses onze données. Cet afflux a d'ailleurs été accompagné de phénomènes similaires chez les Pouillots à grands sourcils *P. inornatus* et de Hume *P. humei*. L'afflux s'est produit entre le 9 octobre et le 5 novembre, avec la moitié des mentions au cours de la dernière décade d'octobre, ce qui est parfaitement conforme à la phénologie de l'ensemble des données françaises. On relèvera trois données de fin novembre et de décembre en Côte-d'Or, dans l'Hérault et la Marne, plus une de janvier 2017 dans l'Ain, qui correspondent sans doute à des oiseaux erratiques, arrivés plus tôt en Europe. L'Hérault et la Côte-d'Or accueillent là leur second Pouillot de Pallas, tandis que c'est une première pour la Marne et l'Ain. Toutes les autres données proviennent des îles bretonnes ou du département du Nord... Situation beaucoup plus proches de la normale en 2017, avec trois données de fin octobre à fin novembre le long du littoral Manche-Atlantique. À signaler que quelques données supplémentaires n'ont pas fait l'objet de fiches, dont deux sur Ouessant en 2016, et une sur l'île de Sein et une dans le Nord en 2017.

POUILLOT DE HUME *Phylloscopus humei* (28/28) (28/28 - 7/7 - 2/2)

2017 **Pas-de-Calais** - Wissant, enr., phot., du 6 décembre au 8 février 2018, phot., du 20 décembre au 28 janvier 2018 (H. Machouk *et al.*).

2016 **Finistère** - Ouessant, Arland, enr., phot., 24 octobre (C. Peignot, J. Prunier *et al.*), Stang Meur, enr., 2 et 3 novembre (S. Wroza *et al.*).

Loire-Atlantique - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, 29 décembre (S. Reeber).

Morbihan - Erdeven, étang de Loperhet, phot., du 20 au 27 décembre (P.J. Dubois *et al.*); Sarzeau, phot., du 25 au 31 décembre (Y. Blat *et al.*); Saint-Pierre-Quiberon, Kerdavid, phot., du 26 décembre au 18 janvier 2017 (A. Trémion, Y. Flour *et al.*).

Vendée - Ile d'Yeu, phot., du 8 au 13 novembre (J.-M. Guilpain, O. Penard *et al.*).

(Du nord-est de l'Afghanistan à la Chine centrale). L'automne 2016 s'approche du précédent record de 2003 (huit données), et pourrait même le dépasser avec les deux données qui manquent encore à l'appel, dans le Nord et le Tarn. Il s'agit donc, comme pour le Pouillot de Pallas et le Pouillot à grands sourcils d'un afflux remarquable par son ampleur. Les données ci-dessus sont concentrées géographiquement, venues de quatre départements limitrophes du centre ouest de la France, avec une donnée de fin octobre, deux de début novembre et quatre de fin décembre, en parfaite conformité avec ce qui est connu de l'espèce en France. En 2017, deux nouveaux cas d'hivernage sont enregistrés, mais au même endroit!

POUILLOT DE SCHWARZ *Phylloscopus schwarzi* (16/16) (16/16 - 1/1 - 2/2)

2017 **Finistère** - Plogoff, Kergadelen, phot., 16 et 17 octobre (J.-F. Blanc *et al.*).

Nord - Dunkerque, 14 octobre (Q. Dupriez *et al.*).

2016 **Finistère** - Ouessant, Kergadou, phot., 9 octobre (E. Bouzendorf, F. Bouzendorf, J.-M. Guilpain, S. Vincent *et al.*).

(Sibérie centrale et sud-orientale). Après un vide en 2015, une nouvelle donnée en 2016 et deux en 2017, ce qui pourrait constituer un nouveau record avec les deux autres observations finistériennes de cette année n'ayant pas fait l'objet de fiches pour l'instant. Le Nord accueille ici son second Pouillot de Schwarz, et le Finistère son neuvième. Les dates d'observation sont parfaitement dans la norme, toutes les mentions françaises étant à ce jour du mois d'octobre.

POUILLOT BRUN *Phylloscopus fuscatus* (70/71) (70/71 – 5/5 – 6/6)

2017 Finistère – Ouessant, Pount Cam, enr., phot., du 23 au 27 octobre (H. Foxonet *et al.*); Ar Reun, 30 octobre (Q. Guibert).

Isère – Sassenage, barrage de Saint-Egrève, enr., phot., du 8 au 13 novembre (P. de Ferrière *et al.*).

Landes – Labenne, marais d'Orx, phot., du 26 au 28 novembre (P. Legay, F. Cazaban).

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, 1A, capt., phot., 2 novembre (O. Poisson *et al.*).

Morbihan – Hoëdic, 11 octobre (Groupe Ouigre).

2016 Aude – Leucate, les Coussoules, 15 octobre (T. Guillosson, G. Olioso).

Charente-Maritime – Rochefort, station de Lagunage, phot., du 4 au 9 novembre (N. Issa *et al.*).

Lozère – La Canourgue, plan d'eau de Booz, 11 octobre (F. Legendre).

Morbihan – Bangor, Bedex, phot., 1^{er} novembre (M. Giroud, I. Giroud).

Pas-de-Calais – Sangatte, bois de Blériot, 25 octobre (M. Dehaye).

2015 Hérault – Villeneuve-lès-Maguelone, enr., phot., du 10 janvier au 2 février (son et photo sur www.ornitho.fr).

Nord – Loon-Plage, enr., phot., du 3 décembre au 11 mars 2016 (A. Mauss *et al.*).

Rhône – Saint-Georges-de-Reneins, La Grange Picard, enr., 20 et 21 octobre (G. Bruneau *et al.*).

(Sibérie, Mongolie, Chine). Il se passe manifestement quelque chose dans le statut de ce pouillot, qui devient de plus en plus régulier. L'année 2015 compte désormais sept données, chiffre qui n'avait été atteint auparavant qu'en 2007. Cinq et six données ont été homologuées jusqu'à présent pour 2016 et 2017, mais ce n'est malheureusement qu'un pâle reflet des afflux notés ces deux années. En effet, ce sont huit données en 2016 (Charente-Maritime, Finistère, Pas-de-Calais, Gironde, Landes) et huit autres en 2017 (Finistère, Pas-de-Calais, Var, Côtes-d'Armor, Vendée) qui n'ont fait l'objet d'aucune fiche à ce jour...

POUILLOT ORIENTAL *Phylloscopus orientalis* (0/0) (0/0 – 0/0 – 1/1)

2017 Hérault – Frontignan, Mas d'Angoulême, +2A, enr., phot., 21 et 22 mai (J.-Y. Barnagaud, S. Wroza *et al.*).

(Balkans, Turquie et Proche-Orient). Suite à la révision des données françaises antérieures (V. *Ornithos* 22-6 : 301) et à la nécessité de disposer d'éléments irréprochables, notamment d'enregistrements, pour constituer une première mention nationale, cette observation de 2017 devient la seule et unique donnée française du Pouillot oriental.



21. Pouillot de Schwarz
Phylloscopus schwarzii,
Ouessant, Finistère,
octobre 2016 (Hugo
Touzé). *Radde's Warbler*.

FAUVETTE ÉPÉRVIERE *Sylvia nisoria* (101/103) (74/75 – 1/1 – 3/3)

2017 Finistère – Île de Sein, 1A, phot., 7 octobre (S. Guérin).

Jura – Vincent-et-Lombard, +1A, 6 mai (J.-P. Paul).

Nord – Grand-Fort-Philippe, 1A, phot., 2 novembre (J. Courtin *et al.*).

2016 Maine-et-Loire – La Ménitrière, 1A, 26 novembre (S. Havet *et al.*).

2015 Pas-de-Calais – Audinghen, cap Gris-Nez, 1A, 18 octobre (B. Luneau, Y. Brouillard).

2014 Pas-de-Calais – Marck, le Fort-Vert, 1A, capt., phot., 27 août (F. Toulotte, F. Caloin *et al.*).

Pas-de-Calais – Marck, le Fort-Vert, 1A, capt., phot., 29 septembre (F. Toulotte *et al.*).

(Eurasie centrale jusqu'à l'Altaï et nord-ouest de la Mongolie). Grâce aux deux données du Pas-de-Calais, qui confirment une fois de plus l'intérêt de ce site pour la capture d'espèces inhabituelles, l'année 2014 compte désormais huit données, ce qui constitue un nouveau record annuel. La situation est beaucoup plus calme en 2016, malgré une observation dans une localité particulièrement intéressante. L'année 2017 a vu arriver trois données, donc une remarquable au printemps dans le Jura, sachant que deux données du Finistère et du Nord ne sont pas encore parvenues au CHN.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (2/2) (2/2 – 0/0 – 2/2)

Individus présentant les caractéristiques des sous-espèces orientales *minula*, *margelanica* ou *halimodendri*

2017 Finistère – Île de Sein, Phare, phot., 26 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois).

Pas-de-Calais – Loon-Plage, mort en centre de soins, phot., 17 janvier (S. Risser *et al.*).

(Sud de l'Asie, entre l'Iran et la Mongolie). Deux nouvelles mentions pour ce groupe de sous-espèces orientales, ce qui est non seulement lié aux nouvelles connaissances acquises sur les sous-espèces de cette fauvette, mais aussi à l'intérêt nouveau qu'elles suscitent auprès des ornithos de terrain. Il faut néanmoins tenir compte du fait que ces connaissances progresseront encore beaucoup à l'avenir, et que le CHN sera sans doute amené à réévaluer ces données au fur et à mesure que de nouvelles informations se feront jour. L'identification en nature de ces sous-espèces n'est possible que sur la base de très bonnes photographies permettant notamment de détailler la coloration des rectrices externes, et d'informations sur les cris émis. L'oiseau du Pas-de-Calais a été confirmé génétiquement comme appartenant au groupe *halimodendri*.



22. Pouillot brun
Phylloscopus fuscatus,
Audinghen, Pas-de-Calais,
octobre 2016 (Daniel
Haubreux). *Dusky Warbler*.



23. Locustelle lancéolée *Locustella lanceolata*, Sein, Finistère, octobre 2017 (Julien Daubignard). *Lanceolated Warbler*.



24. Locustelle lancéolée *Locustella lanceolata*, Sein, Finistère, octobre 2017 (Stéphane Guérin). *Lanceolated Warbler*.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (0/0) (0/0 - 0/0 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce sibérienne *blythi*

2017 **Finistère** - Ouessant, marais du Niou, phot., du 25 au 30 octobre (F. Bouzendorf, J. Piette *et al.*)

(Taïga sibérienne depuis l'Oural et plus à l'Est jusqu'en Mongolie, au Sud jusque dans l'Altai). Des analyses génétiques (cytochrome b) ont permis de s'assurer de l'identité subsppécifique de cet oiseau. À noter que le statut en France de *blythi* n'est pas encore bien déterminé et qu'il est possible qu'une partie non négligeable des Fauvettes babillardes vues chez nous en automne appartiennent en fait à cette sous-espèce. Pour l'instant, les critères d'identification sur le terrain doivent encore être consolidés, des analyses génétiques étant plus sûres à ce stade.

FAUVETTE DES BALKANS *Sylvia cantillans cantillans/albistriata* (34/34) (33/33 - 1/1 - 2/2)

2017 **Hautes-Alpes** - Cervières, 2 mâles 2A, phot., 16 mai (F. Lecourtier *et al.*).

Var - Hyères, île de Porquerolles, Mont de Tiélo, mâle +1A, enr., 30 mai (A. Audevard).

2016 **Haute-Saône** - Quincey, les Essarts-Bertin, mâle, phot., 12 avril (J.-M. Gérard, I. Bitschy).

2010 **Haute-Savoie** - Localité non précisée, mâle 2A, phot., 14 avril (T. Vibert-Vichet).

(De la Slovénie à l'Ouest de la Turquie). Situation normale en termes de fréquentation pour cette fauvette, même s'il manque encore une donnée de Charente-Maritime en 2017. Les localités orientales sont attendues, mais les dates des deux données de 2017 sont plus tardives que la norme, le pic d'affluence se situant entre le 10 avril et le 10 mai.

FAUVETTE SARDE *Sylvia sarda* (23/22) (22/21 - 0/0 - 1/1)

Hors de Corse, où l'espèce est nicheuse sédentaire et commune

2017 **Cantal** - Ségur-les-Villas, mâle 2A, phot., 11 avril (Y. Blat).

(Principalement Corse et Sardaigne). Ce n'est que la sixième mention continentale de cette espèce au XXI^e siècle, et aussi la seconde donnée seulement en provenance d'un département hors de la frange méditerranéenne, après celle des Hautes-Alpes en 1998 (V. *Ornithos* 22-6: 301). La date en revanche est parfaitement conforme à ce qui est connu de l'espèce sur le continent.

FAUVETTE DE L'ATLAS *Sylvia deserticola* (0/0) (0/0 - 1/1 - 0/0)

2016 **Hérault** - Frontignan, les Aresquiers, mâle 2A, phot., 7 mai (C. Haag, D. Gailly, P. Gailly *et al.*)

(Massif de l'Atlas, du Maroc à la Tunisie). Cet oiseau de sous-espèce non déterminée fournit la première mention française de cette espèce et aussi la seconde en Europe, l'autre provenant de Malte... L'observation aura malheureusement été très brève et seuls quelques observateurs auront eu le temps d'en profiter! Une note détaillée relatant cette extraordinaire découverte vient de paraître (GAILLY & HAAG 2018).

LOCUSTELLE LANCÉOLÉE *Locustella lanceolata* (1/2) (1/2 - 0/0 - 1/1)

2017 **Finistère** - Île de Sein, phot., 9 octobre (S. Guérin *et al.*).

(Du sud-est de la Finlande, et grande partie de la Russie à l'Est jusqu'au Pacifique, Nord de la Mongolie, Mandchourie). Une révision des données de Locustelle lancéolée et de Locustelle de Pallas *L. certhiola* a été faite par le CHN, en particulier en raison de la non-concordance entre le pattern d'apparition en France et ce qui est désormais connu du statut de ces espèces en Europe de l'Ouest. Une note détaillée sur cette révision sera publiée prochainement. Il s'agit donc ici désormais de la seconde mention française de l'espèce, la première provenant déjà de l'île de Sein, le 15 septembre 2007 (V. *Ornithos* 16-5: 303).

LOCUSTELLE FLUVIATILE *Locustella fluviatilis* (14/15) (11/12 - 1/1 - 1/1)

2017 **Nord** - Sassegnies, mâle +1A, phot., du 27 mai au 9 juin (C. Fievet, M. Leseine *et al.*).

2016 **Bas-Rhin** - Muttersholtz, Ehnwihr, mâle cht., enr., 21 mai (P. Sigwalt *et al.*).

(Sud de la Baltique et Balkans jusqu'en Sibérie occidentale). Après deux mentions en 2015, en voici deux autres, à nouveau en provenance du nord-est du pays, et à des dates parfaitement classiques. La mention de 2016 constitue par ailleurs une première régionale.



25. Locustelle fluviatile *Locustella fluviatilis*, adulte, Sassegnies, Nord, mai 2017 (Édouard Dansette). *Adult River Warbler*.

HYPOLAÏS BOTTÉE *Iduna caligata* (14/14) (14/14 - 0/0 - 0/0)

2015 Charente-Maritime - Saint-Froult, RNN de Moëze-Oléron, ferme de Plaisance, 1A, capt., phot., 31 août et 1^{er} septembre (J.-F. Blanc *et al.*).

(Iran, Asie centrale, Mongolie). Une donnée s'ajoute pour l'année 2015, qui en comptait déjà une le 29 août dans le Maine-et-Loire (V. *Ornithos* 23-6: 320), à une date très similaire et précoce par rapport à ce qui est connu de l'espèce en France. Rien en revanche en 2016, ni en 2017 pour cette hypolaïs qui est notée en moyenne une année sur deux depuis 2000.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus* (0/0) (0/0 - 0/0 - 0/0)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce orientale *fuscus*

La seule et unique mention française de l'espèce, obtenue à Corné, Maine-et-Loire le 20 mai 1990 (*Alauda* 60-4: 214) a été révisée et rejetée lors de la réunion plénière d'avril 2018, à la lumière de connaissances plus récentes sur le statut et l'identification de ce taxon en dehors de son aire. Il apparaît entre autre qu'il existe une large zone d'intergradation avec *scirpaceus*, et qu'il est préférable de disposer d'analyses génétiques pour supporter une mention en Europe occidentale.

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola* (55/55) (55/55 - 2/2 - 1/1)

2017 Seine-Maritime - Sandouville, 1A, capt., phot., 5 septembre (Y. Jacob *et al.*).

2016 Charente-Maritime - Moëze, RNN Moëze-Oléron, 1A, capt., phot., 23 août (J.-F. Blanc *et al.*).

Loire-Atlantique - Donges, +1A, capt., phot., 8 octobre (P. Chable, N. Hillier, S. Voccia, H. Dugué).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). Après une absence complète en 2015, trois nouvelles données s'ajoutent pour cette espèce, et classiquement toutes trois issues de camps de baguage de la façade Manche-Atlantique. À signaler que quatre données de 2017 (trois dans le Finistère et une dans le Var) n'ont pas encore été examinées à ce jour.

ÉTOURNEAU ROSELIN *Pastor roseus* (237/418) (237/418 - -/- - -/-)

2006 Charente-Maritime - Esnandes, digue des Mizottes et pointe Saint-Clément, 1A, 10 décembre (L. Barbaro).

(Sud-est de l'Europe et sud-ouest de l'Asie). Une donnée parvenue tardivement s'ajoute pour cette espèce, dont les observations ne sont plus soumises à homologation nationale depuis le 1^{er} janvier 2013.

GRIVE DORÉE *Zoothera dauma* (18/19) (8/8 - 0/0 - 1/1)

2017 Finistère - Ouessant, Ar Reun, phot., du 22 au 26 octobre (J. Bottinelli *et al.*).

(Sibérie). Sixième mention seulement de cette magnifique grive pour le XXI^e siècle en France, qui aura fait le plaisir d'un bon nombre d'observateurs... Toutes les données obtenues depuis la création du CHN en 1981 datent des deux dernières décades d'octobre, et cinq d'entre elles provenaient déjà d'Ouessant.

GRIVE À AILES ROUSSES *Turdus eunomus* (4/4) (2/2 - 1/1 - 0/0)

2016 Nord - Steenwerck, mâle 1A, phot., 18 novembre (J. Savart).

(Sibérie centrale et de l'Est, Kamchatka). Observation exceptionnelle de cette grive qui n'avait pas été notée en France depuis le 21 janvier 1994 en Haute-Savoie (V. *Ornithos* 2-4: 160) et qui n'est pas mentionnée tous les ans en Europe. Comme beaucoup de grives sibériennes, elle n'a pas stationné longtemps...

ROSSIGNOL PROGNÉ *Luscinia luscinia* (11/11) (9/9 - 0/0 - 0/0)


2013 Pas-de-Calais - Marck, le Fort-Vert, 1A, capt., phot., 25 août (F. Toulotte *et al.*).

2011 Charente-Maritime - La Rochelle, pointe de Chef-de-Baie, 20 août (L. Barbaro), précédemment refusée (V. *Ornithos* 23-6: 328), à présent acceptée après réexamen.

(Nord de l'Allemagne et sud de la Suède, Ukraine et sud de la Finlande à l'est jusqu'en Sibérie centrale). Deux données viennent s'ajouter pour cette espèce qui reste très rare en France, les deux mentions précédentes remontant à 2008. Près de la moitié des observations ou captures françaises proviennent du Pas-de-Calais, la Charente-Maritime étant désormais le département visité le plus méridional. Il existe maintenant six données pour le mois de septembre et quatre pour août.



26. Grive à ailes rousses *Turdus eunomus*, mâle, Steenwerck, Nord, novembre 2016 (Joël Savart). *Male Dusky Thrush*.



27. Traquet isabelle *Oenanthe isabellina*, femelle, Gravelines, Nord, octobre 2016 (Julien Piette). *Female Isabelline Wheatear*.

ROBIN À FLANCS ROUX *Tarsiger cyanurus* (14/14) (14/14 - 1/1 - 0/0)

2016 Nord - Grand-Fort-Philippe, mâle 1A, phot., 27 octobre (J.-J. Hannequin).

(De la Finlande à la Sibérie orientale et au Japon). Alors qu'il existe 12 données homologuées entre 2002 et 2012, il n'en existe que deux entre 2013 et 2017, ce qui pourrait être le signe d'une raréfaction de l'espèce... Le Nord n'avait pas encore été visité, mais la date est classique, la dernière décade d'octobre regroupant neuf des 15 mentions françaises.

GOBEMOUCHE À DEMI-COLLIER *Ficedula semitorquata* (3/3) (3/3 - 0/0 - 0/0)

2015 Alpes-Maritimes - Châteauneuf-Grasse, golf de la Grande Bastide, mâle, phot., 22 et 24 mars (Y. Veret, M. Veret, P. Luxembourg).

(Sud des Balkans, Turquie, Caucase jusque dans le nord-est de l'Iran). Troisième mention française pour cette espèce en provenance de l'est de la Méditerranée, en une date et un lieu néanmoins attendus, les deux premières données étant du 17 avril et du 7 mai dans le Var.

TARIER DE SIBÉRIE *Saxicola maurus* (40/41) (36/37 - 0/0 - 1/1)

Individus présentant les caractéristiques des sous-espèces *maurus*, *stejnegeri*, *variegatus* ou *hemprichii*

2017 Nord - Dunkerque, fem. 1A, phot., 7 novembre (M. Roca *et al.*).

(Depuis l'Ukraine et la Turquie, Asie centrale jusque dans l'est de la Sibérie et la Mandchourie). C'est seulement la seconde mention de ce groupe de sous-espèces depuis 2014, alors que la décennie précédente en regroupe 17. Les Hauts-de-France accueillent là leur dixième Tarier de Sibérie, à une date un peu plus tardive qu'à l'accoutumée.

TRAQUET ISABELLE *Oenanthe isabellina* (19/19) (18/18 - 1/1 - 0/0)

2016 Nord - Gravelines, plaine de Rexam, fem., phot., du 15 au 18 octobre (D. Haubreux *et al.*).

(Roumanie jusqu'au nord de la mer Caspienne). La totalité des données françaises proviennent de quatre départements seulement, et le Nord en faisait déjà partie, sur la base d'une observation du 16 octobre 1993 (V. *Ornithos* 2-1: 13). La date est classique, le mois d'octobre regroupant à lui seul deux tiers des mentions. Une donnée de 2017 dans le Finistère n'a malheureusement pas fait l'objet de fiche à ce jour.



28. Traquet pie *Oenanthe pleschanka*, femelle 1^{re} année, Plouguerneau, Finistère, octobre 2016 (François Morazé). 1st-cy female Pied Wheatear.

TRAQUET PIE *Oenanthe pleschanka* (7/7) (7/7 – 1/1 – 0/0)

2016 **Finistère** – Plouguerneau, fem. 1A, enr., phot., du 26 au 29 octobre (Y. Le Corre *et al.*).

(De la Roumanie au Moyen-Orient, puis zones steppiques jusque dans l'est de la Chine et de la Mongolie). Huitième mention française et troisième pour le Finistère, là-encore à une date typique, puisque quatre autres données sont du mois d'octobre, et les trois dernières de novembre.

TRAQUET DU DÉSERT *Oenanthe deserti* (44/45) (43/43 – 3/3 – 1/1)

2017 **Bouches-du-Rhône** – Saintes-Maries-de-la-Mer, mâle 1A, phot., 18 et 19 novembre (T. Laurent *et al.*).

2016 **Pas-de-Calais** – Boulogne-sur-Mer, fem., phot., du 17 décembre au 5 janvier 2017 (F. Gabillard, G. Flohart *et al.*).

Vendée – Île d'Yeu, fem., phot., 17 mars (F. Portier).

Vosges – La Bresse, fem. 1A, phot., 22 et 23 octobre (G. Haas *et al.*).

2015 **Finistère** – Ouessant, Kadoran, fem. 1A, phot., 11 et 12 novembre (photo sur www.ornitho.fr).

(Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest). L'année 2015 compte désormais sept données et arrive juste derrière 1997 (dix mentions) en termes de fréquentation. La situation est plus conforme à la normale en 2016 et 2017 avec quatre données, parmi lesquelles on notera surtout la localité vosgienne (les autres départements ayant déjà été visités par l'espèce) et la date de mars, une première.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (0/0) (0/0 – 1/1 – 0/0)

Individus présentant les caractéristiques des sous-espèces orientales du groupe *tschutchensis*

2016 **Finistère** – Ouessant, Porz Doun, 1A, enr., phot., 29 et 30 octobre (K. Guille, R. Watts *et al.*).

(Nord et est de la Mongolie, Mandchourie, Sibérie orientale, ouest et nord de l'Alaska). Première mention française pour ce groupe de sous-espèces distinct, mais dont l'identification en Europe demande malgré tout de bonnes photographies et des enregistrements, ou des analyses génétiques. Une note détaillée sur cette donnée et les critères d'identification de ce groupe figure dans le présent numéro.

BERGERONNETTE DES BALKANS *Motacilla flava feldegg* (122/145) (111/132 – 8/8 – 3/3)

2017 **Haute-Corse** – Rogliano, Macinaggio, mâle +1A, 17 avril (M. Giroud).

Hérault – Lansargues, les Cayrelles, mâle +1A, forme *melanogrisea*, phot., 2 avril (J. Chiffard Carricaburu).

Pyrénées-Orientales – Le Barcarès, déchetterie, mâle +1A, phot., 15 et 16 avril (C. Peignot *et al.*).

2016 **Ain** – Saint-Paul-de-Varax, Dombes, étang du Gour, mâle, phot., 2 avril (P. Cruzier *et al.*).

Aude – Fleury-d'Aude, bassins de décantation de Pissevache, mâle, phot., 16 avril (S. Reyt, J.-M. Dramard, D. Gailly).

Haute-Savoie – Excenevex, bord du lac Léman, mâle +1A, phot., 17 avril (A. Schlatmann, F. Noiro).

Isère – Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, mâle, forme *melanogrisea*, phot., du 3 au 6 avril (E. Morel *et al.*); Gillonnay, Chèvre Noire, mâle +1A, phot., du 22 au 24 mai (P. de Ferrière, G. Laurencin).

Pyrénées-Orientales – Saint-Cyprien, mâle +1A, phot., 10 avril (H. Foxonet).

Savoie – Viviers-du-Lac, mâle, forme *melanogrisea*, phot., 1 et 2 mai (P. Delastre).

Seine-et-Marne – Nangis, mâle +1A, phot., 10 avril (S. Wroza, R. Panvert).

(Balkans jusqu'en Iran et en Afghanistan). L'année 2016 a connu une fréquentation supérieure à la normale et 2017 en est plus proche... Notons toutefois qu'il manque encore deux fiches pour 2016 (Gard et Finistère) et cinq pour 2017 (Ain, Savoie, Isère). La répartition des données, centrée sur le sud-est de la France, est évidemment normale, tout comme le sont les dates étalées entre début avril et début mai. Deux mentions spéciales: d'une part pour la donnée de Seine-et-Marne, ce département n'ayant pas accueilli ce taxon depuis 1980, et d'autre part pour celle de l'Isère, plutôt tardive, du 22 au 24 mai 2017. Pour terminer, signalons que le CHN n'accepte ici que les individus montrant les caractères de *feldegg*, incluant la forme *melanogrisea*, mais que plusieurs autres fiches soumises comme '*superciliaris*', '*dombrowski*' et '*xanthophrys*' concernent bien les types proposés, mais ne peuvent pas être traités comme *feldegg*, et ne sachant pas quel est l'autre taxon parent, elles ne sont pas prises en compte dans les totaux de *feldegg*.

29. Traquet du désert *Oenanthe deserti*, mâle 1^{re} année, Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône, novembre 2017 (Thomas Perrier). 1st-cy male Desert Wheatear.



BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (50/51) (50/51 - 10/11 - 2/2)

2017 Loiret – Saint-Denis-en-Val, Melleray, fem. +1A, phot., 13 mai (M. Lacroix).

Vendée – Noirmoutier-en-l'Île, RNN des marais de Müllembourg, 1A, phot., 21 septembre (D. Desmots).

2016 Aude – Gruissan, Petit Tournebelle, +1A, phot., 1^{er} septembre (F. Garcia, T. Guillosson, C. Haag *et al.*), 1A, phot., du 1^{er} au 3 septembre (F. Garcia, T. Guillosson, C. Haag *et al.*).

Finistère – Plovan, étang de Kergalan, 1A, phot., du 29 août au 2 septembre (M. Canévet *et al.*); Tréogat, Trunvel, 1A, capt., phot., 22 septembre (*vide* S. Provost).

Haute-Savoie – Passy, mâle 2A, phot., du 24 au 27 avril (P. Durrafort, C. Giacomo, S. Nabais, M. Robert *et al.*).

Hérault – Agde, étang du Bagnas, 1A, capt., phot., 4 septembre (B. Chanchus *vide* F. Jiguet).

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, 1A, phot., du 4 au 6 septembre (S. Reeber *et al.*).

Pyrénées-Atlantiques – Momas, lac de l'Ayguelongue, 1A, 17 août (J.-L. Grangé).

Pyrénées-Orientales – Le Barcarès, mâle et fem., phot., 18 et 19 avril (H. Foxonet, G. Olioso, C. Peignot *et al.*).

Var – Fréjus, mâle +1A, phot., 11 avril (C. Bury).

2015 Var – Hyères, salins des Pesquiers, 1A, enr., phot., 9 septembre (A. Audevard).

2014 Haute-Savoie – Sciez, plage de Coudrée, mâle +1A, phot., 28 avril (R. Jordan *et al.*).

(De la Pologne et de la Turquie à l'Asie centrale). Un nouveau record a été atteint en 2016 pour cette bergeronnette avec onze oiseaux observés, loin devant l'année 2009 et ses sept oiseaux. Il faudrait pouvoir y ajouter cinq données qui n'ont pas fait l'objet de fiches à ce jour, en provenance de l'Aude, du Finistère, de l'Hérault, de la Seine-et-Marne et de Charente-Maritime. Aucun des départements visités n'est nouveau pour l'espèce, qui est certes davantage observée le long du littoral centre-ouest et dans le tiers sud-est du pays, mais qui peut être contactée un peu partout. Huit oiseaux sont de l'automne contre trois du printemps, ce qui est habituellement plus équilibré. Retour à la normale en 2017 avec deux données, sachant que deux autres manquent encore (Loiret et Bouches-du-Rhône).

PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewskii* (15/15) (15/15 - 0/0 - 1/1)

2017 Pyrénées-Orientales – Canet-en-Roussillon, ancien hippodrome, 2A, phot., du 12 au 25 février (H. Foxonet, C. Peignot *et al.*).

(Sud de la Sibérie, Chine, nord-est de l'Inde). Première mention pour les Pyrénées-Orientales et seulement la troisième pour la région méditerranéenne, les deux autres étant des Bouches-du-Rhône, dont une déjà en période hivernale.



30. Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii*, Hâble d'Ault, Somme, janvier 2016 (Hugo Touzé). *Blyth's Pipit*.

PIPIT À DOS OLIVE *Anthus hodgsoni* (26/26)

(26/26 - 1/1 - 5/5)

2017 Finistère – Ouessant, Ar Reun et Arland, phot., du 12 au 15 octobre (L. Pelloi *et al.*), Penn ar Ruguel, phot., 27 et 28 octobre (K. Guille *et al.*), le Cromlec'h, enr., 30 octobre (S. Wroza).

Indre-et-Loire – Cinq-Mars-la-Pile, phot., du 16 décembre au 5 mars 2018 (J.-M. Feuillet *et al.*).

Nord – Preux-aux-Bois, enr., 9 octobre (*vide* Q. Dupriez).

2016 Yvelines – Rambouillet, enr., 11 novembre (J. Rochefort).

(Sibérie, Extrême-Orient). Cinq données en 2017 constituent un nouveau record, et une autre en provenance du Var n'a pas encore été examinée. L'observation d'Indre-et-Loire est remarquable non seulement pas la date très tardive, qui rappelle celles du 26 décembre 2011 au 6 janvier 2012 dans la Manche (V. *Ornithos* 19-6: 378), mais aussi par la localité continentale et la durée du stationnement record (ISSA & RÉVEILLAUD 2018). Les autres mentions de 2017 sont nettement plus classiques pour les localités et les dates, mais celle des Yvelines tranche elle aussi par son caractère continental. On notera l'importance des enregistrements pour la détection de cette espèce, la donnée du Nord constituant même une première dans les archives du CHN, s'agissant d'un oiseau dont le cri a été détecté sur un enregistrement nocturne en continu...



31. Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni*, Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire, janvier 2018 (Éric Sansault). *Olive-backed Pipit*.

ROSELIN CRAMOISI *Erythrura erythrura* (239/274) (224/257 - 7/7 - 12/11)

2017 Charente-Maritime – Saint-Clément-des-Baleines, Batardeau, 1A, capt., phot., 19 septembre (J. Gernigon).

Finistère – Île de Sein, 1A, phot., 20 octobre (F. Garcia *et al.*).

Jura – Les Rousses, le Vivier des Rousses, mâle +1A, phot., 5 juin (F. Louiton *et al.*).

Loiret – Chécy, 1A, phot., du 2 au 28 décembre (L. Frédéric *et al.*).

Nord – Grand-Fort-Philippe, mâle 2A, phot., 11 et 12 juin, mâle 2A, phot., 13 juin (J. Piette *et al.*), le même que celui du Platier d'Oye du 10 au 12 juin; Gravelines, mâle 2A, phot., 13 juin (J. Piette *et al.*).

Pas-de-Calais – Oye-Plage, Escardines, mâle 2A, phot., du 10 au 12 juin, RNN du Platier d'Oye, fem. +1A, phot., du 10 au 29 juin, 2 mâles +2A, cht., phot., du 10 juin au 23 juillet, mâle 2A, phot., du 10 juin au 16 juillet, mâle +2A, phot., du 12 au 24 juin (J. Piette *et al.*).

2016 Bouches-du-Rhône – Camargue, Arles, Tour-du-Valat, 1A, capt., phot., 9 novembre (Y. Kayser *et al.*).

Charente-Maritime – Saint-Clément-des-Baleines, mâle 2A, phot., du 26 juin au 4 juillet (A. Pajot, M. Pajot, A. Jambon).

Finistère – Ouessant, Kerbrat, 1A, 7 octobre (T. Gouëlle).

Meurthe-et-Moselle – Pagny-sur-Moselle, mâle +1A, phot., du 24 au 27 juin (T. Armand, C. Morvan, D. Davignon, E. Chauveau, F. Henriot, G. Bach, J. François, A. Lehalle, J.-P. Pichot).

Meuse – Girauvoisin, mâle +1A, phot., du 30 juin au 5 juillet (B. Luneau *et al.*).

Pas-de-Calais – Marck, le Fort-Vert, 1A, capt., phot., 9 octobre (F. Toulotte).

Vendée – Île d'Yeu, dépression de la dune de la Grande Conche, fem./1A, 22 août (X. Hindermeyer).

2015 Finistère – Île de Sein, Troejeur, 1A, phot., 22 septembre (photo sur www.ornitho.fr).

2006 Haut-Rhin – Orbey, crête du Lac blanc, mâle cht., 6 mai (C. Dronneau).

(Europe du Nord et centrale, Asie jusqu'à l'Himalaya). L'année 2016 est dans la moyenne en termes de fréquentation, avec sept données plus une qui manque encore, en provenance du Var. Aucune mention ne semble avoir été obtenue dans les régions où de potentiels nicheurs sont habituellement observés,

mais des individus a priori isolés ont été vus en Lorraine et, plus remarquable, en Charente-Maritime. Les quatre autres observations concernent de jeunes oiseaux à l'automne, dont trois (classiques) sur le littoral Manche-Atlantique, et un, plus original, en Camargue. L'année 2017 accumule 12 mentions, et pourrait même battre le précédent record de 1995 (15 données) en y ajoutant les huit fiches non encore reçues (Mayenne, Nord, Haute-Savoie et Finistère). On remarquera un stationnement remarquable impliquant au moins sept oiseaux dans les Hauts-de-France, le retour d'un oiseau dans le Jura ainsi qu'un stationnement hivernal, qui reste très occasionnel en France.

ROSELIN GITHAGINE *Bucanetes githaginea* (20/21) (20/21 – 1/1 – 1/1)

2017 Vendée – Île d'Yeu, pointe de la Tranche, mâle probable, 2A, phot., 25 mai (X. & M.-P. Hindermeyer, V. Auriaux).

2016 Pyrénées-Orientales – Cerbère, cap Cerbère, mâle, 26 novembre (A. Chaillou *et al.*).

2014 Nord – Ambleteuse, phot., 5 mai (K. Bracke *vide* J. Piette).

(Sud de l'Espagne, Afrique du Nord, Moyen-Orient jusqu'en Inde). Une donnée tardive place 2014 à la première place avec quatre mentions, à égalité avec 2005. Deux nouvelles données s'ajoutent en 2016 et 2017, ce qui fait que le Roselin githagine aura été vu en France lors de huit années au cours de la décennie écoulée. L'île d'Yeu avait déjà été visitée en mai 2008 (V. *Ornithos* 16-5 : 308), mais il s'agit d'une première pour les Pyrénées-Orientales, à une date atypique...

LINOTTE À BEC JAUNE *Linaria flavirostris* (12/44) (12/44 – 4/10 – 4/9)

2017 Pas-de-Calais – Oye-Plage, ouest de la plage du Casino, 3 ind., 18 février (B. Bril), plage du Casino, 5 ind., phot., du 22 novembre au 22 janvier 2018 (J. Piette *et al.*); Le Touquet-Paris-Plage, école de voile, 3 dont au moins 1 mâle, phot., 24 décembre (T. Daumal).

Somme – Le Crotoy, RNN de baie de Somme, phot., 28 décembre (M. Zucca *et al.*).

2016 Manche – Vrasville-sur-Mer, marais de Vrasville, phot., du 24 décembre au 11 février 2017 (A. Verneau, A. Guérard, J.-P. Marie *et al.*).

Nord – Dunkerque, mâle, phot., 2 et 3 novembre (V. Salenbier, F. Bouzendorf, S. Vincent *et al.*); Grand-Fort-Philippe/Gravelines, 8 ind., phot., du 3 au 31 décembre puis 7 ind. jusqu'au 24 février 2017 (S. Risser *et al.*).

Pas-de-Calais – Oye-Plage, plage du Casino, 2 ind., 26 décembre (A. Prampart *et al.*), probablement une partie des huit individus de Grand-Fort-Philippe.

(Îles Britanniques, Scandinavie). Le principal secteur d'hivernage de l'espèce en France s'étend entre Grand-Fort-Philippe, Nord, et Oye-Plage, Pas-de-Calais, les oiseaux changeant plus ou moins régulièrement de site. Il y en avait huit lors de l'hiver 2016-2017 et cinq au cours de l'hiver suivant. La Manche accueille sa première Linotte à bec jaune depuis l'entrée en vigueur de l'homologation de l'espèce en 2012. L'âge des oiseaux n'étant pas évident à déterminer sur le terrain, il est difficile de savoir dans quelle mesure il s'agit d'adultes revenant sur leur site d'hivernage ou de jeunes de l'année. Tous ont donc été comptabilisés chaque année.

BEC-CROISÉ PERROQUET *Loxia pytyopsittacus* (8/12) (4/4 – 0/0 – 2/28)

2017 Somme – Saint-Quentin-en-Tourmont, parc ornithologique du Marquenterre, jusqu'à 23 ind., phot., du 14 octobre au 27 février 2018 (S. Wroza, O. Laporte, R. Benmouhoub *et al.*).

Yvelines – Gambaiseuil, jusqu'à 5 ind., enr., du 24 octobre au 18 mars 2018 (S. Wroza *et al.*).

(Scandinavie, pays baltes et Sibérie occidentale). Un afflux spectaculaire de Becs-croisés perroquets s'est déroulé à l'automne 2017 sur tout le nord de l'Europe, à l'occasion duquel quelques oiseaux se sont aventurés jusqu'en France. Cela a conduit à ces deux données pour un minimum de 28 oiseaux sur deux sites, ce qui surpasse de loin les précédentes mentions françaises de l'espèce, qui n'avait d'ailleurs pas été signalée chez nous depuis 1991. Malheureusement, l'identification de cette espèce reste compliquée, en particulier dans la mesure où beaucoup d'observations de becs-croisés concernent des oiseaux en vol et ne s'arrêtant pas. Dans ce cas, des enregistrements des cris de vol sont préférables pour une homologation, tant certains cris émis par le Bec-croisé des sapins *L. curvirostra* peuvent se révéler troublants (WROZA *et al.* 2018). C'est en partie ce qui explique que plusieurs mentions n'ont pas été signalées au CHN, notamment dans la Somme, l'Ain et la Meurthe-et-Moselle.

32. Linotte à bec jaune
Linaria flavirostris, Grand-Fort-Philippe, Nord, décembre 2016 (Julien Boulanger). *Twite*.



BRUANT MÉLANOCÉPHALE *Emberiza melanocephala* (121/146) (101/123 – 2/2 – 4/4)

2017 Alpes-de-Haute-Provence – Puimoisson, le Bois, mâle +1A, 3 juin (J.-Y. Barnagaud, S. Meriotte).

Bouches-du-Rhône – Istres, Mas Chauvet, fem. +1A, phot., 24 mai (J.-M. Fénérole).

Moselle – Frauenberg, mâle +1A, phot., 5 juin (W. TousSt).

Rhône – Saint-Bonnet-de-Mure, mâle +1A, phot., 21 juin (N. Bouvet).

2016 Aveyron – Millau, mâle +1A, phot., 19 juin (J.-M. Carel *et al.*).

Bouches-du-Rhône – Saintes-Maries-de-la-Mer, parking de la Comtesse, mâle +1A, phot., 14 mai (T. Blanchon *et al.*).

1989 Alpes-Maritimes – Nice, embouchure du Var, mâle +1A, phot., 9 mai (J.-P. Fromentin).

(Sud-est de l'Europe et sud-ouest de l'Asie). Deux et quatre données respectivement pour 2016 et 2017, ce qui est dans la norme. Les dates sont classiques (entre mi-mai et fin juin), comme les localités du sud-est de la France; seule exception notable, la donnée de Moselle, une première régionale. Aucun indice de nidification probant n'a en revanche été obtenu... À signaler enfin qu'il manque encore une donnée des Bouches-du-Rhône en 2016, et deux données (Pyrénées-Orientales et Alpes-de-Haute-Provence) en 2017.

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla* (161/170) (148/155 – 12/13 – 9/9)

2017 Drôme – Livron-sur-Drôme, Jeton, mâle +1A, capt., phot., 18 octobre (B. Delhome).

Finistère – Île de Sein, phot., du 19 au 21 octobre (F. Garcia, M. Zucca *et al.*), phot., du 22 au 28 octobre (F. Garcia, M. Zucca *et al.*); Île de Molène, phot., du 27 octobre au 3 novembre (B. Duchenne *et al.*).

Jura – Villers-Farlay, du 6 au 8 octobre (J.-P. Paul *et al.*).

Morbihan – Hoëdic, phot., 10 octobre (anonyme).

Nord – Villeneuve-d'Ascq, phot., 7 novembre (A. Mauss *et al.*).

Pas-de-Calais – Saint-Omer, étangs du Romelaëre, Woestelandt, mâle 1A, capt., phot., 6 novembre (C. Héroguel).

Vendée – Noirmoutier-en-l'Île, pointe de l'Herbaudière, phot., 31 octobre (J. Piolain).

2016 Finistère – Ouessant, Pount Salaün, 2 ind., du 6 au 11 octobre (D. Grandière *et al.*), marais du Créac'h, 11 octobre (R. Panvert *et al.*), Kerlaouen, 21 octobre (J. Botinelli), Kevasdoué, du 23 au 25 octobre (C. Peignot *et al.*), Kadoran, phot., 24 octobre (A. Pajot, M. Pajot), Parkous, phot., 26 octobre (H. Foxonet, A. Salmon), Goubars, phot., 26 octobre (C. Peignot *et al.*); Île de Sein, phare et Ar Men, phot., du 22 au 24 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois *et al.*), Biladoc, phot., du 26 au 29 octobre (P. Crouzier, P.J. Dubois *et al.*); Île de Molène, 1A, phot., 5 et 6 novembre (B. Pellegrini *et al.*).



33. Bruant nain *Emberiza pusilla*, Sein, Finistère, octobre 2017 (Pierre Rigalleau). *Little Bunting*.

Loire-Atlantique – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, lac de Grand-Lieu, 1A, capt., phot., 10 octobre (S. Reeber).

Mayenne – Origné, La Fromentière, phot., du 8 décembre au 26 février 2017 (F. Bertin, J.-L. Reuzé *et al.*).

2015 Finistère – Crozon, cap de la Chèvre, 13 octobre (D. Grandière).

2013 Pas-de-Calais – Marck, le Fort-Vert, 1A, capt., phot., 2 octobre (F. Toulotte *et al.*).

(Scandinavie, Asie septentrionale). Le Bruant nain est sans doute l'espèce pour laquelle le CHN a eu le plus de mal à recevoir des fiches au cours des deux dernières années, sans doute parce qu'il est récemment devenu un peu moins rare... Au total, 14 fiches de 2016 (Bouches-du-Rhône, Finistère, Vendée, Morbihan, Landes et Var) et 17 fiches de 2017 (Bouches-du-Rhône, Haute-Savoie, Pas-de-Calais, Finistère, Ardèche, Landes et Charente-Maritime) ne peuvent donc pas être traitées ici. Si l'on y ajoute les 12 et 9 données homologuées respectivement pour ces deux années, les totaux sont hors du commun, puisqu'avec 12 mentions, seule l'année 2015 passait auparavant la barre des dix données ! En raison de cette évolution, le CHN a décidé de retirer le Bruant nain de la liste des espèces soumises à homologation nationale à compter du 1^{er} janvier 2018. Les données manquantes précitées sont évidemment toujours les bienvenues.

BRUANT À CALOTTE BLANCHE *Emberiza leucocephala* (40/47) (26/33 – 0/0 – 1/2)

2017 Vaucluse – Cadenet, 1 mâle, 1 fem., phot., du 1^{er} décembre au 9 mars 2018 (S. Rey, Y. Blanchon, F. Mézenge *et al.*).

(Sibérie). L'espèce n'avait pas été mentionnée en France entre 2014 et 2016, même si une donnée ouessantine n'a pas fait l'objet de fiche pour cette dernière année. D'autres mentions ont dû être rejetées en raison du niveau d'exigence requis pour l'identification de cette espèce, facile à confondre avec les hybrides relativement fréquents avec le Bruant jaune *E. citrinella*. Le CHN va d'ailleurs engager la révision des fiches de femelles, afin de s'assurer de leur identité, à la lumière de publications récentes sur le sujet. Quoi qu'il en soit, l'hivernage de deux oiseaux au moins dans le Vaucluse est un fait remarquable, qui rappelle que l'espèce hiverne très localement dans le sud de la France depuis longtemps... Il suffit de trouver où !

ANNEXE 1 – ESPÈCES OU INDIVIDUS EN COURS DE CATÉGORISATION

Cette annexe reprend les données d'espèces classées en catégorie D par la CAF, mais aussi et surtout des individus dont les espèces sont classées en catégorie A, mais qui sont (individuellement) en cours de catégorisation. Les données ci-après ont donc vocation être classées soit en catégorie A, soit en catégorie E à terme. Pour rappel, le CHN est preneur de fiches d'homologation pour toutes les espèces susceptibles d'arriver naturellement sur notre territoire métropolitain, même si les oiseaux paraissent échappés a priori.

FULIGULE À TÊTE ROUGE *Aythya americana*

2016 Bas-Rhin – Plobsheim, Krafft-Plobsheim, mâle, phot., du 11 novembre au 3 mars 2017 (Y. Carasco *et al.*).

(Amérique du Nord). L'origine de cet oiseau n'a pas encore été établie. S'il était considéré comme d'origine naturelle, il s'agirait d'une première mention française de l'espèce.

HARLE COURONNÉ *Lophodytes cucullatus*

2016 Meuse – Lacroix-sur-Meuse, mâle 2A, phot., 15 mars (G. Leclerc).

(Amérique du Nord). Une espèce pour laquelle la grande majorité des données concernent manifestement des échappés, principalement lorsqu'elles proviennent du quart nord-est du pays.

PÉLICAN FRISÉ *Pelecanus crispus*

2016 Haut-Rhin – Aspach-le-Bas, 3 mai (M. Groell).

(Balkans au sud de l'Asie centrale jusqu'à l'ouest de la Mongolie). Une observation en cours de catégorisation pour cette espèce récemment admise en catégorie A par la CAF.

TOURTERELLE MAILLÉE *Streptopelia senegalensis*

1984 Var – Hyères, du 10 au 12 avril (A. Blasco).

(Afrique et Moyen-Orient jusqu'en Inde et dans l'ouest de la Chine). Espèce actuellement classée en catégorie D par la CAF, en attente d'être placée en catégorie A ou E.

ANNEXE 2 – ESPÈCES OU INDIVIDUS DONT L'ORIGINE EST CAPTIVE OU PROBABLEMENT CAPTIVE (CATÉGORIE E)

Cette annexe reprend les données d'espèces classées en catégorie E par la CAF, mais aussi des individus dont les espèces sont classées en catégorie A, mais qui sont (individuellement) classés en catégorie E. Pour rappel, le CHN est preneur de fiches d'homologation pour toutes les espèces susceptibles d'arriver naturellement sur notre territoire métropolitain, même si les oiseaux paraissent échappés a priori.

• **Bernache d'Hutchins** *Branta hutchinsii* – 2016 – Loire-Atlantique – Herbignac, du 5 au 27 avril, 2 ind. le 25 avril (J.-M. Vaillhen).

• **Bernache à cou roux** *Branta ruficollis* – 2016 – Côte-d'Or – Trugny, +2A, phot., du 18 au 20 février (A. Rougeron *et al.*); 2016 – Manche – Querqueville, Dixmude, +2A, phot., du 21 mars au 4 avril (S. Crestey), individu bagué couleur; 2015 – Côtes-d'Armor – Lancieux, polder de Lancieux, +1A, phot., du 23 au 28 décembre (photo sur www.ornitho.fr); 2015 – Côte-d'Or – Dijon, lac Kir, +1A, phot., du 3 septembre au 21 janvier 2016 (A. Rougeron *et al.*); 2015 – Morbihan – Séné, RNN de Séné-Falguérec, +1A, le même oiseau que celui des Côtes-d'Armor, phot., du 4 au 17 décembre (photo sur www.ornitho.fr); 2008 – Creuse – Lussat, étang des Landes, +1A, phot., du 31 octobre au 11 janvier 2009 (G. Dubois *et al.*).

• **Harle couronné** *Lophodytes cucullatus* – 2016 – Creuse – Saint-Agnant-de-Versillat, mâle et fem., phot., 17 avril (A. Bruère).

• **Pétrel de Bulwer** *Bulweria bulwerii* – 2017 – Gironde – Soulac-sur-Mer, phot., 1^{er} août (*vide* S. Provost), récupéré affaibli, arrivé dans les eaux françaises sur un cargo, mort en centre de soins.

• **Pélican frisé** *Pelecanus crispus* – 2017 – Maine-et-Loire – Parnay, 1A, phot., 18 et 19 septembre (A. Guillemart *et al.*); 2017 – Meurthe-et-Moselle – Art-sur-Meurthe, Ambanie, phot., 16 avril (G. Juppé *et al.*); 2017 – Meuse – Stenay, +3A, du 12 au 19 mars (M. Collet *et al.*); Moselle – Ay-sur-Moselle, les Vieilles Eaux, +3A, phot., 2 avril (F. Huguet, R. Taylor); Oise – Le Plessis-Brion, +5A, phot., 28 octobre (R. Leroy *et al.*); Yvelines – Saint-Germain-en-Laye, 1A, phot., 9 septembre (B. Frangeul *et al.*); 2016 – Marne – Giffaumont-Champaubert, lac de Der-Chantecoq, +2A, phot., du 31 octobre au 8 décembre (O. Plisson, A. Lhelle, G. Schmitt, S. Risser *et al.*); 2016 – Mayenne – Sainte-Suzanne, étang des Landes, +1A, phot., 21 septembre

(F. Duchenne, B. Duchenne); 2016 – Nièvre – Coulanges-les-Nevers, imm. ?, phot., du 25 au 30 janvier (D. Dupuy, G. Gillon, P. Loquet *et al.*); 2015 – Marne – Outines, Giffaumont-Champaubert, Arrigny, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, Ponthion et Matignicourt-Goncourt, lac du Der-Chantecoq et ses environs, 2A, phot., du 8 au 23 février (J. Rougé, L. Simon). En 2017, un jeune oiseau a d'abord été vu dans les Yvelines, puis en Maine-et-Loire, en Espagne puis au Portugal, tandis qu'un autre a circulé en Lorraine au printemps, et un troisième s'est brièvement montré dans l'Oise.

- **Pélican gris** *Pelecanus rufescens* – 2016 – Finistère – Trebabu, étang de Kerjan, phot., +5A, phot., 18 et 19 mars (J. Caloc, B. Pellegrini, A. Corre *et al.*); 2015 – Sarthe – Spay, +4A, phot., du 9 au 20 décembre, puis trouvé mort le 13 avril 2016 (F.-M. Bouton *et al.*), échappé du parc zoologique de Branféré, Morbihan.
- **Ibis chauve** *Geronticus eremita* – 2017 – Corse-du-Sud – Vico, Sagone, 4 ind. de 1A, phot., du 26 novembre au 19 décembre (J.-F. Seguin), nés à Udine, nord-est de l'Italie, dans le cadre d'un programme d'introduction.
- **Grue demoiselle** *Grus virgo* – 2016 – Seine-Saint-Denis – Sevran, parc des Sœurs, +1A, phot., 16 août (D. Omarov).
- **Outarde barbue** *Otis tarda* – 2017 – Morbihan – Sarzeau, pointe de Penvins, mâle 1A, phot., 2 décembre (A.-S. Hochet). Il manque encore des données du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et de la Manche, possiblement toutes du même oiseau.
- **Pluvier fluviatile** *Pluvianus aegyptius* – 2017 – Gironde – Gujan-Mestras, +1A, capt., apporté en centre de soin, phot., 12 et 13 mars (F. Dissard).
- **Astrild ondulé** *Estrilda astrild* – 2017 – Gard – Vauvert, Petite Camargue, Scamandre, phot., du 28 au 31 mars (L. Précigout *et al.*).
- **Roselin familial** *Erythrura mexicana* – 2013 – Bas-Rhin – Schaffhouse-près-Seltz, mâle +1A, phot., 23 novembre (photos sur www.ornitho.fr).

ANNEXE 3 – LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHN rappelle une nouvelle fois que la plupart des données qui figurent dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Ceci est bien souvent dû à une description trop courte, manquant d'éléments. Il est donc une nouvelle fois conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si a priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée. La non-homologation d'une donnée ne préjuge évidemment pas de l'identité de l'oiseau observé et encore moins de la compétence ou de la crédibilité du (ou des) observateur(s), mais bien du manque de robustesse de la description, notamment au regard des archives du CHN. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non-homologation sont indiquées entre parenthèses.

2017

- Bernache du Canada** *Branta canadensis parvipes* – Nord – Les Moères, phot., 25 janvier (cet oiseau photographié montre effectivement toutes les caractéristiques de la sous-espèce *parvipes*, susceptible d'arriver naturellement en Europe. Malheureusement, il manque d'une comparaison directe de la taille avec d'autres oiseaux. Enfin, le contexte des échappés captifs joue négativement, avec plusieurs sous-espèces maintenues en captivité en Europe, et potentiellement croisées entre elles...).
- Sarcelle à ailes bleues** *Anas discors* – Pas-de-Calais – Saint-Omer, RNN des étangs du Romelaraie, étang Guy Robert Nord, +1A, 20 juin, 27 juillet et 22 septembre (les éléments disponibles ne permettent pas d'éliminer à coup sûr une Sarcelle cannelle *A. cyanoptera* ou un hybride impliquant l'une de ces deux espèces et le Canard souchet *A. clypeata*).
- Aigrette des récifs** *Egretta gularis* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, Amphise, phot., 14 avril (les photos montrent manifestement des critères hybrides avec l'Aigrette garzette *E. garzetta*).
- Pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus* – Hérault – Vic-la-Gardirole, chemin de la Poule d'eau, phot., 4 mars (il s'agit d'un pélican hybride échappé de captivité qui fréquente le littoral méditerranéen depuis quelques temps déjà).
- Buse féroce** *Buteo rufinus* – Indre-et-Loire – Le Louroux, étang du Louroux, 3 juillet (les informations contenues dans la description ne permettent pas de trancher); Doubs – Laviron, la Prax, +2A, 18 janvier (observation malheureusement très brève qui n'a pas permis de noter la coloration précise du dessous du corps et des ailes...).
- Aigle criard** *Aquila clanga* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, +5A, phot., du 29 janvier au 19 février (les documents disponibles, de bonne qualité, montrent des caractères manifestement hybrides); Gard – Saint-Gilles, RNR de Coute, 2A/3A, 12 janvier (cet oiseau est proposé comme hybride avec un Aigle pomarin dans la fiche, et en effet, il en montre les caractères. À noter que ces données, si elles ne peuvent être acceptées comme Aigle criard ou Aigle pomarin, conservent malgré tout un intérêt manifeste et sont conservées comme telles).
- Aigle pomarin** *Aquila pomarina* – Loire-Atlantique – Saint-André-des-Eaux, la Chaussée Neuve, 2A/3A, 15 mai (description malheureusement trop sommaire pour permettre d'éliminer les autres espèces d'aigles, voire un éventuel hybride, même si la date fait ici davantage penser à un Aigle pomarin).

Aigle des steppes *Aquila nipalensis* – Aude – Mouthoumet/Salza, +4A, 5 octobre (rien n'exclut un Aigle royal *A. chrysaetos*, qui semblerait même indiqué dans la description par une queue barrée).

Marouette de Baillon *Zapornia pusilla* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, la Fangouse, mâle +1A cht., 27 avril (description un peu trop succincte d'un contact uniquement auditif).

Outarde barbue *Otis tarda* – Pyrénées-Atlantiques – Ustaritz, 19 juin (observation dans des conditions de lumière très difficiles d'un oiseau qui était en effet probablement une Outarde barbue, par élimination).

Bécasseau à échasses *Calidris himantopus* – Gironde – Lège-Cap-Ferret, 16 octobre (description un peu confuse, notamment des parties inférieures et des pattes, qui ne conviennent pas bien à l'espèce proposée, qui reste d'apparition exceptionnelle en France).

Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis* – Somme – Saint-Valéry-sur-Somme, baie de Somme, +1A, 10 août (observations malheureusement lointaines qui n'ont permis de voir que les joues et le cou décrits comme roux. D'autres critères sont nécessaires pour éliminer avec certitude la possibilité d'une Bécasseau minute *C. minuta* très coloré).

Bécasseau de Baird *Calidris bairdii* – Seine-et-Marne – Lesches, phot., 16 mai (la silhouette est en effet allongée, mais la coloration d'ensemble et notamment les franges rousses des tertiaires indiquent un Bécasseau minute *C. minuta*).

Bécasseau rousset *Calidris subruficollis* – Charente-Maritime – Yves, RNN des marais d'Yves, 1A, phot., 18 septembre (les photos montrent plus probablement un Bécasseau maubèche *C. canutus*).

Bécasseau d'Alaska *Calidris maura* – Gironde – Gujan-Mestras, port de Meyran, 2A, phot., 29 avril (les photographies montrent manifestement un Bécasseau variable *C. alpina* de petite taille, qui effectivement évoque le Bécasseau d'Alaska).

Chevalier bargette *Xenus cinereus* – Bouches-du-Rhône – Arles, Mas-Thibert, Marais du Vigueirat, 30 octobre (description trop courte ne permettant pas d'éliminer d'autres limicoles à long bec).

Chevalier grivelé *Actitis macularius* – Haute-Corse – Biguglia, 1A, 19 septembre (il manque des informations sur le motif des couvertures alaires, l'étendue de la barre alaire, la longueur relative de la queue, ce qui ne permet pas d'éliminer la possibilité d'un Chevalier guignette *A. hypoleucos* aux parties nues colorées).

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes* – Seine-Maritime – Etretat, phot., 23 août (les photographies montrent un jeune Chevalier gambette *T. totanus*, un piège classique...).

Glaréole à ailes noires *Glareola nordmanni* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, Manade Thibaut, Mas du Juge, +1A, 18 juin (c'était sans doute ça, mais l'observation lointaine n'a pas forcément permis d'éliminer la possibilité d'un hybride).

Mouette atricille *Larus atricilla* – Charente-Maritime – Saint-Denis-d'Oléron, pointe de Chassiron, +2A, phot., 3 novembre (fiche essentiellement basée sur des photographies, qui semblent montrer un Goéland brun *L. fuscus* à tête souillée. La courte description ne permet malheureusement pas de contrebalancer cette impression).

Goéland ichthyaète *Larus ichthyaetus* – Gironde – Le Teich, Parc ornithologique, 2A, 21 août (la description pointe effectivement vers cette espèce mais n'est pas suffisante pour une observation ponctuelle, par un observateur seul, et sans photographies, s'agissant d'une potentielle seconde mention nationale).

Faucon gerfaut *Falco rusticolus* – Ain – Saint-Bernard, +2A, 20 février (description nettement trop succincte qui ne permet pas d'éliminer la possibilité d'un faucon hybride échappé de fauconnerie, comme il y en a davantage en France que de Faucons gerfauts...).

Hypolaïs bottée *Iduna caligata* – Maine-et-Loire – La Possonnière, 26 septembre (identification probablement juste, mais un doute subsiste. La description est malheureusement incomplète pour éliminer avec certitude d'autres petits sylvidés comme la Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola* et surtout l'Hypolaïs rama *I. rama*).

Hypolaïs pâle *Iduna pallida* – Loire-Atlantique – La Chapelle-sur-Erdre, le Roty, 24 août (description intéressante mais un certain nombre d'éléments manquent pour éliminer la possibilité d'autres hypolaïs, notamment sans pigments jaunes comme il en existe. L'observation de cette espèce à cette époque, loin de la Méditerranée et dans l'intérieur des terres demande évidemment une evidence complète de doute...).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus fuscus* – Morbihan – Sauzon, Phare des Poulains, 1A, phot., 26 octobre (fiche bien construite et très argumentée qui décrit un oiseau qui effectivement présente des caractères attribués à cette sous-espèce. Il s'avère néanmoins que les variations entre sous-espèces sont clinales et qu'il reste encore des choses à apprendre pour diagnostiquer cette sous-espèce en Europe de l'Ouest. En attendant, le CHN préfère s'en tenir à des analyses génétiques).

Agrobate roux *Cercotrichas galactotes* – Haute-Corse – Baccaggio, Macinaggio, 17 mai (fiche intéressante d'une observation trop brève, qui n'a en fait permis que de voir le dessus de l'oiseau et sa queue à l'envol. Ce qui est décrit pointe bien vers cette espèce, mais vu sa rareté en France, il paraît préférable de s'en tenir à des conditions d'observations plus solides).

Traquet rieur *Oenanthe leucura* – Dordogne – Berbiguières, +1A, 25 mai (description difficile à interpréter comprenant des critères comme « taille supérieure à celle d'un Merle » incompatibles avec cette espèce, au demeurant devenue exceptionnelle en France).

Bergeronnette des Balkans *Motacilla flava feldegg* – Aude – Leucate, Coussouls, mâle +1A, phot., 12 avril (comme proposé dans la fiche, montre des caractères de la forme *superciliaris*); Bas-Rhin – Brumath – mâle +1A, phot., 1^{er} mai (impossible

d'éliminer la possibilité d'une *thunbergi* à la tête sombre); Cantal – Le Fau, Source du Chaumeilhou, mâle +1A, 23 avril (description intéressante à une bonne date, mais il manque de référence à *thunbergi* pour un oiseau qui est malheureusement resté muet); Gironde – Saint-Vincent-de-Paul, mâle +1A, phot., du 4 au 13 avril (montre des caractères de la forme *dombrowski*); Jura – Cramans, mâle +1A, phot., 26 avril (comme proposé dans la fiche, montre des caractères de la forme *superciliaris*); Puy-de-Dôme – Sauviat, les Patûreaux, mâle +1A, 3 mai (une fiche probablement à la limite de ce qui est nécessaire pour trancher entre une *thunbergi* à tête sombre comme il en existe, et une *feldegg*, sachant que le cri décrit n'évoque pas forcément cette dernière); Pyrénées-Orientales – Le Barcarès, lagunage, mâle +1A, phot., 17 avril (comme proposé dans la fiche, montre des caractères de la forme *xanthophrys*).

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, le Vigueirat, Clos des Montures, 1A, 21 août (description indiquant cette espèce, mais la présence sur le même site et la veille d'une jeune Bergeronnette grise *M. alba* dépourvue de taches sombres sur la poitrine rend une confusion possible).

Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* – Finistère – Plogoff, pointe du Raz, 18 octobre (l'oiseau, vu en vol et criant, était plus que vraisemblablement de cette espèce. Mais pour ce type d'observation, le CHN préfère s'appuyer sur des enregistrements).

Bec-croisé perroquet *Loxia pytyopsittacus* – Pas-de-Calais – Gonnehem, 13 octobre (quelques observations de becs-croisés émettant des cris bien différents de ceux habituels du Bec-croisé des sapins *L. curvirostra* ont été faites dans le cadre de l'afflux de Becs-croisés perroquets dans le nord de l'Europe à l'automne 2017, et il est possible qu'elles concernent toutes cette espèce... Comme pour les autres passereaux vus en vol, le CHN préfère néanmoins s'en tenir aux observations avec photos et/ou enregistrements).

Bruant rustique *Emberiza rustica* – Jura – Pagny, ancienne gravière, 11 février (observation brève et description qui omet beaucoup de critères diagnostiques de cette espèce).

2016

Cormoran pygmée *Phalacrocorax pygmaeus* – Gard – Saint-Laurent d'Aigouzes, du 8 janvier au 20 février (c'était probablement ça, mais la description est vraiment trop sommaire pour supporter cette identification aux yeux des archives).

Buse féroce *Buteo rufinus* – Ain – Chaleins, le Fournieux, 21 mars (description insuffisante qui ne permet pas d'éliminer la possibilité d'une Buse variable *B. buteo* atypique); Yvelines – Les Bréviaires, étang de Pouras, phot., 30 novembre (les photographies incluses montrent qu'il s'agit plus probablement d'une Buse variable *B. buteo*).

Aigle criard *Aquila clanga* – Bouches-du-Rhône/Gard – Camargue et Petite Camargue, phot., du 6 novembre au 5 mars 2017 (photos malheureusement trop lointaines pour éliminer la possibilité d'un hybride); Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, +3A, phot., du 19 novembre au 19 février 2017 (de bonnes photographies pointent des caractères hybrides); Somme – Cayeux-sur-Mer, Hâble d'Ault, 9 février (manifestement un grand aigle, mais description insuffisante pour aller plus loin); Gard – Vauvert, phot., 14 mars (les documents fournis ne permettent pas d'exclure un hybride).

Aigle pomarin *Aquila pomarina* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, le Sambuc, +4A, 31 août (fiches trop sommaire sans détail sur les critères diagnostiques, la date n'excluant pas un hybride).

Gravelot semipalmé *Charadrius semipalmatus* – Loire-Atlantique – Bourgneuf-en-Retz, 18 septembre (le cri mentionné indique cette espèce, mais l'oiseau n'a pas été observé correctement, ce qui est insuffisant pour valider cette donnée).

Bécasseau falcinelle *Calidris falcinellus* – Bas-Rhin – Plobsheim, plan d'eau de Krafft-Plobsheim, phot., 11 novembre (les photographies montrent un Bécasseau variable *C. alpina* en plumage hivernal).

Bécasseau minuscule *Calidris minutilla* – Charente-Maritime – Saint-Just-Luzac, Moulin des Loges, 1A, phot., du 30 novembre au 6 décembre (certaines photos au moins montrent ce qui semble plutôt être un Bécasseau variable *C. alpina* avec les pattes teintées par la vase).

Chevalier à pattes jaunes *Tringa falvipes* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, Mas-Thibert, Marais du Vigueirat, 3 mars (la description est malheureusement trop juste pour exclure la possibilité d'un Chevalier sylvain *T. glareola*).

Mouette de Bonaparte *Chroicocephalus philadelphia* – Rhône – Lyon, Parc de la tête d'or, +2A, phot., 13 janvier (ni la description ni la photo ne permettent d'éliminer une Mouette rieuse *C. ridibundus*).

Faucon gerfaut *Falco rusticolus* – Pas-de-Calais – Audighen, 1A, 4 décembre (la description proposée ne permet pas d'aller au-delà d'un grand faucon indéterminé ou hybride).

Pie-grièche masquée *Lanius nubicus* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, plage de Piémanson, 4 avril (observation lointaine et aux jumelles, aboutissant à une description insuffisante pour éliminer par exemple un hybride).

Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* – Bouches-du-Rhône – Arles, Marais de Beauchamp, enr., 12 octobre (le cri enregistré correspond à celui d'un Pouillot véloce *P. collybita*).

Pouillot de Hume *Phylloscopus humei* – Aude – Port-la-Nouvelle, 19 novembre (observation brève et frustrante des dires mêmes de l'observateur, qui n'aura pas permis d'écarter un Pouillot à grands sourcils *P. inornatus* au cri atypique).

Pouillot brun *Phylloscopus fuscus* – Pyrénées-Orientales – Saint-Nazaire, La Plassa, 28 mars (la description est un peu trop sommaire, en particulier pour une donnée printanière, même s'il s'agit possiblement de l'espèce proposée); Finistère – Ouessant, Stang Meur, du 20 au 21 octobre (fiche malheureusement vraiment trop incomplète).

Pouillot montagnard *Phylloscopus sindianus* – Vendée – Île-d'Olonne, observatoire de Chanteloup, phot., enr., 3 et 4 novembre (oiseau très intéressant, cependant les documents ne permettent pas d'apprécier des éléments très importants comme la coloration du sourcil, les franges des rémiges primaires, ou encore la coloration des doigts. Il s'agirait ici d'une première française pour une espèce très occasionnelle en Europe).

Fauvette babillarde orientale *Sylvia curruca minula/margelanica/halimodendri* – Finistère – Ouessant, Kerhuel, phot., 20 octobre (l'identification de ce groupe de taxon nécessite de bonnes photos des retrices externes et des enregistrements du cri, ce qui n'a malheureusement pas été le cas ici).

Fauvette des Balkans *Sylvia cantillans albistriata* – Savoie – Motz, phot., mâle, +1A, 2 avril (les photos ne permettent pas d'être certain de la sous-espèce proposée et le cri n'a pas été entendu); Aude – La Roque-de-Fa, phot., mâle, 12 avril (l'oiseau photographié correspond à un oiseau de la sous-espèce *inornata* à moustaches marquées).

Grive à gorge rousse *Turdus ruficollis* – Calvados – Sept-Vents, la Redantière, 9 mai (description malheureusement insuffisante pour une espèce d'apparition aussi exceptionnelle en France et en Europe de l'Ouest).

Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* – Nord – Loon-Plage, arrière-port de Dunkerque, 10 novembre (observation en voiture durant quelques secondes qui a permis de relever des critères qui effectivement correspondent à l'espèce, mais un doute lié aux conditions d'observation subsiste...).

Bergeronnette des Balkans *Motacilla flava feldegg* – Var – Fréjus, base nature, phot., 29 avril (ni la description ni les photos ne permettent d'être certain de l'identification de cette sous-espèce).

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* – Aude – Narbonne, Grand Castelou, phot., ad, 14 avril (les documents fournis ne permettent pas d'exclure une Bergeronnette flavéole *M. flava flavissima* ou un hybride comme il en existe); Manche – Créances, 1A, 28 août (les critères diagnostiques ne sont pas mentionnés, difficile d'acquiescer des certitudes sur cette base).

Bruant nain *Emberiza pusilla* – Bouches-du-Rhône – Marignane, plage du Jai, 11 décembre (description trop sommaire pour éliminer par exemple un Bruant des roseaux *E. schoeniclus*).

Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephala* – Nord – Dunkerque, digue du Braek, phot., fem., du 6 au 7 novembre (bonne fiche avec nombreuses photos, mais les éléments disponibles ne permettent pas d'exclure un hybride, les difficultés d'identification étant accrues chez les jeunes femelles. Cette fiche sera néanmoins incluse dans la révision à venir des fiches de femelles de cette espèce).

34. Chevalier grivelé *Actitis macularius*, Serrières-de-Briord, Ain, décembre 2016 (Vincent Palomares). *Spotted Sandpiper*.





35. Macreuse à front blanc
Melanitta perspicillata, mâle,
La Ferté-Bernard, Sarthe,
janvier 2017 (Fabrice Jallu).
Male Surf Scoter.

2015

Pouillot brun *Phylloscopus fuscus* – Bouches-du-Rhône – Les Saintes-Maries de la Mer, phot., 10 janvier (les photos montrent un Pouillot véloce *P. collybita*).

Traquet oreillard oriental *Oenanthe hispanica melanoleuca* – Charente-Maritime – Saint-Pierre-d'Oléron, le Cleune, fem, phot., du 8 au 10 juin (oiseau trop pâle et à poitrine trop chaude pour confirmer l'identification, qui au demeurant est loin d'être aisée).

Bergeronnette des Balkans *Motacilla flava feldegg* – Gironde – La Teste-de-Buch, prés salés, mâle, phot., 21 avril (il pourrait s'agir plus probablement d'un oiseau de la sous-espèce *thunbergi*).

2014

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* – Bouches-du-Rhône – Arles, Camargue, nord Vaccarès, phot., +4A, 3 mai (il s'agit vraisemblablement de l'hybride bien connu dans ce secteur).

2012

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* – Pas-de-Calais – Marck, Hemmes de Marck, Nord, phot., 134 ind., 22 septembre (ce groupe d'oies a été observé de très loin et vu également le même jour au cap Gris-Nez. L'effectif impliqué et la date ne peuvent effectivement correspondre qu'à l'Oie à bec court, mais les éléments de description, photos comprises, ne permettent pas de s'en assurer complètement).

2011

Aigle pomarin *Aquila pomarina* – Gard – Bellegarde, 4A, 8 mai (la date semble indiquer cette espèce en effet, mais il s'avère que les hybrides avec l'Aigle criard *A. clanga* peuvent non seulement ressembler beaucoup à l'Aigle pomarin, mais aussi adopter son calendrier de migration...).

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus caudatus* – Alpes-Maritimes – Cabris, 2 ind., phot., 9 février (les photos montrent des oiseaux ne correspondant pas aux individus typiques de la sous-espèce proposée).

2010

Pélican frisé *Pelecanus crispus* – Lyon – Vaulx-en-Velin, Parc de Miribel-Jonage, +4A, 6 février (l'élément le plus probant dans la description est la poche gulaire orange, mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour écarter la possibilité d'un hybride comme il en existe en captivité).

Aigle pomarin *Aquila pomarina* – Haute-Savoie – Vulbens, 10 octobre (trop peu d'éléments pour déterminer cet aigle).

Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* – Charente-Maritime – Saint-Denis-d'Oléron, Port de Chassiron, +4A, 17 août (l'identification des adultes de cette espèce demande une photographie de bonne qualité du dessus de l'aile ouverte, ce qui n'est pas le cas ici).

1977

Pétrel de Bulwer *Bulweria bulweri* – Hérault – Frontignan, en mer, 7 juin (dans le cadre de la révision des données françaises de l'espèce, le CHN a examiné les éléments disponibles pour ces données anciennes. Ici, la description ne permet pas d'exclure l'Océanite de Swinhoe *O. monorhis* ni même un engoulevent *Caprimulgus* sp.).

Entre 1850 et 1900

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* – Doubs – Individu naturalisé au Muséum d'Histoire Naturelle de Montbéliard, phot., 1A (la biométrie est celle d'une jeune Bergeronnette grise *M. alba*). Cette donnée constituait jusqu'à présent la première mention française de l'espèce (V. *Ornithos* 16-6 : 408).

REMERCIEMENTS

Le CHN tient une nouvelle fois à remercier tous ceux qui, en 2016 et 2017, ont contribué à son fonctionnement :

- avant tout, l'ensemble des ornithologues et photographes ayant contribué à cette synthèse par la rédaction de fiches et l'envoi de photographies, sans qui le CHN ne pourrait pas fonctionner ;
- les responsables de comités d'homologation régionaux, d'associations ou organismes collectant des données : Christian Dronneau, Alain Fossé, Xavier Hindermeyer, Grégory Juppet et Cédric Peignot ;
- Julien Gernigon, Sophie Meriotte, Dominique Michelat, Julien Piette, Fabien Toulotte ont soit apporté des informations complémentaires, soit aidé au traitement des données ;
- pour leurs relectures et conseils avisés : Pierre-André Crochet, Julien Gonin, Hugo Touzé et Frédéric Veyrunes.
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la revue *Ornithos*, partenaires historiques du CHN, pour l'aide financière nécessaire à la réunion plénière annuelle.

BIBLIOGRAPHIE

• AUDEVARD A. (2018). Observation d'une Alouette monticole *Melanocorypha bimaclata* à Hyères en 2015 : première mention française de l'espèce. *Ornithos* 25-5 : 312-317. • COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE (2016). Liste officielle des Oiseaux de France – version 2016 (Catégories A, B et C). *Ornithos* 23-5 : 254-271. • DUFOUR P., PONS J.-M., COLLINSON J.-M., GERNIGON J., DIES J.-I., SOURROUILLE P., & CROCHET P.-A. (2017). Multilocus barcoding confirms the occurrence of Elegant Terns in Western Europe. *Journal of Ornithology* 158(2) : 351-361 (doi 10.1007/s10336-016-1380-0). • FLUITI A. & ROCHA É. (2014). Un Fou à pieds rouges *Sula sula* sur un lac provençal : première mention française de l'espèce. *Ornithos* 21-3 : 158-161. • GAILLY D. & HAAG C. (2018). Première mention française de la Fauvette de l'Atlas *Sylvia deserticola*. *Ornithos* 25-4 : 240-243. • GUILPAIN J.-M. & VINCENT S. (2018). Première mention française du Pouillot de Temminck *Phylloscopus coronatus*. *Ornithos* 25-2 : 121-124. • HELLQUIST A. (2016). Identification of female Pine Bunting – new pieces to the puzzle. *Dutch Birding* 38 : 129-146. • ISSA N. & RÉVELLAUD P. (2018). Premier hivernage prolongé d'un Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* en France. *Ornithos* 25-1 : 176-178. • KAYSER Y. & CLEMENT D. (2013). Un Martinet cafre *Apus caffer* dans l'Hérault en juin 2011 : première mention française. *Ornithos* 20-3 : 188-191. • PONS J.-M. (2018). Premières mentions validées du Vautour de Rüppell *Gyps rueppellii* en France. *Ornithos* 25-1 : 44-49. • PROVOST P. (2017). Un Fou à pieds rouges *Sula sula* aux Sept-Îles, Côtes-d'Armor : deuxième mention française. *Ornithos* 24-5 : 300-301. • REYT S. (2017). Première mention de l'Ammomane élégante *Ammomanes cinctura* en France. *Ornithos* 24-5 : 294-297. • WROZA S., ROCHEFORT J. & DALLET B. (2018). Suivi acoustique d'un groupe de Becs-croisés perroquets *Loxia pytyopsittacus* hivernants. *Ornithos* 25-3 : 162-168.

SUMMARY

Rare birds in France in 2016 and 2017. *The year 2016 was an average year for most rare species in France, though with higher numbers for many passerines. Among the best surprises were 4 migrant passerine species new for France: Bar-tailed Desert Lark, Tristram's Warbler, Eastern Crowned Warbler and Eastern Yellow Wagtail (a bird belonging to Eastern Asian subspecies of the Yellow Wagtail). A Bimaculated Lark observed in 2015 was also the first for France. Also of interest were the second Long-toed Stint and White-rumped Swift. The 5th Dusky Thrush occurred 20 years after the previous record. A few species occurred in unusual numbers, such as Citrine Wagtail (11 individuals), Pallas's Leaf Warbler (20 individuals), Hume's Leaf Warbler (7 individuals) and Little Bunting (13 individuals, breaking the 2015 record of 12 individuals). Finally, this year was also good for Franklin's Gull (5 individuals). The year 2017 produced the 2nd French record of Red-footed Booby and Lanceolated Warbler, the 3rd Lesser Short-toed Lark, the 4th Royal Tern, the 4th and 5th Red-necked Stints and the 5th Steppe Eagle. Noteworthy are a group of eight Lesser White-fronted Geese and record numbers of Wilson's Storm Petrel (13 individuals), Solitary Sandpiper (2), Olive-backed Pipit (5) and Parrot Crossbill (28). From 1st January onwards, records of Little Bunting and Broad-billed Sandpiper will no longer be considered by the French Rarities Committee.*

CHN c/o LPO, CS 90263, 17305 Rochefort Cedex (homologation.chn@gmail.com) ■