



Cultivo tivo de servicio

A stylized illustration of a plant with a thick, grey, carrot-like root system and several green leaves with white veins. The plant is positioned behind the text 'Cultivo tivo de servicio'.

© 2023 Zinma Seeds Company, Inc

FICHA TÉCNICA



Cultivo de Servicio

Rabanito Forrajero BOKITO

© 2023 Zinma Seeds Company, Inc

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo	Cultivo de Servicio
Ciclo de producción	-
Ciclo	Intermedio
Estructura de planta	Erecta

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

Aporte de materia orgánica, control de nematodos y control de malezas.

MANEJO

Compatibilidad con otras especies	Tréboles y gramíneas
Ambiente recomendado	Loma y media loma
Densidad de siembra (kg/ha)	
• Cultivo puro	10 - 15
• Consociado	5 - 10

ZINMA SEEDS

Ruta 32 Km 111
Pergamino
Buenos Aires
Argentina

Tel.

2477 466 190
2477 690 970

info@zinmaseeds.com
www.zinmaseeds.com

Características

Variedad de rabanito forrajero (*Rapahanus sativus* sp. *oleiferus*) que produce una gran cantidad de biomasa. Ideal para incrementar la materia orgánica. Y, sobre todo eso, es resistente a nematodos del quiste. Tiene muy buena capacidad de rebrote luego de un corte o pastoreo.

Manejo Recomendado

La cama de siembra debe estar fina y firme. Profundidad de siembra: 1 - 2 cm.
Fecha de siembra: desde mediados de primavera a fin de verano.
La densidad de siembra dependerá de la fecha de siembra y textura del suelo. Fechas de siembra temprana se pueden sembrar con menor densidad, y en suelos pesados aumentar la densidad.
Fertilización: 60 - 80 kgN/ha en cultivos luego de cereales de invierno. En suelos arenosos aplicar 40 kgN/ha luego de la siembra y 40 kgN/ha luego del primer mes de emergido.