

ලමා සෞඛ්‍ය සහ සංවර්ධන සටහන
සිතුවම් ඉරිදි මගින් විරුද්ධීය ප්‍රතිකර්ම
CHILD HEALTH AND DEVELOPMENT RECORD



SAMPLE

NOT FOR USE

FAMILY HEALTH BUREAU

MINISTRY OF HEALTH

SRI LANKA

නම
පෙර
Name



Family Health Bureau



Ministry of Health

Revised 2015

දරුවාගේ පරික්ෂා කිරීම
பார்வை நிலையப் பரிசோதித்தல்

(මෙම කොටස මෙ / සො / රැකබලන්නන් විසින් පිරවීම සඳහා)
 (தாய் / தகப்பன் / பராமரிப்பவர்களால் நிரப்பப்படல் வேண்டும்)

ඉපදී පළමු මාසයේ සිට **බිම් කැන** **1෦෦෦** **මාසයේ**
ஆம் இல்லை

අලුත්කම දෙසට පැරණි අයුරු
 යොමුකරනවාද?

පැරණි බිම් ඉහල දෙසට යොමු
 කරනවාද?

මාස 6 වන විට
 බඩ ඉහල දෙසට හැරවීමේදී බඩ
 දෙසට බලා දරවා පිහිටාත්මකව
 සිටියාද?

එවිට දරුවාගේ අස් දෙසට එකට
 වලකය වේද?

මාස 6 වන විට
 දරුවා විමසීමෙන් අපට බලන්නේද?
 දරුවා අත දිගේ කර යමක් ඇල්ලීමට
 උත්සාහ කරන්නේද?

දරුවාට වටපිටියේ ඇති බවට බඩ
 සැක කරනවාද?

මාස 10 දී
 දරුවාට මාසපැතිල්ල හා දඩට
 ඇතිල්ල ආබාධයෙන් ඔබා දවස
 අනුව ගැනීමට සැකිලියක් ඇත්ද?

මාස 12 දී
 බිම් දරුවා නොසෙස් දේවල් දෙසට
 අත දිගු කොට එවා ඉල්ලනවාද?

සලකන පුද්ගලයින් දුටුවීම ඔවුන් දරුවාට
 කරා කිරීමට පෙරම දරුවා බලන්නට
 සලකන්නවාද?

බිම් දරුවාගේ පෙතිම පිළිබඳ යම් සැකයක්
 ඇත්නම්/දරුවාට වටපිටියේ ඇතැයි පෙනී
 යන්නේ නම් හෝ ඉහත අනෙකුත් ප්‍රශ්න
 වලින් එකකට හෝ ඔබේ පිළිතුරු දීමට
 නොහැකි නම් බිම් ප්‍රදේශයේ
 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්/සෞඛ්‍ය
 වෛද්‍ය නිලධාරීන්/වෙනත් වෛද්‍යවරයෙකු
 සමඟින්.

උපදෙස්: මෙහි ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබේ දරුවාගේ වර්තමාන තත්වය පිළිබඳව පමණක් වන බවයි. ඔබේ දරුවාගේ වර්තමාන තත්වය පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් නොමැති නම් ඔබේ ප්‍රදේශයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්/වෙනත් වෛද්‍යවරයෙකු සමඟින් සම්මත කර ගන්න.

දරුවාගේ ඇසීම පරික්ෂා කිරීම
கேட்டல் நிலையப் பரிசோதித்தல்

(මෙම කොටස මෙ / සො / රැකබලන්නන් විසින් පිරවීම සඳහා)
 (தாய் / தகப்பன் / பராமரிப்பவர்களால் நிரப்பப்படல் வேண்டும்)

පරහන් පුද්ගලයන්ට පසු **බිම් කැන** **1෦෦෦** **මාසයේ**
ஆம் இல்லை

සලකන පුද්ගලයන් දුටුවීම ඔවුන් දරුවාට
 කරා කිරීමට පෙරම දරුවා බලන්නට
 සලකන්නවාද?

මාස 1 වන විට
 සලකීමේදී ඇසීමට හෝ දිලීමට පෙනී
 (වැනකකින් පිටතට බිම් දැකීම) බිම්
 කළහා ගැනීමට හා එවැනි කිසිවක්
 සිදුවීමට සලකනවාද?

මාස 4 සිට
 හම මට හෝ රැකබලන්නා පෙනීමට
 හෙතෙමගේ බලන්නේ කර නම් ඇසු
 විට නිශ්චයව සිටියාද?

මාස 7 සිට
 කවි කල වනම මව/රැකබලන්නා
 දෙසට හැරෙන්නේද?

මාස 9 වන විට
 දිනපතා ඇසෙන ඉරු පුරුදු බිම්
 වලට සලකනවාද?

තමාට නොපෙනෙන තැනක සිට කර
 බිම් දැක ගෙන බලන්නේද?

මාස 12 වන විට
 තමාගේ නමට හා අනෙකුත් ඉරු
 බිම් වලට පිහිටා දක්වන්නේද?

බිම් දරුවාගේ ඇසීම පිළිබඳ යම්
 සැකයක් ඇත්නම් හෝ ඉහත ප්‍රශ්න
 වලින් එකකට හෝ ඔබේ පිළිතුරු දීමට
 නොහැකි නම් බිම් ප්‍රදේශයේ
 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්/සෞඛ්‍ය
 වෛද්‍ය නිලධාරීන්/වෙනත් වෛද්‍යවරයෙකු
 සමඟින්.

උපදෙස්: මෙහි ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබේ දරුවාගේ වර්තමාන තත්වය පිළිබඳව පමණක් වන බවයි. ඔබේ දරුවාගේ වර්තමාන තත්වය පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් නොමැති නම් ඔබේ ප්‍රදේශයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්/වෙනත් වෛද්‍යවරයෙකු සමඟින් සම්මත කර ගන්න.

7. දරුවාට සති 4ක් සම්පූර්ණ වූ විට ළදරු ළමා කායනයට ගෙන ගොස් පරීක්ෂා කරවා ගන්න.
8. ඔබගේ දරුවාගේ වර්ධනය කිසි පරිදි සිදුකිරීමක් දැකගැනීමට මසකට වරක් බරද, අරද, පරිදි දැක මැන බලා සටහන් කරවා ගන්න. වර්ධන වේගයට යා යුතු මාර්ගයෙන් වෙනස් වෙන්නේ නම් ළමා කායනයේ අවයව පර්යේෂණයක් ලබා ගන්න.
9. පවුල් ආර්ථිකය

දරුවාට සති 6ක් වන විට පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්/මහජන සෞඛ්‍ය සේවක/සෞඛ්‍ය සේවක නිලධාරී/වෙනත් වෛද්‍යවරයෙක් හමුවී ඔබ හෝ ඔබගේ පවුල් සංවිච්චන ක්‍රමය හා වෙනත් සිරිම අරමුණු, මෙමගින් ඔබට උපුටා දැනීමේදී දරු උපත පමණක් නොව වෙනත් වර්ධනය හා සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කර ගත හැක.

10. ප්‍රතිශක්තිකරණය

වයස (දක්වා ඇති වයස සම්පූර්ණ වූ විට දීමට)	එන්නත	වලංගු වන රෝග
උපතේදී	බී : ඩී : ජී එන්නත	පිදුරුවන් හා ළමුන්ට වැළඳෙන සෛෂ වර්ධන රෝග
මාස 2 සම්පූර්ණ වූ විට	පොලියෝ මුඛ එන්නත 1 පෙන්වා සංයුජ එන්නත 1	• පොලියෝ • ගලපරලය • පිටගැස්ම
මාස 4 සම්පූර්ණ වූ විට	පොලියෝ මුඛ එන්නත 2 අළු පොලියෝ එන්නත (පෙන්වා) සංයුජ එන්නත 2	• කක්කල් කැපීම • පොටෙට්ටිස් බී
මාස 6 සම්පූර්ණ වූ විට	පොලියෝ මුඛ එන්නත 3 පෙන්වා සංයුජ එන්නත 3	• තිමෝටිලස් ඉන්ෆුවෙන්ස් බී රෝග
මාස 9 සම්පූර්ණ වූ විට	සංජීව, සම්මුල්ගය, රුබෙල්ලා 1	• සංජීව, සම්මුල්ගය, රුබෙල්ලා
මාස 12 සම්පූර්ණ වූ විට	ජපන් නිදිකරුවරුදාය	ජපන් නිදිකරුවරුදාය
මාස 18 සම්පූර්ණ වූ විට	පොලියෝ මුඛ එන්නත 4	• පොලියෝ • ගලපරලය, කක්කල් කැපීම.
අවුරුදු 3 සම්පූර්ණ වූ විට	සංජීව, සම්මුල්ගය, රුබෙල්ලා 2	• සංජීව, සම්මුල්ගය, රුබෙල්ලා
අවුරුදු 5 සම්පූර්ණ වූ විට	ද්විත්ව එන්නත (ගලපරලය, පිට ගැස්ම)	• පොලියෝ • ගලපරලය
අවුරුදු 11 සම්පූර්ණ වූ විට	ඒ ටී බී එන්නත (වැඩිහිටි පිටගැස්ම හා ගලපරලය එන්නත)	• පිටගැස්ම, ගලපරලය
	වෙනත්	• කාලිංච බෝවීමේ අවදානමක් ඇති රෝග

11. ප්‍රතිශක්තිකරණයක් පසු ඇතිවන අතුරු ආබාධ පිළිබඳ දැනුවීම

ඔබේ දරුවාට ලබාදෙන එන්නත් උපරිම ගුණාත්මක භාවයකින් යුතු වුවා වේ. එන්නතකින් පසු සෑම අතුරු ආබාධ ඇතිවීමේ අසාධාරණ හේතුවක් නොවේ. (උදා : එන්නත් කල ස්ථානය රතු වීම, ඉදිමීම, සම යට ගැටිත්තක් මතු වීම, මද උණ, සමේ පසු මතු වීම) මෙවැනි සුළු අතුරු ආබාධ සඳහා විශේෂ ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය නොවේ. ඉතාම කලාතුරකින් වෙනත් ගතකිරීමට අවශ්‍යවන තරම් අතුරු ආබාධ ඇතිවිය හැකිය. (උදා : එන්නතකින් පසුව ඇතිවන උණ, වලිඳු පුළු හෝ හදවල අසාත්මිකතාවයන් : හුස්ම ගැනීමේ අසාත්මිකතාවය, ඇසපුරාම පසු මතු වීම වැනි). එන්නතකින් පසු අතුරු ආබාධයක් ඇති වුවහොත් පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ට / මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට / මහජන සෞඛ්‍ය සේවක/ සෞඛ්‍ය සේවක නිලධාරීන්ට හෝ එන්නත දෙනු ලැබූ වෛද්‍යවරයාට වාර්තා කරන්න.

12. දරුවාට වයස මාස 6 සිට මාස 6 කට වරක් වීමේ A අර්ථමාත්‍රා වූ අවුරුදු 5 දක්වා ලබා දෙන්න.

• දරුවාට අවුරුදු 1 1/2 සිට ඔබ්බකුලවලට පසු ප්‍රතිකාරය අවුරුදු 5 දක්වා ලබා දෙන්න.

ඔබට සම් ගණනා ගැටලුවක් ඇතිකම් ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ ප්‍රාදේශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්, ගණනා ගැටලු නිලධාරීන් හෝ වෙනත් වෛද්‍යවරයන් හමුවන්න.

ආහාර දීම

මෙහි සඳහන් වන්නේ සියලු දරුවන් සඳහා පොදු උපදෙස් වන අතර ඒවා දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එක් ආහාර වේලකදී දරුවාට දිය යුතු ආහාර ප්‍රමාණය සහ වේල් ගණනද, ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී එකතු කළ යුතු තෙල් ප්‍රමාණයද, දරුවාගෙන් දරුවාට වෙනස් විය හැක.

උපගත් සිට දරුවාට වයස මාස 6 ක් සම්පූර්ණ වන තෙක්

- මව්කිරි පමණක්ම දෙන්න.
- දුවා ටාච් දෙකෙහිදීම දරුවා ඉල්ලන සෑම විටකදීම මව්කිරි දෙන්න.
- දරුවාට ලැබෙන සිරි ප්‍රමාණයන් ලෙස ඇත්දැයි දැනගැනීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය දරුවාගේ බර මාසයෙන් මාසයට සිට වර්ධන සටහනෙන් සලකනු කර බැලීමයි. තවද, මව්කිරි පමණක් ලබන ළදරුවකු දිනකට වාට 6ක් වත් මුඛා පහකිරීමද, මව්කිරි ප්‍රමාණයන් බවට කාඩකයකි.



දරුවාට වයස මාස 6 සම්පූර්ණ වූ වහාම

- දරුවාට වයස මාස 6 සම්පූර්ණ වූ වහාම එනම් දින 180 ක් පසු මව්කිරි වලට අමතරව වෙනත් ආහාර දීම ආරම්භ කරන්න.
- අමතර වුවද පුළුබ කිරීමට හැකිකම් හා මව්කිරි දොවා තබා ගැනීමට අවදානමක් ඇත්නම් මාස 5 සිට අමතර ආහාර දීම ආරම්භ කළ හැක.
- අමතර ආහාර පදාර්ථ දෙන විට ආරම්භයේදී හොඳින් මත් ගැනන් මත් තලපයට දොවාගත් මව්කිරි ස්වල්පයක් එකතු කර දරුවාට බහිනි වූ විට කවන්න. ඊට පසු මව් කිරි ලබා දෙන්න.
- මත් තලපයෙන් හේ සැඳි 2-3 ක් පමණ පළමු දින දෙන්න. ක්‍රම ක්‍රමයෙන් දෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න.
- දින 3ට පමණ පසු මවට ඇට වර්ගයක් (පරිප්පු වැනි) එකතු කර මත් ගා කවන්න. කුඩු කර ගත් කාල්මැස්සන්, මාළු, කුකුල් මස්, පිඤ්ඤ වැනි යකඩ බහුල ආහාර ද, අමතර ආහාර පදාර්ථ ද, සහිතයකින් පමණ එකතු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. ක්‍රම ක්‍රමයෙන් විවිධ ඵලවතු වං කොපු වර්ගද, එකතු කරන්න.
- දරුවාට වයස එක අගුරු ආහාරය බැගින් සඳහන්ව දෙන්න. එසේ දින 3ක් පමණ දුන් පසු ගැටළුවක් නොමැති නම් තවත් අගුරු ආහාර වර්ගයක් එයට එකතු කරගන්න.
- පරිප්පු, වට්ටක්කා, අඳු කෙසෙල්, අර්භාසල්, කැරට් වැනි ඵලවතු, තම්පල, සාරු, ගොවුකොල, මුකුළුවැන්න වැනි පලා වර්ගද මේ කාලයේදී සඳහන්ව දිය යුතුය.
- දවසට එක් වරක් පොඬු කරගත් / සුරාගත් කෙසෙල්, පැහොල්, ඉඳුණු ඇලි සේර, ඉඳුණු කෙඳි අඹු අඹ, කොමු වැනි පළතුරක් කවන්න.
- දිනකට ප්‍රමාණවේල් 2-3 ක් පමණ ලබා දෙන්න.
- කෑම වේල් අතරට දරුවාට අවශ්‍ය කෑම විටම මව්කිරි ලබාදෙන්න.
- අමතර ආහාර අරඹා සහිතයක් පමණ වන විට එයට තෙල් ස්වල්පයක් එකතු කළ හැකිය : උදා : පොල්තෙල්, උකු පොල්කිරි, බටර්, මාගරන්, තලපෙල් වැනි.



දරුවාට මාස 7 අවසානයේ සිට

සියුම් කැඩලි අඩංගු වන සේ කොළින් පොති කර ගත් මත්, අැව වර්ගයක්, ඝුම්බු සහ ගත් කාල්මස්සන් / මාළු / ඝුඛල් මත්, වළුවළු හා සලු සමග කවත්ත. අභාගට පිසීමට උඤ්ඤාලිකිටි හෝ හෝල් හේ හැන්දක් සමඟ වකඟු සහ ගත්ත. සලඟුරුද දෙන්න. යකඩ සුලඹ අභාගට දීම දරුවාගේ වර්ධනයට හා මොළුය වැඩිමට අත්‍යවශ්‍ය වේ. දිනකට ප්‍රධාන අභාගට වේල් 2-3 ක් දෙන්න. වේල් දෙකක් අතරමැදට මවු සිට දෙන්න.

වරකට අඩු කෝප්පයකින් හාගයකට වඩා වකක් වැඩියෙන් දෙන්න. විකිම මුරු සිරිමට මුමඟුමයෙන් කැඩලි සලුන්වා දෙන්න. අභාගට වල විවිධත්වයක් ඇති කරන්න.

- අභාගට ගැනීමට ගෙදර වෙනම තැනක් සෑදුනම් කර ගන්න. සවුලේ සාමාජිකයින් අභාගට ගත්තා අභාගටය නිරීක්ෂණය කිරීමට දරුවාට අවස්ථාව සලස්වන්න.
- කවන අභාගට ගැන දරුවා සමඟ සවා කරන්න. රස, පාට ආදිය ගැන සිතා දෙන්න.
- අභාගටය කවන අතරතුරේදී මඩ දරුවාට ඇදුරය ඔව දැනෙන්න ඉඩ සෙවන්න.

දරුවාට මාස 8-9 වන විට

- විවිධ අභාගට වලට මුරු සිරිම ඉතා වැදගත්ය
- ප්‍රධාන වේල් 3-4 ක් (වරකට අඩු කෝප්පයකින් හාගයකට වඩා) වකක් වැඩියෙන් දෙන්න. මෙම ප්‍රධාන වේල් අතරමැදට පෝෂ්‍යදායී කෙටි අභාගට වේල් දිනකට 1-2ක් දෙන්න.
- තරමක අභාගට කැඩලි සලුන්වා දිය යුතුය.
- දරුවාට අභාගට වීමෙන් කප දීමෙන් වැළකින්න.
- මේ වයසේදී ඇතිලිවලින් අල්ලෙන කැමට හැකි අභාගට දෙන්න.

මාස 9 - 12 දක්වා

- ප්‍රධාන අභාගට වේල් 3-4 ක් (වරකට අඩු කෝප්පයකින් තුන්කාලක් ඔගින) සහ ඒ අතරමැදට දිනකට පෝෂ්‍යදායී කෙටි අභාගට වේල් 1-2ක් (හැමිමු ඇව වර්ග/හැමිමු ඇව වර්ග/ සලඟුරු/වෝගටි වැනි) දෙන්න.
- අභාගට වේලකින් සුදු මවුසිරි ලබා දෙන්න.

මාස 12 සිට

- පෝෂ්‍යදායී සවුලේ අභාගට ලබා දෙන්න. ප්‍රධාන වේල් 3-4 ක් (වරකට සම්පූර්ණයෙන් පුරවන ලද අඩු කෝප්ප වකකට වඩා) සහ කෙටි වේල් 2ක්.
- කිසිම අවස්ථාවක අභාගට ගැනීමට ඔල සිරිමෙන් වැළකින්න. දරුවාට කොළින් ඔබනින වකඟුරු සිට අභාගට දෙන්න. මේ සදහා ප්‍රධාන අභාගට වේලකට පැය 2 කට පමණ පෙර සිට දරුවාට අභාගට පාන (කිරි, විස්කෝඟු, පැණි රස කැම වැනි දෝ) දීමෙන් වැළකි සිටින්න.
- දරුවාට පැණි රස කැම දීම සීමා කරන්න. ඒ වෙනුවට සැවුම් සලඟුරු වැනි දේ සලුන්වා දෙන්න.
- විවිධ අභාගට වර්ග ලබාදීමෙන් අවශ්‍ය සියළුම පෝෂක දරුවාට ලැබෙයි.

මෙහි දරුවාට ලැබෙන අභාගටය ප්‍රමාණවත්දැයි ඔල/ගැනීමට ඇති සහසුම ඔබය හා මුමඟුඟුලව ඔර සිරු ගැනීමය.

දරුවකු රෝග වූ විට අභාගට දීම පිළිබඳ පොදු උපදෙස්

- රෝග වූ විට දරුවකුගේ කැම රුචිය අඩු විය හැකිය. එහෙත්, ඉක්මන් ප්‍රවය සදහා වෙනදාටත් වඩා වැඩි අභාගට ප්‍රමාණයක් දරුවාට අවශ්‍ය වේ. එම නිසා,
 - පෝෂ්‍ය ගුණයෙන් වැඩි අභාගට
 - ඝුම්බු ප්‍රමාණවලින්
 - වැඩි වාග ගහකක් ලබා දෙන්න.
- රෝගය යුග වී සති දෙකක් යනතුරුවත් අඩුම තරමින් වැඩිපුර එක් අභාගට වේලකින් ලබාදෙන්න.
- දරුවාගේ වර්ධනය අඩාල වී ඇත්නම් මෙම වැඩිපුර අභාගට වේල දරුවාගේ ඔර වැඩිවී මාස 6 ක් යනතුරු වත් ලබාදිය යුතුය.
- අභාගට පිළියෙළ කරන විට හෝල් බොදා ගන්න. දරුවාගේ වර්ධනය අනුව එක් එක් දරුවා සදහා බොදාගත යුතු හෝල් ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැක.
- දරුවාට පාචනය වැළඳී ඇත්නම් බීමට ගත්තා දියට ප්‍රමාණය වැඩිපුර අවශ්‍ය ඔැවින් වැඩිපුර කැපවතුර, සලඟුරු යුෂ, හේ හා පිවති බීමට දෙන්න. ඒ සමගම අභාගටද ලබාදෙන්න.

දරුවාගේ මානසික වර්ධනය මැන බැලීම පොදු උපදෙස්

දරුවාට පහත සඳහන් දෑ වලින් සමහරක් කිරීමට නොහැකිනම් තම ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී / වෙනත් වෛද්‍යවරයෙකු සම්මතය. තවද, මව විසින් හැකි සෑම විටකදීම දරුවාගේ මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට ක්‍රියාකාරකම් (උත්තේජනය) කළ යුතුය. තවද, දරුවා සෑදුනම් විට පමණක් උත්තේජනය ලබාදිය යුතු අතර ඒ සදහා දරුවා අකමැත්තක් දක්වන්නේ නම් ඔල සිරිමක් නොකළ යුතුය. එසේ ඔල සිරිමෙන් දරුවාගේ සමස්ත සංවර්ධනය අඩාල විය හැක.

දරුවාගේ මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට උපයෝගී කළ හැකි රජු

- මවුසිරි දෙන සැමවිටම දරුවා ගේ ඇස් ඔබේ ඇස්වලට සුදු කර ගන්න.
- මවුසිරි දෙන අතරතුර ප්‍රදරුවාට ලයන්ජිවන සවා කරන්න/දරු සැළවිලි ගි ගසන්න.
- ප්‍රදරුවාට ඇදුරුගෙන්, සියුම්ව පිරිමදින්න.
- ප්‍රදරුවා නොතකන්න වූ විට එයට හේතුව නොහා ඇදුරුගෙන් ඉරුල් කර ගන්න.
- ප්‍රදරුවාගේ නිස කෙලින් කිරීම ඉක්මන් කිරීමට මුනින් අතට තබන්න.
- දරුවාට සිතාබිමට උනන්දු කරවීමට ඔහු / ඇයගේ සිතාවට ප්‍රතිචාර දක්වන්න.
- නොයෙක් ගබ්දා නතක දිස්වීමත් / කැපී පෙනෙන පාට වලින් යුතු වලනය වන සෙල්ලම් ඔහු ප්‍රදරුවාට ඉනලින් එල්ලා තබා එවා වලනය වන සැටි ඔැලීමට සලස්වන්න.

වයස හති 6 සිට මාස 3 දක්වා ප්‍රදරුවකු

- මුනින් අතට වැසිරි සවින විට නිස එසවීමට පුළුවන.
- එක් තැනක සිට තවත් තැනකට වලනය වන දෙයක් දෙස දිගටම ඔල සිටීමට පුළුවන.
- හැපිසිගේ ඇති වූ විකාල ගබ්දායකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ තම ක්‍රියාකාරිත්වය නැවැත්වීමෙන් හෝ එය වැඩි කිරීමෙන්ය.
- යම් උත්තේජනයක් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලෙස ආ-----ඔ-----ඒ -----වැනි ගබ්දා හැඟීමේ හැකියාව ඇත.
- මව සඳහාගෙන සිතාබිමට පුළුවන.

දරුවාගේ මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට මාස 3 සිට කල හැකි රජු

- ප්‍රදරුවා ඉරුල් කරගන්න. සියගන්න. ඔහු/ඇයට ඇසෙන සේ මවුද සකින්න නිස ගසන්න.
- ප්‍රදරුවාට කතා කිරීමට උනන්දු කරවීමට ඔහු/ඇය හතන නොයෙක් ගබ්දා වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න.
- ප්‍රදරුවාට මුනින් අතට පෙරලීමට උපහාර කිරීමට, මුනින් අතට, උඩු අතට, පැත්තට සිටින්න සවින්න.
- ප්‍රදරුවාට යම් කැණිතයක් සඳහන් අල්ලා ගැනීමට පුරුදු කිරීම සඳහා ප්‍රදරුවාගේ අතට යම් කැණිතයක් දීම එය අල්ලා ගත්පසු කෙමින් ඉවතට අදින්න.
- දරුවාට අත දික් කර යමක් ගැනීමට මුරු සිරිමට ඇත් දුරින් සෙල්ලම් ඔහු තබා එවා ගැනීමට උනන්දු කරවන්න.



මාස 3 - 6 වයසැති දරුවා

- මුඛයේ අතට සිටින විට හිස හා පපුව ඉහළට ඔසවයි.
- ඇතිලි එකිනෙක පටලවා ගනිමින් තම අත් සමඟ කෙල්ලම් කරයි.
- යම් ද්‍රව්‍ය දෙකට අත දිගු කර මුඛ අත්ලෙපීම අල්ලා ගනියි.
- ගනිදියක් ඇසුණු දෙයකට හිස හරවයි.
- තනි අඟුණේ ගනිදි පිට කරයි (ආ--ඩා---ටා---ඩා---)
- ගනිදි නතා) සනාභවයි.



මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට මාස 6 සිට කල හැකි රේ

- තනිවම හිඳ ගැනීමට ප්‍රයෝජනවලට උදව් කරන්න. ආධාර ඇතුළු දරුවා හිඳුවා හැඩීම ආරම්භ කරන්න.
- එකවර අත් දෙකින්ම නාණ්ඩා අල්ලා ගැනීමට අවස්ථාව සලකා දෙන්න.
- ප්‍රදරුවාට අනුකරණය කල හැකි නිත් ඇදගන්නා) සුඛ හැඟිමින් ඔහුට / ඇයට වචන අනුකරණය කිරීමට අවස්ථාව සලකා දෙන්න.
- ඔබේ මුහුණ රෙද්දකින් වසමින් සහ අරිමින් දරුවා සමග හැඟිමුත්තන් කෙල්ලම් කරන්න.
- එකිනෙකට වෙනස් වූ ගනිදි පිට කරන කෙල්ලම් ඔහු ප්‍රදරුවාට දෙන්න.
- ප්‍රදරුවා එළිමහනට ගෙන ගොස් අවට පරිසරය පෙන්වන්න.
- එළිමහන ගෙදර දොරේ සිදුවන කටයුතු අතරතුරේදී දරුවා සමඟ කතා කරන්න.



මාස 6 - 9 වයසැති දරුවා

- උඩු අතට වැහිරි සිටින විට හිස ඔසවයි.
- උඩු අතට පිට මුඛයේ අතවත්, මුඛයේ අතට පිට උඩු අතවත් හැරෙයි/පෙරලෙයි.
- එක් අතකින් අනිත් අතට යම් යම් දේ මාරු කරයි.
- යම් හැඩක් හැඩත හැඩත ගනිදි කරයි - ඩා -- ඩා -- ඩා) - ටාටා--


මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට මාස 9 සිට කල හැකි රේ

- තද පැහැලි ඔහුසිටත් මත සිට ගැනීමට ප්‍රයෝජනවලට උදව් කරන්න.
- නාඪකයකට යම් ද්‍රව්‍ය දැමීමටත්, ඉන් ඉවතට ගැනීමටත් ප්‍රයෝජනවලට අවස්ථාව සලකා දෙන්න.
- එළිමහන ගෙදරේ කරන වැඩ ගැන දරුවා සමඟ කතා කරන්න.
- ප්‍රදරුවාට නොයෙක් පින්තූර පෙන්වා එවායේ නම් කියා දෙන්න.
- ප්‍රදරුවා සමග කෙල්ලම් කරන්න.



වයස මාස 9 - 12 වයසැති දරුවා

- උදව් හැතිව හිඳ ගනී.
- තනිවම අල්ලාගෙන සිට ගනී.
- ගනිදි අනුකරණය කරයි.
- තනි වචන උච්චාරණය කරයි. හේරාමක් ඇති ගනිදි පිට කරයි.
- සරල උපදෙස් හේරාමී ගනී. උදා: අත්පුඩු ගැසීම, අත වැනීම (සුඛ ගැනීමේදී).



මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට මාස 12 සිට කල හැකි රේ

- ප්‍රදරුවාට ඇතිලිමට අවස්ථාව සලකා දෙන්න.
- හිටහේ ඇති පුරු පුරුදු දේවල් ගැන අසන්න.
- ප්‍රදරුවාට මෝලයක් පෙරලීමට අවස්ථාව සලකා දෙන්න.
- පවුලේ කාමරයකින් ආහාර ගන්නා විට ප්‍රදරුවා ද ඊට සහභාගි කරවාගන්න. අතින් අල්ලා ගෙන තනිවම කැ හැකි ආහාර අතට දෙන්න.
- තනිවම අතින් අරඟෙන කැම සඳහා ඔත් ඇට කිහිපයක් පිකානකට දමා දෙන්න.
- එළිමහන ඔබ දැකීම. කරන නොයෙක් දේ පිළිබඳව දරුවා සමඟ කතා කරන්න.
- විවිධ දේ විස්තර කිරීමට නිවාදැරි වචන පාවිච්චි කරන්න.




මාස 12 - 18 වයසැති දරුවා

- උදව් ඇතිව ඇතිලිමට පුහුණු.
- අඹුම ගණනේ වචන 2-3 ක් වත් කීමට පුහුණු. උදා - දෙන්න, අර.
- පුරු පුරුදු දේවල් ගැන ඇසු විට අත දිගු කර පෙන්වයි.
- ඛුඩා මෝලයක් පෙරලිය හැක.
- අඹුම වගයෙන් ගරිටයේ එක කොටසක්වත් (හනා, කට, ඇස වැනි) හඳුනා ගත හැක.
- මතපට ඇතිල්ල හා දඹර ඇතිල්ල උපයෝගී කරගෙන ඛුඩා දේවල් අනුමා ගනී.


මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට මාස 18 සිට කල හැකි රේ

- දරුවාට පති හැඟීමට අවස්ථාව සලකා දෙන්න.
- විශාල මෝලයක් අල්ලන හා විකි කරන ආකාරය පෙන්වන්න.
- දරුවාට ගරිටයේ අවසාන කැපුණ්ඩා දෙන්න.
- දරුවාට තම ඇඳුම් ගැලීමට අවස්ථාව ලබාදෙන්න. අසන ප්‍රශ්න වලට සරල වචන භාවිතා කරමින් සැමවිටම පැහැදිලි කිරීමක් ලබාදෙන්න.
- ඔබ එළිමහන කරන, දකින නොයෙක් දේ පිළිබඳව දරුවා සමඟ කතා කරන්න.



මාස 18 - අවුරුදු 2 වයසැති දරුවා

- උදව් හැතිව ඇතිලි.
- උදව් ඇතිව පති කලී.
- බිලෙක්ස් 2-3 ක් ගොදාගෙන ඛුණක් සාදයි.
- වචන 10 ක් පමණ කතා කරයි. අඹුම ගණනේ වචන 2 ක් සකින වාක්‍යයක් වත් කතා කිරීමට හැකිය. උදා : තාත්තා එන්න - කාරය දෙන්න.
- සිය ගැනීමට හොල් උල් කරයි.



මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට අවුරුදු 2 සිට කල හැකි රදේ

- තනි කඟුලෙන් සිට ගෙන ගෙටරෙස් සමබන්ධතාවය රැකීමට දරුවාට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.
- දරුවාට කප්පාදක්, සරල චේතනාමය, මුහුණක් ඇඳීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.
- දරුවාට තම අත්දැකීම් ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.
- මළ මුහු පන කිරීමට වැසිකිලි භාවිතය පුරුදු කරන්න-නමුත් බලකරන්න එව.
- දරුවාගේ දත් පිරිසිදු කිරීමට හැකිවන තරම්. මවගේ පදවී ඇතිව දත් මෙදින්න.



අවුරුදු 2 - 3 වයසැති දරුවා

- වැටෙන්නේ නැතිව දිවීමට හැකිවන අත.
- වැටෙන්නේ නැතිව පැනීමට දිගේ ඉහල පහල යාමට හැකිය.
- උවුමක් / වඟු සහිත රූපයක් ඇඳීමට පුලුවන.
- වචන 3 ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් වාක්‍යයක් ගෙන හැටීමට හැකිවන අත.


මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට අවුරුදු 3 සිට කල හැකි රදේ

- තනි කඟුලෙන් පැන පැන යාමට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.
- සෙල්ලම් බඩු එකට ගෙන ගැනීමට හා ඔමානුකූලව අසුරා තැබීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.
- නොයෙක් රූප හා වර්ණ පාදකා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.
- තනිවම තම කඟුල් කෝදා පින ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.



අවුරුදු 3 - 4 වයසැති දරුවා

- තනි කඟුලෙන් සිට ගනී.
- පහිසකින් පැනීමට හැකිය.
- සපත්තු දැමීම හා ඇඳීම ඇදී ගැනීම කල හැක (මොත්තම් දමා ගැනීම හැට).
- වාග්‍ය හා රටා පිටපත් කරයි.
- භූතව ගණන් කරයි.
- අඩුම තරම්ත් උඩ-පට, ලහ-දුර වැනි පද දෙකක්වත් දකී.
- සම්පූර්ණ හා සමහර විට සංකීර්ණ වාක්‍ය පවා භාවිතා කළ හැකිය.




මානසික වර්ධනය දියුණු කිරීමට අවුරුදු 4 සිට කල හැකි රදේ

- දරුවාට තනි කඟුලෙන් පැනීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් වලට ඉඩ ලබා දෙන්න.
- පින්තූර කැපීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්න.
- දරුවාට තම ඇඳුම් වල බොත්තම් දමා ගැනීමට පුරුදු කරන්න.
- ස්තූතිය, කරුණාකර වැනි භාවිතා කළ යුතු සමාජ ආචාර පුරුදු කරන්න.
- දරුවා අසන ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න. ප්‍රශ්නවලට බොරු පිළිතුරු සැපයීම හෝ පිළිතුරු සැපයීම පමණක් නොකරන්න.
- කණිට යාම, ආහාර පිසීම, සෙල්ලම් බඩු පිළිවෙලකට අසුරා ගැනීම වැනි පවුලේ ක්‍රියාකාරකම් වලට දරුවා සහභාගී කරවාගන්න.



අවුරුදු 4 - 5 වයසැති දරුවා

- තනි කඟුලෙන් පැනීමට හැකිය.
- තනිවම ඇඳුම් ඇඳගනී.
- තනිවම ආහාර ගනී.
- සරල මිනිස් රූප ඇඳීමට හැකිවන අත.
- සෙල්ලම් කරන විට අන් දරුවන් හා සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරයි.
- ක්‍රියා පදය, අතිත, වර්තමාන සහ අනාගත කාල වලට අනුව නිවැරදිව භාවිතා කරමින් පින්තූරයක් විස්තර කළ හැක.
- තම නම සහ වයස ප්‍රකාශ කල හැක.



නියුණු මාපියවර

මාපියවර අතිශය තෘප්තිමත් එහෙත් ඉතා බැරපැරැම් කර්තව්‍යයකි. "නිවැරදි තොරතුරු හා දැනුම ලබා ගැනීම තුළින් දෙමාපියන් වන ඔබට එයින් සතුටක් ලැබෙනවා" පමණක් නොව ප්‍රීතීමත් හා මනා සැකිලිමත් ඇති දරුවන් සඳුවනාගන්නන් පුලුවන."

සන්නිවේදනය : කටා, කිරීම හා සවන්දීම

- සහායක මනා සෙත්වීම් වෙනුවට වනාන්ත මනා සෙත්වීම් කරන්න
- වනාන්ත ව ජේට්ට් ප්‍රකාශ කිරීමේ දී ළමයින් ඒවාට බොහෝ සෙයින් එකඟ වෙති. උදාහරණයක් වශයෙන් පුළු පද්දන වනා කිරීමෙන් වය නැවත කිරීමට පෙළඹීමට ඉඩ ඇත. එහෙත් පුළුලේ කෙළින් ඉදිගර්භෝන නොදැයි හේද කියා කිරීමෙන් වයට ඇපුම් කර දීමට පෙළඹෙන්න පුළුවන.
- දරුවා ඉදිරියේ මුහු/ඇස සිටින බව නොහඟා දරුවා ගැන කතා කිරීමෙන් වළකින්න
- දරුවන්ගේ වැරදි ඔවුන්ට ඇසෙන්නට වෙනත් කෙනෙකුට කිවීමෙන් ඔවුන් අනාගතයේ එම වැරදි නොකරයි කියා සමහර දෙමාපියෝ සිතති. එහෙත් වය වසේ වන්නේ නැත. වය දරුවාගේ හිතට වේදනාවක් ඇති කරන අතර මව්පියන් පිළිතුරු කිරීමට ද ඉඩ ඇත.
- දරුවාට සම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වූ විට වනා මැදිහත් වී එය විසඳන්නට යාමත් එහරම් සුදුසු නැත ඒ වෙනුවට දරුවා සමග එකතු වී එම ප්‍රශ්නය විසඳීමට උත්සාහ කරන්න. අනාගතයේ ඇති වන ගැටලු විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය පුහුණු හා ආත්ම විශ්වාසය එයින් ලැබේ.
- දරුවා වෙනත් දරුවකු සමග සැසඳීම
- සම් අකාරයකින් සිය දරුවාට වඩා වැඩි හැකියාවක් ඇති දරුවකු සමග සැසඳීම සුදුසු යැයි සමහර දෙමාපියෝ සිතති. මෙය දරුවාගේ ආත්මානිමානයට හානිකර වේ. මෙය කිරීමෙන් වළකින්න.

ගාරිටික දැඹුවම් (පහර දීම, කම්බුලට ගැසීම, කණ ඇදීම ආදිය) ළමයින් කික්මවීමේ පිළිසු ම භූමිය ලෙස පමණට දෙමව්පියෝ සිතති. එහෙත් එය කාර්යක්ෂම භූමියක් නොවේ. ලංකාවේ කෙටෑ සම්බන්ධතාවයන් ඊළිව් කික්මවීමේ ගාරිටික දැඹුවම් නිසා දරුවන්ට නොයෙක් මානසික ගැටලු ඇති වෙත බවය. අපේක්ෂිත යහපත් ප්‍රතිඵල (ලබා දෙන බවට පත්වූ විට ඇති වෙතත් විකල්ප විනය ඇති කිරීමේ භූම සිබේ.

- එතනවලට වඩා ශීඛාව කැපී පෙනේ
- දරුවන්ගෙන් තමා භූමත් බලාපොරොත්තු වන්නේද, යන්න ඇදවියට මගින් උගන්වන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් ස්තූතිය යන්න සීම පුහුණු කිරීමට බවට අදායන නම් බව වෙනුවෙන් යමක් කළ විගස ස්තූතිය පවසන්න.
- අවධානය යන නොසලකා හැරීම

ළමාගේ අයහපත් චර්යාවන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. යහපත් චර්යාවන්ට අවධානය දැක්වන්න. අවධානය ගෙන දෙන චර්යාවන් ඔවුන් හදවත හැඩත කරනු ලැබේ. එහෙත් කැ ගැසීම හෝ වේදනාවෙන් තැවීම පවා අවධානය යොමු වන චර්යාවන් බව මතක තබාගන්න. අවධානය කොතෙක්ම නොලැබීමට වඩා කැ ගැසීමෙන්වත් මිනිස්සු කියන අවධානය ලබා ගැනීමට ළමයින් උත්සුක වෙයි. ළමාගේ යහපත් චර්යා පිළිබඳව අවධානය දැක්වීම ඉතා වැදගත්ය. ඔබේ දරුවා නිසැකව පෙනුමක් සියටයි ද, ඔහුට ඇයට චර්යා කාරණා අවධානය ගෙනෙන චර්යාව හැඩත කරනු ලබයි යන මුලධර්මය මතක තබා ගන්න.

- සීමා සියලු කිරීම
- ළදරුවන්ට යන ඇවිදීමට පුරුදු වන දරුවන් කික්මවීමට සීමාවන් පැහැවීම කළ හැකි නොද භූමියකි. උදාහරණයක් වශයෙන් පවස 7න් පසු ව ටැප්පානිකි යන්නට පාරිභිති කිරීමෙන් වැළකිය යුතු නම් එය ළමුට පන්සුන්ට සාමාන්‍ය පරිදි දැනුම් දෙන්න. තවත් වේලාවක් එය නැරඹීමට ළමා මනසෙන් ඉල්ලා සිටියහොත් ටැප්පානිකි නරඹන කාල සීමා මතක්කර දී ටැප්පානිකි වන දමන ලෙස පවසන්න. තව දුරටත් ළමා කණවේ කැමැත්ත සහිතව ඉල්ලා සිටියහොත් ඔබට ටැප්පානිකි යන්නට වන දමන්න. එහෙත් කොපයක් හෝ කළකිරීම් ස්වභාවයක් හෝ නොදක්වා එය කළ යුතුයි.
- පවහන් යන තහනම

ළමාගුගේ යහපත් මුඛ මහ අගය කරන බවට ළමාට පැහැවීමට නොද භූමියක් වන්නේ සටහන් තබා ගැනීමය. උදාහරණයක් වශයෙන් ළමාට රූ කෑම වේලා කිසි පරිදි හා අවසන් කළේද, යනු සටහන් කළ හැකිය. මෙබඳු වත් අවස්ථාවකට හටගත් බැගින් යොදා - තරු සියයක් වත් වූ විට ඒ සඳහා තැග්ගක් දීමද, කළ හැකිය. වැඩිමහල් ළමයින්ට වඩා ඛඩා ළමයින්ට මේ භූමිය යොදාගත හේ.

- කාලය දීම
- දරුවාගේ හැකිම් පාලනය කර තමා කළ දේ එතරම් නොද හැකි මව ගැන කල්පනා කිරීමට ළමාට කාලය දීම තම භූමියකි. මේ සඳහා ළමාට ඛඩා විය හැකි දේවල් කිරීමට නොහැකි පටිපාටියක් තෝවා ගත යුතුය. කාමරයක බඩු රකින මුල්ලෙන්, බඩු ස්ඵලයක් සහිත කාමරයක් යන ස්ථාන පුදුසු කියුණුය. ළමාට පාලනය කර ගත නොහැකි වූ අවස්ථාවක ඔහුට හෝ ඇයට මේ කල්පි තෝවාගත් තැනක ස්ඵලය වේලාවක් (ළමාගේ වයස අනුව) වැඩි වී හෝ හැගිට හෝ සිටීමට පාලනයන්න.

විනය පිළිබඳ පොදු රිති සියපත්

- මව්පිය දෙදෙනා තම ළමයින් නික්මවීමට යොදා ගන්නා භූම පිළිබඳව එකඟත්වයක් තිබිය යුතුය.
- එකම වැරද්දක් සඳහා දෙන දැඩුවම සියලු දරුවන්ටම සමාන විය යුතුය.
- පුත්‍ර තරුණ කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය. සියලු දේ කරන්න. කළ හැකි දේ සමහරක් සියන්න.
- ළමයින්ගෙන් අසාධාරණ ඉල්ලීම් නොකරන්න. ඔවුන්ගේ වයස හා අවස්ථාව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. සිදුකරන වයසෙන් අවුරුදු තුනක ළමාගුගෙන් මේසය මත නොවැටෙන පරිදි අහාර ගැනීම බලාපොරොත්තු විය නොහැකිය.
- ළමයින් සමග කතා කරමින් අන්තර් සබඳතා පවත්වන්න. ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ සැහැදිලි ව දක්වන්න. වැඩිමහල් ළමයින් සමග තර්කාන්විතව සංවාදයේ යෙදෙන්න. කටා කිරීමේදී සහසුන් වන්න.

දරුවාගේ මුඛ සෞඛ්‍යය රැකගැනීම

- මුල්ම සිරි දහ මාස 6-12 අතර කාලයේ දී මතු වේ (කාමාන්‍යයෙන් මාස 9 දී පමණ). අවුරුදු 2 1/2 දී පමණ දත් 20ක් ලෙස සිරි දත් මතු වීම සම්පූර්ණ වේ.
- මාස 12වන විටත් දත් මතු නොවුවහොත් දත්ත වෛද්‍යවරයෙකු හමුවී උපදෙස් ලබා ගන්න.

- දත් මතු වන අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් යටි ඇත්දේ ඉදිරිපස දත් මුලින් මතු වේ. උඩු ඇත්දේ ඉදිරිපස දත් දෙවනුව මතු වන අතර ඉන් පසු මුඛයේ ඉදිරිපස සිට පිටුපස තෙක් දත් භූමභූමයෙන් මතු වේ
- දත් නොමැතිව වුවද දරුවාට අර්ධ ඝන සහ සියුම් කැබලි සහිත මෘදු ආහාර ගැනීමට හැකි බැවින් ආහාර දීම පිළිබඳ ලබා දෙන උපදෙස් නිසි ලෙස පිළිපදින්න.

- කලාතුරකින් උපකේෂ්ම බිලඳකුගේ දත් මතු වී තිබිය හැකිය. එම දත් සෙලවේ නම් ඒවා ගැලවී උතුළට නිටවීමේ අවදානමක් ඇත. එමනිසා දත් කලින් මතු වී ඇති අවස්ථාවලදී උපදෙස් සඳහා ළමා ඇති විශේෂඥ දත්ත සායනය වෙත යොමු වන්න.

දත් ජෝන

- දත් දිවාගාම ඛඩා ළමුන් අතර බහුලවම දක්නට ඇති මුඛ රෝගයයි. ආහාරවල ඇති සීනි මෙම තත්ත්වය ඇති කිරීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකයකි.
- එසේම ආලෝපිකී දත් ගත්තිමත් කර දිවාගාමට ප්‍රතිරෝධයක් ඇති කරයි. නිවැරදිව අනුරුත් ආලෝපිකී දත්තාලේප කාලීනයෙන් නිසි ආලෝපිකී ප්‍රමාණය දා මතුපිටට ලබා දිය හැකිය.
- දත් දිවාගාමේ මුලික අවස්ථාවේ දී කිසිදු අපහසුතාවයක් නොදැනේ. එය පඳුනා ගත හැක්කේ දත් පරීක්ෂා කර වෙනස්වීම් දැක ගැනීමෙන් පමණි. එවිට නිවැරදි ආහාර හා සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කිරීමෙන් මෙම රෝගය තවදුරටත් පැතිරීම පාලනය කර ගැනීමට හැකිය.

එම නිසා ඛඩා ළමුන්ගේ මුඛ සෞඛ්‍යය රැක ගැනීමට පහත සඳහන් මූලික කරුණු අනුගමනය කිරීම වැදගත්ය.

- නිතරට ආහාර රටාවකට ඛඩා කළ සිටීම දරුවා පුරු කරන්න.
 - o හැකි සෑමවිටම නැවුම් පළතුරු, එළවළු හා බාහ්‍ය වර්ග ලබා දෙන්න.
 - o පැණිපා, රසකැවිලි හා බිස්කට්, බිනිස් වැනි ඇලෙන පුළු පිටි සහිත ආහාර සීමා කරන්න.
 - o ළදරු ආහාර-පානවලට සීනි එකතු කිරීමෙන් වළකින්න.
 - o පැණිපා ආහාරවලට පසු වතුර බීමට පුරු කරන්න.
- දරුවාගේ දත් නිවැරදිව මදින්න.
 - o පළමු දහ මතු වූ දා සිට දවසට දෙවරක් දත් මදින්න.
 - o දත් 4ක් මතු වූ දා සිට අනිවාර්යයෙන්ම දත් මුරාසුරාත් හැකිව කරන්න.
 - o වයස මාස 12 ඉක්මවූ පසු ආලෝපිකී සහිත දත්තාලේප ස්වල්පයක් (අනි පටලයක්) අනිවාර්යයෙන්ම යොදා දත් මදින්න.

දරුවාගේ දත් නිවැරදිව පරීක්ෂා කරන්න.

- දත් මතුපිට පුදු හෝ පුඹුරු පැහැ ලෙස ඇතිදැයි පරිගනකට වරක් පරීක්ෂා කරන්න.
- එවන් ලෙස දුටුවහොත් -

- “පැණිපා ආහාර” හැකිතම හැකි පමණ අවම කරන්න.
- දවසට දෙවරක් ආලෝපිකී සහිත දත්තාලේප ස්වල්පයක් යොදා මෙම පුද්ගල විශේෂයෙන් ආවරණයවන ලෙස දත් මදින්න. මෙමගින් මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් පැතිරීම පාලනය කර ගැනීමට හැකිය.
- වැඩිදුර උපදෙස් අවශ්‍යවේ නම් දත්ත වෛද්‍යවරයෙකු හමුවන්න.



பிறந்த குழந்தைகளின் பராமரிப்பு

1. பிர்வசத்தின் பின்னர் கவனிக்கவேண்டியது

- கூடிய விரைவில் குழந்தையை தாயிடம் அரவணக்கக்கொடுப்பதால்
- பிறந்து ஒரு மணித்தியாலத்துக்குள் தாய்ப்பாலூட்ட ஆரம்பிக்கலாம்.
- குழந்தையை உஷ்ணமாக வைத்திருக்கலாம்.
- குழந்தையை சூரியனிலிருந்து பாதுகாக்கலாம்.

- வைத்திய சாலையிலிருந்து வெளியேற முதல்
- குழந்தைக்கு பிச்சீஜி. கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
- தாயிற்கு ஹெர்மீன் A. (மேலதிக அளவு, ருபெல்லா தடுப்பு மருந்து முன்பு கொடுக்கப்படாவிடில்) கொடுத்தல்.

2. குழந்தையை உஷ்ணமாக வைத்திருங்கள்.

- குழந்தையை தாயின் மாரில் போடுங்கள்
- அறைறய சுத்தமாகவும் வெப்பமாகவும் வைத்திருங்கள்.
- குளிர்ய இடுப்பின் குழந்தையை கவனிக்காமல் போர்த்தி தலைக்கு மேல்வெய் தோப்பி அணியவும்.
- குழந்தைக்கு தூய கார்பு அலகியம்.

பிர்வசத்தின் பின் வீடு சென்றவுடன் உங்கள் பகுதி குற-உ க்கு அறிவிப்புகள். அவர் வீட்டுக்கு வந்து முதல் 10 நாட்களுக்குள் 2 தடவைகளும், 11-18 நாட்களுக்குள் ஒரு தடவையும், 42 நாட்களளவில் ஒரு தடவையும் உங்களையும் குழந்தையைப் பரிசோதித்து, தேவையான அறிவுரை கூறுவார்.

3. தாய்ப்பாலூட்டல்

- குழந்தையின் 6 மாதம் வரையும் தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுக்கவும். (வேறு நிரகாரம் கொடுக்க வேண்டாம்)
- தாய்ப்பால் குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா போசனை பதார்த்தங்களையும் கொண்டுள்ளது.
- குழந்தை பிறந்தவுடன் காக்கும் முதல் பால் (கொலஸ்திரம்) குழந்தையை ஆபத்தான நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கும்.
- அடிக்கடி பாலூட்டுவதால் பால் சுரப்பு அதிகரிக்கும்.
- குழந்தையின் தேவைக்கேற்ப தாய்ப்பாலூட்டவும் (இரவும், பகலும்).

4. தொப்புள் கொடிப்பராமரிப்பு

- தொப்புள் கொடியை திறந்தும் உலர்வாகவும் வைத்திருங்கள்.
- குழந்தையை நலமாக இருப்பின், தினமும் குளிக்கவாப்பதன் மூலம் சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

5. குழந்தையை உளவுகுத்தியபின் தூண்டுதல்

- நேசத்தின் அரவணகப்படுங்கள்.
- தாலூட்டுப்பாடுங்கள்.
- குழந்தையின் உடலைத் தடவிடுங்கள்.
- சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதும், பாலூட்டும் போதும் குழந்தையின் அன்பாகப் பேசுங்கள்.
- பாலூட்டும் போது குழந்தையின் கண்ணோடு கண் தொடர்பு வைத்திருங்கள்.
- குழந்தை பார்ப்பதற்கு வெவ்வேறு நிறங்கள் கொண்ட விளையாட்டுப்போடுக்களை வைப்புகள்.
- அசாதாரணமாக அமைதியாக இருத்தல் / அளவுக்குமிடீ அழுதல் / முனகுதல்.
- தாய்ப்பாலூட்டும் போது.
- தொப்புள்கொடியில் இருந்து தூய்மையான பதார்த்தம் வெளியேறாதது. சிவந்து இருத்தலும்.
- பிறந்து 72 மணித்தியாலங்களுக்குள் உடல் மஞ்சள் நிறமாதல், அல்லது 2 கிராமம்க்கு மேலும் உடல் மஞ்சள் நிறமாக இருத்தல்.
- குழந்தையின் உடல் வெப்பநிலை அசாதாரணமாகக் குறைந்தோ, கூடியோ இருத்தல்.
- அவயங்களில் அசாதாரண அசைவு / வலிப்பு.

6. ஆபத்தான அறிகுறிகள்

- அசாதாரணமாக அமைதியாக இருத்தல் / அளவுக்குமிடீ அழுதல் / முனகுதல்.
- தாய்ப்பாலூட்டும் போது.
- தொப்புள்கொடியில் இருந்து தூய்மையான பதார்த்தம் வெளியேறாதது. சிவந்து இருத்தலும்.
- பிறந்து 72 மணித்தியாலங்களுக்குள் உடல் மஞ்சள் நிறமாதல், அல்லது 2 கிராமம்க்கு மேலும் உடல் மஞ்சள் நிறமாக இருத்தல்.
- குழந்தையின் உடல் வெப்பநிலை அசாதாரணமாகக் குறைந்தோ, கூடியோ இருத்தல்.
- அவயங்களில் அசாதாரண அசைவு / வலிப்பு.

- 7. 4 வார முடிவில் குழந்தையை, குழந்தைகள் 15ல பிணி ஆய்வு நிலையத்திற்கு, முன்பரிசோதனைக்குக் கொண்டு செல்லல் வேண்டும்.

- 8. குழந்தை சரியான முறையில் வளர்ச்சியடைகிறதாவென அறியுதற்கு, குழந்தையை மா தமொடுமுறை நிறுத்தல் வேண்டும். எதிர்பார்க்கப்பட்ட திசையில் வளர்ச்சி வரைபு செல்லாவிடின், குழந்தைகள் 15ல பிணியாய்வு நிலையத்திலிருந்து அறிவுரைப்பைப் பெறவும்.

9. குடும்பக்கூப்போடு

குழந்தையின் 6 கிராம முடிவில், நீங்கள் தெரிவு செய்த குடும்பக்கூப்போட்டு முறை பற்றித் தீர்மானிப்பதற்கு குடும்ப 15ல உத்தியோகத்தார் / குடும்பச் சுகாதார தாதிய சுகாதாரி / சுகாதார வைத்திய அதிகாரி / வேறு வைத்திய அதிகாரியை அனுகுதல் வேண்டும். இதன் மூலம் அடுத்த கர்ப்பத்தினைப் பிற்போட்டு, இக் குழந்தையின் வளர்ச்சியையும், விருத்தியையும் முன்னோர் செய்யலாம்.

10. தடுப்பு மருந்து அட்டவணை

வயது	தடுப்பு மருந்து	தடுப்பு மருந்து மூலம் தடுக்கப்படக்கூடிய போய்கள்
பிறந்தவுடன்	பிச்சீஜி.	5 வயதிற்கு கீழுள்ள குழந்தையை பாதுகாக்கும் கட்டுறைய வகை
2 மாதம் பூத்தியான பின்	வாய்முலையான போலியோ-1 பென்றாவலண்ட் 1	• போலியோ • குக்கல்
4 மாதம் பூத்தியான பின்	• போலியோ-2 • வாய்முலையான பென்றாவலண்ட் 2 • ஊரிமுலையான போலியோ	• தொண்டை, கர்ப்பவளி • ஏற்பு வலி • செக்கண்டரி B
6 மாதம் பூத்தியான பின்	• வாய்முலையான போலியோ-3 • பென்றாவலண்ட் 3	• கீரணமேலன் இன்புக்ஷென்ஸா • B இனால் பாப்ப்டும் போய்கள்
9 மாதம் பூத்தியான பின்	• சின்னமுத்து, சுவைக்கட்டு, ருபெல்லா	• சின்னமுத்து, சுவைக்கட்டு, ருபெல்லா யப்பாசு மூளைக்களப்பச்சல்
12 மாதம் பூத்தியான பின்	• யப்பாசு மூளைக்களப்பச்சல்	• சின்னமுத்து
18 மாதம் பூத்தியான பின்	• ஊரிமுலையான போலியோ 4 • முக்கட்டு	• போலியோ • சின்னமுத்து, குக்கல், ஏற்பு வலி
3 வயது பூத்தியான பின்	• சின்னமுத்து, சுவைக்கட்டு, ருபெல்லா - 2	• சின்னமுத்து, குக்கல், ஏற்பு வலி
5 வயது பூத்தியான பின்	• வாய்முலையான போலியோ 5 • இடுக்கட்டு, (தொண்டை) கர்ப்பவளி, ஏற்பு வலி	• போலியோ • சின்னமுத்து, சுவைக்கட்டு, ருபெல்லா
11 வயது பூத்தியான பின்	• வயது வந்தவர்களுக்கான இடுக்கட்டு (தொண்டை) கர்ப்பவளி, ஏற்பு வலி	• தொண்டை, கர்ப்பவளி, ஏற்பு வலி
	வேறு	• சுரைத்திற்கு சுலைம் பாப்ப்டும் போய்கள்

11. தடுப்புசி மருந்தேற்றிய பின் ஏற்படும் எதிர்மறை விளைவுகளை அறிவிக்கவும்

உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்படும் தடுப்புசி மருந்துகள் உயர்தரமானது. தடுப்புசி வழங்கப்பட்ட பின் சிறிய பக்க விளைவுகள் ஏற்படுவது அசாதாரணமானது அல்ல. (உதாரணம் - ஊசி போட்ட இடத்தில் சிவந்து வள்கியிருத்தல், தோலுக்குக் கீழ் கட்டியாக இருத்தல், காய்சல், படுக்கை போன்றவை) இவ்வகையான பக்க விளைவுகளுக்கு பிரத்தியேக வைத்தியம் தேவையில்லை. மிகச் சரிதராக பக்க விளைவுகளினால் வைத்தியசாலை அனுமதி தேவைப்படுகின்றது. (உதாரணம் - காய்சலூட்டானை வலிப்பு, மிகவும் பாதுகாப்பான ஒவ்வாம உடல் முழுதும் படுக்கை போன்றவை).

தடுப்புசி மருந்தேற்றலால் இவ்வாறான எதிர்மறை விளைவுகள் ஏற்படும் உங்கள் குடும்ப சுகாதார அதிகாரியோடு, பொது சுகாதார பரிசோதகர், பொது சுகாதார தாதி உத்தியோகத்தார், சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அல்லது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தடுப்புசி ஏற்றிய வைத்தியருக்குத் அறிவிக்க வேண்டும்.

12. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு 6 மாதத்தில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கொரு தடவை 5 வயது வரை விற்றயின் A கொடுக்க வேண்டும்.

- உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு 1 1/2 வயடத்திலிருந்து 5 வயடங்கள் வரை சரியான காலப்பகுதிகளில் பூச்சிமருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

ஏதாவது பிர்வசனை ஏற்பட்டால், உங்கள் பகுதி குற-உ / சுகாதார வைத்திய அதிகாரி / வேறு வைத்திய அதிகாரியை அணுகவும்.

எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பொதுவான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதைத்தவிர செய்து கவனிக்கவும், சரியான அளவு, சிறி இடைவெளி, சமைக்கும் போது சேர்க்க வேண்டிய எண்ணெயின் அளவு, போன்றவை குழந்தைக்குக் குழந்தை வேறுபடலாம்.


குழந்தை பிறந்தது முதல் 6 மாதம் முடிவும் வரை

- தாய்ப்பால் மட்டுமே.
- தேவைப்படும் போது தாய்ப்பால் கொடுத்தல் (இரவும் பசுவும்)
- குழந்தை யோதுமான அளவு தாய்ப்பால் பெறுகின்ற அளவு களை கண்டறிவதற்குக் குழந்தையை மாதத்திற்கு ஒரு தடவை நிறுத்து; அதனை வளர்ச்சி வரைபில் பதிவேதே சிறந்த முறையாகும். மேலும் தாய்ப்பால் மட்டும் அருந்தும் சிசு, ஒரு நாளைக்குக் குறைந்தது 6 தடவைகளாவது சிறுநீர் கழிப்பின், இது போதுமான அளவு தாய்ப்பால் கிடைப்பதென்பதற்கு அறிகுறியாகும்.



- 6 மாத முடிவில் (180 நாட்கள் முடிவடைந்த பின்னர்) தாய்ப்பாலூட்டல் வேறு உணவுகளை ஆரம்பிப்புகள். எனினும் தாய்ப்பால் வெவ்வேறாக இருந்து விடுமுறை கிடைக்காவிடின், அல்லது குழந்தையின் வளர்ச்சி வந்தல் விரைவில் விடுமுறை அல்லது தாய்ப்பால் சில வேளைகளில் தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு கடினமாக இருப்பின் 5ம் மாதத்தின் தொடக்கத்திலேயே உப உணவைக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம்.

- உப உணவை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நன்கு மசித்த சோற்றுடன் தாய்ப்பால் சிறிது சேர்த்து ஆரம்பிக்கலாம். பசியை இருக்கும் பொழுது உப உணவை கொடுக்கலாம். அதன் பின்னர் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம்.
- ஆரம்பத்தில் மசித்த சோற்றில் 2-3 தேக்கரண்டி அளவு கொடுக்க தொடங்கி, படிப்படியாக அளவைக் கூட்டலாம்.
- 3 நாட்களின் பின்னர் பருப்பு வகைகளை மசித்த சோற்றுடன் கடைத்து கொடுக்கலாம். தொடர்ந்து சிறு துணிக்கைகளாக்கப்பட்ட கருவாய், மீன், கோழி இறைச்சி, சரஸ் போன்ற இரும்புச்சத்து கூடிய உணவை ஒரு வாரத்தில் சேர்க்கவும். படிப்படியாக மரக்கறி வகைகள், பச்சை இலைவகைகளை அறிமுகப்படுத்தவும்



- ஒரு புதிய உப உணவை முதலில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். 3 நாட்களுக்கு கொடுத்து, ஒரு பிச்சினைவையும் இல்லாதுவிடல். அடுத்த புதிய உப உணவை ஆரம்பிக்கலாம்.
- பருப்பு, பூசணி, சாம்பல் வாழைக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கரட், இலைக்கறிவகைகள் (வல்லவை, சாரணை, முளைக்கீரை, பொன்னாங்காணி) என்வற்றை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
- மசித்த புழங்கள் வாழைப்பழம், பப்பாசி, மாம்பழம், வத்தகைப்பழம் தினமும் ஒரு தடவை கொடுக்கலாம்.
- ஒரு நாள்நிக்கு 2-3 தடவைகள் பிரதான உணவுகளை வழங்கவும்.
- பிரதான உணவுகளுக்கிடையில் குழந்தையின் தேவைக்கேற்பத் தாய்ப்பாலூட்டவும்.
- உப உணவு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரு வாரங்களிற்கு பின்னர் உணவுடன் எண்ணெய் சேர்க்கவும். உம் தேங்காய் எண்ணெய், தடிப்பான தேங்காய் பால் எண்ணெய், மாஜரின், நல்லெண்ணெய்.

குழந்தையின் 7 மாத முடிவில்

சிறிய துணிக்கைகளாக்கப்பட்ட உணவைக் கொடுத்தல். சோற்றுடன் சோயாபீன்ஸ், பீன்ஸ் போன்ற விதையணவுகள், தாளாக்கப்பட்ட நெத்தல், மீன், கோழி இறைச்சி, மரக்கறி, பச்சை இலை வகைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். உணவு சமைக்கும் போது ஒரு தேக்கரண்டி கட்டித் தேங்காய்ப்பால் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தல். தினமும் புழங்கள் கொடுங்கள். குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு இரும்புச் சத்து மிகவும் அவசியமாகையால் இரும்புச் சத்து நிறைந்த உணவைக் கொடுத்தல் வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவைகள் பிரதான உணவு கொடுங்கள்.

- 2 பிரதான உணவுகளிற்கிடையில் தாய்ப்பாலூட்டுங்கள். ஒரு பிரதான உணவு தேநீர் கோப்பையின் 1/2 (அரைவா சியை) விட கூடுதலாக இருந்தல் வேண்டும். சிரமமாக உணவுத்துணிக்கைகளின் பருமனைக் கூட்டுவதன் மூலம் உணவை மென்று உணவைப் பறக்குங்கள்.
- உணவு உண்பதற்கு தனிபான ஒரு இடத்தை ஒதுக்குங்கள். குடும அங்கத்தவர்களை உணவு உண்ணும் போது அவதானிக்க விடுங்கள்.
- உணவை வழங்கும் போது குழந்தையின் கதைப்பதுடன் வெவ்வேறு வகையான உணவுகளை உண்கைக் கொடுத்து அவற்றின் சுவையையும் பற்றி சொல்லிக் கொடுங்கள்.
- உணவை வழங்கும்போது குழந்தையின் அன்பாக பறகவும்.

8-9 மாதம்

- குழந்தைக்கு வெவ்வேறு வகையான உணவுகள் உண்பதற்கு பறக்கப்படுத்தல் மிகவும் அவசியமாகும்.
- ஒரு நாள்நிக்கு 3-4 பிரதான உணவுகளை கொடுக்கவும் (1/2 தேநீர் கோப்பையையும் விட சிறிது அதிகமாக), பிரதான உணவுகளிற்கிடையில் 1-2 போஷணைகளும் இடைப்பட்ட உணவை வழங்கவும்.
- சிறிய துணிக்கைகளாக்கப்பட்ட (நன்கு மசிக்கப்பட்ட அல்லாத) உணவினை குழந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தல்.
- நன்கு கடைப்பட்ட உணவுகளை கொடுப்பதனை தவிர்த்தல்.
- குழந்தையின் கை விரல்களினால் பற்றிப் பிடிக்கப்பட்ட கூடிய ஓரளவு பருமனுடைய உணவுகளை கைகளால் பிடித்து உண்கைக் கொடுத்தல்.

9-12 மாதம்

- ஒரு நாள்நிக்கு 3-4 பிரதான உணவுகளை கொடுக்கவும். (3/4 தேநீர் கோப்பை அளவு) பிரதான உணவுகளிற்கிடையில் 1-2 போஷணைகளும் உப உணவுகளை வழங்கவும் (அவித்த பயறு, அவித்த கௌப்பி போன்ற விதைப்பயறுகள், அவித்த கிழங்கு, பழங்கள், யோகட்)
- உணவிற்கு பின் தாய்ப்பால் கொடுக்கவும்

12 மாதம் முதல்

- குழந்தை தானாகவே உண்ண சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தல். ஒரு வயதில் போஷணைகள் குடும உணவை உண்ணக் கொடுத்தல். மூன்று தொடக்கம் 4 பிரதான உணவுடன் (ஒரு தேநீர் கோப்பையையும் விட அதிகம்) இரு இடைப்பட்ட உணவு.
- குழந்தையை உண்ண கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம். குழந்தைக்குப் பசி எடுக்கும் வரை பொறுத்திருக்கவும். இதற்காக பிரதான உணவிற்கு 2 மணித்தியால்களிற்கு முன்பிருந்தே எதுவித உணவோ, பானமோ (உ-ம் : பால், பீஸ்கட், இனிப்புகள்) கொடுக்க வேண்டாம்.
- இனிப்பு பண்டங்களை குறைபுங்கள். அதற்கு பதிலாக உட்கள் புழங்களை அறிமுகப்படுத்தவும். இனிப்பு பண்டங்களை உண்டரின குழந்தையின் வாயை நன்கு கழுவியிடவும்.
- குழந்தைக்கு சகல போஷணைகளையும் வழங்கக்கூடியவாறு வெவ்வேறு வகையான உணவுகளை வழங்கவும்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படும் உணவு போதுமானதானவரை, கிரமமாக நிறுப்பதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

குழந்தை நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் பொழுது விதிமுறைகள்

- குழந்தை நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது குழந்தைக்கு பசி குறைவாக இருக்கும். குழந்தை நோயிலிருந்து விரைவாக குணமடைய ஆரம்பிக்கும் போது குழந்தைக்கு சாதாரண நிலையிலும் விட கூடியளவு உணவு உண்பப்படும்.
- 1. கூடியளவு போஷணைகள் உணவுகள்
- 2. குறைந்தளவு உணவு
- 3. உணவு அடிக்கடி கொடுக்கப்பட வேண்டும்
- குணமடைந்த பின்னர் சாதாரணமாக கொடுப்பதை விட மேலதிக உணவு இரண்டு கிறமையுக்குக் கொடுக்கள்.
- வளர்ச்சி வீதம் குறைவடைந்தால் நிறை அடிகிரிப்பை அடைந்த 6 மாதங்களின் பின்னரும் மேலதிக உணவு கொடுக்கப்படல வேண்டும்.
- குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கேற்ப, உணவில் சேர்க்கப்படும் எண்ணெயின் அளவும் வேறப்படும்.
- வயிற்றோட்டத்தினால் குழந்தை பாதிக்கப்பட்டால், அதிகளவு நீராகாரம் கொடுக்க வேண்டும். ஜீவனி, கஞ்சி, பழச்சாறு, தேள் போன்ற மேலதிக நீராகாரம், சாதாரண உணவுடன் கொடுத்தல் வேண்டும்.

உள விருத்தியைக் கண்காணித்தல் பொது அறிவுரைகள்

குழந்தை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில செயற்பாடுகளை செய்யாவிடின், உங்கள் பகுதி சுகாதார வைத்திய அலகாரி அல்லது வேறு வைத்திய அலகாரியை அணுகவேண்டும். மேலும் இயலுமானவரை தாய் குழந்தையின் மனவிரித்தியை தூண்டக்கூடிய சில செயற்பாடுகளை கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும்.

குழந்தையின் பிறப்பு முதல் வீட்டில் தூண்டுதல்


- பாலூட்டும் போது கண்ணோடு கண் தொடர்பு வையுங்கள்.
- பாலூட்டும் போது தாலாட்டுப் பாடுங்கள் / அன்பாகக் கதைப்புகள்.
- மெதுவாகத் தட்டிங்கள்.
- குழந்தை சிறுநீர்மடும்போது அன்பாக அரவணையுங்கள்.
- குழந்தையின் பள்ளிகைக்குப் பதிலளிப்பதன் மூலம் புனிதகைக்குத் தூண்டுங்கள்.
- வயிற்றுக்கமாக படுக்கவைத்து, தலையை உயர்த்தப் பழக்குங்கள்.
- குழந்தையில் இருந்து 15-20 சே.மீ தூரத்தில் அசைக்கிற, சத்தம் எழுப்புகின்ற விளையாட்டு பொருட்களைப் பல நிறங்களில் தூக்கி அடுக்குங்கள்.

6 வாரம் - 3 மாதக் குழந்தை

- சூப்பறப்படுத்திக்கும் போது தலையை உயர்த்த முடியும்.
- கண்களால், அசையும் பொருளைத் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும்.
- பெரிய சத்தத்திற்கு தனது செய்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
- தூண்டலுக்கு ஆ-ஆ ஓஓ ஈஈ போன்ற ஒலி எழுப்பதல்.
- தரவயக்கண்டிவடின் புனிதகைத்தல் (செருகபுனிதகை).

3 மாதம் முதல் வீட்டில் தூண்டும் முறைகள்

- அரவணைத்தல், பாடுதல், முத்திடல், அன்பாக பேசுதல்.
- குழந்தை எழுப்பும் ஒலிகளுக்கு பதில் அளிப்பதன் மூலம் குழந்தையைப் பேசத் தூண்டுதல்.
- குழந்தையை சூப்பறப்படுக்க உதவுவதன் மூலம், குழந்தை முதுகுப் புறமாகப் படுக்க, பக்கவாட்டில் சரிய உதவுதல்.
- கையிலில் சில பொருட்களை கொண்டு குழந்தை பிடித்திவடின் அதனை மெதுவாக இருப்பதன் மூலம் பொருட்களை இறுக்கமாக பிடிக்கப் பழக்குங்கள்.
- விளையாட்டுப் பொருட்களை, எடுக்கக் கூடிய தூரத்தில் வைப்பதன் மூலம் கையை நீட்டிப் பொருட்களை எடுக்கப்படுகக்கூடிய.
- குழந்தைக்கு வித்தியாசமான நிலைகளைப் பழக்குதல். (இருத்தல், சூப்பறப்படுத்தல்)



3 மாதம் தொடக்கம் 6 மாதக் குழந்தை

- வயிற்றுபுறமாக படுத்திருக்கும் போது தலையையும், மார்பையும் உயர்த்துதல்.
- விரல்களை பின்றுதல், கைகளால் விளையாடுதல்.
- கைகளை நீட்டிப் பொருட்களைப் பற்றிப்பிடித்தல்.
- ஒலியை நோக்கி தலையைத் திருப்பதல்.
- சுட டா ரா பா போன்ற ஒரு சொல் சத்தங்களை உச்சரித்தல்.
- பலமாகச் சிரித்தல்.

6 மாதம் முதல் வீட்டில் தூண்டும் முறைகள்

- குழந்தை தனியாக உட்கார தூண்டுவதுடன், குழந்தையை தொடர்ந்து இருக்கப் பழக்கவும்.
- இரண்டு கைகளாலும் ஒரே நேரத்தில் பொருட்களைப் பிடிக்க பழக்குங்கள்.
- குழந்தைக்குப் பிடித்தமான ஒசையுடைய சேர்ந்தான மீள உச்சரிக்க ஊக்குவிப்புகள்.
- கைகளால் முகத்தை மறைத்து ஒளித்துப் பிடித்து விளையாடப் பழக்குங்கள்.
- வேறுபட்ட ஒலியுடைய விளையாட்டுப் பொருட்களைக் கொடுங்கள்.
- குழந்தையை வெளியில் அழைத்து சென்று குழலைக் காட்டுங்கள்.
- குழந்தையின் விட்டில் நடைபெறும் வேலைகள் பற்றி அவ்வப்போது கதைப்புகள்.



6-9 மாதக் குழந்தை

- முதுகுப்புறமாக படுக்கும் போது தலையை உயர்த்துதல்.
- உடலை முதுகுப்புறமாகவும் வயிற்றுப்புறமாகவும் பிரட்டுதல். (உடம்பு பிரட்டுதல்)
- ஒரு கையிலிருந்து மற்ற கைக்கு பொருட்களை மாற்றுதல்.
- டாடா ராரா லாலா பா பா போன்ற ஒலிகளை எழுப்பதல்.


9 மாதம் முதல் வீட்டில் தூண்டும் முறைகள்

- கடினமான சமதாரையில் எழுந்து நிற்க உதவுதல்.
- ஒரு பாத்திரத்தில் பொருட்களைப் போடவும் எடுக்கவும் பழக்குதல்.
- நாளாந்த செயன்முறை பற்றி குழந்தையுடன் கதைப்புகள்.
- படங்களைக் காட்டிப் பெயர்களை சொல்லிக்கொடுத்துதல்.
- குழந்தையின் விளையாட்டுங்கள்.




9-12 மாதக் குழந்தை

- உதவியின்றி இருத்தல்.
- எழுந்து நிற்கும் போது உதவியுடன் நிற்கல்.
- ஒலிகளை மீள் சொல்லுதல்.
- அர்த்தமுள்ள சத்தங்களை எழுப்புதல்.
- ஒரு சில பொற்களை உச்சரித்தல்.
- சிறிய இலகுவான அறிவறுத்தல்களைச் செய்தல். (கைத்தட்டுதல், கை அசைத்தல்)



2 வயது முதல் வீட்டில் தூண்டும் முறைகள்

- குழந்தைக்கு ஒரு காலில் சமநிலையில் நிற்க விடுங்கள்.
- குழந்தைக்கு வட்டம், முகம், நேர்கோடு போன்றவற்றை வரைய சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள்.
- குழந்தையின் அணுஅணுங்களைச் சொல்ல விடுங்கள்.
- மலகூட்டத்தில் மலம், சிறநீர் கழிக்கப் பழக்குங்கள்.
- கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம்.
- குழந்தையின் பற்களை ஆரோக்கியமாக பேணுங்கள். பற்களைச் சுத்தமாக வைத்திருங்கள். தாயின் உதவியுடன் பல் துலக்குதல்.
- இனிப்பு உண்டின் பல் துலக்கி, வாய் கழுவுப் பழக்குங்கள்.



12 மாதம் முதல் வீட்டில் தூண்டும் முறைகள்

- அவனை / அவளை தானாகவே நடக்க உதவுங்கள்.
- பழக்கமான பொருட்களைக் காட்டி, கேட்டல்.
- குழந்தைக்குப் பற்கை உருட்டப் பழக்குங்கள்.
- குடுமபத்தினி உணவு அருந்தும் போது குழந்தையையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். குழந்தையின் கையில் கொடுத்து தாளாக உணவை விடுங்கள்.
- சோறு சிறிதளவு தட்டில் இட்டு குழந்தையிடம் கொடுத்து உணவைக் கொடுங்கள்.
- நீங்கள் நாளுக்கு நாள் பார்க்கும், செய்யும் செயல்கள் பற்றி குழந்தையுடன் பேசுங்கள்.
- குழந்தையிடம் வேறு பட்ட பொருட்களைக் காட்டி விளரிக்கும்போது, சரியான சொற்களைப் பாவிக்கவும்.




12-18 மாதக் குழந்தை

- உதவியுடன் நடத்தல்.
- குறைந்தது 2-3 சொற்களை உச்சரித்தல். (இனியும், தா, அது)
- கேட்கும் போது, பழக்கமான பொருட்களைச் சுட்டிக் காட்டுதல்.
- சிறிய பற்கை உருட்டுதல்.
- உடலின் ஒரு அங்கத்தையாவது அறிந்திருத்தல்.
- சிறிய பொருட்களை பெருவிரல், சுட்டு விரல்களால் பிடித்து எடுத்தல்.


18 மாதம் முதல் வீட்டில் தூண்டும் முறைகள்

- குழந்தைக்கு படி ஏற உதவுதல்.
- பெரிய பற்கை பிடிக்கவும், எறியவும் காட்டிக் கொடுங்கள்.
- குழந்தைக்கு உடலின் பாகங்களைக் கற்றுப்பிடுங்கள்.
- குழந்தையின் ஆடைகளை தானாக கழற்ற விடுங்கள்.
- குழந்தையின் விளைக்களுக்கு எரியையான உதாரணங்களுடன் விடை சொல்லுங்கள்.
- குழந்தையுடன் நீங்கள் தினமும் பார்க்கின்ற செய்கின்ற விடயங்களைப் பற்றிக் கதைக்கவும்.



18 மாதம் - 2 வயதுக் குழந்தை

- உதவியின்றி நடத்தல்.
- உதவியுடன் படி ஏறுதல்.
- 2-3 குற்றிகள் கொண்டு தூண் அமைத்தல்.
- 10 பொற்களை உச்சரித்தல். குறைந்தது ஓர் இரண்டு சொற்றொடரை பாவித்தல் அம்மா வா, பந்து தா
- முத்தம் சொடுக்க உதடுகளைக் குவித்தல்.



2-3 வயதுக் குழந்தை


- விராமல் இருதல்.
- வீராமல் படி ஏறி இறங்குதல்.
- வளைந்த, வட்டமான பொருட்களைப் படமாக வரைதல்
- 3 சொற்களுக்கு மேற்பட்ட வசனங்களைப் பாவித்தல்

3 வயது முதல் வீட்டில் தூண்டும் முறைகள்

- குழந்தையை ஒரு காலில் தூள் விடுங்கள்.
- குழந்தைக்கு குவிக்கவும், பின்னர் ஒழுங்காக அடுக்க விடுங்கள்.
- வித்தியாசமான உருவங்களையும், நிறங்களையும் அறிய சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள்.
- கை கால்களை தானே கழுவி உலர்த்தப் சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள்.

3-4 வயதுக் குழந்தை

- ஒரு காலில் நிற்கல்.
- படியிலிருந்து பாய்தல்
- ஆடைகள் அணிதல், பாதணிகள் அணிதல். (பொத்தாளிகள் பூட்ட முடிவதில்லை).
- வட்டங்களையும், வடிவமைப்புகளையும் பார்த்துக் கற்றுதல்.
- 3 வரை எண்ணுதல்.
- குறைந்தது 2 நிலை சம்பந்தமான சொற்களைத் தெரிந்திருத்தல். உ+ம் லோல், கீழ், அருகில், தூரம்.
- முழுமையான, சிக்கலான வசனங்களைப் பாவித்தல்.



4 வயது முதல் வீட்டில் தூண்டும் வழிகள்

- ஒருகாலில் தரவடந்தற்கு சிந்திப்பும் கொடுங்கள்.
- படங்களை வெட்டிப் பழக்குங்கள்.
- ஆடைகளின் பொத்தான்களைப் புட்டிப் பழக்குங்கள்.
- நல்ல பழக்க வழக்கங்களைப் பழக்குங்கள். நன்றி, தயவு செய்து போன்ற சொற்களை பாவித்தல்.
- குழந்தையின் கேள்விக்கு சரியான பதிலைக் கொடுங்கள். பொய் சொல்லவோ, பதில் சொல்ல காலம் தாமதமவோ வேண்டாம்.
- குடும்பத்தின் செயற்பாடுகளில் குழந்தையை ஈடுபடுத்துங்கள் (சமையல், கடைக்கு செல்லுதல், விளையாட்டு பொருட்களை ஒழுங்குபடுத்துதல்.)

4-5 வயதுக்கு குழந்தை

- ஒரு காலில் துள்ளுதல்.
- தாளாக உடைகளை அணிதல்.
- கிண்பெயிலால் எடுத்துத் தாளாக உடைவகுத்துதல்.
- இலகுவான மனித உருவங்களை வரைதல்.
- வயதிற்குரிய சிறுவர்களுடன் ஒத்து விளையாடுதல்.
- வினைச்சொற்களைச் சரியான காலங்களில் பயன்படுத்திப் பங்களிப்பை விபரித்தல்.
- பெயர், வயது எவ்வாறான சரியாகக் குறிப்பிடல்.

திறமையுள்ள பெற்றோர்த்தளவைய


திறமையுள்ள பெற்றோர்த்தளவைய ஒரு தேவையான செயற்பாடாகும். சிறப்பான திறமையையப்பாவிப்பதன் மூலம் நற்பண்புள்ள மகிழ்ச்சியான பிள்ளைகளை உருவாக்க முடியும்.

தொடர்பாடல் : கேட்டலும் பேசுதலும்.

- **எதிர்ப்பறையான சொற்களை தவிர்ந்து நேர்மறையான சொற்களைப்பாவிக்கவும்.**
நேர்மறையான இருப்பதன் மூலம் பிள்ளைகள் அதிக கீழ்ப்படிவுகளையின்களாக மாறுவார்கள் உதாரணமாக கதிரையை ஆட்ட வேண்டாம் என்று கூறவந்தற்கு பதிலாக கதிரையில் எப்படி நேராக உற்கார வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும்.
- **பிள்ளைகளின் முன்னால் பிள்ளைகளின் தவறுகளைப்பற்றிப் பேசுதலைத் தவிர்த்தல்.**
சில பெற்றோர்கள் நினைக்கிறார்கள் பிள்ளையின் தவறுகளை அவர்களின் முன்னாலேயே பற்றுவர்களிடம் சொல்லும் போது பிள்ளைகள் திருந்துவார்கள் என்று ஆனால் பிள்ளை பெற்றோரைத் விருப்பாததைத் தவிர அவர்களது தவறான நடத்தைப்பில் மாற்றம் வராது.
- **பிள்ளைகள் ஏதாவது பிரச்சினையில் இருக்கும் போது அப்பிரச்சினையை நீங்கள் தளிய வேண்டாம்.**
மாராக அவர்களுடன் சேர்ந்து தீர்ப்பதற்கு உதவி புரியுங்கள். இப்படி செய்வது நீண்ட கால அடிப்படையில் பிள்ளைகளுக்கு நம்பிக்கையை வளர்ப்பதோடு பிரச்சினைகளை கையாள்வதற்கு உதவும்.

ஒரு பிள்ளையை மற்ற பிள்ளைகளுடன் ஒப்பிடுவதைத் தவிர்த்தல்.

குழந்தையின் நடத்தைகளை சிறுத்துவதற்கு நல்ல நடத்தைகளையே மற்ற பிள்ளைகளுடன் ஒப்பிடுதல் ஒரு நல்ல முறையென்று சில பெற்றோர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆனால் இம்முறை பிள்ளைகளின் தன்னம்பிக்கையை சிதைக்கும்எனவே இதைத் தவிர்த்தல்.



ஒழுக்கம் பெறுதல்

உடல்நிதியான தன்மைகள் (அடித்தல், கண்ணத்தில் அறைதல், முடிமையிடித்து இழுத்தல்) ஒழுக்கம் பெறுவதற்கான நல்ல முறையென சில பெற்றோர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆனால் அது அப்படி அல்ல என்னதென்புறிந்து கொள்ள வேண்டும். உடல்நிதியான தன்மைகள் பிள்ளைகளின் மனநிதியான பிரச்சினைகளுக்கு இடமே செல்லும்.

இருந்தாலும் பல நேர் மறையான முறைகள் ஒழுக்கத்தை பெறுவதற்காக உண்டு

- **கவனத்தில் எடுத்தலும் அசட்ட செய்ந்தலும்.**
நல்ல நடத்தைகளுக்கு கவனத்தை செலுத்தும் அதே நேரம் பிள்ளையின் கூடாத நடத்தைகளை அசட்ட செய்தல். பிள்ளைகளை கவனத்தையிடாததற்காக கிருபித்திருப்ப செயல்கள் ஆனால் எதற்கும் செலவழிப்பதற்கு திருத்தல் ஆகிய கவனத்தில் எடுத்தலே ஆகும்.
- பிள்ளைகள் தங்கள் செயல்களை வெளியிடும் திருத்தல் மூலம் சில நிமிடங்கள் கவனத்தில் எடுத்தலை விடுபவர்கள் அறவே கவனம் கொடுத்ததைவிட.
- **நேர் மறையான நடத்தைகளுக்கு கவனத்தை செலுத்தல் மிக முக்கியமாகும்.**
உதாரணமாக பிள்ளை அமைதியாக படுத்தும் வாசித்துக் கொண்டுநடந்து பாராட்ட வேண்டும்.
- **மட்டுப்படுத்தல்**
பிள்ளையின் சில செயற்பாடுகளை மட்டுப்படுத்தல் ஒழுக்கம் பெறுவதற்கு முக்கிய நல்ல முறையாகும் உதாரணமாக : தொலைக்காட்சி பாப்பதை மட்டுப்படுத்தல். பிள்ளை இறவு 7 மணிக்குப் பிள்ளை தொலைக்காட்சி பாப்பதை தடுப்பதற்கு பிள்ளைக்கு முன்னரே அறிவித்து இருக்க வேண்டும். பிள்ளை தொடர்ந்து பாக்க வேண்டும் என அடம் பிடித்து அழுதால் 7 மணிக்குப் பிள்ளை TV பாக்கக் கூடாது என்பதை குறிப்பிட்டுத்திய பிள்ளை கோபத்தையோ அல்லது துக்கத்தையோ காட்டாமல் தொலைக்காட்சிசீரையை அகனைத்து விட வேண்டும்.

பள்ளியிலுமும் பரிசு கொடுத்தலும்.

சிறு பிள்ளைகளின் நல்ல நடத்தைகளைப் பாராட்டுவதற்கு இது சிறந்த முறையாகும். அவர்களின் ஒவ்வொரு நல்ல நடத்தைக்கும் ஒரு நட்சத்திரம் (ஸ்டார்) வழங்கவும். குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான நட்சத்திரங்களைப் பெற்றதற்கு பிள்ளைக்கு ஒரு பரிசு வழங்க வேண்டும்.

நேரம் கழித்தல்.

ஒரு பிள்ளை தானே செய்த தவறை எண்ணியாற்படுத்தலும் உள்ளக் கிடக்கையை சமாளியுபற்றல்களும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பொறி முறையாகும்.

இதை செய்வதற்கு பிள்ளைக்கு குறைந்தளவு தூண்டல்கள் உள்ள ஒரு இடத்தைத் தேர்வு செய்யவும். (நேரம் குழந்தையின் வயதைப் பொறுத்தது) நிற்க அல்லது உட்கார வைக்க வேண்டும். ஒரு அறைபின் முலை அல்லது ஒரு சில பொருட்கள் உள்ள அறை எவ்வளவு பொருத்தமான இடமாகும்.

ஒழுக்கத்தை பெறுவதற்கு தேவையான சில பொதுவான வரையறைகள்.

- பிள்ளைகளின் ஒழுக்கத்தைப் பெறுவதற்கு இரண்டு பெற்றோர்களும் எம்முறைமையை பின்பற்றுவதென ஒரு உடனிடப்பட்டுக்கு வர வேண்டும்.
- ஒரு குறிப்பிட்ட பிறகு திருத்தல் முறை எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும்.
- ஒன்றிலல்லாத எச்சரிக்கைகளை ஒரு போதும் விடுக்க வேண்டாம். சொல்லுவதைச் செய்யுங்கள். செய்யக்கூடியதை சொல்லுங்கள்.
- முடியாதவற்றை செய்யும்படி வற்புறுத்த வேண்டாம். கவனத்தில் எடுங்கள். உதாரணமாக 3 வயது பிள்ளை உடைகளை மேசையில் சிந்தாது சாப்பிட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது பிள்ளையால் முடியாத காரியமாகும்.
- உங்களை பிள்ளைகளுடன் பேசுங்கள் மற்றும் கலந்து கொள்ளுங்கள். உங்களை எதிர்பார்ப்பது தெளிவு படுத்துங்கள். காரணத்தை தெரியப்படுத்தி கலந்து ஆலோசியுங்கள். அமைதியாகப் பேசுங்கள்.

සටහන් - குறிப்புகள்



දරුවා හොදින් වැඩෙනගත් දැඩි දැකගැනීමට මසකට වරක් නොවරදවම වර කිරීමකිනි.
 பிள்ளை நன்றாக வளருகின்றதானவென அறிவுதற்கு, பிள்ளையைத் தவறாது பாதுகாத்தோரும் நிறுக்கவும்.



දරුවාගේ දින/දස ද වරින් වර මාන බලා සිටිනත් කර ගැනීමද වැදගත්කි.
 பிள்ளையின் நீளம் உயரத்தைக் காலத்திற்குக் காலம் அளந்து பதிவு செய்யப்படும் முக்கியமாகும்.




ආදර, ඉරිසිවැඩෙන හා ආරදැකීම් ලැබෙන සර්වම වැඩි දරුවා වැඩිත් වැදීමකිනි යි.
 பெற்றுக்கொண்ட அன்பு, பாதுகாப்பு, அன்புடைய என்දையுறவுப் பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளையின் புத்தொலித்தளம் அமைபும்.



දරුවාට මො රැකවරකමක් හොදිම වැඩි පවුල සැපයුම් කරමකි.
 பிள்ளையின் சிறந்த பாராமரிப்பிற்காக தகுந்த குடும்பக்கட்டுப்பாடுகளே பெற்றுகொள்வது உத்தியோக அமைபும்.

ලමා සෞඛ්‍ය සහ සංවර්ධන සටහන
සිතුවම් ඉරිදි සහ මවුබාල වර්ගයේ ප්‍රතිරෝධී
CHILD HEALTH AND DEVELOPMENT RECORD



SAMPLE

NOT FOR USE

FAMILY HEALTH BUREAU

MINISTRY OF HEALTH

SRI LANKA

නම

පෙයර්

Name



Family Health Bureau



Ministry of Health

Revised 2015