

გახსოვდეთ! პროფილაქტიკური აცრები იცავს ბავშვს
სახითო დაავადებებისაგან, ვაქცინაცია ბავშვისათვის
უვნებელია.
აცრები ტარდება დაღგნილი კალენდრის მიხედვით,
რომელიც შემუშავებულია მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ექიმ-
ექსპერტთა მიერ.
დაგვიანებული აცრა ზრდის როგორც ბავშვის ავად გახდომის,
ასევე აცრის შემდგომი გართულებების რისკს!

აცრების კალენდარი

ასაკი	ვაქცინა
დაბადებიდან 12 საათში	ჰეპატიტი B 1 - HBV 1
2-5 დღე	ტუბერკულოზი (ბცჟ) - BCG
2 თვე	ჰეპატიტი B ² ; დტყ 1; პოლიომიელიტი 1 - HBV2; DPT1; OPV1
3 თვე	დყტ 2; პოლიომიელიტი 2 - DPT2; OPV2
4 თვე	ჰეპატიტი B 3; დყტ 3; პოლიომიელიტი 3 - HBV3; DPT2; OPV2
12 თვე	წითელა/წითურა/ყბაყურა (წწე) 1 - MMR1
18 თვე	დყტ 4, პოლიომიელიტი 4 DPT4; OPV4
5 წელი	დიფთერია/ტეტანუსი (დტ), პოლიომიელიტი 5, წწე 2 - DT, OPV5, MMR2
14 წელი	ტეტანუსი/დიფთერია (ტდ) - Td

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო

**პროფილაქტიკური აცრების ბარათი
(მშობლებისათვის)**
CERTIFICATE of VACCINATION

სახელი, გვარი

Name _____

დაბადების თარიღი

Date of Birth _____

მისამართი

Adress _____

სამედიცინო დაწესებულება

Health Center _____

დაბეჭდილია ვიშნევსკაია-როსტროპოვიჩის ფონდის ფინანსური
დაზმარებით.

ვაქცინა Vaccine	აცრის თარიღი Date	უკუჩვენება Contraindications	ამცრელი Vaccinator
ჰეპატიტი B HBV			
ტუბერკულოზის BCG			
DPT, DT, Td დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა (დგტ) DPT, DT, Td			
პოლიომიელიტის OPV			
წითელა/ წითურა/ ყბაფურას MMR			
სხვა ვაქცინები, შრატები, იმუნოგლობულინები (ჩაწერეთ)			

გახსოვდეთ! ჰეპატიტი B-ს საწინაარმდევო აცრა ღვიძლის კიბოს საწინააღმდევო პირველ ვაქცინად არის მიჩნეული. 2005 - 2006 წლებში 13 წლის ბავშვები აიცრება MMR ვაქცინით.

აცრის შემდეგ 1-3 დღის განმავლობაში სწეულის ტემპერატურამ შესაძლოა მოიმატოს ($38,5^{\circ}$ -მდე), შეინიშნებოდეს ზოგადი აგზებადობა, აცრის ადგილის შეწითლება, შეშუპება, მტკივნეულობა - ეს ორგანიზმის ბუნებრივი რეაქციაა და მის ჯანსაღ იმუნურ სისტემაზე მეტყველებს.

აცრის შემდგომი სხვა რეაქციების აღმართობა უკიდურესად მცირეა,

ამ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მამართეთ ექიმს! აცრები უფასოა!