

ENSAIO DE COMPETIÇÃO DE CULTIVARES DE TRIGO E TRITICALE EM PONTA PORÃ - MS – SAFRA 2024/2024

¹João Paulo Oliveira Ribeiro, ²Eluana Domingues Gonçalves, ³Leomar Gadenz, ³Elton José Erbes

METODOLOGIA

Local: Fazenda CIATEC-CIARAMA.

Coordenadas geográficas: 22°37' S 55°36' O, altitude de 635 m.

Data de semeadura	20/04/2024
Data de emergência	27/04/2024

Sistema de semeadura: Plantio direto

Densidade de semeadura: 400 sementes viáveis por m².

Cultura anterior: Soja

Tamanho das parcelas: 6 linhas x 5,0m x 0,20m de espaçamento entre linhas

Número de repetições: 03 repetições

Adubação de Manutenção: 300 kg/ha (15-15-15)

Ureia: 100 kg ha⁻¹

Fungicida:

- Trifloxistrobina + Protiocanazol (0.5 L ha⁻¹ p.c.) + Mancozeb (1.5 kg ha⁻¹ p.c.)
- Trifloxistrobina + Protiocanazol (0.5 L ha⁻¹ p.c.) + Mancozeb (1.5 kg ha⁻¹ p.c.)

Data de Colheita: Várias (de acordo com a maturação das cultivares).

Sistema de colheita: Mecânica

O ensaio foi instalado em boas condições de umidade do solo, devido ao registro de chuvas anteriores à data. Contudo, enfrentou-se longos períodos sem precipitação e com altas temperaturas, incluindo intensas ondas de calor registradas durante períodos críticos do desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Dessa forma, o desempenho de muitas cultivares, principalmente as de ciclo precoce/superprecoce, foi prejudicado.

Dadas condições climáticas houve baixa pressão de doenças foliares. Não houve registro de Brusone.

¹ Eng. Agr. Dr. Pesquisador, Fundação MS, e-mail: joaoribeiro@fundacaoms.org.br.

² Eng^a. Agr^a. Assistente de Pesquisa, Fundação MS.

³ Técnico Agrícola, Fundação MS.




Figura 1 - Registros mensais de precipitação no período de condução dos ensaios em Ponta Porã-MS, safra 2024/2024. Fonte: Farmers Edge/Fundação MS.

Avaliações:

Notas de avaliação de doenças (mancha amarela, ferrugem e brusone) e acamamento:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R		MR		MS		S		AS

Nota: R: resistente; MR: moderadamente resistente; MS: moderadamente susceptível; S: susceptível; AS: altamente susceptível.

RESULTADO

Tabela 2 - Número de dias para o espigamento e maturação, altura da planta, notas de mancha amarela, massa de 100 grãos, peso hectolitro, produtividade de grãos e rendimento relativo, de cultivares de **trigo** e **triticale**, semeadas em **20/04/2024**, Faz. CIATEC-CIARAMA, Ponta Porã-MS.

Cultivar	Espigamento (dias)	Maturação (dias)	Altura (cm)	Mancha Amarela	Massa de 100 grãos	Peso hectolitro (kg/hct)	Prod. (sc ha ⁻¹)*	Rendimento Relativo (%)
BAR-30	59	109	67.00	1.33	3.60	80.47	46.58 a	139.43
BRS-TAMBAQUI ^A	47	110	73.00	1.67	4.13	78.23	44.85 a	134.26
IPR-GOITACA ^A	52	111	67.00	1.33	4.30	77.07	44.44 a	133.04
TBIO-PONTEIRO	62	110	59.00	0.67	3.37	77.80	43.75 a	130.97
BRS-404	51	99	65.33	2.67	3.73	78.50	42.12 a	126.08
ORS-1403	58	107	57.33	1.00	3.10	77.60	41.55 a	124.37
TBIO-CONVICTO	58	106	59.67	2.00	3.49	81.33	40.75 a	121.99
IPR-AIMORE ^A	42	111	73.67	2.67	4.70	75.60	39.77 a	119.06
BRS-ATOBÁ	51	101	54.67	2.67	3.58	81.87	38.56 b	115.41
IPR-CATUARA	46	94	57.00	2.33	4.16	85.23	38.53 b	115.33
TRÓPICO	54	106	54.00	2.00	3.91	73.87	37.93 b	113.55
CD-1303	48	96	52.00	1.33	3.53	77.33	37.61 b	112.58
BELA-3	46	96	53.67	2.00	4.16	76.30	37.60 b	112.54
DM-4025	58	109	46.00	1.67	3.74	69.30	36.92 b	110.52
BRS-COLEIRO	52	108	62.00	2.67	3.59	77.60	35.82 b	107.21
IPR-POTYPORÃ	55	106	53.33	2.00	3.86	77.37	35.65 b	106.70
BIOTRIGO-TITAN	55	107	51.33	2.00	3.56	74.07	35.00 b	104.76
ORD-TURBO	45	93	45.00	2.00	3.59	74.77	34.93 b	104.57
BRS-MACUCO	58	109	58.00	2.67	3.29	84.07	34.62 b	103.64
ORS-FEROZ	46	96	51.67	1.67	3.58	76.33	34.57 b	103.49
BRS-JACANA	52	104	57.33	2.67	4.03	80.93	34.44 b	103.09
BRS-SANHAÇO	60	108	54.00	1.67	3.66	76.83	33.95 b	101.63
TSZ-CHIARO	49	101	53.33	1.67	3.00	78.20	32.82 c	98.25
ORS-SOBERANO	52	101	47.67	2.00	3.06	78.87	32.08 c	96.04
ORS-FALCÃO	45	99	48.33	2.33	3.69	71.87	32.05 c	95.95
ORS-ABSOLUTO	47	97	52.00	2.67	3.47	78.50	31.76 c	95.07

TBIO-DUQUE	52	102	56.67	2.33	6.71	80.73	31.61 c	94.63
BELA-1	45	91	48.33	2.00	3.70	76.17	31.49 c	94.25
DM-3025	52	104	48.33	1.50	3.31	77.10	31.02 c	92.84
BELA-2	45	96	49.67	2.33	3.58	78.90	30.98 c	92.73
BAR-31	60	109	60.67	2.00	3.71	82.03	30.50 c	91.29
IPR-BATОВI	60	107	53.67	2.00	3.10	80.27	29.70 c	88.89
VENCITORE	56	102	53.33	2.00	3.23	71.70	27.30 d	81.71
FPS-XERIFE	54	109	47.67	2.67	3.53	72.47	27.12 d	81.17
TBIO-CALIBRE	45	88	43.67	1.00	3.25	78.00	26.22 d	78.49
ORS-GLADIADOR	48	109	48.67	1.33	3.95	79.90	26.09 d	78.10
ORS-SELVAGEM	52	105	50.00	2.00	3.51	75.47	25.31 d	75.76
BIOTRIGO-TALISMÃ	53	102	48.33	2.67	3.25	77.53	24.98 d	74.77
TBIO-TRUNFO	53	105	46.33	1.33	3.20	74.13	24.75 d	74.08
TBIO-MOTRIZ	58	111	45.67	2.67	3.47	76.87	24.73 d	74.01
ORS-SENNA	42	85	47.33	1.00	3.59	75.67	23.46 d	70.22
FPS-REGENTE	45	89	46.00	2.50	3.44	71.03	21.58 d	64.61
BRS-264	46	92	59.67	2.50	3.04	76.40	21.02 d	62.91
Média	51.55	102.33	54.12	2.01	3.66	77.31	33.41	100
CV (%)	-	3.45	9.91	-	25.45	6.75	15.23	-

*Médias de produtividade de grãos seguidas pela mesma letra na coluna constituem grupo estatístico homogêneo ($p \leq 0,05$), pelo teste Scott & Knott.

(A) Cultivares de tritcale.

Rendimento relativo (%): (produtividade de grãos * 100)/média geral

Não houve ocorrência de acamamento de plantas, ferrugem da folha e brusone.