

DOSES DE MAGNÉSIO NO TEOR FOLIAR E NA PRODUTIVIDADE DE GRÃOS DA CULTURA DO MILHO SAFRINHA IRRIGADO POR ASPERSÃO

*Eng. Agr. Dr. Douglas de Castilho Gitti, Eng. Agr. Marcos Antonio Szeremeta Spak,
Eng. Agr. Bruno Harthcopf Esposito, Tec. Agr. Reinaldo Paniagua do Nascimento*


OBJETIVO

Avaliar a eficiência de doses de magnésio em aplicação nos estádios V6 e V8 no teor foliar de nutrientes, componentes de produção e na produtividade de grãos do milho safrinha irrigado por aspersão.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no ano agrícola, safra 2026 no município de Maracaju MS, Brasil, em área experimental irrigada da Fundação MS localizada na Fazenda Alegria, Talhão Area 1. O clima da região, segundo classificação de Köppen, é do tipo Aw, com precipitação pluvial média anual de 1.500 a 1.750 mm, temperatura média anual de 27 °C.

Gráfico 1. Precipitação pluviométrica por decêndio e acumulado por mês no período de condução do experimento da safra verão. Fundação MS, Maracaju, MS, 2026. Fonte: Estação meteorológica Farmers Edge.



O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico de textura argilosa. A caracterização química e de textura do solo da área experimental foi

realizada com a coleta da análise de solo na profundidade de 0-20 e 20-40 cm, sendo os resultados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização química e de textura do solo da área experimental nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Fundação MS, Maracaju MS, 2026.

Prof (cm)	--- pH --- CaCl ₂	--- H ₂ O	MO gdm ⁻³	P Meh.	P Res.	K -----	Ca	Mg mmolc	Al dm ⁻³ -----	H+Al	SB	T	V (%)
0-20	5,2	5,9	33	18,4	58	3,2	59,0	17,3	0,0	55,45	79,5	134,95	58,91
20-40	5,2	5,9	27	5,4	18	2,3	50,8	13,3	0,0	58,47	66,4	124,87	53,17
Prof (cm)	S -----	Zn	B mg	Cu dm ⁻³ -----	Mn	Fe -----	Relação Ca/Mg	Ca -----	Mg % da CTC	K -----	M	Argila (%)	
0-20	17,3	3,5	0,59	8,2	119,7	30,2	3,41	43,72	12,82	2,37	0,0	58,3	
20-40	32,0	1,5	0,46	8,9	96,8	35,6	3,82	40,68	10,65	1,84	0,0	59,50	

Análise realizada em 10/09/2025 – Maracaju, Talhão Área 1 – Pivô D. Código FMS 29026 (0-20 cm) e 29027 (20-40 cm)

Foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições e cinco tratamentos (Tabela 2). Os estádios de desenvolvimento do milho foram definidos segundo a escala fenológica proposta por Ritchie (1989).

Tabela 2. Descrição dos tratamentos avaliados na cultura do milho safrinha. Fundação MS, Maracaju, MS, 2026.

Trat.	PRODUTO	Dose Mg (g ha ⁻¹)	Dose Produto (L ha ⁻¹)	Aplicação
1	Testemunha	0	0	-
2	Nutril Magnésio Kimberlit	56 + 56	0,5 + 0,5	V6 + V8
3	Nutril Magnésio Kimberlit	112 + 112	1,0 + 1,0	V6 + V8
4	Nutril Magnésio Kimberlit	224 + 224	2,0 + 2,0	V6 + V8
5	Nutril Magnésio Kimberlit	448 + 448	4,0 + 4,0	V6 + V8

TA35 – 50 mL/ha

As parcelas foram constituídas por 5 linhas com 6 m de comprimento, considerando-se como área útil as 3 linhas centrais com 6 m de comprimento.

As sementes de milho foram tratadas com os produtos Cropstar[®] TSI e Redigo[®] TSI.

A semeadura do milho foi realizada no dia 11 de fevereiro de 2026 utilizando o Híbrido DKB260 VTPRO4 na densidade de semeadura de 3,3 sementes por metro com 0,5 m entre linhas, ocorrendo à emergência das plântulas seis dias após a semeadura.

A adubação foi realizada no sulco de semeadura utilizando 400 kg ha⁻¹ do formulado 12-15-15. A adubação de cobertura foi realizada no estágio V2 com utilização de 150 kg ha⁻¹ de Ureia (45-00-00) e no estágio V4 com utilização de 350 kg ha⁻¹ de Sulfato de Amônio (21-00-00).

A aplicação dos tratamentos foi realizada nos estádios V6 e V8, conforme descrito na Tabela 2, com pulverizador costal de pressão constante (CO₂), equipado com barra de 2,5 m e cinco pontas AXI 11002, espaçadas a 50 cm. O volume de calda foi de 120 L ha⁻¹, com pressão de 20,3 psi. As aplicações ocorreram sob condições climáticas adequadas, com dados detalhados de umidade e temperatura apresentados a seguir.

Tabela 3. Aspecto técnico relacionado à aplicação foliar realizada na cultura da soja. Fundação MS, Maracaju, MS, 2026.

Aplicação	Estádios fenológicos	Data	Horário	T°C	U.R. (%)
1ª aplicação	V6	05/03/2026	08:28	30°	53
2ª aplicação	V8	18/03/2026	08:08	32°	72

A colheita foi realizada no dia 15 de julho de 2026 aos 147 dias após a emergência das plântulas (DAE).

Foram realizadas as seguintes avaliações:

Análise foliar: foi realizada a coleta de 15 folhas por tratamento no estágio R1 e posteriormente as amostras foram secas, identificadas e encaminhadas ao laboratório para determinação de macro e micronutrientes.

Número de fileira por espiga e número de grãos por fileira: foi determinado o número de fileiras e grãos em 5 plantas por parcela no momento da colheita.

População final de plantas: foi determinado a quantidade de plantas em 10 metros lineares antes da colheita, logo após convertido em plantas por hectare.

Massa de 100 grãos: foi retirada uma amostra de 100 grãos de cada parcela para a análise da massa dos grãos, corrigindo-se para 13% de umidade (b.u.).

Produtividade: foi realizada a colheita mecanizada das parcelas aos 147 DAE. As amostras foram pesadas e os dados transformados em kg ha⁻¹, corrigindo-se a produtividade para 13% de umidade (b.u.).

Os resultados foram submetidos ao teste F da análise de variância. As doses de zinco foram analisadas por regressão, sendo ajustados modelos lineares e quadráticos. Foi utilizado o programa estatístico Sisvar para análise dos resultados.

RESULTADOS

Tabela 4. Teor foliar de macronutrientes obtidos em coletas realizadas no florescimento feminino da cultura do milho obtidos em função da aplicação de doses de magnésio nos estádios V6 e V8 da cultura do milho. Fundação MS, Maracaju, MS, 2026.

Nº	TRATAMENTOS	Dose Mg (g ha ⁻¹)	N	P	K	Ca	Mg	S
			g kg ⁻¹					
1	Testemunha	0	30,25	3,00	2,00	5,75	3,50 ¹	2,00
2	Nutril Magnésio Kimberlit	56 + 56	30,75	3,00	21,00	6,00	3,25	1,75
3	Nutril Magnésio Kimberlit	112 + 112	30,00	2,80	22,20	4,80	3,00	2,00
4	Nutril Magnésio Kimberlit	224 + 224	29,66	2,66	24,33	4,00	2,00	2,00
5	Nutril Magnésio Kimberlit	448 + 448	29,25	3,00	23,00	4,50	2,75	2,00
	Teste F	-	0,61 ^{ns}	1,15 ^{ns}	2,17 ^{ns}	1,47 ^{ns}	8,61 ^{**}	1,00 ^{**}
	Regressão	-	-	-	-	-	RQ	-
	CV (%)	-	4,80	9,27	7,00	26,32	12,18	11,47
	Média	-	30,00	2,90	22,40	5,05	2,95	1,95

^{**}, * e ^{ns} – significativo a 1 e 5% de probabilidade, e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV - Coeficiente de variação. DMS - diferença mínima significativa. (1) Y = 3,6730 - 0,0052x + 0,000005x² (R² = 0,86),

Tabela 5. Teor foliar de micronutrientes obtidos em coletas realizadas no florescimento feminino da cultura do milho obtidos em função da aplicação de doses de magnésio nos estádios V6 e V8 da cultura do milho. Fundação MS, Maracaju, MS, 2026.

Nº	TRATAMENTOS	Dose Mg (g ha ⁻¹)	Fe	Mn	Zn	Cu	B
			mg kg ⁻¹				
1	Testemunha	0	150,75	61,25	15,00	11,25	11,25
2	Nutril Magnésio Kimberlit	56 + 56	178,75	61,25	15,00	10,75	12,25
3	Nutril Magnésio Kimberlit	112 + 112	159,60	58,20	15,80	11,80	9,80
4	Nutril Magnésio Kimberlit	224 + 224	167,66	46,00	15,00	11,66	10,33
5	Nutril Magnésio Kimberlit	448 + 448	151,25	53,25	16,00	11,50	10,00
Teste F		-	2,84 ^{ns}	1,95 ^{ns}	0,17 ^{ns}	0,32 ^{ns}	0,19 ^{ns}
Regressão		-	-	-	-	-	-
CV (%)		-	8,63	15,07	15,73	12,90	14,57
Média		-	161,20	56,60	15,40	11,40	10,70

^{**}, * e ^{ns} – significativo a 1 e 5% de probabilidade, e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV - Coeficiente de variação. DMS - diferença mínima significativa.

Tabela 6. Número de grãos por fileira e número de fileiras por espiga obtidos em função da aplicação de doses de magnésio nos estádios V6 e V8 da cultura do milho. Fundação MS, Maracaju, MS, 2026.

Nº	TRATAMENTOS	Dose Mg (g ha ⁻¹)	Número de fileiras por espiga	Número de grãos por fileira
1	Testemunha	0	17,75	29,25
2	Nutril Magnésio Kimberlit	56 + 56	17,75	29,25
3	Nutril Magnésio Kimberlit	112 + 112	18,20	31,00
4	Nutril Magnésio Kimberlit	224 + 224	17,33	30,00
5	Nutril Magnésio Kimberlit	448 + 448	17,75	30,75
Teste F		-	1,34 ^{ns}	1,69 ^{ns}
Regressão		-	-	-
CV (%)		-	2,95	4,34
Média		-	17,80	30,10

^{**}, * e ^{ns} – significativo a 1 e 5% de probabilidade, e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV - Coeficiente de variação. DMS - diferença mínima significativa.

Tabela 7. População final de plantas, massa de 100 grãos e produtividade obtidos em função da aplicação de doses de magnésio nos estádios V6 e V8 da cultura do milho. Fundação MS, Maracaju, MS, 2026.

Nº	TRATAMENTOS	Dose Mg (g ha ⁻¹)	População Final de Plantas	Massa de 100 grãos (g)	Produtividade (sc ha ⁻¹)
1	Testemunha	0	65.000	35,50	209,82 ¹
2	Nutril Magnésio Kimberlit	56 + 56	65.555	37,50	205,95
3	Nutril Magnésio Kimberlit	112 + 112	63.888	37,00	216,02
4	Nutril Magnésio Kimberlit	224 + 224	62.222	36,66	217,53
5	Nutril Magnésio Kimberlit	448 + 448	67.222	36,75	206,62
	Teste F	-	1,24 ^{ns}	0,60 ^{ns}	1,42 ^{ns (p<0,28)}
	Regressão	-	-	-	-
	CV (%)	-	4,47	5,19	4,15
	Média	-	64.777	36,70	211,11

^{**}, ^{*} e ^{ns} – significativo a 1 e 5% de probabilidade, e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV - Coeficiente de variação. DMS - diferença mínima significativa. (1) $y = 207,0395 + 0,0427x - 0,000048x^2$ ($R^2 = 0,65$),

CONCLUSÃO

Considerando as condições edafoclimáticas e para o período de condução do presente experimento, pode-se concluir que:

A aplicação de doses de Mg foliar não proporcionou aumento no teor foliar de Mg no milho safrinha irrigado por aspersão no intervalo de doses entre 112 e 896 g/ha de Mg parcelado em duas aplicações (V6 e V8).

Em ambiente de produção com teor de Mg no solo com 17,3 mmolc/dm³ (12,82% da T) e teores foliares de Mg no milho entre 2,0 até 3,5 g/kg as doses de Mg avaliadas proporcionaram aumento da produtividade de grãos do milho safrinha irrigado por aspersão até a dose máxima estimada de 448 g/ha de Mg parcelado em duas aplicações (V6 e V8).

REFERÊNCIAS

RITCHIE, S.; HANWAY, J. J. How a corn plant develops. Ames: Iowa State University of Science and Technology/ Cooperative Extension Service, 1989.