

# 양수천자

## Amniocentesis

Amniocentesis is a test in which a small amount of amniotic fluid is removed with a thin needle. Amniotic fluid is the fluid that surrounds a baby in the uterus (womb). The sample is sent to a lab and tested for certain birth defects or genetic problems. This test may also be done for other reasons. The results of this test are very accurate.

### There are some risks with this test:

- A leak or infection of the amniotic fluid
- The needle touching the baby
- Early delivery
- Miscarriage

Talk to your doctor about these risks and any other concerns.

### During the Test

Arrive on time for your test. Plan on this test taking about 1 hour.

- You will wear a hospital gown.
- You will lie on your back with your stomach uncovered.
- Your stomach will be cleaned.
- Your doctor will use ultrasound to see your baby and find safe pockets of amniotic fluid. An ultrasound is a picture of your baby using sound waves.
- Your doctor may numb the skin where the needle goes in. You may feel a sting.

양수천자는 얇은 바늘로 소량의 양수를 제거하는 검사입니다. 양수는 자궁(아기집) 내 아기를 둘러싸고 있는 유체입니다. 샘플은 실험실로 보내져 특정한 선천적 결함 또는 유전적 문제가 있는 지 검사됩니다. 이 검사는 또한 다른 이유에 의해 수행될 수도 있습니다. 이 검사의 결과는 매우 정확합니다.

### 이 검사를 할 때 약간의 위험이 따릅니다:

- 양수의 누출이나 감염
- 바늘이 아기를 건드릴 가능성
- 조기 분만
- 유산


이러한 위험 및 기타 우려 사항에 대해 담당의와 상의하십시오.

### 검사 중

검사받는 날 제시간에 도착하십시오. 약 1 시간정도 걸릴 것으로 예상하십시오.

- 병원 가운을 입게 됩니다.
- 복부를 노출한 채 등을 대고 누워 있어야 합니다.
- 위장을 세척하게 됩니다.
- 담당의가 초음파를 이용하여 아기를 보면서 안전한 양수 주머니를 찾습니다. 초음파는 음파를 이용하여 찍은 태아의 사진입니다.
- 주사를 찌르는 피부를 약간 마취시키기도 합니다. 바늘이 들어갈 때 따끔할 수 있습니다.

- When the needle enters the uterus, you may feel cramping.
- The doctor will take out a small sample of the fluid and remove the needle. The needle is in for less than 1 minute.
- A monitor will be placed on your stomach for 15 to 30 minutes to check your baby's heartbeat.
- Once the lab tests are complete, your doctor will share the results with you. This may take about 2 weeks.



- 바늘이 자궁을 통과할 때 약간 경련을 느낄 수 있습니다.
- 의사는 양수를 채취한 후 바늘을 뽑습니다. 바늘이 들어가 있는 시간은 1 분도 되지 않습니다.
- 모니터를 복부에 15-30 분 가량 놓고 태아의 심장 박동을 검사합니다.
- 실험실 검사가 완료되면, 의사가 결과를 귀하에게 알려드립니다. 결과는 약 2 주가 소요될 수 있습니다.

## After the Test

- Rest at home today.
- Drink plenty of liquids.
- If you have cramping, lie on your left side.

## Call your doctor right away if you have:

- Severe cramping
- Fluid leaking from the vagina
- Bleeding from the vagina
- Fever
- Your baby is less active
- Other concerns

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

## 검사 후

- 검사 받은 날은 집에서 쉬십시오.
- 물을 충분히 마시십시오.
- 경련이 있으면 왼쪽으로 돌아누우십시오.

## 아래와 같은 증상이 있을 경우 즉시 의사에게 알려십시오:

- 심한 경련
- 질에서 액체가 흘러나옴
- 질에서 피가 나옴
- 발열
- 태아가 잘 움직이지 않음
- 그밖에 문제

질문 또는 우려사항이 있을 경우 담당의나 간호사와 상의하십시오.