

Cắt Bao Quy Đầu ở Nam Giới

Male Circumcision

A circumcision is the removal of the piece of skin, called the foreskin, from around the end of the penis, called the glans. This is an elective procedure or surgery, which means you decide if you want to have it done.

If you decide to have a circumcision for your son, it is done in the hospital nursery by your baby's doctor before your baby goes home.

Cắt bao quy đầu là cắt một phần da, còn được gọi là bao quy đầu, khỏi vùng quanh đầu dương vật, còn được gọi là đầu dương vật. Đây là thủ thuật hay phẫu thuật không bắt buộc, có nghĩa là quý vị tự quyết định có muốn thực hiện hay không.

Nếu quý vị quyết định cắt bao quy đầu cho con trai thì bác sĩ của trẻ sẽ thực hiện thủ thuật này trong phòng chăm sóc trẻ của bệnh viện trước khi trẻ xuất viện.

How Circumcision is Done

The procedure takes about 15 minutes. The doctor uses a numbing medicine, so the baby feels little pain.

A metal clamp is used around the penis and a piece of it, called the bell, is slipped under the foreskin to protect the end of the penis. The skin is cut around the bell and removed, so the end of the penis can be seen.

The penis may be wrapped in Vaseline gauze. If needed, special gauze or stitches are used for bleeding.

After the circumcision

- Your baby will be checked for bleeding for about an hour after the procedure.
- Many babies sleep for the first few hours, but try to wake him to feed.

Dương Vật Chưa Cắt Bao Quy Đầu
Uncircumcised Penis



Dương Vật Đã Cắt Bao Quy Đầu
Circumcised Penis



Quy Trình Cắt Bao Quy Đầu

Thủ thuật chỉ mất khoảng 15 phút. Bác sĩ sử dụng một loại thuốc gây tê nên trẻ hầu như không cảm thấy đau.

Bác sĩ dùng kẹp kim loại giữ quanh dương vật và luồn một phần kẹp, được gọi là dụng cụ bảo vệ đầu dương vật, xuống dưới bao quy đầu để bảo vệ đầu dương vật. Bác sĩ sẽ cắt quanh dụng cụ bảo vệ đầu dương vật và tháo ra để có thể thấy đầu dương vật.

Có thể dùng gạc Vaseline để băng bó dương vật. Nếu cần, sẽ sử dụng gạc đặc biệt hoặc khâu để xử lý nếu chảy máu.

Sau khi cắt bao quy đầu

- Trẻ sẽ được kiểm tra xem có chảy máu hay không trong khoảng một giờ sau khi thực hiện thủ thuật.
- Nhiều trẻ sẽ ngủ trong vài giờ đầu nhưng hãy cố gọi trẻ dậy bú.

- He may seem uncomfortable when urinating after the numbing medicine has worn off. Holding and swaddling will often soothe him.
- Swelling in the area will go away in 4 or 5 days.

Care at home

- Keep your baby off of his stomach for the first few days.
- Keep the area clean and dry.
- Use warm water only when washing, with no soap. Gently pat dry.
- With each diaper change for the next 7 days or until the penis is healed:
- Wash your hands before and after.
- Do not use diaper wipes directly on the penis. The alcohol in them can sting.
- Do not try to remove the crust that forms on the wound. It is a part of healing.
- Apply Vaseline to the end of the penis until it is healed.

Call your baby's doctor if you notice:

- More than a few drops of blood on the penis or if the diaper has a spot of blood larger than an inch across.
- No wet diapers or very few within 12 hours of the circumcision.
- Signs of infection, like redness, swelling, pus draining from the area, foul odor or fever.

- Trẻ có thể tỏ vẻ không thoải mái khi tiểu tiện sau khi thuốc tê hết tác dụng. Ôm và quấn tã cho trẻ thường sẽ xoa dịu trẻ.
- Nếu vết thương bị sưng thì sẽ hết trong 4 hoặc 5 ngày.

Chăm sóc tại nhà

- Không để trẻ chạm vào bụng trong vài ngày đầu.
- Giữ vết thương sạch sẽ và khô ráo.
- Chỉ dùng nước ấm để rửa, không dùng xà phòng. Vỗ khô nhẹ nhàng.
- Mỗi lần thay tã trong 7 ngày tiếp theo hoặc cho đến khi dương vật lành:
- Rửa tay trước và sau khi thay.
- Không sử dụng khăn ướt lau trực tiếp lên dương vật. Còn trong khăn ướt có thể khiến trẻ bị xót.
- Không cố lau sạch vảy cứng hình thành trên vết thương. Đó là một phần trong quá trình lành lại.
- Bôi kem Vaseline vào đầu dương vật cho đến khi lành hẳn.

Gọi cho bác sĩ của trẻ nếu quý vị phát hiện:

- Trên dương vật có nhiều máu (hơn vài giọt) hoặc nếu tã có vết máu rộng hơn 1 inch.
- Trẻ không đi tiểu hoặc tiểu rất ít trong vòng 12 giờ sau khi cắt bao quy đầu.
- Các dấu hiệu nhiễm trùng như đỏ, sưng, chảy mủ từ vết thương, mùi hôi hoặc sốt.