


Воспаление среднего уха

Middle Ear Infection

Middle ear infection is called otitis media. This infection occurs when germs get into the middle ear and the area fills with fluid.

Germs from a cold or flu can lead to a middle ear infection.

Fluid build-up in the middle ear can put pressure on your eardrum causing pain or other symptoms.



Воспаление среднего уха, или средний отит, развивается, когда в среднее ухо попадают микробы и оно наполняется жидкостью.

Воспаление могут вызывать бактерии и вирусы.

Скапливающаяся в среднем ухе жидкость может давить на барабанную перепонку, вызывая боль или другие симптомы.

Signs and Symptoms

- Ear pain
- Fever
- Drainage from the ear
- Hearing loss
- Loss of balance

Your Care

- Your doctor will ask you about your symptoms and check your ears.
- Ear infections often go away on their own.
- Antibiotic medicine may be ordered for severe infections. Take all of your medicine as directed.
- Follow your doctor's recommendations to treat pain using over-the-counter pain relievers.

Признаки и симптомы

- Боль в ухе
- Повышенная температура
- Выделения из уха
- Ухудшение слуха
- Нарушение равновесия

Лечение

- Врач расспросит вас о симптомах и осмотрит ваши уши.
- Часто ушные инфекции проходят сами по себе.
- При тяжелом течении болезни могут быть назначены антибиотики, которые необходимо принять до конца согласно указаниям врача.
- Следуйте рекомендациям врача по использованию безрецептурных обезболивающих.

- Do not put anything in your ears including liquids, herbs or cotton-tipped applicators unless directed to by your doctor. They can block your ear canal, causing a loss of hearing or infection.

Call your doctor right away if you have:

- Pain that gets worse
- Fever that gets higher or does not go away
- Drainage that gets worse
- Hearing loss

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

- Без рекомендации врача не вводите в уши ничего, включая жидкости, травы или аппликаторы с ватными наконечниками. Они могут заблокировать слуховой проход и вызвать потерю слуха или воспаление.

Немедленно позвоните врачу, если у вас:

- Усиливается боль
- Растет или не снижается температура
- Усиливаются выделения
- Пропал слух

Если у вас есть вопросы или опасения, обратитесь к врачу или медсестре.