



Formentera

LAS AVES DE
FORMENTERA

Cogujada montesina (*Galerida theklæe*)

LAS AVES DE FORMENTERA

Edita y publica: Consell Insular de
Formentera. Abril 2022.

Fotografías y textos:
Jordi Serapio Riera, Endèmics.

Dipòsit legal: DL F 24-2022

LAS AVES DE FORMENTERA

Para los amantes de la naturaleza Formentera es una isla que sorprende a cada paso. Su situación estratégica, a caballo entre Europa y África, justo en medio de una de las principales rutas migratorias del mundo, hace de la isla un punto importante para la avifauna europea. Los ecosistemas insulares destacan, además, por su extrema singularidad. Cada una de las islas del Mediterráneo tiene su carácter y personalidad propia, determinada por su diversidad biológica y riqueza paisajística.

Las pequeñas dimensiones de la isla hacen que sea posible recorrerla de punta a punta en un solo día. Aunque para conocer y disfrutar del encanto de sus espacios naturales, es necesario destinar al menos una semana completa. Y los atractivos que encontraremos varían de una estación a otra. La primavera, que aquí se presenta de forma muy intensa, es uno de los mejores momentos del año para conocer la isla. Como ocurre con los meses de otoño, también muy favorables para la observación de aves, los pasos migratorios incrementan notablemente el número de especies.

La diversidad de la fauna y flora de Formentera, muy marcada por la insularidad, y la calidad de sus hábitats, constituyen el motivo de que una parte importante de su territorio se encuentre incluido dentro de la Red Natura 2000. Diferentes espacios están calificados como Zonas de Especial Protección para las Aves, y Lugares de Importancia comunitaria.



Pardillo común (*Carduelis cannabina*)



¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTA GUÍA?

En las páginas siguientes te invitamos a descubrir las aves y la naturaleza de Formentera. Recorreremos sus principales espacios naturales, desde las extensas playas de arena blanca y aguas turquesas, los altos acantilados de la Mola, pasando por las zonas de cultivo, los bosques y matorrales, y los estanques y las salinas.

La información presentada va destinada tanto a los ornitólogos expertos, que quieran anotar en sus cuadernos de campo algunas de las especies estrella, como a los que se inician en la observación de aves, o simplemente desean realizar un paseo agradable en contacto con la naturaleza. La vistosa e icónica lagartija, endémica de la isla, nos acompañará en todas y cada una de las salidas.

De entre las **doscientas especies de aves** que pueden observarse a lo largo del año en Formentera (ver anexo), en cada una de las propuestas destaca un pequeño grupo más emblemático o representativo. En algunos casos se trata de especies que, o son exclusivas del archipiélago balear, como la amenazada pardela balear (*Puffinus mauretanicus*), o la curruca balear (*Sylvia balearica*), o bien resultan raras o localizadas en otros lugares.

La intención de esta pequeña guía no es otra que invitar a disfrutar de una manera respetuosa del patrimonio natural que ofrece esta isla. A su vez, la guía quiere concienciar de la extrema fragilidad del entorno. Al final encontrará una recopilación de **buenas prácticas** para evitar posibles impactos.



LOS ISLOTES DE ES FREUS



Grupo de pardelas cenicientas (*Calonectris diomedea*)

LOS ISLOTES DE ES FREUS: SANTUARIO PARA LAS AVES MARINAS

El primer contacto con las aves y la naturaleza comienza ya antes de llegar a la isla. El viaje en ferry entre Ibiza y Formentera hace posible observar las aves marinas más comunes, y también, dependiendo de la época, algunas de las más emblemáticas, como la pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*), la pardela balear (*Puffinus mauretanicus*) o la gaviota de Audouin (*Larus audouinii*).

En es Freus, el brazo de mar que separa Formentera de Ibiza, encontramos un rosario de pequeños islotes que constituyen auténticos vergeles para estas especies, y lugares de nidificación de gran importancia. S'Espardell, al lado de levante, acoge durante la primavera una numerosa colonia de cría de gaviota de Audouin, además de algunas decenas de parejas de cormoranes moñudos o pardelas baleares. Del mismo modo que los pequeños islotes Es Penjats y las Illes Negres.

S'Espalmador, el mayor de los islotes formenterenses, es un microcosmos de una riqueza biológica extraordinaria.

Los sistemas dunares de la playa de s'Alga, en Espalmador, son unos de los mejores conservados de las Baleares, tras los que crece un valioso sabinar costero, y en el interior de la isla se sitúa una pequeña zona húmeda de aguas salobres, llamada sa Bassa de s'Espalmador, donde se concentran y reproducen algunas parejas





Colonia reproductora de gaviota de Audouin (*Larus audouinii*) en la isla de s'Espardell.

de las aves acuáticas más habituales de Formentera: el chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*), la cigüeñuela (*Himantopus himantopus*), o el tarro blanco (*Tadorna tadorna*). Además, una pequeña colonia de la amenazada pardela balear cría también a los peñascos marítimos de Espalmador que se observan durante el trayecto en ferry.

Este conjunto de islotes, muy transitado en verano por multitud de embarcaciones de recreo, se encuentra dentro del ámbito del Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera y está incluido dentro de la Red Natura 2000 por tratarse de un sitio de Importancia comunitaria (LIC), y ser una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El mar que los rodea, por constituir el hábitat de estas especies prioritarias, goza del reconocimiento internacional de un Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA, por sus siglas en inglés: Important Bird Area).

ESPECIES DESTACABLES

- Pardela balear (*Puffinus mauretanicus*)
- Pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*)
- Paíño (*Hydrobates pelagicus*)
- Cormorán moñudo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*)
- Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)
- Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)
- Charrán patinegro (*Sterna sandvicensis*)
- Alcatraz (*Sula bassana*)
- Págalo grande (*Stercorarius skua*)



Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)



VUELTA A LOS ESTANQUES Y LAS SALINAS



VUELTA A LOS ESTANQUES Y LAS SALINAS DE FORMENTERERA

Cerca del puerto de la Savina encontramos la única zona húmeda de Formentera, formada por dos grandes estanques y unas antiguas salinas. Para los formenterenses es un lugar emblemático, muy presente en la historia reciente de la isla, ligada a la actividad salinera. Y es, por otra parte, el espacio que concentra una mayor biodiversidad y presenta más posibilidades para la observación de aves. Sólo atravesar en coche la carretera que conduce de la Savina al núcleo urbano de Es Pujols ya podemos realizar las primeras observaciones de las especies típicas de esta zona, como los flamencos (*Phoenicopterus roseus*), las cigüeñuelas (*Himantopus himantopus*), o los tarros blancos (*Tadorna tadorna*). Es fácil apreciar a simple vista la riqueza natural de este espacio.

El Estany Pudent, el Estany des Peix, y las Salinas Ferrer y Marroig conforman este área que forma parte del Parque Natural de ses Salines.

Este espacio protegido engloba además una parte marítima inmensa, de gran importancia por la presencia de extensas praderas de *Posidonia oceanica*, que son la base de todo el ecosistema. Sistemas dunares de gran valor preceden las playas circundantes de Illetes, Levante y Cavall d'en Borràs, de aguas turquesas privilegiadas.



Grupo de flamencos (*Phoenicopterus roseus*)






Grupo de zampullines cuellinegros (*Podiceps nigricollis*) en el Estany Pudent

Las salinas han sido, desde la antigüedad, un lugar de interacción entre la naturaleza y el hombre, que, mediante la explotación de las salinas, ha propiciado la creación de un hábitat que las aves han sabido aprovechar. Las pequeñas zonas húmedas del Mediterráneo tienen una importancia capital para las aves acuáticas europeas. Huyendo del frío invernal, muchas especies buscan refugio en estas áreas del sur de Europa, sea para pasar el invierno, o sea sólo como lugar de paso donde reposar y alimentarse para continuar el viaje hasta destinos más lejanos.

Recorrer a pie el camino de es Brolls, que bordea el Estany Pudent, nos permite observar de cerca diferentes especies de aves limícolas, anátidas o ardeidos que se citan anualmente. Algunas, como el chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*), son sedentarias, mientras que otros se presentan sólo en los meses de verano para nidificar, o bien durante el invierno. Un grupo importante de aves sólo hace acto de presencia de forma esporádica durante los pasos migratorios. Es el caso, por ejemplo, de la garza imperial (*Ardea purpurea*).

El Estany Pudent acoge una de las concentraciones de zampullines cuellinegros (*Podiceps nigricollis*) más importantes de Europa.

El zampullín cuellinegro es, a finales de verano y durante el otoño, la especie más abundante. Algunos años se cuentan por miles. Observarlos un día de calma, con las aguas del lago como un espejo, resulta un espectáculo sorprendente.





Chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Este espacio natural acoge vida durante todo el año, pero es durante la primavera y el otoño, coincidiendo con los pasos migratorios, el momento que más diversidad de especies podemos observar. Aún así, muchos limícolas inician los movimientos postnupciales ya en el mes de agosto, y a partir de este momento los bordes de los estanques pueden ofrecernos algunas sorpresas interesantes.

ESPÈCIES DESTACABLES

- Águila pescadora (*Pandion haliaetus*)
- Flamenco (*Phoenicopterus roseus*)
- Cerceta común (*Anas crecca*)
- Tarro blanco (*Tadorna tadorna*)
- Zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)
- Avoceta (*Recurvirostra avosetta*)
- Cigüeñuela (*Himantopus himantopus*)
- Chorlitejo patinegro patinegro (*Charadrius alexandrinus*)
- Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)
- Correlimos chico (*Calidris minuta*)
- Buitrón (*Cisticola juncidis*)
- Lavandera boyera (*Motacilla flava*)
- Curruca balear (*Sylvia balearica*)
- Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)
- Curruca rabilarga (*Sylvia undata*)

RUTAS VERDES:

1 (La Savina - Ses Illetes), **2** (La Savina - Sant Francesc - Es Pujols),
3 (La Savina - Cala Saona), **4** (Sant Francesc - Ses escoles - Can Marroig).



Tarro blanco (*Tadorna tadorna*)



Cigüeñuela (*Himantopus himantopus*)

RECORRIDO POR LA MOLA



RECORRIDO POR LA MESETA DE LA MOLA


La Mola forma una unidad con personalidad propia dentro de la isla de Formentera. Se trata de la zona más alta, con imponentes acantilados que se alzan sobre el mar formando un gran macizo rocoso. Alcanza los 195 metros de altitud en su punto más alto, sa Talaïassa, y presenta una pluviometría ligeramente superior a la del resto del territorio formenterense. Su riqueza natural y ornitológica radica en la diversidad de ambientes. Vista desde el cielo parece un mosaico de tierras rojizas destinadas al cultivo, pequeñas manchas de vegetación forestal, y altos acantilados que caen al mar.

Formentera mantiene vivo su espíritu rural, y recorrer los senderos interiores de la Mola es, probablemente, la mejor manera de impregnarse de ella. Entre los campos de higueras, cereales y viñedos podremos observar una buena lista de especies ligadas a los entornos rurales: pequeñas bandadas de jilgueros y otros fringílidos, abubillas, alcaudones, tarabillas, etc.

En el pueblo del Pilar, justo al borde de la iglesia, nidifica cada año una pareja de golondrinas (*Hirundo rustica*).

Es importante destacar que las aves asociadas a las zonas agrícolas se encuentran actualmente en regresión a nivel global. Los cambios en los usos del suelo y la tecnificación de la actividad agraria son, entre otras, las causas de este declive.

Entre bosques de pinos, sabinas y otra vegetación arbustiva podremos observar con facilidad los dos sílvidos más abundantes de la isla: *Sylvia*





Pardela balear (*Puffinus mauretanicus*)

melanocephala y *Sylvia balearica*. En primavera y en verano crían en este hábitat la tórtola europea (*Streptopelia turtur*), y los papamoscas grises (*Muscicapa tyrrenica balearica*), una subespecie que es endémica de las Baleares. El búho chico (*Asio otus*), una especie poco conocida y difícil de observar, sitúa sus nidos en los pinos más espesos.

La naturaleza caliza de las rocas que conforman la Mola provoca que sus acantilados estén llenos de agujeros en forma de grutas y cuevas. Este es el lugar elegido por las pardelas baleares para establecer sus colonias de reproducción, y criar cada año a su único polluelo. La pardela balear es el ave marina más amenazada de Europa, un endemismo que en todo el mundo sólo se reproduce en las islas Baleares, y se encuentra en peligro crítico de extinción.

Cuantitativamente, la colonia de pardelas baleares (*Puffinus mauretanicus*) de la Mola es la más importante del mundo.

La población reproductora total de esta especie se estima en 3.000 parejas, y sólo en los acantilados de la Mola crían 460 (unas 700 parejas en toda la isla de Formentera incluyendo las de los islotes de s'Espalmador y s'Espardell). Los investigadores estiman que cada año se pierde un 14% de la población reproductora, y a este ritmo la pardela balear podría extinguirse en poco más de 60 años. La interacción con la industria pesquera y la contaminación del mar son algunas de las amenazas que encuentra en el mar abierto, donde hacen vida prácticamente todo el año. Solamente acceden a tierra firme para nidificar, donde los depredadores introducidos por el hombre (ratas y gatos) depredan sobre sus huevos y polluelos. Actualmente se desarrolla un proyecto de conservación para paliar algunas de estas amenazas.

Abubilla (*Upupa epops*)





Es un ave popular y conocida por los formenterenses que coloquialmente se refieren a los habitantes de la Mola con el gentilicio de "virots", aludiendo al nombre popular con el que se conoce esta especie en la isla. De la misma familia que los pardela balear, crían también en los acantilados de la Mola las pardelas cenicientas (*Calonectris diomedea*) y los paños (*Hydrobates pelagicus*). Además, un mínimo de tres parejas de halcones peregrinos (*Falco peregrinus*) tienen establecidos aquí sus territorios de cría. Un paseo por la línea de los acantilados nos permitirá observar y escuchar los reclamos característicos de los gorriones chillones (*Petronia petronia*), el canto aflautado de los roqueros solitarios (*Monticola solitarius*) o los chillidos de los vencejos (*Apus apus*), todas especies comunes en esta zona.

ESPECIES DESTACABLES

- Pardela balear (*Puffinus mauretanicus*)
- Pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*)
- Paño (*Hydrobates pelagicus*)
- Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)
- Búho chico (*Asio otus*) y Autillo (*Otus scops*)
- Alcaraván (*Burhinus oedicnemus*)
- Abubilla (*Upupa epops*)
- Alcaudón común (*Lanius senator badius*)
- Roquero solitario (*Monticola solitarius*)
- Papamoscas gris (*Muscicapa tyrrenica balearica*)
- Curruca balear (*Sylvia balearica*)
- Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)
- Gorrion chillón (*Petronia petronia*)
- Cogujada montesina (*Galerida theklae*)

RUTAS VERDES: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32



Halcón (*Falco peregrinus*)

PASEO POR LA PLANICIE DE ES CAP DE BARBARIA




PASEO POR LA PLANICIE DE ES CAP DE BARBARIA

El extremo sur de Formentera es también el punto más meridional del archipiélago balear. Esta finca, que fue adquirida por el Gobierno Balear, recibe el nombre de *sa Tanca d'Allà Dins*. A primera vista destaca por su singularidad paisajística y aspecto desolado. Aquí se localizan el conocido faro de Barbaria y una torre de vigilancia del siglo XVIII.

Tras la apariencia estéril de este lugar seco y pedregoso, poblado de vegetación arbustiva moldeada por los vientos, con sabinas, acebuches y romeros, se esconden algunas especies de aves singulares que tienen preferencia por los espacios abiertos. Este es el hábitat de la terrera común (*Calandrella brachydactyla*), que llega en primavera para construir su nido, y transformar con sus melódicos cantos el paisaje sonoro de esta llanura. Se trata de una especie vulnerable y en regresión a escala global, aunque en Formentera es abundante, y el Cap de Barbaria es el mejor lugar para observarla. La cogujada montesina (*Galerida theklae*), de la misma familia de los aláudidos, también es fácil de localizar aquí. Es una especie abundante y presente durante todo el año en diferentes lugares de la isla.

Un ave emblemática que podemos observar en es Cap es la *Sylvia balearica*

Este pequeño passeriforme, que en Formentera recibe el nombre *ganyet* o *enganyeta*, es de la familia de los sílvidos, y junto con la pardela balear, es una de las dos especies de aves endémicas de Baleares. De carácter inquieto, lo observaremos moverse entre los arbustos, o, aún más





Curruca baléar (*Sylvia balearica*)

fácilmente, escucharemos el canto áspero que los machos emiten desde lo alto de pequeñas atalayas entre la vegetación. Es una especie sedentaria, bastante abundante en la isla, que en todo el mundo sólo se encuentra en Formentera, Ibiza y Mallorca: es una de las joyas de observación obligada.

El popular alcaraván (*Burhinus oedicnemus*) también habita y se reproduce en el Cap de Barbaria, como lo hace también en muchos campos de cultivo del interior de la isla.

La planicie de Es Cap constituye una especie de pista de aterrizaje para los migrantes que vienen del sur.

Durante el inicio de la primavera, coincidiendo con el paso migratorio prenupcial, es fácil observar pequeños passeriformes de paso, como las collalbas (*Oenanthe Oenanthe* y *Oenanthe hispanica*), la bisbita campestre (*Anthus campestris*), o algunas rapaces como el águila calzada (*Aquila pennata*) y los aguiluchos (*Circus sp.*).

El largo perímetro de costa está formado por peñascos marítimos que alcanzan una altitud que se aproxima a los 40 metros, y donde desembocan algunas pequeñas torrenteras que, cuando llueve, evacuan las aguas al mar, quedando secas el resto del tiempo. Esta larga línea de costa acoge poblaciones importantes de pardela balear, de cormoranes moñudos y de gaviotas patiamarillas (*Larus michahellis*). Y al menos una pareja de halcones (*Falco peregrinus*) tienen en estos acantilados su territorio de cría.





Juvenil de terrera común (*Calandrella brachydactyla*)

Una experiencia muy recomendable, quizás inusual, es realizar una visita nocturna a visitar el Cap de Barbaria. Las noches tranquilas de los meses de marzo y abril ofrecen la posibilidad de escuchar los cantos estrambóticos las pardelas baleares. En este momento del año la actividad de las colonias de cría se muestra frenética. Además, la falta casi total de contaminación lumínica, con el faro de Barbaria como único punto de luz, harán de la salida un auténtico espectáculo para los sentidos.

ESPECIES DESTACABLES

- Pardela balear (*Puffinus mauretanicus*)
- Cormorán moñudo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*)
- Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)
- Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)
- Alcaraván (*Burhinus oedicnemus*)
- Roquero solitario (*Monticola solitarius*)
- Terrera común (*Calandrella brachydactyla*)
- Cogujada montesina (*Galerida theklae*)
- Bisbita campestre (*Anthus campestris*)
- Curruca balear (*Sylvia balearica*)
- Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)
- Collalbas (*Oenanthe oenanthe* y *Oenanthe hispanica*)
- Gorrion chillón (*Petronia petronia*)
- Pardillo común (*Carduelis cannabina*)

RUTAS VERDES: 8, 9, 10, 11 y 12



CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

Cualquier actividad que se desarrolla en el medio natural, por inofensiva pueda parecer, puede tener una serie de impactos negativos hacia los hábitats y las especies. Formentera es un territorio pequeño y extremadamente frágil. Hay que afrontar toda salida de campo y jornada de observación siguiendo un código de buenas prácticas que asegure el bienestar de las especies que tratamos de observar, y la conservación de sus hábitats. Todos somos responsables en la medida que nos corresponde. A continuación, se enumeran algunas recomendaciones:

- El bienestar de las aves y la conservación de los espacios es siempre la máxima prioridad. Evitar molestar las especies que tratemos de observar, manteniendo una distancia de seguridad que no altere su comportamiento, y especialmente durante las épocas de nidificación y migración.
- Respetar las fincas privadas, y la normativa de los espacios naturales protegidos, evitando acceder a sitios restringidos, no saliendo de los viales acondicionados, etc.
- Colaborar en la aportación de datos. Las observaciones obtenidas por aficionados de todos los niveles pueden aportar datos muy interesantes, y resultan muy útiles para el conocimiento de la distribución de las especies, e incluso dan información sobre problemas globales como el cambio climático. Os animamos a compartir vuestras observaciones con ornitólogos locales, o entidades conservacionistas (ver enlaces web).

WEBS DE INTERÉS

- Página oficial de turismo de Formentera: www.formentera.es
- Red Natura 2000 en las Islas Baleares: www.xarxanatura.es
- GEN GOB Ibiza: www.gengob.org
- Registro ornitológico de las islas Baleares: www.citau.gobmallorca.com
- SEO BirdLife: www.seo.org
- Rare birds in Spain: www.rarebirdspain.net
- Balears Natura: www.ca.balearsnatura.com
- Can Marroig (Centro de interpretación Parque Natural de Ses Salines): Información y visitas, llamar al Parque natural: 971.30.14.60 Ext. 3.

LISTA COMPLETA DE LAS AVES QUE PUEDEN OBSERVARSE EN FORMENTERA

A lo largo del año es posible observar en Formentera más de 200 especies de aves, contando aquellas que son sedentarias (nidifican y pasan todo el año en la isla), las que vienen solo en invierno, otras que se presentan en primavera y en verano para reproducirse, y un buen número que solo aparece durante los pasos migratorios. A esta cifra hay que añadir un grupo de aves divagantes o accidentales que visitan la isla de forma irregular y ocasional. Quizás tú puedes añadir nuevas especies a este listado. ¡La observación de aves es una actividad imprevisible!

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE POPULAR ESTATUS

ANATIDAE

☐ <i>Anser albifrons</i>	Ánsar careto	●
☐ <i>Anser anser</i>	Ánsar común	●
☐ <i>Tadorna tadorna</i>	Tarro blanco	● ● ●
☐ <i>Anas penelope</i>	Silbón europeo	● ●
☐ <i>Anas strepera</i>	Ánade friso	● ●
☐ <i>Anas crecca</i>	Cerceta común	● ●
☐ <i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade real	●
☐ <i>Anas acuta</i>	Ánade rabudo	● ●
☐ <i>Anas querquedula</i>	Cerceta carretona	●
☐ <i>Anas clypeata</i>	Cuchara común	● ●
☐ <i>Netta rufina</i>	Pato colorado	●
☐ <i>Aythya ferina</i>	Porrón común	● ●
☐ <i>Aythya nyroca</i>	Porrón pardo	●
☐ <i>Aythya fuligula</i>	Porrón moñudo	●
☐ <i>Aythya marila</i>	Porrón bastardo	●

● SEDENTARIO

● ESTIVAL-REPRODUCTOR

● HIVERNANTE

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE POPULAR ESTATUS

☐ <i>Melanitta nigra</i>	Negrón común	●
☐ <i>Mergus serrator</i>	Serreta mediana	● ●
PHASIANIDAE		
☐ <i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	●
☐ <i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	● ●
☐ <i>Phasianus colchicus</i>	Faisán	●
PODICIPEDIDAE		
☐ <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zampullín chico	●
☐ <i>Podiceps cristatus</i>	Somormujo lavanco	●
☐ <i>Podiceps nigricollis</i>	Zampullín cuellinegro	● ● ● ● ○
PROCELLARIIDAE		
☐ <i>Calonectris diomedea</i>	Pardela cenicienta	●
☐ <i>Puffinus mauretanicus</i>	Pardela balear	●
☐ <i>Puffinus yelkouan</i>	Pardela mediterránea	●
HYDROBATIDAE		
☐ <i>Hydrobates pelagicus</i>	Paño europeo	●

● MIGRANTE

● ACCIDENTAL

○ NO REPRODUCTOR

LISTA COMPLETA DE LAS AVES QUE PUEDEN OBSERVARSE EN FORMENTERA

SULIDAE			
☐ <i>Morus bassanus</i>	Alcatraz	●	
PHALACROCORACIDAE			
☐ <i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorán grande	●	
☐ <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormorán moñudo	●	
ARDEIDAE			
☐ <i>Botaurus stellaris</i>	Avetoro común	●	
☐ <i>Ixobrychus minutus</i>	Avetorillo común	●	
☐ <i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinete común	●	
☐ <i>Ardeola ralloides</i>	Garcila cangrejera	●	
☐ <i>Bubulcus ibis</i>	Garcilla bueyera	● ●	
☐ <i>Egretta garzetta</i>	Garceta común	● ●	
☐ <i>Egretta alba</i>	Garceta grande	●	
☐ <i>Ardea cinerea</i>	Garza real	● ●	
☐ <i>Ardea purpurea</i>	Garza imperial	●	
CICONIIDAE			
☐ <i>Ciconia nigra</i>	Cigüeña negra	●	
☐ <i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña común	●	
☐ <i>Mycteria ibis</i>	Tántalo africano	●	
THRESKIORNITHIDAE			
☐ <i>Plegadis falcinellus</i>	Morito común	●	
PHOENICOPTERIDAE			
☐ <i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamenco común	● ● ○	
ACCIPITRIDAE			
☐ <i>Pernis apivorus</i>	Abejero europeo	●	
☐ <i>Milvus migrans</i>	Milano negro	●	
ACCIPITRIDAE			
☐ <i>Milvus milvus</i>	Milano real	●	
☐ <i>Gyps fulvus</i>	Buitre leonado	●	
☐ <i>Circus gallicus</i>	Águila culebrera	●	
☐ <i>Circus aeruginosus</i>	Aguilucho lagunero	● ●	
☐ <i>Circus cyaneus</i>	Aguilucho palido	●	
☐ <i>Circus pygargus</i>	Aguilucho cenizo	●	
☐ <i>Accipiter nisus</i>	Gavilán	● ●	
☐ <i>Buteo buteo</i>	Busardo ratonero	●	
☐ <i>Aquila pennata</i>	Águila calzada	● ●	
PANDIONIDAE			
☐ <i>Pandion haliaetus</i>	Águila pescadora	● ●	
FALCONIDAE			
☐ <i>Falco naumanni</i>	Cernícalo primilla	●	
☐ <i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo común	●	
☐ <i>Falco vespertinus</i>	Cernícalo patirrojo	●	
☐ <i>Falco columbarius</i>	Esmerejón	●	
☐ <i>Falco subbuteo</i>	Alcotán	●	
☐ <i>Falco eleonora</i>	Halcón de Eleonora	●	
☐ <i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino	●	
RALLIDAE			
☐ <i>Rallus aquaticus</i>	Rascón	● ●	
☐ <i>Porzana porzana</i>	Polluela pintoja	●	
☐ <i>Crex crex</i>	Guión de cordornices	●	
☐ <i>Gallinula chloropus</i>	Gallineta común	●	
☐ <i>Porphyrio porphyrio</i>	Calamón	●	

● SEDENTARIO ● ESTIVAL-REPRODUCTOR ● HIVERNANTE ● MIGRANTE ● ACCIDENTAL ○ NO REPRODUCTOR

LISTA COMPLETA DE LAS AVES QUE PUEDEN OBSERVARSE EN FORMENTERA

RALLIDAE			
☐	<i>Fulica atra</i>	Focha común	● ●
GRUIDAE			
☐	<i>Grus grus</i>	Grulla	●
HAEMATOPODIDAE			
☐	<i>Haematopus ostralegus</i>	Ostrero euroasiático	●
RECURVIROSTRIDAE			
☐	<i>Himantopus himantopus</i>	Cigüeñuela	● ● ●
☐	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avoceta	● ●
BURHINIDAE			
☐	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Alcaraván	●
GLAREOLIDAE			
☐	<i>Glareola pratincola</i>	Canastera común	●
CHARADRIIDAE			
☐	<i>Charadrius dubius</i>	Chorlitejo chico	● ●
☐	<i>Charadrius hiaticula</i>	Chorlitejo grande	● ●
☐	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Chorlitejo patinegro	●
☐	<i>Charadrius morinellus</i>	Chorlito carambolo	●
☐	<i>Pluvialis apricaria</i>	Chorlito dorado	● ●
☐	<i>Pluvialis squatarola</i>	Chorlito gris	● ●
☐	<i>Vanellus vanellus</i>	Avefría	● ●
SCOLOPACIDAE			
☐	<i>Calidris canutus</i>	Correlimos gordo	●
☐	<i>Calidris alba</i>	Correlimos tridáctilo	●
☐	<i>Calidris minuta</i>	Correlimos menudo	● ●
☐	<i>Calidris temminckii</i>	Correlimos de Temmink	●
SCOLOPACIDAE			
☐	<i>Calidris ferruginea</i>	Correlimos zarapatín	●
☐	<i>Calidris alpina</i>	Correlimos común	● ●
☐	<i>Philomachus pugnax</i>	Combatiente	●
☐	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	Agachadiza chica	●
☐	<i>Gallinago gallinago</i>	Agachadiza común	● ●
☐	<i>Gallinago media</i>	Agachadiza real	●
☐	<i>Scolopax rusticola</i>	Chocha perdiz	● ●
☐	<i>Limosa limosa</i>	Aguja colinegra	●
☐	<i>Limosa lapponica</i>	Aguja colipinta	●
☐	<i>Numenius phaeopus</i>	Zarapito trinador	●
☐	<i>Numenius arquata</i>	Zarapito real	●
☐	<i>Tringa erythropus</i>	Archibebe oscuro	●
☐	<i>Tringa totanus</i>	Archibebe común	●
☐	<i>Tringa stagnatilis</i>	Archibebe fino	●
☐	<i>Tringa nebularia</i>	Archibebe claro	● ●
☐	<i>Tringa ochropus</i>	Archibebe grande	●
☐	<i>Tringa glareola</i>	Andarrios bastardo	●
☐	<i>Actitis hypoleucos</i>	Andarrios chico	● ●
☐	<i>Arenaria interpres</i>	Vuelvepedras	● ●
STERCORARIIDAE			
☐	<i>Stercorarius skua</i>	Págalo grande	● ●
LARIDAE			
☐	<i>Larus melanocephalus</i>	Gaviota cabercinegra	● ●
☐	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Gaviota enana	● ●
☐	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Gaviota reidora	● ●

● SEDENTARIO ● ESTIVAL-REPRODUCTOR ● HIVERNANTE ● MIGRANTE ● ACCIDENTAL ○ NO REPRODUCTOR

LISTA COMPLETA DE LAS AVES QUE PUEDEN OBSERVARSE EN FORMENTERA

LARIDAE

☐	<i>Chroicocephalus genei</i>	Gaviota picofina	●
☐	<i>Larus audouinii</i>	Gaviota de Audouin	● ● ●
☐	<i>Larus michahellis</i>	Gaviota patiamarilla	●
☐	<i>Rissa tridactyla</i>	Gaviota tridáctila	●

STERNIDAE

☐	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Pagaza piconegra	●
☐	<i>Hydroprogne caspia</i>	Pagaza piquirroja	●
☐	<i>Sterna sandvicensis</i>	Charrán patinegro	● ●
☐	<i>Sterna hirundo</i>	Charrán común	●
☐	<i>Sternula albifrons</i>	Charrancito común	●
☐	<i>Chlidonias hybrida</i>	Fumarel cariblanco	●
☐	<i>Chlidonias niger</i>	Fumarel común	●
☐	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Fumarel aliblanco	●

ALCIDAE

☐	<i>Alca torda</i>	Alca	● ●
☐	<i>Fratercula arctica</i>	Fraillecillo	● ●

COLUMBIDAE

☐	<i>Columba livia</i>	Paloma bravía	●
☐	<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	●
☐	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtola europea	●
☐	<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola turca	● ●

STRIGIDAE

☐	<i>Otus scops</i>	Autillo	●
☐	<i>Athene noctua</i>	Mochuelo común	●
☐	<i>Asio otus</i>	Búho chico	●

STRIGIDAE

☐	<i>Asio flammeus</i>	Búho campestre	●
--------------------------	----------------------	----------------	---

CUCULIDAE

☐	<i>Clamator glandarius</i>	Críalo europeo	●
☐	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	●

TYTONIDAE

☐	<i>Tyto alba</i>	Lechuza común	●
--------------------------	------------------	---------------	---

CAPRIMULGIDAE

☐	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras gris	●
--------------------------	------------------------------	------------------	---

APODIDAE

☐	<i>Apus apus</i>	Vencejo común	● ●
☐	<i>Apus pallidus</i>	Vencejo pálido	●
☐	<i>Apus melba</i>	Vencejo real	●

ALCEDINIDAE

☐	<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador	● ●
--------------------------	----------------------	-----------------	-----

MEROPIDAE

☐	<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco europeo	●
--------------------------	------------------------	-------------------	---

CORACIIDAE

☐	<i>Coracias garrulus</i>	Carraca	●
--------------------------	--------------------------	---------	---

UPUPIDAE

☐	<i>Upupa epops</i>	Abubilla	●
--------------------------	--------------------	----------	---

PICIDAE

☐	<i>Jynx torquilla</i>	Torcecuello	● ●
--------------------------	-----------------------	-------------	-----

ALAUDIDAE

☐	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrera común	● ●
☐	<i>Galerida theklae</i>	Cogujada montesina	●

● SEDENTARIO ● ESTIVAL-REPRODUCTOR ● HIVERNANTE ● MIGRANTE ● ACCIDENTAL ○ NO REPRODUCTOR

LISTA COMPLETA DE LAS AVES QUE PUEDEN OBSERVARSE EN FORMENTERA

ALAUDIDAE

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|---|
| ☐ | <i>Alauda arvensis</i> | Alondra común |   |
|--------------------------|------------------------|---------------|---|

HIRUNDINIDAE

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| ☐ | <i>Riparia riparia</i> | Avión zapador |  |
| ☐ | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Avión roquero |  |
| ☐ | <i>Hirundo rustica</i> | Golondrina común |   |
| ☐ | <i>Cecropis daurica</i> | Golondrina dáurica |  |
| ☐ | <i>Delichon urbicum</i> | Avión común |   |

MOTACILLIDAE

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| ☐ | <i>Anthus campestris</i> | Bisbita campestre |   |
| ☐ | <i>Anthus pratensis</i> | Bisbita pratense |  |
| ☐ | <i>Anthus trivialis</i> | Bisbita arbóreo |  |
| ☐ | <i>Anthus spinoletta</i> | Bisbita ribereño alpino |   |
| ☐ | <i>Motacilla flava</i> | Lavandera boyera |   |
| ☐ | <i>Motacilla cinerea</i> | Lavandera cascadeña |   |
| ☐ | <i>Motacilla alba</i> | Lavandera blanca |   |

TROGLODYTIDAE

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---|
| ☐ | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Chochín |  |
|--------------------------|--------------------------------|---------|---|

PRUNELLIDAE

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|---|
| ☐ | <i>Prunella modularis</i> | Acentor común |  |
|--------------------------|---------------------------|---------------|---|

TURDIDAE

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| ☐ | <i>Cercotrichas galactotes</i> | Petirrojo |  |
| ☐ | <i>Erithacus rubecula</i> | Ruiseñor común |   |
| ☐ | <i>Luscinia megarhynchos</i> | Pechiazul |  |
| ☐ | <i>Luscinia svecica</i> | Colirrojo tizón |  |
| ☐ | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Colirrojo real |   |

TURDIDAE

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| ☐ | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Colirrojo tizón |  |
| ☐ | <i>Saxicola rubetra</i> | Colirrojo real |  |
| ☐ | <i>Saxicola rubicola</i> | Tarabilla norteña |  |
| ☐ | <i>Oenanthe oenanthe</i> | Collalba gris |  |
| ☐ | <i>Oenanthe hispanica</i> | Collalba rubia |  |
| ☐ | <i>Oenanthe deserti</i> | Collalba desértica |  |
| ☐ | <i>Oenanthe leucura</i> | Collalba negra |  |
| ☐ | <i>Monticola saxatilis</i> | Roquero rojo |  |
| ☐ | <i>Monticola solitarius</i> | Roquero solitario |  |
| ☐ | <i>Turdus torquatus</i> | Mirlo capiblanco |  |
| ☐ | <i>Turdus merula</i> | Mirlo común |  |
| ☐ | <i>Turdus pilaris</i> | Zorzal real |   |
| ☐ | <i>Turdus philomelos</i> | Zorzal común |   |
| ☐ | <i>Turdus iliacus</i> | Zorzal alirrojo |   |
| ☐ | <i>Turdus viscivorus</i> | Zorzal charlo |   |

SYLVIIDAE

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| ☐ | <i>Cettia cetti</i> | Ruiseñor bastardo |  |
| ☐ | <i>Cisticola juncidis</i> | Buitrón |  |
| ☐ | <i>Locustella naevia</i> | Buscarla pintoja |  |
| ☐ | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Carricerín común |  |
| ☐ | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Carricero común |   |
| ☐ | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Carricero tordal |  |
| ☐ | <i>Iduna opaca</i> | Zarzero pálido occidental |  |
| ☐ | <i>Hippolais icterina</i> | Zarzero icterino |  |
| ☐ | <i>Hippolais polyglotta</i> | Zarzero polígota |  |

 SEDENTARIO
  ESTIVAL-REPRODUCTOR
  HIVERNANTE
  MIGRANTE
  ACCIDENTAL
  NO REPRODUCTOR

LISTA COMPLETA DE LAS AVES QUE PUEDEN OBSERVARSE EN FORMENTERA

SYLVIIDAE

☐	<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca capirota	● ●
☐	<i>Sylvia borin</i>	Curruca mosquitera	●
☐	<i>Sylvia nisoria</i>	Curruca gavilana	●
☐	<i>Sylvia curruca</i>	Curruca zarcerilla	●
☐	<i>Sylvia communis</i>	Curruca zarzera	●
☐	<i>Sylvia conspicillata</i>	Curruca tomillera	●
☐	<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga	● ●
☐	<i>Sylvia balearica</i>	Curruca balear	●
☐	<i>Sylvia cantillans</i>	Curruca carrasqueña	●
☐	<i>Sylvia melanocephala</i>	Curruca cabecinegra	●
☐	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquitero papialbo	●
☐	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Mosquitero silbador	●
☐	<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común	● ●
☐	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Mosquitero musical	●
☐	<i>Regulus regulus</i>	Reyezuelo sencillo	●
☐	<i>Regulus ignicapilla</i>	Reyezuelo listado	●

MUSCICAPIDAE

☐	<i>Muscicapa tyrrenica balearica</i>	Papamoscas balear	●
☐	<i>Muscicapa striata</i>	Papamoscas gris	●
☐	<i>Ficedula albicollis</i>	Papamoscas cerrojillo	●
☐	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papamoscas collarino	●

ORIOIDAE

☐	<i>Oriolus oriolus</i>	Oropéndola común	●
--------------------------	------------------------	------------------	---

LANIIDAE

☐	<i>Lanius collurio</i>	Alcaudón dorsirrojo	●
☐	<i>Lanius meridionalis</i>	Alcaudón real	●
☐	<i>Lanius senator</i>	Alcaudón común	● ●

CORVIDAE

☐	<i>Corvus corax</i>	Cuervo	● ○
--------------------------	---------------------	--------	-----

STURNIDAE

☐	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornino pinto	● ●
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----

PASSERIDAE

☐	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común	●
☐	<i>Petronia petronia</i>	Gorrión chillón	●

FRINGILLIDAE

☐	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón común	● ●
☐	<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	●
☐	<i>Carduelis chloris</i>	Verderón	●
☐	<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	●
☐	<i>Carduelis spinus</i>	Lúgano	● ●
☐	<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común	●

☐	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Picogordo	●
--------------------------	--------------------------------------	-----------	---

EMBERIZIDAE

☐	<i>Emberiza hortulana</i>	Escribano hortelano	●
☐	<i>Emberiza pusilla</i>	Escribano pigmeo	●
☐	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Escribano palustre	● ●
☐	<i>Emberiza calandra</i>	Triguero	●

● SEDENTARIO ● ESTIVAL-REPRODUCTOR ● HIVERNANTE ● MIGRANTE ● ACCIDENTAL ○ NO REPRODUCTOR



Roquero solitario (*Monticola solitarius*)



Consell Insular
de Formentera

www.formentera.es

formentera