



LES OISEAUX DE FORMENTERA

Cochevis de Thékla (*Galerida theklae*)

LES OISEAUX DE FORMENTERA

Édition et publication : Conseil
Insulaire de Formentera. Mai 2018.

Photographies et textes : Jordi
Serapio Riera, Endèmics.

Dépôt légal: DL F 87-2018

LES OISEAUX DE FORMENTERA

Pour les amoureux de la nature, Formentera est une île des plus surprenantes. Stratégiquement située entre l'Europe et l'Afrique, au beau milieu de l'une des principales routes migratoires du monde, l'île constitue un site important pour l'avifaune européenne. Les écosystèmes insulaires relèvent par ailleurs d'une extrême singularité. Chaque île méditerranéenne possède en effet son propre caractère et sa propre personnalité, déterminés par la biodiversité et la richesse des paysages de chacune d'entre elles.

En raison de ses dimensions réduites, l'île peut être explorée de bout en bout en un seul jour. Il est cependant nécessaire d'y consacrer au moins une semaine entière si l'on souhaite profiter du charme de ses espaces naturels.

Les points d'intérêt que nous y découvrirons sont différents d'une saison à l'autre.

Le printemps, qui se manifeste ici de manière très intense, est en effet l'un des meilleurs moments de l'année pour découvrir l'île. En automne, le nombre d'espèces augmente de manière considérable au moment des flux migratoires, ce qui en fait aussi une période très propice à l'observation des oiseaux.

La diversité de la faune et de la flore de Formentera, inhérente à l'insularité, ainsi que la qualité de ses biotopes expliquent la raison pour laquelle une importante partie de son territoire est classée dans le Réseau Natura 2000. Différents espaces sont de ce fait désignés comme étant des Zones de Protection Spéciale pour les oiseaux et des Sites d'Importance Communautaire.



Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)



LES ÎLOTS D'ES FREUS :
SANCTUAIRE D'OISEAUX MARINS (page 4)

RETOUR AUX ÉTANGS ET AUX
SALINES (MARAIS SALANTS) (page 8)

PARCOURS À TRAVERS
LE PLATEAU DE LA MOLA
(page 14)

BALADE SUR LA PLAINE
D'ES CAP DE BARBARIA (page 20)



QUE CONTIENT CE GUIDE ?

Les pages suivantes nous invitent à découvrir les oiseaux et l'environnement de Formentera. Nous explorerons les principaux espaces naturels de l'île, depuis les grandes plages de sable blanc aux eaux turquoise et les hautes falaises de La Mola, jusqu'aux zones cultivées, les forêts, les buissons, ainsi que les étangs et les marais salants.

L'information présentée ci-dessous s'adresse aussi bien aux experts ornithologues qui souhaiteraient répertorier quelques-unes des espèces phares dans leurs carnets de terrain, qu'à ceux qui s'initient à l'observation des oiseaux ou qui veulent simplement se retrouver au contact de la nature le temps d'une promenade. Le lézard emblématique et coloré de Formentera, endémique de l'île, nous accompagnera dans chacune de nos balades.

Les espèces les plus emblématiques et représentatives de l'île seront mises en évidence dans la liste des deux-cents espèces d'oiseaux observables à Formentera (voir annexe). Dans certains cas, il s'agit soit d'espèces exclusivement originaires de l'archipel des Baléares telles que le puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) menacé d'extinction, ou la fauvette des Baléares (*Sylvia Balearica*), soit d'espèces rares ou qui ne sont pas endémiques.

Ce petit guide n'a pour seul but que de vous faire découvrir le patrimoine naturel de l'île dans le plus grand respect. Ce guide existe aussi pour sensibiliser le lecteur à l'extrême fragilité de l'environnement. Enfin, vous y trouverez un résumé des bonnes pratiques à adopter pour éviter d'éventuelles répercussions sur l'environnement.



LES ÎLOTS D'ES FREUS



Groupe de puffins de Scopoli (*Calonectris diomedea*)

LES ÎLOTS D'ES FREUS : SANCTUAIRE D'OISEAUX MARINS

La rencontre avec les oiseaux et la nature se fait avant même d'atteindre l'île. Le voyage en ferry entre Ibiza et Formentera permet en effet d'observer les oiseaux marins les plus communs mais aussi, selon les époques, les plus emblématiques, tels que le puffin de Scopoli (*Calonectris diomedea*), le puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) ou encore le goéland d'Audouin (*Larus audouinii*).

Dans le détroit d'Es Freus qui sépare Ibiza de Formentera, de nombreux petits îlots font office de véritables vergers pour ces espèces et servent de lieux de nidification d'intérêt majeur. À l'est du détroit, S'Espardell accueille une importante colonie d'oisillons de goéland d'Audouin, ainsi qu'une dizaine de couples de cormorans huppés ou de puffins des Baléares. Il en va de même pour les petits îlots Es Penjats et Illes Negres.

S'Espalmador, le plus grand des îlots de Formentera, est
un microcosme d'une incroyable richesse biologique.

À S'Espalmador, les systèmes dunaires de la plage de S'Alga comptent parmi les mieux conservés des Baléares et abritent derrière eux une forêt de sables côtières de grande valeur. À l'intérieur de l'île, une petite zone humide d'eau salée appelée Sa Bassa de





Colonie reproductrice de goélands d'Audouin (*Larus audouinii*) sur l'île de s'Espardell.

s'Espalmador accueille quelques couples des oiseaux aquatiques les plus répandus de Formentera qui viennent s'y reproduire : le pluvier à collier interrompu (*Charadrius andrinus*), l'échasse blanche (*Himantopus himantopus*) ou le tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*). Durant le trajet en ferry, il est également possible d'observer une petite colonie de puffins des Baléares, espèce menacée qui nidifie sur les falaises maritimes de S'Espalmador.

Très fréquenté en été par de nombreux bateaux de plaisance, cet ensemble d'îlots se trouve à l'intérieur du Parc Naturel de Ses Salines d'Ibiza et Formentera et fait partie du Réseau Natura 2000 en tant que Site d'Importance Communautaire (SIC) et Zone de Protection Spéciale (ZPS). La mer qui entoure ces îlots constitue l'habitat de ces espèces prioritaires et bénéficie à ce titre de l'appellation Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (IBA en anglais : Important Bird Area).

ESPÈCES REMARQUABLES

Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*)
Puffin de Scopoli (*Calonectris diomedea*)
Océanite tempête (*Hydrobates pelagicus*)
Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*)
Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*)
Goéland leucophée (*Larus michahellis*)
Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)
Fou de Bassan (*Sula bassana*)
Grand labbe (*Stercorarius skua*)





RETOUR AUX ÉTANGS ET AUX SALINES (MARAIS SALANTS) DE FORMENTERA

RETOUR AUX ÉTANGS ET AUX SALINES (MARAIS SALANTS) DE FORMENTERA

À proximité du port de La Savina, se trouve la seule zone humide de Formentera, formée par deux grands étangs et d'anciens marais salants. Ce lieu représente tout un symbole pour les habitants de Formentera et reste encore très présent dans l'histoire récente de l'île, intimement liée à l'exploitation saline. C'est en outre un espace qui abrite une très grande biodiversité et qui est relativement propice à l'observation des oiseaux. Il suffit d'emprunter la route qui mène au centre urbain d'Es Pujols depuis La Savina pour observer les premières espèces typiques du secteur telles que les flamants (*Phoenicopterus roseus*), les échasses blanches (*Himantopus himantopus*) ou les tadornes de Belon (*Tadorna tadorna*). La richesse naturelle de cet espace s'apprécie aisément à l'œil nu.


L'Estany Pudent, l'Estany des Peix et les Salines Ferrer y Marroig constituent un ensemble qui fait partie intégrante du Parc Naturel de ses Salines.

Cet espace protégé embrasse en outre une zone maritime immense dont l'intérêt essentiel repose sur la présence de vastes prairies de posidonies qui sont à la base même de tout cet écosystème. Des systèmes dunaires d'intérêt majeur précèdent également les plages environnantes de Illetes, Llevant et Cavall d'en Borràs baignées de remarquables eaux turquoise.



Groupe de flamants (*Phoenicopterus roseus*)






Groupe de grèbes à cou noir (*Podiceps nigricollis*) sur l'Estany Pudent

Depuis l'Antiquité, les marais salants ont toujours représenté un lieu d'interaction entre l'homme et la nature. Leur exploitation a favorisé l'émergence d'un habitat dont les oiseaux ont su tirer profit. Les petites zones humides de la Méditerranée sont d'une importance capitale pour les oiseaux aquatiques européens. De nombreuses espèces fuyant le froid hivernal trouvent en effet refuge dans ces régions du sud de l'Europe, que ce soit pour y passer l'hiver ou pour s'y reposer et se nourrir au cours de leur périple vers des destinations plus lointaines.

En parcourant à pied le chemin d'Es Brols, nous aurons l'occasion de voir de près différentes espèces d'oiseaux limicoles mais aussi des anatidés ou des ardéidés qui sont observés chaque année. Certaines d'entre elles comme le pluvier à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) sont sédentaires, tandis que d'autres ne font leur apparition qu'en été en période de nidification ou durant l'hiver. Un nombre assez conséquent d'oiseaux n'apparaît que de manière sporadique au moment des flux migratoires. C'est le cas, par exemple, du héron pourpré (*Ardea purpurea*).

L'Estany Pudent sert de refuge à l'une
des plus importantes concentrations
de grèbes à cou noir (*Podiceps
nigricollis*) d'Europe.

Dès la fin de l'été et tout au long de l'automne, le grèbe à cou noir est l'espèce la plus abondante. Certaines années, on en dénombre des milliers. Observez-les un jour où les eaux du lac sont calmes comme un miroir et vous aurez droit à un spectacle des plus surprenants.





Pluvier à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)


C'est un environnement plein de vie tout au long de l'année mais c'est au printemps et en automne, lors des migrations, que l'on pourra observer les espèces les plus diverses. Cela dit, de nombreux limicoles entament leurs mouvements postnuptiaux dès le mois d'août et le rebord des étangs peut dès lors nous offrir quelques surprises intéressantes.

ESPÈCES REMARQUABLES :

Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)
Flamant (*Phoenicopterus roseus*)
Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)
Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)
Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)
Échasse blanche (*Himantopus himantopus*)
Pluvier à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
Petit gravelot (*Charadrius dubius*)
Bécasseau minute (*Calidris minuta*)
Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)
Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)
Fauvette des Baléares (*Sylvia balearica*)
Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)
Fauvette pitchou (*Sylvia undata*)

ITINÉRAIRES VERTS :

1 (La Savina - Ses Illetes), **2** (La Savina - Sant Francesc - Es Pujols),
3 (La Savina - Cala Saona), **4** (Sant Francesc - Ses escoles - Can Marroig).



Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)



Échasse blanche (*Himantopus himantopus*)



PARCOURS À TRAVERS LA MOLA


PARCOURS À TRAVERS LA MOLA

Au sein de l'île de Formentera, La Mola constitue un ensemble très caractéristique. Il s'agit de la région la plus élevée de l'île avec ses imposantes falaises qui se dressent sur la mer en formant un grand massif rocheux. Leur point culminant, Sa Talaïassa, atteint les 195 mètres de hauteur et rend compte d'une pluviométrie légèrement supérieure au reste de l'île. Sa richesse naturelle et ornithologique découle de sa biodiversité. Vue du ciel, elle laisse apparaître une mosaïque de terres rouges cultivées, de petites parcelles de forêt et de hautes falaises qui tombent à pic dans la mer.

L'esprit rural est toujours présent à Formentera et la meilleure façon d'appréhender l'île reste probablement de parcourir les sentiers intérieurs de La Mola. Les champs de figuiers, de céréales ou même les vignes offrent un espace favorable pour observer de nombreuses espèces présentes en milieu rural : vols de chardonnerets et autres fringillidés, huppes, pies-grièches, tariers pâtres, etc.

Dans le village El Pilar, un couple d'hirondelles (*Hirundo rustica*) vient chaque année faire son nid sur les bords de l'église.

Il est important de signaler que les oiseaux que l'on rencontre en zone agricole sont actuellement en régression au niveau mondial. Les modifications de l'usage des sols et la mécanisation agricole sont, entre autres causes, responsables de ce déclin. Parmi les pinèdes, sables et autres végétations arbustives nous pourrions aisément observer les deux sylviidés les plus abondants de l'île : *Sylvia melanocephala* a





Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*)

et *Sylvia balearica*. Au printemps et en été, la tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) et le gobemouche des Baléares (*Muscicapa tyrrenica balearica*), une sous-espèce endémique de l'archipel, viennent nicher dans cet habitat. Le hibou moyen-duc (*Asio otus*), une espèce peu connue et difficile à observer, vient quant à lui nicher dans les pins les plus denses.

Constituées de roche calcaire, les falaises sont ponctuées de nombreux trous formant de petites grottes et cavernes. Les puffins des Baléares y élisent domicile pour établir leurs colonies de reproduction et élever un seul poussin par an. Le puffin des Baléares est l'oiseau marin le plus menacé d'Europe. Exclusivement endémique des Îles Baléares, il est en danger critique d'extinction.

D'un point de vue quantitatif, la colonie de puffins des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) de La Mola est la plus importante du monde.

La population reproductrice totale de l'espèce est estimée à 3000 couples, dont 460 nichent dans les falaises de La Mola (environ 700 couples sur l'île de Formentera, en incluant les îlots de S'Espalmador et S'Espardell). Les chercheurs estiment la perte annuelle de la population reproductrice à 14 %. À ce rythme, le puffin des Baléares pourrait avoir complètement disparu dans un peu plus de 60 ans. L'industrie de la pêche et la pollution du milieu marin sont les principales menaces auxquelles ils sont confrontés en haute mer où ils vivent quasiment toute l'année. Sur la terre ferme, qu'ils ne rejoignent que pour y construire leur nid, les prédateurs introduits par l'homme (rats et chats) menacent leurs œufs et leurs poussins. Un projet de conservation est actuellement mis en œuvre afin de pallier certaines de ces menaces.

Huppe fasciée (*Upupa epops*)





C'est un oiseau populaire et connu à Formentera sous le nom de virot, un terme qui, de manière familière, sert aussi à désigner les habitants de La Mola. Les puffins de Scopoli (*Calonectris diomedea*) et les océanites tempête (*Hydrobates pelagicus*), tous deux appartenant à la même famille que le puffin des Baléares, nichent aussi sur les falaises de La Mola. Par ailleurs, au moins trois couples de faucons pèlerins (*Falco peregrinus*) y ont établi leurs territoires de nidification. En se promenant sur la crête des falaises, nous aurons l'occasion d'observer et d'entendre les trilles caractéristiques des moineaux soulcies (*Petronia petronia*), le chant flûté des monticoles bleus (*Monticola solitarius*) ou les cris des martinets noirs (*Apus apus*), des espèces fréquentes dans cette zone.

ESPÈCES REMARQUABLES

Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*)
 Puffin de Scopoli (*Calonectris diomedea*)
 Océanite tempête (*Hydrobates pelagicus*)
 Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
 Hibou moyen-duc (*Asio otus*) et Petit-duc scops (*Otus scops*)
 Œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)
 Huppe fasciée (*Upupa epops*)
 Pie-grèche (*Lanius senator badius*)
 Monticole bleu (*Monticola solitarius*)
 Gobemouche des Baléares (*Muscicapa tyrrhenica balearica*)
 Fauvette des Baléares (*Sylvia balearica*)
 Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)
 Moineau soulcie (*Petronia petronia*)
 Cochevis de Thékla (*Galerida theklae*)

ITINÉRAIRES VERTS : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32



Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)



BALADE SUR LA PLAINE D'ES CAP DE BARBARIA

BALADE SUR LA PLAINE D'ES CAP DE BARBARIA

L'extrême sud de Formentera est aussi le point le plus méridional de l'archipel. Racheté par le gouvernement des Baléares, ce domaine est connu sous le nom de Sa Tanca d'Allà Dins. Il se démarque à première vue par la singularité de ses paysages et son environnement désert. On y trouve le célèbre phare de Barbaria et une tour de garde du XVIII^e siècle.

Sous l'apparence stérile de ce lieu sec et caillouteux couvert de végétation arbustive façonnée par les vents, constellé de sables, d'oliviers sauvages et de romarins, se cachent quelques-unes des espèces les plus singulières préférant les espaces ouverts. C'est l'habitat de l'alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) qui débarque au printemps pour y faire son nid et envahir de ses chants mélodieux le paysage sonore de cette plaine. Il s'agit d'une espèce vulnérable et en régression au niveau mondial, bien qu'abondante à Formentera. Le Cap de Barbaria est le lieu idéal pour l'observer. On pourra aussi aisément y trouver le cochevis de Thékla (*Galerida theklae*), de la même famille que les alaudidés. L'espèce est abondante et présente tout au long de l'année en différents points de l'île.

L'emblématique fauvette des Baléares
(*Sylvia balearica*) peut être aperçue à Es Cap.

Ce petit passeriforme que l'on appelle *ganyet* ou *enganyeta* à Formentera appartient à la famille des sylviidés et fait partie, avec le puffin des Baléares, de l'une des deux espèces endémiques de l'archipel. D'un naturel curieux, on peut le voir se déplacer parmi les arbustes ou, plus





Fauvette des Baléares (*Sylvia balearica*)

simplement, entendre les cris secs émis par les mâles depuis le sommet de petits promontoires au milieu de la végétation. Il s'agit d'une espèce sédentaire, assez abondante sur l'île, et que l'on ne trouve qu'à Formentera, Ibiza ou Majorque : c'est l'un des joyaux à voir obligatoirement.

Le Cap de Barbaria mais aussi les nombreuses terres cultivées de l'intérieur de l'île sont les lieux d'habitat et de reproduction du célèbre œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*).

La plaine d'Es Cap fait office de
piste d'atterrissage pour les
migrateurs du sud.

Au début du printemps, lors de la migration pré-nuptiale, on peut aisément observer de petits passeriformes de passage, tels que les traquets (*Oenanthe oenanthe* et *Oenanthe hispanica*), le pipit rousseline (*Anthus campestris*) ou quelques rapaces tels que l'aigle botté (*Aquila pennata*) et les busards (*Circus sp.*).

L'important périmètre côtier est constitué de rochers marins qui atteignent une hauteur avoisinant les 40 mètres et desquels surgissent de petits torrents, asséchés la plupart du temps. Par temps de pluie, leurs eaux se déversent dans la mer. Cette longue frange côtière abrite d'importantes populations de puffins des Baléares, des cormorans huppés et des goélands leucophées (*Larus michahellis*). C'est aussi dans ces falaises qu'un couple de faucons (*Falco peregrinus*) au moins a établi son territoire de nidification.





Jeune alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)

Si vous souhaitez vivre une expérience des plus opportunes, voire insolites, rien de tel qu'une visite nocturne du Cap de Barbaria. Les nuits calmes des mois de mars et avril sont en effet une occasion de pouvoir écouter les chants surréalistes des puffins des Baléares. À cette époque de l'année, l'activité des colonies de nidification est particulièrement intense. L'absence quasi totale de pollution lumineuse, avec le phare de Barbaria pour seule source de lumière, feront de cette sortie un véritable spectacle pour les sens.

ESPÈCES REMARQUABLES

- Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*)
- Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*)
- Goéland leucophée (*Larus michahellis*)
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)
- Œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)
- Monticole bleu (*Monticola solitarius*)
- Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)
- Cochevis de Thékla (*Galerida theklae*)
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*)
- Fauvette des Baléares (*Sylvia balearica*)
- Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)
- Traquets (*Oenanthe oenanthe* et *Oenanthe hispanica*)
- Moineau soulcie (*Petronia petronia*)
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)

ITINÉRAIRES VERTS : 8, 9, 10, 11 et 12



CODE DE BONNES PRATIQUES

Toute activité se déroulant en milieu naturel, aussi inoffensive semble-t-elle, peut causer une série d'impacts négatifs sur les habitats et les espèces. Formentera est en effet un territoire de petite taille et extrêmement fragile. Il importe donc d'envisager toute sortie champêtre et toute journée d'observation selon un code de bonnes pratiques assurant le bien-être des espèces que nous tâchons d'observer, tout comme la conservation de leurs habitats. Nous sommes tous responsables chacun à notre niveau. Voici quelques recommandations :

- Le bien-être des oiseaux et la préservation des espaces doivent toujours être la priorité absolue. Évitions de déranger les espèces que nous essayons d'observer, en conservant une distance de sécurité qui ne modifie pas leur comportement, tout particulièrement en période de nidification et de migration.
- Respectons les domaines privés et la réglementation des espaces naturels protégés en évitant d'accéder à des sites restreints, sans s'écarter des routes aménagées, etc.
- Contribuons à l'apport de données. Les observations recueillies par des passionnés de tous niveaux peuvent apporter des données très intéressantes et s'avérer très utiles pour la connaissance de la répartition des espèces. Elles révèlent également des informations sur des problèmes mondiaux tels que le changement climatique. Nous vous encourageons également à partager vos observations avec des ornithologues locaux ou des institutions écologistes (voir liens internet).

SITES WEB D'INTÉRÊT

- Site officiel du tourisme de Formentera : www.formentera.es
- Réseau Natura 2000 aux Îles Baléares : www.xarxanatura.es
- GEN GOB Ibiza : www.gengob.org
- Registre ornithologique des Îles Baléares : www.citau.gobmallorca.com
- SEO BirdLife : www.seo.org
- Rare birds in Spain : www.rarebirdspain.net
- Balears Natura : www.ca.balearsnatura.com
- Can Marroig (Centre d'interprétation du Parc Naturel de Ses Salines) : Informations et visites, contacter le Parc Naturel : 971.30.14.60 Ext. 3.

LISTE EXHAUSTIVE DES OISEAUX OBSERVABLES À FORMENTERA

Formentera compte plus de 200 espèces observables tout au long de l'année, en incluant les espèces sédentaires (vie et nidification sur l'île toute l'année), celles qui ne sont présentes qu'en hiver, d'autres qui arrivent au printemps et en été pour s'y reproduire et de nombreuses autres qui n'apparaissent qu'au moment des migrations. Il convient d'ajouter à ces chiffres un groupe d'oiseaux divagants ou accidentels qui séjournent sur l'île de manière irrégulière et occasionnelle. Peut-être serez-vous amenés à compléter cette liste avec de nouvelles espèces. L'observation ornithologique est une activité imprévisible !

NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	STATUT	NOM SCIENTIFIQUE	NOM VERNACULAIRE	STATUT
ANATIDAE					
☐ <i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse	●	☐ <i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire	●
☐ <i>Anser anser</i>	Oie cendrée	●	☐ <i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	● ●
☐ <i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	● ● ●	PHASIANIDAE		
☐ <i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	● ●	☐ <i>Alectoris rufa</i>	Perdrix	●
☐ <i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	● ●	☐ <i>Coturnix coturnix</i>	Caille	● ●
☐ <i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	● ●	☐ <i>Phasianus colchicus</i>	Faisan	●
☐ <i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	●	PODICIPEDIDAE		
☐ <i>Anas acuta</i>	Canard pilet	● ●	☐ <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	●
☐ <i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	●	☐ <i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	●
☐ <i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	● ●	☐ <i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	● ● ● ○
☐ <i>Netta rufina</i>	Nette rousse	●	PROCELLARIIDAE		
☐ <i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	● ●	☐ <i>Calonectris diomedea</i>	Puffin de Scopoli	●
☐ <i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	●	☐ <i>Puffinus mauretanicus</i>	Puffin des Baléares	●
☐ <i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	●	☐ <i>Puffinus yelkouan</i>	Puffin yelkouan	●
☐ <i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan	●	HYDROBATIDAE		
			☐ <i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête	●
● SÉDENTAIRE	● ESTIVANT-REPRODUCTEUR	● HIVERNANT	● MIGRATEUR	● ACCIDENTEL	○ NON REPRODUCTEUR

LISTE EXHAUSTIVE DES OISEAUX OBSERVABLES À FORMENTERA

SULIDAE		
☐ <i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	●
PHALACROCORACIDAE		
☐ <i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand cormoran	●
☐ <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran huppé	●
ARDEIDAE		
☐ <i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	●
☐ <i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	●
☐ <i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	●
☐ <i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu	●
☐ <i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	● ●
☐ <i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	● ●
☐ <i>Egretta alba</i>	Grande aigrette	●
☐ <i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	● ●
☐ <i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	●
CICONIIDAE		
☐ <i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	●
☐ <i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	●
☐ <i>Mycteria ibis</i>	Tantale ibis	●
THRESKIORNITHIDAE		
☐ <i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	●
PHOENICOPTERIDAE		
☐ <i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	● ● ○
ACCIPITRIDAE		
☐ <i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	●
☐ <i>Milvus migrans</i>	Milan noir	●
ACCIPITRIDAE		
☐ <i>Milvus milvus</i>	Milan royal	●
☐ <i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	●
☐ <i>Circus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	●
☐ <i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	● ●
☐ <i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	●
☐ <i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	●
☐ <i>Accipiter nisus</i>	Épervier d'Europe	● ●
☐ <i>Buteo buteo</i>	Buse variable	●
☐ <i>Aquila pennata</i>	Aigle botté	● ●
PANDIONIDAE		
☐ <i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur	● ●
FALCONIDAE		
☐ <i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	●
☐ <i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	●
☐ <i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	●
☐ <i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	●
☐ <i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	●
☐ <i>Falco eleonora</i>	Faucon d'Éléonore	●
☐ <i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	●
RALLIDAE		
☐ <i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	● ●
☐ <i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	●
☐ <i>Crex crex</i>	Râle des genêts	●
☐ <i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau	●
☐ <i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane	●

● SÉDENTAIRE ● ESTIVANT-REPRODUCTEUR ● HIVERNANT ● MIGRATEUR ● ACCIDENTEL ○ NON REPRODUCTEUR

LISTE EXHAUSTIVE DES OISEUX OBSERVABLES À FORMENTERA

RALLIDAE		
☐ <i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	● ●
GRUIDAE		
☐ <i>Grus grus</i>	Grue cendrée	●
HAEMATOPODIDAE		
☐ <i>Haematopus ostralegus</i>	Huitrier pie	●
RECURVIROSTRIDAE		
☐ <i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	● ● ●
☐ <i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	● ●
BURHINIDAE		
☐ <i>Burhinus oedicnemus</i>	Œdicnème criard	●
GLAREOLIDAE		
☐ <i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier	●
CHARADRIIDAE		
☐ <i>Charadrius dubius</i>	Petit gravelot	● ●
☐ <i>Charadrius hiaticula</i>	Pluvier grand-gravelot	● ●
☐ <i>Charadrius alexandrinus</i>	Pluvier à collier interrompu	●
☐ <i>Charadrius morinellus</i>	Pluvier guignard	●
☐ <i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré	● ●
☐ <i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	● ●
☐ <i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	● ●
SCOLOPACIDAE		
☐ <i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	●
☐ <i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	●
☐ <i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	● ●
☐ <i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	●
SCOLOPACIDAE		
☐ <i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	●
☐ <i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	● ●
☐ <i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié	●
☐ <i>Lymnocyrtus minimus</i>	Bécassine sourde	●
☐ <i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	● ●
☐ <i>Gallinago media</i>	Bécassine double	●
☐ <i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	● ●
☐ <i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	●
☐ <i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	●
☐ <i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	●
☐ <i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	●
☐ <i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	●
☐ <i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	●
☐ <i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatille	●
☐ <i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	● ●
☐ <i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc	●
☐ <i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	●
☐ <i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	● ●
☐ <i>Arenaria interpres</i>	Tournepierrre à collier	● ●
STERCORARIIDAE		
☐ <i>Stercorarius skua</i>	Grand labbe	● ●
LARIDAE		
☐ <i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	● ●
☐ <i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	● ●
☐ <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	● ●

● SÉDENTAIRE ● ESTIVANT-REPRODUCTEUR ● HIVERNANT ● MIGRATEUR ● ACCIDENTEL ○ NON REPRODUCTEUR

LISTE EXHAUSTIVE DES OISEAUX OBSERVABLES À FORMENTERA

LARIDAE		
☐ <i>Chroicocephalus genei</i>	Goéland railleur	●
☐ <i>Larus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	● ● ●
☐ <i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée	●
☐ <i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	●
STERNIDAE		
☐ <i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	●
☐ <i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne	●
☐ <i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	● ●
☐ <i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	●
☐ <i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine	●
☐ <i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	●
☐ <i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	●
☐ <i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère	●
ALCIDAE		
☐ <i>Alca torda</i>	Petit pingouin	● ●
☐ <i>Fratercula arctica</i>	Macareux moine	● ●
COLUMBIDAE		
☐ <i>Columba livia</i>	Pigeon biset	●
☐ <i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	●
☐ <i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle des bois	●
☐ <i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle turque	● ●
STRIGIDAE		
☐ <i>Otus scops</i>	Petit-duc scops	●
☐ <i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna	●
☐ <i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	●
STRIGIDAE		
☐ <i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	●
CUCULIDAE		
☐ <i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	●
☐ <i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	●
TYTONIDAE		
☐ <i>Tyto alba</i>	Chouette effraie	●
CAPRIMULGIDAE		
☐ <i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	●
APODIDAE		
☐ <i>Apus apus</i>	Martinet noir	● ●
☐ <i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle	●
☐ <i>Apus melba</i>	Martinet à ventre blanc	●
ALCEDINIDAE		
☐ <i>Alcedo atthis</i>	Martin pêcheur d'Europe	● ●
MEROPIIDAE		
☐ <i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	●
CORACIIDAE		
☐ <i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	●
UPUPIDAE		
☐ <i>Upupa epops</i>	Huppe	●
PICIDAE		
☐ <i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	● ●
ALAUDIDAE		
☐ <i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle	● ●
☐ <i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla	●

● SÉDENTAIRE ● ESTIVANT-REPRODUCTEUR ● HIVERNANT ● MIGRATEUR ● ACCIDENTEL ○ NON REPRODUCTEUR

LISTE EXHAUSTIVE DES OISEAUX OBSERVABLES À FORMENTERA

ALAUDIDAE			
☐ <i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	● ●	
HIRUNDINIDAE			
☐ <i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	●	
☐ <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	●	
☐ <i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	● ●	
☐ <i>Cecropis daurica</i>	Hirondelle rousseline	●	
☐ <i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	● ●	
MOTACILLIDAE			
☐ <i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	● ●	
☐ <i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	●	
☐ <i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	●	
☐ <i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	● ●	
☐ <i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	● ●	
☐ <i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	● ●	
☐ <i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	● ●	
TROGLODYTIDAE			
☐ <i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	●	
PRUNELLIDAE			
☐ <i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	●	
TURDIDAE			
☐ <i>Cercotrichas galactotes</i>	Agrobate roux	●	
☐ <i>Erithacus rubecula</i>	Rouge-gorge familier	● ●	
☐ <i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	●	
☐ <i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir	●	
☐ <i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	● ●	
TURDIDAE			
☐ <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	●	
☐ <i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	●	
☐ <i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâle	● ●	
☐ <i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	●	
☐ <i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard	●	
☐ <i>Oenanthe deserti</i>	Traquet du désert	●	
☐ <i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur	●	
☐ <i>Monticola saxatilis</i>	Monticole merle-de-roche	●	
☐ <i>Monticola solitarius</i>	Monticole merle-bleu	●	
☐ <i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	●	
☐ <i>Turdus merula</i>	Merle noir	●	
☐ <i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	● ●	
☐ <i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	● ●	
☐ <i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	● ●	
☐ <i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	● ●	
SYLVIIDAE			
☐ <i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti	●	
☐ <i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	●	
☐ <i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	●	
☐ <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	●	
☐ <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	● ●	
☐ <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	●	
☐ <i>Iduna opaca</i>	Hypolaïs obscure	●	
☐ <i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs ictérine	●	
☐ <i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	●	

● SÉDENTAIRE ● ESTIVANT-REPRODUCTEUR ● HIVERNANT ● MIGRATEUR ● ACCIDENTEL ○ NON REPRODUCTEUR

LISTE EXHAUSTIVE DES OISEAUX OBSERVABLES À FORMENTERA

SYLVIIDAE					
☐	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	●	●	
☐	<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	●		
☐	<i>Sylvia nisoria</i>	Fauvette épervière	●		
☐	<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde	●		
☐	<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	●		
☐	<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes	●		
☐	<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou	●	●	
☐	<i>Sylvia balearica</i>	Fauvette des Baléares	●		
☐	<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	●		
☐	<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale	●		
☐	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	●		
☐	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	●		
☐	<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	●	●	
☐	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	●		
☐	<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	●		
☐	<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	●		
MUSCICAPIDAE					
☐	<i>Muscicapa tyrrenica balearica</i>	Gobemouche des Baléares	●		
☐	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	●		
☐	<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche noir	●		
☐	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche à collier	●		
ORIOLOIDAE					
☐	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	●		
LANIIDAE					
☐	<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	●		
☐	<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche méridionale	●		
☐	<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	●	●	
CORVIDAE					
☐	<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau	●	○	
STURNIDAE					
☐	<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	●	●	
PASSERIDAE					
☐	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	●		
☐	<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie	●		
FRINGILLIDAE					
☐	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	●	●	
☐	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	●		
☐	<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	●		
☐	<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	●		
☐	<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	●	●	
☐	<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	●		
☐	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Gros-bec casse-noyaux	●		
EMBERIZIDAE					
☐	<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan	●		
☐	<i>Emberiza pusilla</i>	Bruant nain	●		
☐	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	●	●	
☐	<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	●		

● SÉDENTAIRE ● ESTIVANT-REPRODUCTEUR ● HIVERNANT ● MIGRATEUR ● ACCIDENTEL ○ NON REPRODUCTEUR

Source : Annuaire ornithologique des Baléares, 2016. Groupe Baléare d'Ornithologie et de défense de la nature



Monticole bleu (*Monticola solitarius*)



Consell Insular
de Formentera

www.formentera.es

