



PLANTEN VAN FORMENTERA

PLANTEN VAN FORMENTERA

Onder de hoede van de Consell
Insular de Formentera. mei 2021.

Foto's en tekst door
Jordi Serapio, Endèmics.

DL F 72-2021

PLANTEN VAN FORMENTERA

Met deze brochure willen we je kennis laten maken met de inheemse flora van Formentera.

Het plantenrijk is een van de meest in het oog springende natuurlijke erfgoederen van het eiland en een van de redenen waarom een groot deel van het grondgebied deel uitmaakt van verscheidene beschermde natuurgebieden: het Natuurpark van Ses Salines en het Natura 2000-netwerk. Meer dan zeshonderd planten maken deel uit van de bloemrijke catalogus van dit eiland. Het is ook opmerkelijk dat een grondgebied van zulke bescheiden afmetingen zoveel verschillende biotopen herbergt: brede stranden met duinsystemen, kliffen, zoutmoerassen, landbouwgronden en bosgebieden.

We nemen je mee op een tocht door deze gebieden om hun bijzondere kenmerken en de meest emblematische planten die er groeien te ontdekken. Je zult ook interessante wetenswaardigheden tegenkomen, aangevuld met een vleugje etnobotanie.

Ons enige doel is belangstelling te wekken voor de natuur van het eiland, de kennis ervan te bevorderen en te stimuleren het eiland op een respectvolle manier te ontdekken.

De *piepkleine Chaenorhinum formenterae* uit de weegbreefamilie, endemische soort van de Pitiusen en Mallorca, groeit weelderig op de zanderige gronden en stranden van Formentera.




Bovendien willen we ook de aandacht vestigen op de extreme kwetsbaarheid van het natuurlijke erfgoed van het eiland en de noodzaak om het te beschermen en voor toekomstige generaties te behouden.

De natuur van Formentera oogt zowel ingetogen als bevoorrecht. Ondanks de laagste gemiddelde neerslag van de Balearen, is de vegetatie van het eiland in staat zich in al haar pracht te tonen.

De lente, die hier kort maar krachtig is, is ongetwijfeld de beste periode om van de flora en landschappen van het eiland te genieten. Op zonnige dagen tegen het einde van februari is de komst van het bloemenseizoen al voelbaar. En eind mei zorgen de langere dagen en de stijgende temperaturen voor een vroegtijdige zomerslaap, die aanhoudt gedurende de warmste maanden. Met verlangen wordt uitgekeken naar de herfstregens, die zo belangrijk zijn voor de mediterrane vegetatie, en planten weer doen opleven na de zomerse droogte. De herfst lijkt hier op een tweede lente met duizenden ontkiemende zaden en de bloei van verschillende plantensoorten, waardoor het eiland zich weer volop met kleur vult.

De verrassende natuur, de combinatie van aantrekkelijke landschappen en de mogelijkheid om bijzondere soorten te observeren, maken van Formentera een uniek paradijs voor ecotoerisme.





WE TREKKEN DE BOSSEN IN

De bosgebieden van Formentera worden gevormd door een heterogeen geheel van plantengemeenschappen, die generiek als *bossen* bekend staan.

Het betreft een struikachtige begroeiing van houtachtige soorten, waaronder de mastiekboom, jeneverbes, rozemarijn en heide. De boomlaag wordt altijd gedomineerd door de Sabijnse jeneverbes en de den en de kruidlaag kan erg variëren.

De soorten die op Formentera deel uitmaken van de bosvegetatie zijn uitermate goed aangepast aan het mediterrane klimaat en vormen een altijd groen landschap, onafhankelijk van het jaargetijde.

Deze begroeiing kan meer of minder dicht zijn en is rijk aan soorten. Daar waar de bodemgesteldheid een grotere dichtheid en ontwikkeling toelaat, verschijnt de maquis en andere soorten zoals de aardbeiboom (zeer zeldzaam op Formentera).

Wanneer de struiklaag minder dicht en dik is, ontstaat er een begroeiing met een grotere soortenrijkdom met onder andere volop rozemarijn, heide en verschillende soorten cistusrozen. Deze begroeiing, de garrigue, is de meest voorkomende landbiotoop van Formentera.





De aardbeiboom, die zeer schaars is op het eiland, is alleen te vinden in de grotere bosgebieden, in de omgeving van La Mola.

Een andere veel voorkomende struikvorm op het eiland is het veel lagere tijmbosje. De aromatische en plaatselijk zeer populaire kegeltijm (*Thymra capitata*) is de belangrijkste soort, samen met andere soorten van het geslacht *Micromeria*.

De steeneik is slechts sporadisch aanwezig. Er zijn alleen een aantal alleenstaande exemplaren, zonder dat ze deel uitmaken van de bosgebieden. Het is zelfs zo, dat twee van deze exemplaren gecatalogiseerd zijn als bijzondere bomen: de steeneiken van *Can Rita* en die van *Can Vicent des Torrent*.

In de gebieden van La Mola en Cap de Barbaria is de bosbiotoop het beste vertegenwoordigd. Op het hele eiland echter worden landbouwgebieden afgewisseld door bosvegetaties, waardoor er een mozaïek met een grote diversiteit en landschappelijke waarde ontstaat.

De boscossystemen zijn essentieel voor het vasthouden van het regenwater en de bescherming van de bodem. Ze vormen bovendien een vitaal toevluchtsoord voor wilde dieren.

De invloed van de mens, hoewel niet altijd zichtbaar, is terug te vinden in alle bosgebieden van het eiland. Deze vormden een belangrijke natuurlijke hulpbron en zijn sinds de oudheid ingrijpend veranderd. De productie van houtskool of kalk of eenvoudigweg het gebruik van hout of brandhout waren de belangrijkste traditionele toepassingen. Op veel plaatsen van het eiland zijn de getuigen van deze industrie nog steeds zichtbaar in de vorm van kalkovens en houtskoolbranderijen.



Kegeltijm (*Thymra capitata*)



EEN KORTSTONDIGE BIODIVERSITEIT

Ranunculus paludosus barceloi, met opvallende gele bloemen is een van de belangwekkende soorten die voorkomt op weides met eenjarigen en bolgewassen. Ze is endemisch op de Pitiusen en Mallorca.

Op gronden met een dunne bodemlaag of rotsachtige bodem en op open plekken in de bossen, komen plantengemeenschappen voor met een grote diversiteit: weiden met bolgewassen en eenjarigen. Deze plantengemeenschappen bestaan uit een groot aantal, soms minuscule kleine soorten, die echter van groot belang zijn. Dit is ook de plek waar de tere orchideeën groeien.

Op het eiland Formentera kan deze soort begroeiing een groot gebied beslaan. Vanwege hun grote waarde en kwetsbaarheid zijn deze gebieden door de Habitatrictlijn aangemerkt als Prioritair Gebied van Communautair Belang.

Ze hebben een extreem korte cyclus: tegen het eind van de lente en gedurende de zomer lijken ze dor en levenloos. Door de langverwachte herfstregens ontwaken de sluimerende zaadjes en bollen en bloeien vervolgens even uitbundig als kortstondig.



Die Herbstblüte von *Prospero obtusifolium*

DE ORCHIDEEËN VAN FORMENTERA


Op de open plekken in de bosgebieden is er een groep planten die opvalt door de prachtige bloemen. Geen enkele andere plantensoort heeft natuurliefhebbers zó gefascineerd als de orchidee.

Orchideeën staan ook bekend om hun ingewikkelde bestuivingsstrategieën, waarmee ze bepaalde insecten voor de gek houden. De bloemen van verschillende soorten van het geslacht *Ophrys* bijvoorbeeld, bootsen zó natuurgetrouw de vrouwtjes van sommige vliesvleugelige insecten na, dat de mannetjes, geheel in de ban ervan, met hun bloemen proberen te paren. Wonderen van de evolutie die we tijdens een wandeling door de vele bosgebieden van het eiland kunnen bewonderen.

Tot nu toe zijn er op Formentera een totaal van zeventien inheemse soorten orchideeën bekend, een respectabel aantal gezien de geringe afmetingen van het gebied.

Het is duidelijk dat deze kleine plantjes zeer kwetsbaar zijn, ze groeien alleen op een onverstoorde bodem en onder zeer bijzondere omstandigheden. In geen enkel geval is het geoorloofd hun bloemen te plukken.

Op de volgende pagina's tref je alle op het eiland aanwezige soorten aan met hun bloeiperiode.



Ophrys lutea. Maart - April



Anacamptis collina. Februari - Maart



Ophrys apifera. April-Mei



Himantoglossum robertianum. Februari



Gennaria diphylla. Maart



Anacamptis pyramidalis. Mei



Ophrys tenthredinifera. Februari - Maart



Setopias parviflora. April



Ophrys bombyliflora. Maart



Orchis anthropophora. April



Ophrys dyris. Februari - Maart



Anacamptis coriophora. April




Spiranthes spiralis. Oktober



A close-up photograph of a flower with a green, bilobed calyx and a dark, velvety, pouch-like labellum. The flower is shown in profile, highlighting its intricate structure.

Ophrys fusca bilunulata. Oktober

A photograph of a slender green plant with a single, elongated, spotted leaf and a tall, thin stem topped with a small cluster of tiny, light-colored flowers.

Neotinea maculata. April

A photograph of a green plant with a single, elongated, spotted leaf and a tall, thin stem topped with a small cluster of tiny, light-colored flowers.

Ophrys fusca. December - Maart

A photograph of two flowers with dark, velvety, pouch-like labella and green, bilobed calyxes. The flowers are shown in profile, highlighting their intricate structure.

Ophrys speculum. Maart - April



TUSSEN AKKERS EN GEWASSEN

Op Formentera is een belangrijk deel van de grond bestemd voor de landbouw. De vijgenboom (het symbool bij uitstek van het eiland) en de wijnstok zijn de meest wijdverbreide gewassen, gecombineerd met het jaarlijks zaaien van granen. In mindere mate groeien er amandel-, johannesbrood- en olijfbomen, kenmerkend voor de karakteristieke droge landbouw van het eiland, die van oudsher gepaard gaat met extensieve geiten- en schapenhouderij. Vanwege het watergebrek zijn er maar weinig geïrrigeerde gebieden op Formentera.

Menselijk ingrijpen in het milieu heeft geleid tot de vestiging van gespecialiseerde plantengemeenschappen, die hun cycli hebben kunnen aanpassen aan de bewerking van het land. Het betreft akkerflora en ruderales vegetatie, beter bekend onder de naam onkruid.

Een oneindige lijst van schitterende voorjaarsbloeiers vult de landbouwgebieden en wegen van het binnenland met heerlijke geuren en prachtige kleuren: klaprozen, goudsbloemen, akkerwinde, madeliefjes, gladiolen en nog veel meer.

Het is een heel gevarieerde flora, alom bekend en gewaardeerd door de bevolking, die al sinds de oudheid belangrijke culinaire en medicinale toepassingen kent.

Samen met de bosgebieden vormen deze gebieden een karakteristieke bontgekleurde lappendeken, vooral in jaren met een overvloedige regenval.

Doordat veel landbouwgronden in onbruik zijn geraakt, is de bosvegetatie toegenomen, ten nadele van deze karakteristieke flora.



TRADITIONEEL GEBRUIK VAN PLANTEN

Veel van de wilde planten die op Formentera groeien werden van oudsher gebruikt vanwege hun medicinale eigenschappen of culinaire waarde. We behandelen enkele van de bekendste toepassingen bij wijze van voorbeeld:

Een van de meest gewaardeerde aromatische planten is de veel voorkomende kegeltijm (*Thymbra capitata*). De bloemen worden gebruikt om de heerlijke gedroogde vijgen te kruiden, die nog steeds elke zomer in veel huishoudens voor eigen gebruik worden bereid. Deze plant is ook het belangrijkste ingrediënt bij de bereiding van de beroemde kruidenlikeur.

Blaassilenes (*Silene vulgaris*), plaatselijk bekend als *verdura* (groente), vormen het hoofdingrediënt van de *cuinat*, een typisch gerecht van de Pitiusen dat alleen met Pasen wordt bereid.

Met sint-janskruid (*Hypericum perforatum*), dat veel voorkomt in de wegbermen, werd van oudsher een olie bereid met belangrijke geneeskrachtige en wondhelende eigenschappen.

Tegenwoordig zijn veel van deze traditionele toepassingen verdwenen en een belangrijk deel van deze volkswijsheid, een getuigenis van de nauwe relatie van de mens met zijn omgeving, is verloren gegaan.

Wij verzoeken iedereen die besluit planten te verzamelen, een rationeel en duurzaam gebruik te maken van dit waardevolle erfgoed, zich vooraf op de hoogte te stellen van de geldende wetgeving inzake beschermde soorten, en bij twijfel af te zien van het verzamelen ervan.





DE DUINVEGETATIE

De paradijselijke stranden van Formentera herbergen enkele van de best bewaarde duinsystemen van de Balearen. Ses Illetas, es Cavall d'en Borràs, de uitgestrekte stranden van Levante en Migjorn en ook het strand van s'Alga in s'Espalmador, zijn de belangrijkste voorbeelden.

Het gaat hier om complexe en dynamische ecosystemen met een hoge ecologische waarde. Ze omvatten een onder water gelegen deel, met riffen die worden gevormd door de *Posidonia oceanica* weiden. De planten die op het boven het water gelegen deel, de duinen, groeien vervullen een erg belangrijke functie: door middel van hun wortels, die vaak tot op grote diepte reiken, houden ze het zanderige substraat vast en fixeren ze de duinen. Heel dit grote systeem functioneert als een eenheid die de aanvoer van sedimenten en de erosie, veroorzaakt door de wind en de kracht van de zee, in evenwicht houdt en ervoor zorgt dat dit aantrekkelijke landschap intact blijft.

De duinvegetatie bestaat uit een groot aantal soorten afkomstig uit verschillende families die zich allemaal extreem goed hebben aangepast en in staat zijn op een zanderig substraat en onder barre omstandigheden te groeien. Ze vormen verschillende, opeenvolgende plantengemeenschappen die, naarmate we ons verder van de kust verwijderen, meer diversiteit vertonen. Op de eerste duinenrij treffen we een aantal grassoorten aan zoals biestarwegras (*Elymus farctus*) of *Sporobolus pungens*, *Crucianella maritima* of de zeeraket (*Cakile maritima*). De veel voorkomende *Lotus cytisoides* uit het rolklavergeslacht kleurt de duinen geel met haar opvallende voorjaarsbloemen. Andere soorten zorgen voor nog meer diversiteit: de blauwe zeedistel (*Eryngium*



Strandnarcis (*Pancratium maritimum*)

Sabijnse jeneverbes aan de kust,
gemodelleerd door de zeewind, in de duinen
van de stranden van Cavall d'en Borràs.



maritimum), de zeewinde (*Calystegia soldanella*), of de mooie strandnarcis (*Pancratium maritimum*), die haar grote geurende witte bloemen opent tijdens de warmste maanden van het jaar. Helmgras (*Ammophila arenaria*) kroont de duintoppen, houdt het stuifzand vast en zorgt voor de instandhouding van de eerste duinenrij.

We treffen hier ook enkele bijzondere soorten aan, zoals de *Silene cambessedesii*, een soort koekoeksbloem, die hier *molinet* wordt genoemd, een van de botanische pareltjes van Formentera. Op Ibiza is ze zeldzamer en aan de kust van Castellón komt ze heel weinig voor. Het is een endemische soort van deze drie gebieden. Haar kleurige bloemen, die gedurende de maanden maart en april volop bloeien, verfraaien de duinen van de stranden van het eiland met hun roze tinten.

De *Otanthus maritimus*, die hier *herba des Trucadors* wordt genoemd, is op dit moment een zeer zeldzame, bedreigde soort en is het onderwerp geweest van herstelprojecten.

Op de gestabiliseerde duinen, verder verwijderd van de invloed van de zee, komt de Sabijnse jeneverbes voor die samen met andere struikvormige soorten kleine bosjes vormt.

Duinsystemen zijn uiterst kwetsbaar. Bovendien hebben ze tijdens de zomermaanden veel te lijden van de aanwezigheid van mensen. Het is dan ook van vitaal belang de uitgezette routes te respecteren om schade aan de vegetatie tot een minimum te beperken en te voorkomen dat dit bevoorrechte landschap achteruitgaat.



Silene cambessedesii



FLORA VAN DE ZOOUTPANNEN VAN FORMENTERA

Zoutmoerassen vormen een zeer bijzondere biotoop waar unieke soorten groeien. Op Formentera zijn ze goed vertegenwoordigd dicht bij de zoutpannen (s'estany Pudent, s'estany des Peix of de Salinas Ferrer y Marroig) en in de kleine lagune van het eilandje s'Espalmador.

Het extreem hoge zoutgehalte van deze plekken is voor de meeste planten een beperkende factor. Er is slechts een klein aantal planten dat onder deze omstandigheden kan groeien.

De vegetatie in deze gebieden wordt gedomineerd door loogkruid en biezen en wordt aangevuld met andere groepen van belang: het geslacht *Limonium* onderscheidt zich van de rest en hoewel het er niet erg opzichtig uit ziet, is het van grote wetenschappelijke waarde. Omdat er enkele endemische soorten voorkomen, zijn de zoutpannen van Formentera voor de Balearen een van de belangrijkste kerngebieden voor de diversiteit van dit geslacht: *Limonium formenterae*, *Limonium wiedmanni* y *Limonium grosii* zijn de belangrijkste en ze komen alle drie alleen op de Pitiusen voor. Deze planten gaan vaak vergezeld van *Cynomorium coccineum*, een parasiet met een vreemd uiterlijk omdat ze geen chlorofyl bevat.

Aan de weg van Es Brolls, die langs de Estany Pudent loopt, zijn er enkele zones met vegetatie gelieerd aan de aanwezigheid van zoet water, dat op deze plaats direct aan de oppervlakte stroomt. Hier tref je lisdodden en riet aan. Dit is bijna het enige voorbeeld van dit type vegetatie op het eiland, met uitzondering van enkele kleine tijdelijke poelen die zich vullen met regenwater: kleine gebiedjes die echter ook van groot botanisch belang zijn en bijdragen aan de diversiteit van de flora van het eiland.



Limonium formenterae

The background of the slide is a photograph of several thin, green, branching stems of a plant with clusters of small, bright yellow flowers. The stems and flowers are set against a clear, deep blue sky. The lighting is bright, suggesting a sunny day. The text is overlaid on the left side of the image.

TUSSEN ZOUT EN ROTSEN: PLANTEN AAN DE KUST

Diplomatix ibicensis, komt vooral dicht bij de kust veel voor.

Omdat Formentera zo klein is en ook geen grote hoogteverschillen kent, is op het hele eiland de invloed van de zee goed te merken, zelfs in het binnenland. Bijna dertig procent van de geïnventariseerde planten komen van nature voor in kuststreken.

De rotsachtige gedeelten van de zeereep, die meer zijn blootgesteld aan de invloed van de zee, vertonen een zeer schrale vegetatie als gevolg van het zoute stuifwater en het bijna volledig ontbreken van substraat. Weinig planten slagen erin om in een dergelijke vijandige omgeving te groeien, en de planten die er wel in slagen zijn niet erg opvallend of nemen verwrongen vormen aan door de invloed van de heersende winden.

Op deze plekken nemen enkele soorten van het geslacht *Limonium* (lamsoor) een bijzondere plaats in vanwege hun hoge endemiciteit op het eiland. Er zijn voor deze onopvallende planten geen volksnamen bekend op de Pitiusen. *Limonium minutum*, uitsluitend te vinden op de Balearen, is de meest voorkomende soort van deze biotoop, gevolgd door de *Limonium formenterae*. Meer plaatselijk verschijnt de *Limonium cossonianum*, de enige uit het geslacht die witte bloemen draagt. Zeevenkel sluit zich vaak aan bij deze soorten en zo vormen ze een karakteristieke plantenassociatie.

De *Diploaxis ibicensis* uit de kruisbloemenfamilie met gele bloemen komt hier ook veel voor. Hoewel de wetenschappelijk naam naar het eiland Ibiza verwijst, komt ze op Formentera erg veel voor. Ze groeit ook aan de kust van Valencia en op de eilanden Cabrera en Mallorca, zij het meer plaatselijk.

Op de kleiner eilanden rondom Formentera, s'Espardell, s'Espalmador of de verschillende eilandjes van es Freus, is de kustbiotoop ook goed vertegenwoordigd.



An aerial photograph of a coastal bay. The water is a vibrant turquoise color, revealing dark, rocky seabeds and patches of seaweed. A small white boat is visible in the middle ground. The bay is bordered by steep, rocky cliffs covered in green vegetation. The sky is a clear, bright blue.

TUSSEN KLIFFEN EN ROTSWANDEN

De kliffen van la Mola, en in mindere mate enkele plekken van Cap de Barbaria, herbergen enkele plantensoorten met een uitzonderlijke ecologische waarde.

In deze gebieden heersen bijzondere microklimatologische omstandigheden die voor een specifieke leefomgeving zorgen waar bepaalde planten een toevluchtsoord vinden. Een voorbeeld daarvan is de Europese dwergpalm (*Chamaerops humilis*), de enige inheemse palmboom van het eiland. Op Formentera groeien ze uitsluitend verscholen tussen de ontoegankelijke rotsen van la Fernanda of punta de sa Creu.

De lythofyten van de rotsformaties van la Mola zijn rijk aan endemische soorten: hier tref je *Biscutella ebusitana*, *Asperula pau*i of *Galium friedrichii* aan, die alle drie uitsluitend op de Pitiusen voorkomen. En de beste populaties van *Saxifraga corsica cossoniana*, een minuscuul plantje met witte bloemen, bevinden zich op vlakke stukken en in rotsspleten van dit gebied.

In deze leefomgeving valt ook de *Scabiosa cretica* (een soort duifkruid) op, een middelhoge struik met spectaculaire roze bloemen.

In de schaduw van rotspieken en in kleine stroompjes groeien verschillende soorten interessante varens.



Asperula pau

Scabiosa cretica



De hoge dichtheid aan zeevogels op deze plekken is bevorderlijk voor het bestaan van stikstofminnende plantengemeenschappen. In de buurt van de vuurtoren van la Mola groeit dan ook veelvuldig de *Salsola oppositifolia* (een soort loogkruid), een forse struik die niet op de rest van de Balearen voorkomt, en *Lycium intricatum* uit de nachtschadefamilie, een andere plant met een zeer beperkte verspreiding op de Balearen.

ENDEMISCHE SOORTEN VAN HET EILAND. DE CHARME VAN HET ZELDZAME

Het isolement van eilanden is bepalend voor de biologische diversiteit en bevordert de evolutie van unieke vormen die aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast. Het begrip endemisme wordt gebruikt om planten, of andere soorten organismen, aan te duiden waarvan de geografische verspreiding zich beperkt tot een bepaald gebied. Het Middellandse Zeebekken wordt beschouwd als een van de gebieden op aarde met de grootste plantendiversiteit, en de Balearen in hun geheel worden beschouwd als een hotspot vanwege de aanwezigheid van een groot aantal endemische soorten.

Formentera telt meer dan twintig endemische planten. Sommige komen ook voor op het eiland Ibiza (endemische soorten van de Pitiusen), of op de rest van de eilandengroep de Balearen. Anderen, zoals de *Silene cambessedesii* komen ook voor in nabijgelegen gebieden zoals de provincie Valencia of de eilanden Corsica en Sardinië, waarmee Formentera botanisch gezien veel overeenkomsten vertoont.



Lycium intricatum

Saxifraga corsica cossonianum



Een van deze endemische soorten, *Delphinium pentagynum formenterianum*, komt uitsluitend op het eiland voor en op geen enkele andere plek ter wereld. Deze plant is iets meer dan twintig jaar geleden beschreven.

Een belangrijk deel van de endemische planten op Formentera is zo goed als onbekend bij de plaatselijke bevolking, voornamelijk vanwege hun zeldzaamheid.

Het is van het grootste belang dat deze voor de wetenschap belangrijke soorten en hun standplaatsen in stand worden gehouden. Wanneer ze verdwijnen hebben we ze voorgoed verloren. Daarom zijn veel soorten wettelijk beschermd of het onderwerp van beschermingsprogramma's.



Biscutella ebusitana

ENDEMISCHE SOORTEN

Allium antoni-bolosii eivissanum
Asperula paui
Bellium bellidioides
Biscutella ebusitana
Carduus ibizensis
Carex rorulenta
Chaenorhinum crassifolium
Chaenorhinum formenterae
Delphinium pentagynum formenteranum
Diplotaxis ibicensis
Galium friedrichii
Limonium formenterae
Limonium grosii
Limonium minutum
Limonium wiedmannii
Micromeria filiformis
Micromeria microphylla
Ranunculus paludosus barceloi
Romulea assumptionis
Saxifraga corsica cossoniana
Silene cambessedesii
Sonchus willkommii
Teucrium capitatum majoricum

Delphinium pentagynum formenteranum is een beschermde plant die uitsluitend op Formentera voorkomt en is op dit moment onderwerp van beschermingsprogramma's



Lees meer ...

www.islabotanica.de

Persoonlijke website over de natuur van Formentera van de natuuronderzoekster Barbara Khlar, pionier op het gebied van ontdekkingen van veel plantensoorten van het eiland.

Virtueel herbarium van de westelijke Middellandse Zee

<http://herbarivirtual.uib.es/>

Website van de Botanische afdeling van de Universiteit van de Balearen. Bevat informatie over het grootste deel van de voorkomende planten op onze eilanden. De website is gestructureerd in informatiebladen voor elk van de behandelde planten.

Flora adlib: *La flora emblemática de Formentera e Ibiza. 2015*

Galeria Balear d'Espècies. Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears

Plantes d'Eivissa i Formentera. Cent tretze plantes significatives. 2019. Institut d'Estudis Eivissencs



Cheirolophus intybaceus, komt veel voor in la Mola.



Consell Insular
de Formentera

www.formentera.es

