

## FLUTOX<sup>®</sup>

Cloperastina Fendizoato 17,7mg/5ml  
Suspensión Oral

### 1. ¿Qué es Flutox suspensión oral y para qué se utiliza?

La cloperastina es el principio activo de este medicamento, es un antitusivo que inhibe el reflejo de la tos. Flutox es un medicamento indicado para el tratamiento de las formas improductivas de tos, como tos irritativa o tos nerviosa para adultos y niños a partir de 2 años. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días de tratamiento.

### 2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Flutox?

No tome Flutox:

- Si es alérgico a la cloperastina fendizoato o alguno de los componentes de este medicamento.
- Si es alérgico a los medicamentos para la alergia (antihistamínicos).
- Si está tomando medicamentos para el tratamiento de la depresión.
- Si está embarazada o cree estarlo o si se encuentra en periodo de lactancia.
- No administrar Flutox a niños menores de 2 años.

### 3. Advertencias y precauciones.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Flutox:

- Si tiene la presión intraocular alta.
- Si le han dicho que tiene hipertrofia de la próstata.
- Si presenta dificultad para orinar.
- Si es hipertenso.
- Si tiene problemas de corazón.
- Si tiene una enfermedad degenerativa muscular llamada miastenia grave.
- Si presenta algún tipo de obstrucción gástrica o intestinal, incluyendo úlcera.
- Si presenta tos crónica por ser fumador, por tener problemas pulmonares o asma.
- Si la tos persiste después de 7 días de tratamiento.

### Niños

Los niños menores de 2 años no pueden tomar este medicamento, está contraindicado.

### 4. Otros medicamentos y Flutox.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Flutox puede interactuar con otros medicamentos tales como:

- Medicamentos para ayudarle a dormir (sedantes, analgésicos opioides, barbitúricos, hipnóticos o benzodiacepinas).
- Medicamentos para la depresión y medicamentos para el tratamiento del Parkinson porque pueden potenciar los efectos adversos de este medicamento.
- Medicamentos expectorantes y mucolíticos utilizados para eliminar el exceso de mocos y flemas, porque al tomar al mismo tiempo que un medicamento para la tos como es Flutox, se puede impedir la eliminación del exceso de moco y producir ahogo.

### Toma de Flutox con alimentos, bebidas y alcohol.

Durante el tratamiento con Flutox no se debe de tomar alcohol ya que puede incrementar los efectos del alcohol.

La toma de este medicamento con alimentos y bebidas no afecta a la eficacia del mismo.

### 5. Embarazo y lactancia.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Está contraindicado en embarazo y lactancia.

### 6. Conducción y uso de máquinas.

Flutox puede producir somnolencia a las dosis habituales. Si así fuera, absténgase de conducir y manejar maquinaria peligrosa.

### Flutox contiene metil parabeno y propil parabeno.

Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene metil parabeno (E-218) y propil parabeno (E-216).

## 7. ¿Cómo tomar Flutox suspensión oral?

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

En adultos y adolescentes mayores de 12 años: Una dosis de 10 ml 3 veces al día.

Niños de 7 a 12 años: Una dosis de 5 ml 2 veces al día.

Niños de 5 a 6 años: 3 ml 2 veces al día.

Niños de 2 a 4 años: 2 ml 2 veces al día.

Flutox está contraindicado en niños menores de 2 años.

Agitar el frasco antes de usarlo.

Este medicamento se toma por vía oral.

Para la correcta administración utilizar el vasito dosificador incluido en el envase.

### Si toma más Flutox del que debe.

Los síntomas de la sobredosis son: excitación y dificultad para respirar.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

### Si olvidó tomar Flutox.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Este tratamiento es sintomático si no tiene tos no lo tome y si la vuelve a tener, tome el medicamento como se indica en la sección ¿Cómo tomar Flutox suspensión oral?

## 8. Posibles efectos adversos.

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos que más se pueden producir, aunque son poco frecuentes son: somnolencia y sequedad de boca.

Los efectos adversos que se pueden producir son:

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes): somnolencia, sequedad de boca (a altas dosis) alteraciones del movimiento, temblores y mareos.

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 pacientes): reacción alérgica, urticaria.

### Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

## 9. Condiciones de almacenamiento.

Almacenar a temperatura inferior a 30°C.

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

## 10. Composición.

Cada 100 mL contiene:

Cloperastina Fendizoato ..... 354 mg

(Equivalente a Cloperastina Clorhidrato 200 mg)

Excipientes ..... c.s.p.

Cada 5 mL contiene:

Cloperastina Fendizoato ..... 17,7 mg

(Equivalente a Cloperastina Clorhidrato 10 mg)

Excipientes ..... c.s.p.

Lista de excipientes: Estearato de polioxil 40, Metilparabeno, Propilparabeno, Sacarosa, Agua purificada, Sabor a coco, Celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

- Si necesita consejo o más información, consulte a su médico o farmacéutico.

*PROSPECTO - INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE*

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.

LUKOLL S.A.C.  
R.U.C. 20507062653